Oeffentliches Sanitätswesen.

Ueber Malaria in Oberschlesien.

Von Dr. Hugo Weissenberg, prakt. Arzt in Tichau (O.-Schl.).

Nachdem durch die ebenso interessanten wie erfolgreichen Forschungen der letzten Jahre der Nachweis geführt worden ist, dass die Erkrankung an Malaria auf die Anwesenheit eines die rothen Blutkörperchen bewohnenden Parasiten zurückzuführen und das Auftreten von Malaria in einer Gegend an das Vorhandensein einer bestimmten, den Parasiten übertragenden Stechmückenart gebunden ist, und nachdem somit die Malaria eine von den am gründlichsten erforschten Infektionskrankheiten geworden ist, muss es wohl von Interesse sein, die Gegenden in Deutschland kennen zu lernen, in welchen die bei uns wohl im Verschwinden begriffene Krankheit heute noch vorkommt.

Am bekanntesten scheinen noch die von Marine-Generalarzt Wenzel 1871 beschriebenen „Marschfieber“ der norddeutschen Tiefebene geworden zu sein, welche ja meistens — oft freilich nichts anderes als Abdominaltyphus — Malariaerkrankungen gewesen sind. Aber auch in diesen um Wilhelmshaven und Hamburg gelegenen Marschdistrikten haben sie im Verlauf des 19. Jahrhunderts stark abgenommen, was, wie Abel¹⁾ hervorhebt, weniger auf die ausgeführten Assanierungsarbeiten, als vielmehr auf den von R. Koch als wichtig betonten Umstand zurückzuführen ist, „dass schon seit dem Anfange des Jahrhunderts regelmässig jeder Malariakranke mit Chinin behandelt, schnell geheilt und damit als

¹⁾ Die Gesundheitsverhältnisse Hamburgs im 19. Jahrhundert. Hamburg 1901, S. 269.

Infektionsquelle ausgeschaltet worden ist, und dies umso mehr, als die in Betracht kommenden Stechmückenarten, nach Feststellungen von Nocht, in den Nordseemarschen, besonders in der Umgegend von Cuxhaven, auch heute noch häufig zu finden sind.“

Aus den kürzlich von Marine-Oberassistentenarzt Dr. Mühlens¹⁾ angestellten eingehenden Untersuchungen und den im Anschluss hieran gemachten Mittheilungen von Dr. Thiele²⁾ geht allerdings hervor, dass in diesen Gegenden die Malaria auch heute noch beträchtliche Verbreitung findet.

Bezüglich des Vorkommens der Anophelesmücke in Deutschland berichtete ferner Eysell³⁾, dass er diese Malariastechmücke in der Nähe von Cassel im Jahre 1900 noch im September und Oktober mehrfach im Freien aufgefunden habe.

Endlich hat vor kurzem Herr Kreiswundarzt Dr. Czygan in Benkheim⁴⁾ von einem ostpreussischen Malariaheerde in dieser Wochenschrift Mittheilung gemacht, wobei er das fast gänzliche Fehlen von Berichten über einheimische Malaria hervorhebt. Es sei daher die folgende Veröffentlichung über das Vorkommen des Sumpffiebers in einem entgegengesetzten Ende des deutschen Vaterlandes gestattet.

Dass insbesondere der oberschlesische Industriebezirk mit seiner von Rauch und Staub erfüllten Luft und den wenigen, dazu zumeist industrielle Abwässer aufnehmenden Wasseransammlungen nicht eben ein geeignetes Gebiet für Malariaerkrankungen abgibt, ist ja nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse von der Verbreitungsweise dieser Krankheit leicht verständlich. Thatsächlich kommen hier — soweit mir wenigstens bekannt geworden — Malariaerkrankungen nicht zur Beobachtung.

Von ihm unterscheidet sich aber bezüglich seines ganzen äusseren natürlichen und kulturellen Aussehens in bedeutendem Maasse der angrenzende Kreis Pless. Abgesehen von jenen beschränkten Bezirken, in welchen der Fürst von Pless die schwarzen Diamanten fördern lässt, weist der grösste Theil dieses Kreises, der vor noch nicht allzulanger Zeit zu $\frac{1}{11}$ mit Wasser bedeckt gewesen sein soll, einen ausgedehnten wildreichen Waldbestand auf, bietet weite Feld- und Wiesenflächen intensivem Landwirthschaftsbetriebe dar und enthält eine grössere Anzahl von Gewässern, welche der Fischzucht nutzbar gemacht werden.

Ogleich mir bekannt war, dass in hiesiger Gegend praktizierende Kollegen an Ort und Stelle erworbene Malariaerkrankungen gesehen und behandelt haben, brachte ich dieser Diagnose Zweifel entgegen, theils weil mir selbst trotz jahrelangen Zuwartens kein Fall zur Beobachtung kam, theils unter Einfluss der in Würzburg verbrachten klinischen Semester, wo ja, da es in einer absolut malariafreien Gegend gelegen, eine Malariaerkrankung zumeist die Quittung über eine kurz vorher geleistete Pilgerfahrt nach Rom gewesen ist. Und doch sprachen manche Momente dafür, dass speziell in meinem Wohnorte Malariaerkrankungen vorgekommen sein müssen. Abgesehen von seinem hierfür vorzüglich geeigneten Gelände — mitten im Dorfe sind mehr als zehn grössere und kleinere Teiche vorhanden — sprach dafür der Umstand, dass unsere hiesige polnisch sprechende Bevölkerung für unser symptomatisches Fieber stets den Ausdruck gorączka gebraucht, während sie unter der Benennung zetcha ein Krankheitsbild kennt, aus deren Symptomenbeschreibung mit Nothwendigkeit auf die einer regelrechten Tertiana geschlossen werden muss. Ueber die Etymologie dieses Wortes zetcha verdanke ich Herrn Fürstlich von Pless'schen Archivar Dr. Zivier die Mittheilung, dass diese dialektische Bezeichnung auf einen Stamm zurückgeht, der im altslawischen žizeti lautet und „brennen“, „heiss sein“ bedeutet, so dass also etymologisch zetcha nichts anderes heisst als „Brand“, „Hitze“. Ob dieses Wort auch anderswo und bei polnischen Aerzten geradezu als Uebersetzung von Malaria im Gebrauch ist, entzieht sich meiner Kenntniss.

Endlich habe ich in diesem Jahre Gelegenheit gefunden, mich durch allerdings nur drei, aber sowohl klinisch als auch mikroskopisch gesicherte Fälle aufs bestimmteste von dem Auftreten von Malariaerkrankungen in hiesiger Gegend zu überzeugen.

In dem ersten Falle handelte es sich um ein 14 Jahre altes Mädchen, Tochter eines Bauerngutsbesitzers, welches am 26. Juni d. J. zu mir kam mit der Angabe, dass es am 21. Mai d. J. morgens 6 Uhr einen etwa zweistündigen Frostanfall bekommen habe, an den sich

eine Fieberhitze von vier Stunden Dauer angeschlossen habe, dass sich seit diesem Tage regelmässig jeden zweiten Tag diese Anfälle wiederholen, also beinahe fünf Wochen lang. In der Zwischenzeit sei sie gesund, allerdings in den letzten Tagen sehr schwach und kraftlos geworden. Die Patientin war von blasser Gesichtsfarbe, die Milz nicht palpabel. Von dem regelmässigen Auftreten des Fieberanfalles (40,1°) und dem gänzlich fieberfreien Zustande in der Zwischenzeit konnte ich mich durch Beobachtung von drei Anfällen persönlich überzeugen. Diese letzten drei Anfälle kamen mit zweistündiger Verspätung. War also klinisch schon an der Diagnose kein Zweifel, so habe ich sie durch die Blutuntersuchung sichern können.

Der zweite Fall betraf einen 49 Jahre alten Häusler aus dem benachbarten Dorfe Urbanowitz, der sich am 1. Juli d. J. mit der selbst gestellten Diagnose zetcha bei mir einstellte. Bei diesem Patienten, der seinen ersten Anfall vor 14 Tagen gehabt hat, war der untere Milzrand deutlich, den Rippenbogen überragend, fühlbar. Auch hier war der Blutbefund positiv.

Der dritte Fall betraf eine 35 Jahre alte Bäuerin aus dem gleichen Dorfe. Sie kam am 16. September d. J. in meine Behandlung mit der Angabe, dass sie seit einem Jahre regelmässig jeden vierten Tag Fieberanfälle erleide, in letzter Zeit seien damit heftig ziehende Schmerzen im ganzen Körper verbunden. Die sichtbaren Schleimhäute der Patientin waren blass, die Milz geschwollen. Es handelte sich hier also um einen Fall von Quartanfeber. Den Parasiten konnte ich im Blutpräparat nicht auffinden, weil ich nur ein einziges Trockenpräparat anzufertigen in der Lage war.

In allen diesen drei Fällen verhinderte 1 g Chininum muriaticum, etwa fünf Stunden vorher mit Acidum muriaticum gegeben, prompt den zu erwartenden Anfall und führte nach weiterer zweimaliger Anwendung Freibleiben von Anfällen herbei.

Was die Blutuntersuchung betrifft, so ist ja kein Zweifel, dass der Geübte sowohl mit dem gefärbten Präparate als auch mit dem frischen Bluttropfen zum Ziele kommt. Jedenfalls muss man wohl Herrn Dr. Czygan beistimmen, dass wenigstens der, welcher nur selten Gelegenheit zu solcher Untersuchung hat, sicherlich bei weitem mehr Befriedigung findet, wenn er den Parasiten lebend im Bluttropfen gefunden hat. Es ist ja damit wie mit der Beobachtung anderer einzelliger Lebewesen, wie Wimperinfusorien, Amöben u. s. w., von deren Lebensäusserungen man sich ja im Trockenpräparat keine Vorstellung machen kann. Im gefärbten Präparat kann ferner dies und jenes zu Täuschungen Anlass geben. Hat man aber einen winzigen Bluttropfen so zwischen Deckgläschen und Objektträger langsam ausgebreitet, dass die Blutkörperchen unversehrt und einzeln neben einander liegen, so scheint eine Täuschung ziemlich ausgeschlossen. Im ganzen Präparat herrscht vollkommene Ruhe, nur hier und da gleitet langsam ein weisses Blutkörperchen dahin, und in seinem Innern folgen die eingelagerten Granula träge den hierdurch hervorgerufenen Saftströmungen; endlich wird das Auge gefesselt durch überaus lebhaft tänzelnde Bewegungen, welche in einem oder zwischen mehreren rothen Blutkörperchen von den zahlreichen kleinen hellbraunen Pigmentkörperchen des Parasiten ausgeführt werden, sicher ein sehr anziehender Anblick. Hat man eine solche Stelle gefunden, dann gelingt es mit Leichtigkeit, sie immer wieder von neuem einzustellen. Freilich muss man wissen, dass oft in einem Präparat nur ein einziges Plasmodium aufzufinden ist und jene Beschreibung nur für das ausgewachsene und mit Pigment erfüllte Stadium des Parasiten Geltung hat.

Was das Vorkommen der Anophelesmücke in hiesiger Gegend betrifft, so habe ich sie im Monat Juli in der Wohnung nur vereinzelt aufgefunden, jedenfalls in verschwindend geringer Zahl gegenüber den zahlreichen Fliegenmücken wie *Corethra plumicornis*, *tanypus*, *chironomus* und den Stechmücken der Gattung *Culex*, insbesondere *Culex pipiens* und des durch seine Grösse ausgezeichneten *Culex annulatus*, von welch' letzterer Ruge angiebt, dass sie sehr gemein ist, Grassi, dass er sie ausschliesslich in Malariagegenden gefunden hat. In den Monaten September und Oktober fanden sich immer mehr Individuen von *Anopheles (maculipennis)* in den Wohnungen. Auch ihre Entwicklungsstätten habe ich in den meisten jener erwähnten Dörfer teiche nachweisen und zahlreiche Larven und Puppen von *Anopheles* mit dem Planktonnetz fangen können. Wenn es auch mit Hilfe der eingehenden Beschreibungen in den neueren Malariaschriften — insbesondere Grassi's prächtigem Malariawerk — leicht ist, die Imago und Larve von *Anopheles* zu erkennen, so ist die Unterscheidung der Puppe von ähnlichen schon schwieriger, und es ist wohl am sichersten, sie bis zum Ausschlüpfen

¹⁾ Deutsche medizinische Wochenschrift 1902, S. 589.

²⁾ Deutsche medizinische Wochenschrift 1902, S. 650.

³⁾ Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene Bd. IV, S. 359.

⁴⁾ Deutsche medizinische Wochenschrift 1901, S. 636.

des Insekts in einem Gläschen Wasser aufzubewahren, was ja bei entsprechender Temperatur nur vier Tage in Anspruch nimmt.¹⁾ Kerschbaumer giebt an, dass *Anopheles* nicht in Gewässern vorkommt, die durchschnittlich tiefer als 1 m sind. Ich habe sie auch an Stellen gefunden, die 1,20 m tief waren. Auch gegen die Qualität des Wassers scheinen sie nicht gar zu empfindlich zu sein, wenigstens habe ich sie auch noch in einem Teiche angetroffen, in welchem fast jedes Daphnienexemplar überzogen war von *Carchesium Lachmanni*, dem als Leitorganismus für schlechtes, verunreinigtes Wasser bekannten Wimperinfusionsthierchen.

Ist somit durch die mitgetheilten Fälle das — wenn auch nicht gerade häufige — Vorkommen von Malaria hierorts nachgewiesen, so dürfte es wohl interessiren, dass die in der Nähe der Kreisstadt Pless in der Weichselniederung an der österreichischen Grenze gelegenen Ortschaften, wie Rudoltowitz, Miedzna, Guhrau u. s. w. eine viel grössere Zahl von Erkrankungsfällen aufweisen. Ich verdanke nähere Mittheilungen hierüber Herrn Kreisarzt Medizinalrath Dr. Broll und den in Pless praktizirenden Collegen Dr. v. Samson und Dr. Caro. Insbesondere von letzterem erfuhr ich, dass ihm in den letzten Jahren durchschnittlich etwa 20 Malariaerkrankungen aus jenen Dörfern zur Beobachtung gekommen sind. Gelegentlich einer mit ihm dahin gemachten Fahrt zeigte sich ein dort seit langen Jahren ansässiger Gastwirth aufs genaueste vertraut mit den Symptomen der Krankheit und gab uns an, dass von den etwa 500 betragenden Bewohnern des Dorfes durchschnittlich etwa 25 jährlich an Wechselfieber erkranken. Als Mittel dagegen halte er wegen der grossen Entfernung nach der nächsten Apotheke abgetheilte Pulver vorräthig, die sich durch die Geschmacksprobe als Chinin erwiesen. Freilich werden wohl die Erfolge damit nicht gerade glänzende gewesen sein, da sie nicht, wie es die wissenschaftlichen Erfahrungen erfordern, in entsprechender Zeit vor den zu erwartenden Anfällen gegeben worden sind. Dass es auch hier an Gewässern, geeignet als Entwicklungsstätten der Stechmücken, keinen Mangel hat, war sehr bald festzustellen.

Ein besonders hohes hygienisches Interesse kommt wohl den ja nicht gerade sehr zahlreichen, gutartig verlaufenden und durch Chinin so prompt zu beeinflussenden Malariaerkrankungen hier nicht zu. Immerhin mag es wohl mittheilenswerth erscheinen, dass auch hier Malaria und *Anophelesmücke* nebeneinander vorkommen. Freilich ist hierdurch nicht das Auftreten der wie in meinem ersten Falle (21. Mai d. J.) im Frühjahr erworbenen Malariafälle ganz aufgeklärt. Dass dieser Fall nur ein Rezidiv aus dem Vorjahre gewesen ist, bleibt vollkommen ausgeschlossen. Wenn auch ferner im diesjährigen Frühjahr eine grössere Zahl warmer Tage gewesen sind, so können sie doch kaum ausgereicht haben, um eine neue Stechmückengeneration so früh zur Entwicklung zu bringen. Es bleibt also vielleicht nur übrig, anzunehmen, dass die Uebertragung durch die in der Wohnung überwinterten und durch die Frühlingssonne zu neuem Leben erweckten *Anophelesmücken* weibchen stattgefunden hat.