ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o 2690.

Schreiben des Directors der Sternwarte in Brüssel, Herrn F. Folie, betreffend die Beobachtung von Vergleichsternen, im Anschluss an Nr. 2688 der A. N.

Aucun travail important ne pouvant être entrepris dans la période de transition où se trouve actuellement l'Observatoire de Bruxelles, et en attendant que les nouvelles installations astronomiques d'Uccle-lez-Bruxelles soient achevées, j'ai l'intention de faire déterminer aux instruments méridiens, tant à Bruxelles qu'à Liège, la position apparente des étoiles de comparaison qui ont servi dans les obser-

vations des comètes et des petites planètes, à commencer par celles qui sont renseignées dans les années 1884 et 1885 de votre revue. Je vous serais obligé si vous vouliez communiquer cette décision à vos lecteurs et les informer que l'Observatoire de Bruxelles se chargera volontiers de la détermination des étoiles de comparaison qu'ils voudraient lui communiquer.

Bruxelles le 17 Octobre 1885.

F. Folie.

Determination of the effect of the magnitude of a star on the observed time of its transit, by means of wire screens.

As far as I know, the usual method of observation through screens is as follows:

- I. The illumination of the field is reduced so as to allow the transits of faint stars (8-9 mag.) to be observed, and a bright star (1-3 mag.) is observed through the screens over n wires, which reduced to the middle thread give A .
- II. The screens are removed and the bright star is observed, at the same transit, over n other wires, which reduced to the middle thread give B .

If the screens reduce the magnitude by C then $\frac{A-B}{C}$

is assumed to be the effect per magnitude, and is to be applied to observed right-ascensions.

I wish to point out that it is very important that in process II the illumination of the field shall be increased to its normal state for bright stars. Otherwise there is a strong tendency to observe a limb of the bright star against the (faint) wire, and not to observe its centre over the (distinct) wire as usual. $A-B$ has thus no meaning and should it be applied to the observed RA., errors will arise due to this cause.

Washburn Observatory, University of Wisconsin, 1885 August 17.

Edward S. Holden.

Zusatz des Herausgebers. Die Bemerkung von Herrn Holden scheint mir durchaus zutreffend; es wird Gewicht darauf zu legen sein, dass die Beobachtung des hellen und abgeblendeten Sterns unter den gewöhnlichen Umständen vor sich geht. Bei den Beobachtungen, die ich am Helsingforscher Passageninstrument in dieser Hinsicht anstellte und welche den Unterschied zwischen den Antritten des hellen und abgeblendeten Sterns für mich gleich Null ergaben, konnte ich vom Ocular aus momentan die für die Helligkeit des Sterns passende normale Beleuchtung herstellen.

Kr.

Berichtigung zu „On the Right Ascensions of certain fundamental Stars“ in Nr. 2687.

In the comparisons with various authorities please add the following quantities to the values of α 1875.0 and (O—C):

	Pulk. 1845	Gr. 1861	Pulk. 1865	Pulk. 1871	Gr. 1872
ν Ursae maj.	—0.015	—0.008	—0.006		
γ Ursae min.	—0.111	+0.044	—0.040		
19 Ursae min.		+0.060		+0.020	+0.019
48 H. Cephei		—0.042		—0.012	—0.009
η Ursae min.		+0.266		+0.076	+0.057

These corrections in no wise affect the conclusions deduced, but on the contrary tend to strengthen the case for γ and η Ursae Minoris.

Cambridge, Mass., 1885 Oct. 6.

S. C. Chandler jr.