Die Grössenklassen der Bonner Durchmusterung.

Im Jahre 1871 begann ich mit dem an einem 5 zöll. Fernrohre angebrachten Zöllner'schen Photometer der Pulko-waer Sternwarte eine grössere Messungsreihe, welche zum Zwecke hatte, das photometrische Verhältniss der Sterngrössen der Bonner Durchmusterung auf Grundlage möglichst genauer Messungen zu ermitteln. Wenn auch der detaillirte Plan dieser Arbeit, aus Mangel an Vorarbeiten auf diesem Felde, erst allmählig, Schritt für Schritt, aus der Erfahrung sich ausgebildet hat, so hatte ich doch schon von vorne herein mir dabei zu Hauptbedingungen gemacht, die gefährlichsten Feinde der photometrischen Messungen: die Extinction mit ihren höchst wahrscheinlich täglichen wie jährlichen Aenderungen, und die vorübergehenden localen Lufttrübungen möglichst aus den Beobachtungen auszuschliessen. Zu ersterem Zwecke wurden, nach Rosén's Vorgange, zum Durchmessen nur solche Theile des Himmels ausgewählt, wo Sterne möglichst verschiedener Grössen auf einem Raume von ein paar Quadratgraden zusammenstehen, um für jede solche Gruppe von Sternen einzeln den Helligkeitscoefficienten unabhängig von der Extinction abzuleiten. Um die Aenderungen der Durchsichtigkeit der Luft auszuschliessen, wurde jede Gruppe erst in bestimmter Reihenfolge durchgemessen und darauf in der umgekehrten Reihenfolge zurück; bei solcher Anordnung dürften während der Beobachtungen auftretende Lufttrübungen wohl kaum unbemerkt geblieben sein, und, wo sie allmählig auftraten, sich zum grossen Theile aus den Resultaten eliminirt haben.

Die erste der genannten Bedingungen beschränkte natürlicherweise bedeutend das Beobachtungsmaterial. Die Bonner Durchmusterung bot mir unter dieser Bedingung, ausser den von Rosén benutzten Sternen, 85 Gruppen, welche gegen 480 Sterne umfassen. Da jedoch in diesen Gruppen die Sterne verschiedener Grössen noch nicht gleichmässig genug vertreten waren, fügte ich noch 36 hellere, paarweise nahe bei einander stehende Sterne hinzu. Aus diesem Arbeitscatalog mussten jedoch bei der Revision der erhaltenen Beobachtungen 1) diejenigen Sterne, welche schwächer als 9^m sind, 2) solche Gruppen, in denen ich unbekannte Veränderliche voraussetzen muss, weggelassen werden, worauf die Anzahl der für meinen Zweck brauchbaren Sterne auf 434 herabsank, unter denen sich

83	Sterne	3.-5. Grösse
61	»	5.-6. »
92	»	6.-7. »
101	»	7.-8. »
97	»	8.-9. »

befinden. Die photometrischen Messungen dieser Sterne wurden so regelmässig, wie es der Zustand des Himmels gestattete, fortgeführt und im Jahre 1883 vollständig geschlossen. Geraume Zeit erforderten darauf die Untersuchungen und Ueberlegungen in Betreff der Bearbeitungsweise dieses Materials.

Eine weitere Verzögerung entstand durch den sonst höchst willkommenen Umstand, dass Herr Prof. Pickering mir den gütigen Vorschlag machte, einen bedeutenden Theil der von mir beobachteten Sterne auch in Cambridge mehr-

mals zu messen. Die Vergleichung der Cambridger Beobachtungen mit den meinigen für beiläufig 220 Sterne ergibt durchweg eine so schöne Uebereinstimmung, wie sie a priori kaum zu erwarten war, und giebt mir somit das Zutrauen, dass die aus meinen Beobachtungen sich ergebenden Resultate auf sicherer Grundlage beruhen. Die mittlere Differenz Pickering — Lindemann beträgt für Helligkeitsunterschiede bis zu 4 Grössen bloss $+0.06$ einer Grösse oder $+0.024$ des Helligkeitslogarithmus und bleibt innerhalb dieser Grenzen für alle Helligkeitsunterschiede constant; erst bei Unterschieden, die mehr als 4 Grössenklassen betragen, wird sie etwas grösser, in einem Betrage, zu dessen genauerer Feststellung ich noch weitere Harvard-College Messungen abwarten muss.

In diesen Tagen habe ich die Berechnung meines sämtlichen Beobachtungsmaterials beendet und, indem ich sowohl dieses Material wie die Auseinandersetzung der Behandlungsweise desselben einer ausführlichen speciellen Publication vorbehalte, deren Druck erst nach einiger Zeit wird beginnen können, erlaube ich mir im Folgenden die von mir erlangten Resultate dem Leserkreise der A. N. vorzulegen.

Das mittlere logarithmische Helligkeitsverhältniss zweier benachbarten Grössenklassen (β) der Bonner Durchmusterung für sämtliche von mir gemessenen Sterne zwischen 3. und 9. Grösse ergibt sich aus meinen nach der Methode der kleinsten Quadrate berechneten Gruppen zu

$$\beta = 0.384 \pm 0.005$$

und aus den helleren, wie oben gesagt, zur Ausgleichung der Anzahl der verschiedenen Sterne hinzugezogenen Sternen zu

$$\beta = 0.298 \pm 0.012.$$

Indem ich diese beiden Werthe mit dem von Rosén gefundenen

$$\beta = 0.393 \pm 0.008$$

unter Berücksichtigung der den w. F. entsprechenden Gewichte zusammenziehe (was ich bei der vollkommenen Uebereinstimmung meiner Beobachtungen mit den Rosén'schen für vollständig berechtigt halte, und wodurch zugleich das meinem Plane entsprechende Beobachtungsmaterial der Bonner Durchmusterung nahezu erschöpft wird), erhalte ich als definitiven Werth:

$$\beta = 0.378 \pm 0.004.$$

Aus der paarweisen Vergleichung der Sterne von benachbarten Grössen ergibt sich β für die verschiedenen Grössenklassen wie folgt:

Für Sterne	β	w. F.	Zahl der zu Grunde liegenden Sternpaare
3 ^m - 5 ^m	0.291	± 0.007	48
5 - 6	0.303	± 0.007	78
6 - 7	0.394	± 0.008	88
7 - 8	0.392	± 0.016	103
8 - 9	0.437	± 0.018	74
	$\frac{1}{2}\beta$	w. F.	
9 - 9.5	0.397	± 0.024	27

Die Sterne zwischen $9^m.0$ und $9^m.5$ sind, wie oben bemerkt, bei meiner Ableitung des mittleren β nicht benutzt, weil sich schon vor der endgültigen Berechnung zeigte, dass ihnen ein ganz anderer Helligkeitscoefficient zukommt, wie allen übrigen. Wie man sieht, ist für dieselben $\frac{1}{2}\beta$ ungefähr ebenso gross wie β für die übrigen Sterne, d. h. die Sterne $9^m.5$ der Bonner Durchmusterung sind wenigstens als 10^m zu bezeichnen und sehr oft noch schwächer.

Der auffallend regelmässige Gang in den wahrscheinlichen Fehlern der β für die einzelnen Grössenklassen erweckt zunächst die Frage, ob die sich in demselben äussernde grössere Ungenauigkeit der Bestimmung der schwächeren Sterne in meinen Messungen oder in den Grössenschätzungen der Durchmusterung zu suchen sei. Allerdings zeigen die w. F. meiner Messungen an einem einzelnen Abende, dass ich, wie auch einige andere Photometriker, die schwächeren Sterne etwas weniger genau beobachtete, als die helleren, aber dieser kleine Unterschied verschwindet vollkommen in den weit grösseren Abweichungen der verschiedenen Abende von einander, indem die letzteren auch nicht die Spur einer Ungleichheit in der Beobachtung der Sterne verschiedener Helligkeit zeigen, wie deutlich aus der folgenden Zusammenstellung der mittleren Abweichungen verschiedener Abende von einander nach den Grössen der Sterne zu sehen ist:

Sterne	Mittl. Abweich. verschiedener Abende von einander
$3^m - 4^m$	0.054
4 - 5	0.057

Pulkowa 1887 Nov. 20.

Sterne	Mittl. Abweich. verschiedener Abende von einander
$5^m - 6^m$	0.060
6 - 7	0.050
7 - 8	0.058
8 - 9	0.060

Da nun aber jedes einzelne β durchweg ein Mittel aus mehreren (meist 3 bis 4) Beobachtungsabenden ist, so spricht wohl diese Zusammenstellung entschieden gegen die Möglichkeit, den oben erwähnten Gang in den w. F. der β aus meinen Beobachtungen zu erklären. Es scheint mir deshalb keine andere Erklärung offen, als die Annahme, dass die Grössenschätzungen der Durchmusterung für die helleren Sterne genauer sind als für die schwächeren. Der Umstand, dass die β für die helleren Sterne kleiner ausfallen als für die schwächeren, dürfte vielleicht eine Erklärung darin zu suchen erlauben, dass zugleich die Stufen für die helleren Sterne kleiner waren und somit einen geringeren Spielraum für die Abweichungen der Schätzungen gewährt haben. Wie man sieht, trennen sich die β in zwei deutlich auseinander stehende Categorien, in runden Zahlen: $\beta = 0.300$ für die mit blossen Auge sichtbaren Sterne, und $\beta = 0.400$ für die teleskopischen bis zur 9. Grösse; eine dritte Kategorie würden die noch schwächeren Sterne mit einem noch viel grösseren β bilden. Dass die Grössenschätzungen für diese verschiedenen Categorien von Sternen verschieden genau ausfallen können, oder sogar müssen, dürfte von vorne herein anzunehmen sein.

Ed. Lindemann.

Literarische Anzeige.

Geschichte der Bahnbestimmung von Planeten und Cometen. I. Theil. Die Theorien des Alterthums. Von Dr. N. Herz, Leiter der v. Kuffner'schen Sternwarte in Wien.

Der vorliegende erste Theil des Werkes ist den Bestimmungen der Bahnelemente der grossen Planeten im Alterthum gewidmet. Die verschiedenen Methoden der Bahnbestimmung in der neueren Zeit in ihrer historischen Entwicklung sollen im zweiten Theile auseinander gesetzt werden.

Von den astronomischen Kenntnissen der Alten ist alles dasjenige mitgetheilt, was mit der Bestimmung der Bahnelemente im Zusammenhange steht, dies aber, soweit es ging, bis in die älteste historische Zeit zurückverfolgt. Im ersten Capitel sind diese ältesten astronomischen Forschungen zusammengestellt, sodann die Theorie der homocentrischen Sphären des Eudoxus in analytischer Darstellung, die analytische Prüfung auf ihre Zulänglichkeit und Güte, die Verbesserung des Calippus und die physikalische Theorie des Aristoteles gegeben. Endlich wird der Uebergang zur

Theorie der Epicyklen durch die Regel des Apollonius behufs Bestimmung der Stationen eines Planeten unter der Voraussetzung der epicyklischen Bewegung angeschlossen.

Die eigentliche Theorie der Epicyklen nach Hipparch wird im zweiten Capitel behandelt. Die Sonnen- und Mondtheorie des Hipparch sind ausführlich dargestellt, die Rechnungen zumeist neu durchgeführt. Im Anschlusse hieran folgen die Berichte der römischen Schriftsteller, unter denen Plinius Bahnelemente für die Planeten, wenngleich in sehr confuser Darstellung giebt.

Im dritten Capitel werden die Planetentheorien des Ptolemäus und im 4. Capitel die Breitenbewegungen des Almagest behandelt; für die letzteren wird eine dem Texte des Almagest sich völlig anschliessende neue Erklärung gegeben. Endlich wird aus den im Almagest angeführten Planetenbeobachtungen die oft auftretende Meinung widerlegt, dass Ptolemäus seine Beobachtungen einer willkürlichen Theorie anpasste.

H.

Inhalt:

Zu Nr. 2816. N. Herz. Mittheilungen über die von Kuffner'sche Sternwarte in Wien-Ottakring. 113. — N. Herz. Notiz zur Störungsrechnung. 117. — F. K. Giesel. Ueber die geringste Phase, welche bei der Beobachtung von Sonnenfinsternissen mit freiem Auge noch gesehen werden kann. 119. — J. Bauschinger. Beobachtung der partialen Mondfinsterniss 1887 Aug. 3. 121. — J. Franz. Beobachtungen des neuen Sterns von 1885 im Andromedanebel. 123. — E. Lindemann. Die Grössenklassen der Bonner Durchmusterung. 125. — Literarische Anzeige. 127.