Heinrich Stromberg: Zur Frage über die Umwandlung wichtiger biologischer Eigenschaften bei Bakterien der Enteritisgruppe. (Zentralbl. Bakteriol. I. Abt., Orig., 1911, 58, 401—445.) — Sobernheim und Seligmann haben bei Untersuchungen über das agglutinatorische Verhalten von Enteritisbakterien sprunghafte Veränderungen bei einigen Stämmen beobachtet, indem Stämme der Gärtner-Gruppe Neigung zur Bildung von Sondertypen und zu Rückschlägen in den Haupttypus zeigten, andererseits Paratyphusstämmen gelegentlich starke Herabsetzung oder Verlust der Reaktionsfähigkeit zeigten, dafür aber Agglutinierbarkeit für Gärtner-Sera erwarben. Dabei aber ging das antigene Vermögen dieser Stämme merkwürdigerweise der Wandlung der Agglutinierbarkeit nicht parallel, während andererseits wieder mit dieser Veränderungen in der Kolonienform auf Agar verbunden waren. Verf. hat diese Verhältnisse an 21 Enteritis-Stämmen (9 Gärtner-, 12 Paratyphus-Typus) nachgeprüft und folgendes festgestellt: Mittels der Agglutination konnte in der Mehrzahl der untersuchten Stämme Gärtner- und Paratyphus-Typus scharf getrennt werden. Einige Stämme ließen sich agglutinatorisch schwer oder gar nicht identifizieren, dagegen war das kulturelle Verhalten unverändert. Diese atypischen Kulturen faßt Verf. als in Degeneration begriffene Stämme auf. Während der siebenmonatlichen Beobachtungszeit traten keine Veränderungen der typischen und atypischen Stämme auf, sodaß jeder Beweis für eine in kurzer Zeit erfolgende Umwandlung in eine andere Art fehlt. Zwischen der Kolonienform auf Agarplatten und dem agglutinatorischen Verhalten wurde ein Zusammenhang bei den Enteritisbakterien nicht gefunden; bei der Gärtner-Gruppe kommt ebensowenig wie der Paratyphusgruppe ein einheitlicher Kolonietypus vor. Das Auftreten mehrerer Kolonieförmigkeiten in einer Kultur scheint auf den Beginn einer Degeneration hinzuweisen; in Verbindung damit zeigen die getrennt herangezuchteten Tochterstämmen, die im allgemeinen die Eigenschaften der Mutterkultur tragen, im Rahmen der Mitagglutination gewisse Differenzen, die auf eine Veränderung des spezifischen Rezeptorenapparates schließen lassen. *A. Spieckermann.*

Reiner Müller: Mutationen bei Typhus- und Ruhrbakterien. (Zentralbl. Bakteriol. I. Abt., Orig., 1911, 58, 97—106.) — Typhus- und gewisse Pseudodysenteriebakterien wachsen auf Nähragar mit 1% Rhamnose ähnlich wie *Bacterium coli mutabile* auf Lactoseagar unter Bildung von Knopfkolonien. Verf. spricht das Entstehen dieser Kolonien als Mutation an, als deren Ursache er eine „Rezeptorenverstopfung“ der Typhusbakterien durch die als Nährstoff ungeeignete Rhamnose betrachtet, die dann von einzelnen Individuen durch Mutation überwunden wird. Er empfiehlt diese Knopfbildung als das sicherste diagnostische Merkmal für Typhusbakterien. Auch in älteren Gelatinekulturen von Typhusbakterien beobachtete er mutationsartige Wachstumserscheinungen. *A. Spieckermann.*

H. Kunz-Krause: Über ein neues Kappengläschen mit verstellbarem Tropfstab neuer Konstruktion für mikroskopische Zwecke. (Pharm. Zentralh. 1912, 53, 36—37.)

Fabre-Domergue und R. Legendre: Verfahren zum Nachweis des *Bacterium coli* in anaeroben Kulturen in Wasser und Austern. (Compt. rend. 1910, 151, 1401—1403; Chem. Zentralbl. 1911, I, 692.)

Wein.

J. Laborde: Zur Charakterisierung von Bleicherten und Weißweinen aus roten Trauben. (Annal. des Falsific. 1911, 4, 389—391.) — Mit Bezug auf seine erste Mitteilung über genanntes Thema (*Z.* 1912, 24, 761) macht Verf. auf folgende Unterschiede zwischen Rotwein und Bleichert aufmerksam: Der Gesamt-Gerbstoffgehalt liegt bei den aus Preßsaft hergestellten Bleicherten unter 1 g pro Liter und kann bei den aus normalem Most durch 24-stündige Gärung hergestellten Proben bis zu 2 g steigen. Bei Rotweinen ist er beträchtlich höher. Das Verhältnis

Farbstoff: Önotannin ist durchschnittlich 1 bzw. 0,66, während es bei Rotweinen bedeutend niedriger ist. Die durch Bleichen mit Tierkohle oder schwefliger Säure aus Rotweinen hergestellten Weißweine geben beim Erhitzen mit Salzsäure auf 120° eine spezifische Färbung. Verf. fordert diese Reaktion bei möglichst vielen Weinen auszuführen, um Vergleichswerte aufstellen zu können. *C. Grimme.*

J. Ogier und Richaud: Über die Anwendung von schwefliger Säure bei der Weinbereitung. (Annal. des Falsific. 1911, 4, 197—214.) — Auszug aus dem Bericht des Ministeriums an den Conseil supérieur d'Hygiène publique de France. Der Conseil nahm folgende Resolution an: Der Erlass einer neuen Verordnung, welche sowohl die Menge der freien wie auch der gebundenen schwefligen Säure begrenzt, ist dringend notwendig. Von hygienischem Standpunkte aus ist es unbedenklich, den Gehalt an freier schwefliger Säure auf 100 mg pro Liter zu normieren, die Maximalmenge an gebundener schwefliger Säure auf 350 mg, die Gesamt-Schweflige-Säure also auf 450 mg pro 1 l festzusetzen. Überschreitungen dieser Maximalwerte bis zu 10% sollen geduldet werden. *C. Grimme.*

P. C. Mestre: Schweflige Säure im Weißwein. (Annal. des Falsific. 1911, 4, 266—276 und 338—344.) — Bericht an den Congrès du Syndicat national des Vins, Cidres, Spiritueux et Liqueurs de France. Verf. hat 103 Weißweine der Jahrgänge 1893—1909 aus der Gironde und 34 Weißweine ohne Jahreszahl untersucht. Bestimmt wurden Extrakt, reduzierender Zucker, Gesamtsäure, freie schweflige Säure, gesamtschweflige Säure nach Ripper und nach Haas und Schwefelsäure sowie die Drehung nach Blarez. Berechnet wurden der Gesamt-Alkoholgehalt (gefundenen Alkohol + Alkohol, berechnet aus reduzierendem Zucker: 18), das Verhältnis $\frac{P}{\alpha}$ und

das Verhältnis $\frac{SO_2}{P}$, welches den Gehalt an schwefliger Säure pro g Zucker angibt.

Bei der Bestimmung der freien schwefligen Säure und der schwefligen Säure nach Ripper wurde eine Korrektur von — 0,14 mg pro Liter angebracht, entsprechend der Menge Jod, welche von 1 Liter Most absorbiert wird. Die erhaltenen Analysenwerte sind in drei ausführlichen Tabellen zusammengestellt. Aus ihnen lassen sich folgende Schlüsse ziehen: Die Grenzen, innerhalb welcher der Gehalt an schwefliger Säure schwankt, sind sehr weit. Gesamtschweflige Säure 535—23, freie schweflige Säure 160—11,5 mg pro Liter. Das Maximum an gesamtschwefliger Säure betraf einen 1907-er Wein mit einem Gehalt an 69 mg freier schwefliger Säure pro Liter, das Maximum an freier schwefliger Säure ebenfalls einen 1907-er Wein mit 348 mg gesamtschwefliger Säure pro Liter. — Für dieselbe Klasse von Weinen besteht keine klare Beziehung zwischen der gebundenen schwefligen Säure und der gesamtschwefligen Säure, auch nicht zwischen diesen und der freien schwefligen Säure. Der höchste Prozentsatz an schwefliger Säure wird nicht unbedingt bei den süßesten Weinen gefunden. Dagegen scheint bei den trockenen Weinen die freie schweflige Säure leichter in den gebundenen Zustand überzugehen. Das höchste Verhältnis $\frac{SO_2}{P}$ besteht

bei den zuckerreichen Weinen. In 88% aller untersuchten Weine gab die Methode von Ripper höhere Werte wie die Methode von Haas; letztere Methode ist die genaueste. —

Das Verhältnis $\frac{P}{\alpha}$ scheint als Kriterium für die Natur und die Herkunft eines Weines

brauchbar zu sein. Der Alkoholgehalt schwankte bei den likörartigen Weinen der Sauterne und vom rechten Ufer der Garonne zwischen 11,35—21,30 mit einem Mittel von 16,70, bei den Weinen von Graves zwischen 10,83—14,76 mit einem Mittel von 12,35 und bei den Weinen aus dem Bezirk Entre-deux-Mers zwischen 9,32—13,52 mit einem Mittel von 11,37 Volum-%. Die Umwandlung und Verteilung der schwefligen Säure

in den Mosten und Weinen verläuft in unregelmäßiger Weise. — Verf. schlägt für die Neuregelung des Gesetzes vor: Die Einteilung der Weine in verschiedene Klassen bedarf noch der Beschaffung reichhaltigen Analysenmaterials; die allein zu berücksichtigende Form der schwefligen Säure ist die freie Säure; sie darf zu 100 mg im Liter enthalten sein mit einer Toleranz von 10 %. Die gebundene schweflige Säure ist als physiologisch unschädlich außer acht zu lassen.
C. Grimme.

Th. v. Fellenberg: Untersuchung von Bleiniederschlägen in Wein; Pentose- und Methylpentosebestimmung in Trauben und Wein. (Mitteil. a. d. Gebiete d. Lebensmittelunters. und Hygiene, veröffentlicht v. Schweizer. Gesundheitsamt 1912, **3**, 213 bis 227.) — Von der Tatsache ausgehend, daß wohl durch basisches Bleiacetat (Bleiessig), nicht aber durch neutrales Bleiacetat (Bleizucker) im Wein starke Fällungen eintreten, hat Verf. eine Trennung einiger im Wein vorhandener Stoffe und ihre quantitative Bestimmung auszuführen versucht, um Anhaltspunkte für die Erkennung von Trester- oder überstreckten Trockenbeerweinen zu erhalten. So wurde auch der gesamte Bleiniederschlag ausgeschleudert, die Flüssigkeit von dem Niederschlag möglichst getrennt und dieser wieder mit Alkohol-Äther aufgewirbelt sowie nochmals stark zentrifugiert. Man erhält dann ein konstantes Volumen, das, wenn man das Ausschleudern in einem vom Verf. konstruierten Zentrifugierröhrchen (Firma Hegershoff in Leipzig) vornimmt, zur vergleichweisen quantitativen Bestimmung des Niederschlagsvolumens führen kann. Die Fällung wird dabei besser mit basischem Bleinitrat als mit Bleiessig ausgeführt. Die nach dem Zentrifugalverfahren gewonnenen Werte schwanken bei Naturweinen übrigens ziemlich stark. Die Trockenbeerweine des Handels geben sehr niedrige Zahlen. Vom Verf. selbst bereiteter Trockenbeerwein gab dagegen eine recht hohe Zahl. Die Tresterweine zeigen keine abnormen Werte. — Verf. untersuchte dann weiter die Zusammensetzung des Bleiniederschlags. Durch Zugabe von kohlensaurem Kalk fällt zunächst ein Teil der Weinsäure und der Phosphate aus, durch den darauffolgenden Zusatz von Bleizuckerlösung fällt der Rest der Weinsäure, die Äpfelsäure und die Phosphorsäure sowie ein Teil der schwefligen Säure. Wird hiervon abfiltriert und das Filtrat mit Bleiessig oder basischem Bleinitrat versetzt, so wird zunächst die Bernsteinsäure und der Rest der schwefligen Säure gefällt, dann Spuren Gerbstoff und Farbstoff bei Rotweinen, Inosit, Pektin, Pentosen und Methylpentosen. Die Hauptmenge des Pektins ist aber in Form von Parapektin vorhanden und schon durch neutrales Bleiacetat ausfällbar. Die Methylpentose des Weines verdankt wenigstens teilweise dem Pektin ihren Ursprung. Um dieser Frage nachzugehen, wurden Pentosen und Methylpentosen in den einzelnen Bestandteilen bestimmt. Verf. kommt zu dem Schluß, daß die Trauben Pentosen und Methylpentosen in freier, durch basisches Bleinitrat nicht fällbarer Form sowie in fällbarer Form, wahrscheinlich als Pentosen und Methylpentosen enthalten. Der Traubensaft zeichnet sich durch starkes Vorherrschen von Methylpentosen aus, die Tresterbestandteile, Hülsen, Kerne und Kämme, durch ihren höheren Gehalt an Pentosen. Die Trockenbeerweine des Handels enthalten sehr wenig Pentose und Methylpentose. Tresterweine unterscheiden sich von Naturweinen durch ein anderes Verhältnis dieser beiden Zuckerarten. Außer den genannten Stoffen wurden im Bleiniederschlag noch Andeutungen vorgefunden, die auf das Vorhandensein einer weiteren Säure, sogenannte Molisch-Reaktion, hindeuten.
A. Behre.

Th. v. Fellenberg: Über eine Farbenreaktion des Weines. (Mitteil. a. d. Gebiete d. Lebensmittelunters. und Hygiene, veröffentlicht v. Schweizer. Gesundheitsamt 1912, **3**, 228—231.) — Verf. berichtet über einen neuen Weinbestandteil, der mit Vanillin und Salzsäure, ähnlich wie Phloroglucin und Gerbstoff, eine rote Färbung liefert und den Verf. auf Grund einiger charakteristischer Reaktionen als einen ungesättigten Alkohol anspricht. Jedenfalls ist er weder saurer noch alkalischer Natur. Um störende

Bestandteile des Weines unschädlich zu machen, verfährt Verf. im Einzelfalle folgendermaßen: 10 ccm Wein werden im Scheidetrichter mit 10⁰/o-iger Natronlauge versetzt, bis der Farbumschlag eintritt (etwa 0,5 ccm), dann werden 20 ccm Äther zugegeben und 200-mal durchgeschüttelt, worauf man die Schichten trennt und den Äther im kleinen Erlenmeyer-Kolben verdampft. Der Rückstand wird mit 2,5 ccm konc. Salzsäure und einigen Kryställchen Vanillin versetzt und mit 2,5 ccm 20⁰/o-iger Salzsäure verdünnt. Nach 10 Minuten wird die Intensität der Lösung im Reagensglas mit einer Säurefuchsinlösung verglichen, die 0,1 g des 3 Stunden getrockneten Farbstoffs in 100 ccm enthält. Hiervon werden 0,1 ccm in ein gleichlumiges Reagensglas gebracht und so lange mit Wasser verdünnt, bis beide Lösungen gleiche Intensität haben. Wenn a die Anzahl ccm der verdünnten Fuchsinlösung ist, so ist $x = \frac{50}{a}$ die Menge des die

Reaktion bedingenden Körpers, ausgedrückt in mg Säurefuchsin pro Liter. — Tresterweine geben oft keine Färbung, desgleichen Trockenbeerweine. Durch negativen Ausfall der Reaktion könnte ein schon vorhandener Verdacht auf diese Weine verstärkt werden. Im übrigen hat sie wenig Wert, bei Verschnitten ist sie unbrauchbar. Es wurden Zahlen von 0 bis 41,7 beobachtet. *A. Behre.*

Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik. Berichtsjahr 1909/1910. Teil I. Weinstatistische Untersuchungen. (Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte 1911, **39**, 1—169.) — Die 8. Jahresversammlung der Kommission für die amtliche Weinstatistik fand am 29. und 30. September 1910 in Trier unter dem Vorsitz des Präsidenten des Kaiserlichen Gesundheitsamtes statt. Es nahmen daran teil: als Kommissare der preußischen Regierung der vortragende Rat im Ministerium der geistlichen usw. Angelegenheiten Dr. Abel, Regierungsrat Schrakamp-Trier und Ökonomierat Ehatt-Trier; vom Kaiserlichen Gesundheitsamte Direktor Dr. Kerp und Regierungsrat Dr. Günther; von der Biologischen Anstalt Direktor Dr. Behrens; als Vertreter von Preußen Dr. v. d. Heide und Prof. Dr. Kroemer-Geisenheim, Dr. Petri-Koblenz, Dr. Stern-Kreuznach und Dr. Wellenstein-Trier; von Bayern Prof. Dr. Paul-München, Prof. Dr. Omeis-Würzburg und Prof. Dr. Krug-Speyer; von Württemberg Prof. Dr. Meissner-Weinsberg und Prof. Dr. Windisch-Hohenheim; von Baden Dr. Stang-Augustenberg, von Hessen Prof. Dr. Mayrhofer-Mainz und Prof. Dr. Weller-Darmstadt; von Elsaß-Lothringen Prof. Dr. Kulisch-Colmar und Prof. Dr. Amthor-Straßburg; von Luxemburg Weinkontrolleur Wengler-Grevenmacher, Chemiker Medinger-Luxemburg und Weinbau-Sachverständiger Faber-Grevenmacher; außerdem Oberbürgermeister v. Bruchhausen und Rentmeister Michels-Trier. — Infolge der ungünstigen Witterung des Sommers 1910 und des verheerenden Auftretens von Rebenschädlingen (neben Peronospora vor allem der Heu- und Sauerwurm) ist die Weinernte völlig mißraten. Der Gesamtertrag betrug nur 846139 hl Most gegenüber dem jährlichen Durchschnittsertrag der Jahre 1902—1909 von 2955747 hl. Versuche über den Säurerückgang in gezuckerten und ungezuckerten Weinen sind wiederum mehrfach angestellt worden. Untersuchungen von Krug ergaben im Einklang mit früheren Beobachtungen, daß ein höherer Alkoholgehalt den Säurerückgang ungünstig beeinflusst, indem er dem Säurezerfall der Äpfelsäure entgegen wirkt. Kulisch fand bei Versuchen mit sehr geringen sauren Mosten im allgemeinen einen den Säureabbau begünstigenden Einfluß von erhöhter Temperatur und von der Zuckering. Auch die Versuche von Omeis mit Frankenweinen haben die günstige Wirkung höherer Temperatur auf den Säurerückgang gezeigt. In der Besprechung über Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen berichten Krug und Kulisch über die guten Erfolge mit Nicotin gegen den Heu- und Sauerwurm. Die Kommission bezeichnet es als wünschenswert, die Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes besonders unter Verwendung von Nicotin fortzusetzen. — Nach den Berichten v. d. Heiden's und Meissner's über Gärversuche mit

Ammoniumcarbonat spricht die Kommission ohne Ausnahme die Meinung aus, daß ein Bedürfnis, Gärtsalze bei der Weinbehandlung zuzulassen, nicht vorliege. — In seinem Vortrage über die Zuckerbestimmung im Wein empfiehlt Kulisch, das Filtrieren und Glühen des Kupferoxydul-Niederschlags im Gooch'schen Platintiegel vorzunehmen und das Kupferoxyd zu wägen. Von besonderem Vorteil ist dies Verfahren deshalb, weil man ohne Neufüllung des Tiegels 30 und mehr Niederschläge auf derselben Asbestschicht abfiltrieren kann. — Über die Bestimmung des Glycerins nach dem Jodidverfahren von Zeisel und Fanto (vergl. *Z.* 1909, **17**, 735) teilt Windisch Versuchsergebnisse mit. Bei reinem Glycerin wurden sehr genaue, bei künstlichen weinähnlichen Gemischen und bei Weinen, denen gewogene Mengen Glycerin zugesetzt war, gut übereinstimmende Ergebnisse erzielt. Hoher Zuckergehalt war fast ohne Einfluß, Mannit dagegen sehr schädlich. Im Vergleich mit dem üblichen Kalkverfahren war die Übereinstimmung meist gut, der Unterschied in der Regel nicht größer als 0,03, bisweilen aber auch größer, bis 0,08 g in 100 ccm. Beim Jodidverfahren wurde fast regelmäßig mehr Glycerin gefunden. Bei zuckerreichen Weinen gibt das Kalkverfahren viel zu wenig Glycerin. v. d. Heide erörtert mehrere Befunde anderer Forscher; daß beide Verfahren fast gleiche Werte liefern, obgleich die theoretische Grundlage des Jodidverfahrens denen des Kalkverfahrens überlegen sind, sei darauf zurückzuführen, daß beim Jodidverfahren nur 5 ccm Wein verarbeitet werden. Solange nicht 20 oder 25 ccm Wein verarbeitet werden könnten, wird man das Kalkverfahren beibehalten können. — In einem Vortrage über die Veränderungen der Weinbestandteile beim Trocknen des Extraktes teilt v. d. Heide mit, daß die Ergebnisse Roettgen's (*Z.* 1908, **15**, 257) nachprüft worden seien. Bezüglich der Milchsäure wurde gefunden, daß bald ein Verlust eintrat, bald nicht. Weinsäure geht beim Trocknen in Metaweinsäure über. Es empfiehlt sich, ein indirektes Verfahren an Stelle des direkten Verfahrens der Extraktbestimmung zu setzen. — Über die Entsäuerung mit kohlensaurem Kalk spricht Kulisch. Bei der Anwendung des Entsäuerungsverfahrens sind viele Fehler gemacht worden. Zu verwerfen ist die Entsäuerung bei essigstichigen Weinen und bei Mosten statt bei Jungweinen, sowie bei Weinen ohne erheblichen Weinsäuregehalt. Die in Colmar ausgeführten Versuche ergaben, daß bei genügender Menge Weinsäure die Gesamtsäure fast genau entsprechend der zugesetzten Kalkmenge abgestumpft wurde. Erhebliche Vermehrung des Aschengehaltes wurde nicht beobachtet. Auch in geschmacklicher Hinsicht waren die Erfahrungen überaus günstig, ein störender Geschmacksfehler konnte niemals wahrgenommen werden. — Omeis und v. d. Heide haben ebenfalls mit ausgezeichnetem Erfolge Entsäuerungsversuche mit kohlensaurem Kalk angestellt, letzterer auch mit neutralem weinsaurem Kali, das sich aber als ungünstig erwies. — Weiter berichtet v. d. Heide über die in Gemeinschaft mit Baragiola ausgeführte sehr eingehende analytisch-chemische Untersuchung eines Moselweines. Die Bilanzierung des Extraktes ist nicht vollständig gelungen, weil einerseits die Verfahren zur Bestimmung des Gesamtextraktes mangelhaft sind, andererseits im Wein noch Extraktstoffe vorhanden sein müssen, die sich der quantitativen Ermittlung entziehen. Die bisher übliche Bestimmung des Extraktes und die Berechnung der sog. Extraktreste werden daher abzuändern sein. Die Bilanzierung der Säuren und der Mineralbestandteile gelang dagegen hinreichend genau. Die ausführliche Abhandlung ist in den Landw. Jahrbüchern 1910, **39**, 1021 erschienen. — Die Behandlung von Wein, dem durch Zufall Petroleum beigemischt ist, mit Sesamöl wird von der Kommission als unzulässig erklärt, da es sich hierbei um einen „Zusatz“ handle. Ein Bedürfnis nach Erweiterung der Liste der erlaubten Zusätze wurde nicht für vorliegend erachtet. — Die folgende Tabelle enthält einen Auszug aus den Tabellen, die die Analysenergebnisse in den einzelnen Weinbaugebieten bringen. Im Anhang ist der „Umfang des Weinverschnittgeschäftes im deutschen Zollgebiet im Kalenderjahr 1910“ abgedruckt.

A. Weißweine.

Weinbaugebiet		Zahl der unter- suchten Weine	Spezifisches Gewicht	Alkohol	Extrakt (nach Abzug des 0,1 g übersteigenden Zuckergehaltes)		Mineral- bestand- teile	Glycerin
					Gesamt-	nach Abzug der nicht- flüchtigen Säuren		
g in 100 cem								
Preußen	Rheingau	39	0,9973—1,0045	5,89—9,75	2,31—3,77	1,72—3,14	0,157—0,300	—
	Rheintal unterhalb des Rheingaaes	16	0,9967—1,0000	5,95—8,07	2,14—2,85	1,44—2,27	0,139—0,247	0,4—0,8 ²⁾
	Nahegebiet	52	0,9939—1,0019	5,89— 9,2	2,08—3,06	1,41—2,28	0,164—0,315	0,5—1,0 ³⁾
	Moselgebiet	170	0,9958—1,0044	4,53—8,98	1,92—2,95	0,47—2,19	0,126—0,255	0,4—0,8 ⁴⁾
	Saar- und Ruwergebiet . .	41	0,9972—1,0046 ⁷⁾	4,73—7,94	2,17—2,93	1,17—1,92	0,129—0,206	0,3—0,7 ⁸⁾
Bayern	Sächsisches Weinbaugebiet	4	0,9985—1,0005	5,69—6,96	2,38—2,82	1,40—1,56	0,228—0,266	—
	Franken	47	0,9956—1,0029 ⁹⁾	4,83—8,35 ⁹⁾	1,70—3,58 ⁹⁾	1,15—2,92 ⁹⁾	0,176—0,290	0,4—1,0 ¹⁰⁾
	Pfalz.	39	0,9958—1,0034 ¹¹⁾	3,81—9,78 ¹²⁾	1,85—3,23 ¹³⁾	1,27—2,68 ¹⁴⁾	0,186—0,355 ¹⁵⁾	0,5—1,0 ¹⁵⁾
Württemberg	1. Abstich { Unteres Neckartal . .	3	0,9973—0,9977	6,70—7,06	2,15—2,29	1,20—1,61	0,157—0,212	0,5—0,6
	Remstal	3	0,9964—1,0007	5,66—7,26	1,84—2,52	1,33—1,85	0,195—0,316	0,5—0,6
	Zabergäu	1	0,9987	7,05	2,47	1,52	0,233	0,7
	Kocher- und Jagsttal . .	5	0,9962—1,0001	5,95—8,25	1,86—3,76	0,94—3,11	0,177—0,337	0,5—0,7
	2. Abstich { Unteres Neckartal . .	5	0,9944—1,0046	6,73—8,35	1,94—3,82	1,18—3,07	0,133—0,335	0,5—0,9
Baden	Remstal	3	0,9966—0,9976	5,89—7,26	1,59—1,89	1,06—1,38	0,169—0,237	0,3—0,4
	Kocher- und Jagsttal . .	4	0,9962—1,0010	6,47—8,28	1,60—2,16	0,96—1,66	0,168—0,337	0,4—0,6
	Bodenseegegend	2	0,9982—1,0009	5,20—5,70	1,77—2,15	0,75—1,07	0,167—0,178	0,4—0,5
	Seeweine	10 ¹⁷⁾	0,9927—1,0030	4,55—9,01	2,05—2,81	1,16—2,27	0,197—0,281	—
	Markgräfler	7	0,9964—0,9985	5,43—7,16	1,78—2,31	1,25—1,65	0,179—0,236	—
Hessen	Breisgau und Tuniberg . .	1	1,0000	4,04	1,72	1,12	0,185	—
	Kaiserstuhl	6	0,9966—1,0005	4,33—5,78	1,80—2,22	1,21—1,69	0,201—0,259	—
	Ortenau	12	0,9950—1,0010	3,67—8,12	1,87—2,89	1,30—2,27	0,208—0,278	—
	Mosbach und Taubergrund .	2	0,9954—0,9982	5,77—7,56	2,58—2,79	2,00—2,39	0,288—0,384	—
	Bergstraße	1	0,9969	8,43	2,58	2,00	0,288	—
Oberelsaß	Rheinhessen	49	0,9949—0,9998	5,70—8,98	1,90—3,15	1,38—2,61	0,168—0,417	0,42—0,85
	Bergstraße	57 ²⁰⁾	0,9946—0,9994	6,53—10,07	1,89—2,98	1,37—2,37	0,190—0,396	0,6—0,9 ²¹⁾
	Odenwald	21 ²⁵⁾	0,9959—0,9984	6,27—8,91	1,96—2,66	1,27—2,56	0,213—0,346	0,6—0,8 ²⁴⁾
Unterelsaß		18	0,9956—0,9994	5,23—8,88	1,80—2,88	1,27—2,34	0,169—0,294	—
		11	0,9963—1,0010	3,89—8,63	1,83—2,24	1,25—1,71	0,151—0,255	0,41—0,69 ²⁶⁾

B. Rotweine.

Preußen	Rheingau	1	0,9987	7,26	2,49	1,76	0,195
	Rheintal unterhalb des Rheingaaes	2	0,9977—1,0060	9,36—9,37	3,17—3,45	2,59—2,82	0,210—0,284
	Sächsisches Weinbaugebiet .	1	1,0007	5,83	2,45	1,75	0,290
	Ahrgebiet	5	0,9977—0,9998	6,73—8,35	2,44—2,92	1,95—2,25	0,263—0,324
Bayern	Franken	2	0,9974—0,9984	6,40—7,39	2,41—2,55	1,97—2,03	0,266—0,274
	1. Abstich { Unteres Neckartal . .	9	0,9961—1,0007	5,33—7,87	1,74—2,41	1,05—1,89	0,201—0,251
	Remstal	3	0,9962—0,9992	6,21—7,46	1,81—2,10	1,16—1,27	0,193—0,204
	Zabergäu	2	0,9994—0,9998	5,04—6,37	2,19—2,40	1,45—1,46	0,216—0,220
Württemberg	Kocher- und Jagsttal . .	2	0,9996—1,0038	5,57—6,68	2,03—2,31	1,32—1,48	0,219—0,242
	2. Abstich { Unteres Neckartal . .	6	0,9968—1,0014	5,20—6,66	1,93—2,82	1,26—2,19	0,201—0,319
	Remstal	1	0,9967	7,12	2,04	1,50	0,201
	Kocher- und Jagsttal . .	1	0,9969	6,93	1,90	1,37	0,230

1) Bei 38 Weinen. 2) Bei 10 Weinen. 3) Bei 35 Weinen. 4) Bei 76 Weinen. 5) Bei 81
 17 Weinen. 11) Bei 33 Weinen. 12) Bei 37 Weinen. 13) Bei 29 Weinen. 14) Bei 36 Weinen. 15) Bei
 20) Davon 27 mit Zuckerwasser-Zusatz. 21) Bei 55 Weinen. 22) Bei 53 Weinen. 23) Bei 32 Weinen.

Jahrgang 1909.

Freie Säure	Flüchtige Säure	Nicht- flüchtige Säure	Gesamt- Weinsäure	Milch- säure	Säure- Rest	Ver- hältnis von Alkohol zu Glycerin wie 100:	Alkalität der Asche		
							Gesamt-	der wasser- löslichen	der wasserun- löslichen
g in 100 ccm									
0,48—0,95	0,02—0,09	0,39—0,90	0,12—0,31	0,08—0,37	—	—	0,64—1,56 ¹⁾	0,17—0,83	0,47—1,13 ¹⁾
0,54—1,18	0,02—0,07	0,48—1,13	0,16—0,44	0,06—0,40	0,41—0,68 ²⁾	6,6—10,4 ²⁾	0,7—1,4	0,17—0,63	0,40—1,10
0,47—1,34	0,01—0,08	0,42—1,24	0,13—0,37	0,01—0,35	0,32—0,76 ³⁾	6,6—13,5 ³⁾	0,87—2,3	0—1,00	0,67—1,50
0,64—1,58	0,02—0,11	0,57—1,54	0,15—0,44	0,04—0,48	0,34—1,00 ⁴⁾	6,1—10,6 ⁴⁾	0,63—2,3	0,13—1,00 ⁵⁾	0,40—1,70 ⁶⁾
0,75—1,60	0,03—0,06	0,69—1,56	0,27—0,46	0,07—0,41	0,45—1,20	5,5—10,3 ⁸⁾	0,54—2,2	0,17—0,7 ⁷⁾	0,37—1,70 ⁷⁾
1,02—1,40	0,05—0,08	0,93—1,31	0,32—0,48	0,23—0,26	—	—	0,87—1,13	0,27—0,33	0,60—0,80
0,48—1,49	0,03—0,12	0,48—1,42	0,05—0,37	0,07—0,53	—	7,1—13,4 ¹⁰⁾	0,6—2,3	—	—
0,45—1,28	0,02—0,10 ¹²⁾	0,37—1,25 ¹²⁾	0—0,40 ¹⁶⁾	0,03—0,43 ¹²⁾	0,31—1,10 ¹³⁾	8,3—13,2 ¹⁵⁾	1,3—3,0 ¹¹⁾	—	—
0,59—1,06	0,03—0,05	0,54—1,00	0,30—0,40	0,04—0,14	0,32—0,85	7,5—8,7	1,77—2,26	—	—
0,57—0,85	0,04—0,06	0,49—0,80	0,17—0,26	0,10—0,17	0,41—0,67	8,3—8,8	2,20—3,62	—	—
0,98	0,02	0,95	0,33	0,08	0,78	9,3	2,05	—	—
0,58—0,97	0,03—0,06	0,53—0,92	0,17—0,41	0,08—0,20	0,43—0,77	7,1—9,0	2,0—3,2	—	—
0,56—1,02	0,04—0,06	0,48—0,94	0,09—0,36	0,05—0,21	0,20—0,76	6,0—11,3	1,15—3,50	—	—
0,58—0,62	0,05—0,07	0,49—0,56	0,16—0,25	0,10—0,22	0,40—0,43	4,8—6,8	2,55—3,14	—	—
0,59—0,93	0,05—0,07	0,50—0,87	0,10—0,34	0,15—0,27	0,39—0,70	5,9—7,3	2,20—2,90	—	—
1,06—1,14	0,03—0,05	1,02—1,08	0,33—0,35	0,03—0,28	0,81—0,84	7,0—9,6	1,50—1,60	—	—
0,52—1,49	0,04—0,07	0,45—1,44	0,15—0,43	0,08—0,40	—	—	1,0—3,1	0—2,82	0,28—1,40
0,55—0,79	0,03—0,06	0,48—0,75	0,19—0,33	0,14—0,30	—	—	1,1—1,9	0,20—0,90	0,71—1,10
0,68	0,06	0,60	0,30	0,33	—	—	1,30	0,17	1,13
0,57—0,73	0,04—0,08	0,41—0,71	0,16—0,38	0,25—0,43 ¹⁸⁾	—	—	1,2—2,1	0—0,37 ¹⁹⁾	0,83—1,20 ¹⁹⁾
0,42—0,74	0,04—0,07	0,34—0,69	0,15—0,30	0,07—0,38	—	—	1,5—2,1	0,30—1,33	0,77—1,30
0,51—0,64	0,40—0,58	0,04—0,09	0,11—0,18	0,14—0,28	—	—	1,7—2,6	0,46—1,83	0,77—1,24
0,64	0,04	0,58	0,18	0,14	—	—	1,7	0,46	1,24
0,37—0,83	0,02—0,11	0,28—0,77	0,08—0,38	0,02—0,52	0,17—0,66	7,1—12,3	1,30—4,80	—	—
0,42—0,87	0,05—0,11	0,40—0,80	0,11—0,28 ²²⁾	0,18—0,33 ²³⁾	0,27—0,67 ²²⁾	7,4—11,1 ¹²¹⁾	1,8—3,2	—	—
0,48—1,13	0,06—0,08	0,39—1,04	0,16—0,36 ²⁴⁾	0,16—0,31 ²⁴⁾	0,31—0,99 ²⁴⁾	8,0—10,7 ²⁴⁾	1,8—2,5	—	—
0,61—0,94	0,05—0,10	0,42—0,73	0,11—0,33	0,23—0,49	—	—	1,1—2,4	—	—
0,60—0,77	0,04—0,09	0,53—0,71	0,16—0,31	0,33—0,44	0,42—0,55 ²⁶⁾	8,5—12,05 ²⁶⁾	1,9—2,62	—	—

Jahrgang 1909.

0,76	0,02	0,73	0,11	0,21	—	—	1,34	0,67	0,67
0,66—0,69	0,05—0,06	0,58—0,63	0,22—0,23	0,21—0,29	—	—	0,90—1,07	0,40—0,50	0,50—0,57
0,80	0,08	0,70	0,24	0,18	—	—	1,27	0,40	0,87
0,53—0,92	0,03—0,04	0,48—0,88	0,20—0,25	0,03—0,08	0,36—0,76	7,58—10,00	1,6—2,6	0,8—1,5	0,70—1,20
0,54—0,61	0,07—0,08	0,44—0,52	0,12—0,18	0,24—0,34	—	9,3—9,4	1,0—1,2	—	—
0,58—1,09	0,04—0,08	0,52—1,04	0,23—0,35	0,05—0,19	0,40—0,87	5,3—11,2	1,10—2,50	—	—
0,62—1,00	0,05—0,06	0,54—0,94	0,22—0,29	0,06—0,22	0,40—0,79	6,4—8,0	1,05—2,25	—	—
0,80—1,00	0,03—0,06	0,73—0,96	0,30—0,35	0,07—0,08	0,58—0,79	7,8—7,9	2,30—2,38	—	—
0,60—1,03	0,03—0,04	0,55—0,99	0,29—0,30	0,06—0,19	0,40—0,85	5,8—9,0	2,35—2,76	—	—
0,65—1,01	0,05—0,07	0,59—0,95	0,18—0,32	0,05—0,28	0,44—0,77	6,1—12,1	0,90—2,30	—	—
0,59	0,04	0,54	0,22	0,28	0,43	4,2	2,30	—	—
0,59	0,05	0,53	0,27	0,12	0,39	7,2	2,60	—	—

Weinen. ⁶⁾ Bei 168 Weinen. ⁷⁾ Bei 40 Weinen. ⁸⁾ Bei 15 Weinen. ⁹⁾ Bei 46 Weinen. ¹⁰⁾ Bei 28 Weinen. ¹⁶⁾ Bei 30 Weinen. ¹⁷⁾ 8 Weißherbst, 2 Weiß. ¹⁸⁾ Bei 4 Weinen. ¹⁹⁾ Bei 2 Weinen. ²⁴⁾ Bei 11 Weinen. ²⁵⁾ Davon 2 mit Zuckerwasser-Zusatz. ²⁶⁾ Bei 7 Weinen.

Weinbaugebiet		Zahl der unter- suchten Weine	Spezifisches Gewicht	Alkohol	Extrakt (nach Abzug des 0,1 g übersteigenden Zuckergehaltes)		Mineral- bestand- teile	Glycerin
					Gesamt-	nach Abzug der nicht- flüchtigen Säuren		
g in 100 cem								
Baden	Seeweine	3	0,9966—1,0005	5,07—8,08	2,27—2,46	1,87—2,14	0,278—0,292	—
	Kaiserstuhl	1	0,9956	7,53	2,16	1,63	0,205	—
	Ortenau	1	0,9968	8,29	2,63	2,30	0,335	—
Lothringen		3	0,9961—0,9994	6,65—7,64	2,29—2,69	1,93—2,13	0,233—0,281	—

C. Weißweine.

(Untersucht als Jungweine kurz vor,

Oberelsaß	26	0,9965—1,0039	3,98—8,57	1,92—3,44	0,95—2,35	0,176—0,400	—
Unterelsaß	4	0,9960—1,0061	3,44—7,42	2,01—2,79	1,18—1,73	0,200—0,443	—

Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik. Berichtsjahr 1909/10.
Teil II. Moststatistische Untersuchungen. — (Arb. a. d. Kais. Gesund-
heitsamte 1911, 39, 170—433.) Eine Zusammenstellung von Höchst- und Mindest-
werten aus den Berichten der beteiligten Untersuchungsstellen ist in nachstehender
Tafel enthalten.

Moste des Jahres 1910.

Weinbaugebiet	Art des Mostes	Zahl der Moste	Grade Oechsle	Freie Säure (g in 100 ccm)	Weinbaugebiet	Art des Mostes	Zahl der Moste	Grade Oechsle	Freie Säure (g in 100 ccm)
Preußen.									
A. Bericht der Önochemischen Versuchsstation Geisen- heim a. Rh.					Rheintal { linksrh. (Kr. unterhalb St. Goar) .	weiß	42	45,5—101,7	1,06—1,99
					des Rhein- { rechts- gaues rheinisch .	„	22	41,1—73,3	1,03—1,95
Rheingau	weiß	112	62—92	0,90—1,80	Rheingau	„	117	51—91,5	0,81—1,74
„	rot	2	80—87	1,28—1,44	„	rot	3	78—89,5	1,29—1,45
Rheintal { links- unterhalb rheinisch	weiß	5	55—92	1,35—1,60	Lahngebiet (Unter- und	weiß	4	56,5—64,5	1,34—1,73
des Rhein- { rechts- gaues rheinisch	rot	1	92	1,45	Oberlahnkreis) . .	rot	2	91—91	1,08—1,08
Nahegebiet	„	14	61—73	1,24—1,29	Rhein- und Maingebiet				
Moselgebiet	„	102	54—96	1,02—1,28	(Kr. Wiesbaden Stadt				
Saargebiet	„	24	43—85	0,98—1,74	u. Land)	weiß	23	47,7—90	1,03—1,59
Ahrgebiet	„	1	43—77	0,91—1,46	C. Bericht des Nahrungsmitteluntersuchungsamtes zu Koblenz.				
„	rot	4	63	1,40	Kreise { Mosel- Adenau, Ahr- gebiet .	weiß	196	43,9—87	1,10—2,33
Lahngebiet	weiß	1	61	1,54	weiler, Alten- kirchen, Kuchem, Mayen, Neu- wied, Zell, biet . .	„	36	46,3—72,5	0,99—1,75
Ostdeutsche Weinbau- gebiete	„	4	60—66	1,12—1,50	Stadt- u. Land- kreis Koblenz	„	3	60,0—81,5	1,25—1,56
B. Bericht des Nahrungsmitteluntersuchungsamtes des Kreises Kreuznach.					„	rot	5	68,6—85,5	1,07—1,31
Nahegebiet (Kreis Kreuznach)	weiß	112	31,1—102	0,84—1,75	D. Bericht des Nahrungsmitteluntersuchungsamtes der Stadt Trier.				
Glans- und Nahegebiet (Kreis Meisenheim) .	„	19	33,9—83,5	1,10—1,80	Reg- { Saargebiet . .	weiß	162	39—83,8	0,93—2,01
					Bez. { Obermosel- und				
					Trier { Sauergebiet . .	„	232	41,6—78,7	1,24—2,35

Freie Säure	Flüchtige Säure	Nicht- flüchtige Säure	Gesamt- Weinsäure	Milch- säure	Säure- Rest	Ver- hältnis von Alkohol zu Glycerin wie 100 :	Alkalität der Asche		
							Gesamt-	der wasser- löslichen	der wasserun- löslichen
g in 100 cem							in 100 cem N.-Lauge		
0,40—0,52	0,05—0,07	0,32—0,43	0,19—0,23	0,20—0,30	—	—	2,2—2,7	1,3—1,5	0,9—1,2
0,52	0,06	0,51	0,17	0,17	—	—	1,6	0,57	1,03
0,41	0,07	0,33	0,12	0,16	—	—	2,5	1,5	1,0
0,47—0,69	0,08—0,10	0,36—0,56	0,17—0,20	0,26—0,29	—	—	1,0—2,3	—	—

Jahrgang 1910.

bei oder nach dem ersten Ablassen.)

0,69—1,52	0,04—0,15	0,59—1,45	0,12—0,41	0,07—0,71	—	—	1,2—4,1	—	—
0,71—1,09	0,06—0,10	0,66—0,99	0,12—0,22	0,09—0,43	—	—	1,9—4,5	—	—

Weinbaugebiet		Art des Mostes	Zahl der Moste	Grade Oechsle	Freie Säure (g in 100 ccm)	Weinbaugebiet		Art des Mostes	Zahl der Moste	Grade Oechsle	Freie Säure (g in 100 ccm)
Reg.-Bez. Trier	Mittelmoselge- biet	weiß	708	45,4—90,4	1,00—1,95	Baden.					
	Liesergebiet . .	„	37	48—64	1,25—1,76	Bodenseegegend . .	weiß	17	46—81	0,92—1,71	
	Ruwergebiet . .	„	53	47—75,3	1,08—1,90	Markgräflerland . .	„	4	47—57	1,47—1,63	
						Kaiserstuhl	„	18	33—69	0,69—1,82	
Bayern.						Breisgau u. Tuniberg	„	18	33—68	0,79—1,83	
Franken	weiß	151	39—89,3	0,81—1,81		Ortenau	„	28	44—86	0,75—1,98	
„	rot	4	49—81,4	1,0—1,52		„	rot	1	87	0,91	
Pfalz	weiß	395	21—117	0,74—2,73		Mittelbaden	weiß	7	34—85	0,63—1,46	
„	rot	37	46—71,7	1,16—1,91		„	rot	3	57—64	0,72—1,30	
Württemberg.						Mosbach u. Tauber- grund	weiß	3	59—60	0,83—1,18	
Oberes Neckartal .	rot	6	56,8—74	1,14—1,55		Bergstraße	„	1	55	1,61	
Unteres Neckartal .	weiß	25	59—108,5	0,89—1,58		Hessen.					
„	rot	20	60,5—86,1	1,04—1,62		Rheinhessen	weiß	669	42,6—98,8	0,76—1,94	
Remstal	weiß	9	64,7—81,8	0,88—1,22		„	rot	28	54,4—81,3	0,79—1,60	
„	rot	6	69,8—75,6	1,05—1,31		Bergstraße	weiß	26	63—79	1,01—1,56	
Enstal	weiß	2	47,9—77,1	1,18—1,25		Odenwald	„	1	50	1,42	
„	rot	9	56,4—82,6	1,15—1,55		Elsaß-Lothringen.					
Zabergäu	„	3	57,2—80,3	1,05—1,29		Oberelsaß	weiß	128	40,4—84,8	0,98—2,49	
Kocher- u. Jagsttal	weiß	10	65,1—84	0,85—1,78		„	rot	4	60,6—89,7	1,44—2,00	
„	rot	2	76—76,6	1,17—1,20		Unterelsaß	weiß	110	30,3—76,9	0,81—2,19	
Taubertal	weiß	1	68	1,46		„	rot	2	64—65,2	1,03—2,30	
Bodenseegegend . .	„	2	53,8—62,2	1,56—1,65		Lothringen	weiß	10	55,5—71,5	0,93—1,74	
						„	rot	10	56,1—69,5	1,24—1,80	

Die folgenden Tafeln geben weitere Zusammenfassungen von Einzelergebnissen.

Preußen.

A. Bericht der Önochemischen Versuchsstation Geisenheim a. Rh.

Mostgewicht ° Oechsle	Rheingau		Linkes Rheintal unterhalb des Rheingaus		Rechtes Rheintal unterhalb des Rheingaus	Nahe	Mosel	Saar	Ahr		Lahn	Ostdeutsche Weinbaugebiete	Insgesamt	
	weiß	rot	weiß	rot	weiß				weiß	rot			weiß	rot
Bis 54,9	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	—
von 55,0 „ 64,9	1	—	4	—	1	2	25	5	1	—	1	3	43	—
„ 65,0 „ 74,9	54	—	2	—	2	6	48	14	—	—	—	1	127	—
„ 75,0 „ 84,9	41	1	—	—	—	2	27	4	—	3	—	—	74	4
„ 85,0 „ 94,9	16	1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	19	3
„ 95,0 und mehr	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Freie Säure (g in 100 ccm)														
Von 0,6 bis 0,79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ 0,8 „ 0,99	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	5	—
„ 1,0 „ 1,19	45	—	—	—	—	8	26	3	—	3	—	1	83	3
„ 1,2 „ 1,39	59	1	2	—	3	6	53	15	—	1	—	2	140	2
„ 1,4 „ 1,59	5	1	3	1	—	—	20	4	1	—	1	1	35	2
„ 1,6 „ 1,79	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—
„ 1,8 und mehr	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

B. Bericht des Nahrungsmitteluntersuchungsamtes des Kreises Kreuznach.

Mostgewicht ° Oechsle	Nahegebiet	Glans- und Nahegebiet (Kr. Meisenheim)	Rheintal		Rheingau	Lahngebiet (Unter- und Oberlahn-kreis)	Rhein- und Maingebiet (Kr. Wiesbaden Stadt- und Land)
			linksrhein. unterhalb des Rheingaus (Kr. St. Goar)	rechtsrhein. unterhalb des Rheingaus			
Bis 49,9	1	3	2	1	0	0	1
von 50,0 „ 54,9	7	3	9	1	2	0	0
„ 55,0 „ 59,9	14	1	11	4	4	1	0
„ 60,0 „ 64,9	18	3	8	8	9	3	5
„ 65,0 „ 69,9	30	5	5	5	9	0	3
„ 70,0 „ 74,9	21	2	4	3	23	0	8
„ 75,0 „ 79,9	11	1	0	0	25	0	3
„ 80,0 „ 84,9	5	1	2	0	28	0	1
„ 85,0 „ 90,0	2	0	0	0	8	0	1
mehr als 90,0	3	0	1	0	2	2	1
Freie Säure (g in 100 ccm)							
Bis 0,79	0	0	0	0	0	0	0
von 0,80 „ 0,99	5	0	0	0	10	0	0
„ 1,00 „ 1,19	41	3	1	3	45	2	8
„ 1,20 „ 1,39	46	8	3	10	32	1	10
„ 1,40 „ 1,59	19	6	17	8	29	1	5
„ 1,60 „ 1,79	1	1	14	0	4	2	0
„ 1,80 „ 1,99	0	1	7	1	0	0	0
„ 2,00 und mehr	0	0	0	0	0	0	0

C. Bericht des Nahrungsmitteluntersuchungsamtes zu Koblenz.

Mostgewicht ° Oechsle	Ahr	Rhein	Mosel	Freie Säure g in 100 ccm	Ahr	Rhein	Mosel
Von 40 bis 50	—	2	3	von 0,8 bis 0,9	—	1	—
„ 50 „ 60	—	16	33	„ 1,0 „ 1,19	3	6	10
„ 60 „ 70	2	16	119	„ 1,20 „ 1,39	4	9	59
„ 70 „ 80	3	2	33	„ 1,40 „ 1,59	1	12	79
„ 80 „ 90	3	—	8	„ 1,60 „ 1,79	—	8	38
				„ 1,80 „ 1,99	—	—	9
				mehr als 2,0	—	—	1

Bayern.

Pfalz.

Mostgewicht ° Oechsle	Zahl der Proben	Freie Säure g in 100 ccm .	Zahl der Proben
Zwischen 20 und 30	13 = 2,84 %	zwischen 0,6 und 1,0	8 = 1,74 %
„ 30 „ 40	58 = 12,66 „	„ 1,0 „ 1,5	183 = 39,96 „
„ 40 „ 50	94 = 20,52 „	„ 1,5 „ 2,0	165 = 36,03 „
„ 50 „ 60	147 = 32,10 „	„ 2,0 „ 2,5	97 = 21,18 „
„ 60 „ 70	111 = 24,24 „	„ 2,5 „ 3,0	5 = 1,09 „
„ 70 „ 80	19 = 4,14 „		
„ 80 „ 90	1 = 0,22 „		
„ 90 „ 100	10 = 2,19 „		
„ 100 „ 110	3 = 0,66 „		
„ über 110	2 = 0,43 „		

Württemberg.

Zwischen 40 und 49	2	zwischen 0,6 und 0,79	0
„ 50 „ 59	12	„ 0,8 „ 0,89	4
„ 60 „ 69	39	„ 0,9 „ 0,99	5
„ 70 „ 79	45	„ 1,0 „ 1,09	12
„ 80 „ 89	11	„ 1,1 „ 1,19	24
„ 90 „ 99	0	„ 1,2 „ 1,29	24
„ 100 „ 110	1	„ 1,3 „ 1,39	20
		„ 1,4 „ 1,49	11
		„ 1,5 „ 1,59	7
		„ 1,6 „ 1,69	2
		„ 1,7 „ 1,79	1

Im Anhang ist die Statistik der Weinmost-Ernte im Jahre 1910 aus den „Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reichs“ 1911, 1. Heft S. 123 abgedruckt. Hieraus sei erwähnt, daß Erntemenge und Wert der Ernte des Jahres 1910 weit hinter dem Durchschnitte der Vorjahre zurückbleibt. Der Gesamt-Weinmostertrag betrug in den Jahren 1893—1898 durchschnittlich jährlich 2981624 hl, sein Wert 89,4 Millionen Mark; in den Jahren 1902—1909 waren die entsprechenden Zahlen

2 955 747 hl und 102,7 Millionen Mark; im Jahre 1910 war der Gesamtertrag nur 846 139 hl im Werte von 58,3 Millionen Mark. *G. Sonntag.*

G. Filaudeau: Die Weine der Ernte 1911. (Annal. des Falsific. 1911, 4, 562—569 und 648—659.) — Kurzer Bericht über die vom Zentrallaboratorium des Ackerbauministeriums ausgeführten Untersuchungen über die wahrscheinliche Zusammensetzung der 1911-er französischen Weine. Berücksichtigt wurden die Departements von Gard, les Bouches-du-Rhône, Vaucluse, l'Hérault, Aude, les Pyrénées-orientales, Gironde, la Cote d'Or, Saone-et-Loire, Yonne, Loire-Inférieure und Vendée.

C. Grimme.

H. Astruc und J. Mahoux: Analyse der Weine des Gard und der Camargue. Jahrgänge 1909 und 1910. (Annal. des Falsific. 1911, 4, 572—578.) — Verff. berichten an der Hand von reichhaltigem Tabellen-Material über die Untersuchung von 79 Rot-, Weiß- und Bleichertweinen aus dem Jahre 1909 und von 59 Weinen des Jahres 1910.

C. Grimme.

G. Filaudeau: Die nach Frankreich eingeführten spanischen Weine. (Annal. des Falsific. 1911, 4, 362—380.) — Bericht des Verf.'s an den Landwirtschaftsminister über seine Studienreise in Spanien. Es wird über den Weinbau, die Weinbereitung und die Behandlung in Spanien berichtet. Nähere Untersuchungen wurden ausgeführt mit Weinen aus den Provinzen Gerona, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Albaceta und Murcia, sowie aus dem Bezirk Mancha. Aus den in 7 Tabellen zusammengestellten Analysendaten zieht Verf. folgende Schlüsse: Mit einigen, wenigen Ausnahmen sind die Weine der bereisten Bezirke schwere, gut gepflegte Weine, reich an allen wertvollen Bestandteilen, welche im allgemeinen den Forderungen der französischen Methoden entsprechen, besonders zum Nachweis von Wässerungen. Hervorzuheben ist, daß alle untersuchten Weine eine genügend hohe, fixe Acidität besaßen, die in keinem Falle unter 2,20 (berechnet als Schwefelsäure) sank. Die spanischen Weine sind reich an Mineralstoffen und ähneln etwa den schweren algerischen Weinen. Eine ganz allgemein konstatierte Anomalie ist die Erhöhung des Verhältnisses Alkohol:Extrakt. Hierauf ist aber auch schon von verschiedenen anderen Autoren hingewiesen worden. Verf. fordert zu einer Enquete über die Zusammensetzung der spanischen Weine auf, damit eindeutige Grenzwerte geschaffen werden können. Zur Beurteilung ist unbedingt nötig, die Herkunft oder zum wenigsten den Ausfuhrhafen des Weines zu kennen.

C. Grimme.

G. Filaudeau: Die süßen Apfelweine. (Annal. des Falsific. 1911, 4, 582—583.) — Verf. bringt in einer Tabelle die Analysenzahlen für 4 süße Apfelweine, woraus es sich ergibt, daß es sehr wohl möglich ist, das Hartwerden von süßen Apfelweinen durch geeignete Kellerbehandlung, vor allem häufiges Umfüllen, zu verhindern.

C. Grimme.

W. J. Baragiola und Ch. Godet: Die Wertung der Milchsäure bei der Weinbeurteilung. (Mitteil. a. d. Gebiete d. Lebensmittelunters. und Hygiene, veröffentlicht v. Schweizer. Gesundheitsamt 1912, 3, 235—266.) — Die III. Auflage des Schweizerischen Lebensmittelbuches (1912) bringt im Gegensatz zur älteren Auflage einen besonderen Abschnitt über die Bestimmung der Milchsäure im Wein, nicht aber auch über die Beurteilung der Milchsäurebefunde im gesamten Analysenbilde. Verff. wollen mit ihrer Arbeit zu letzterem Punkte einige praktische Winke geben. Bei deutschen, österreichischen und schweizerischen Weinen kann die Art der Entstehung der Milchsäure im Wein durch die Arbeiten zahlreicher Weinchemiker als aufgeklärt angesehen werden. Verff. wollen aber die gleichen Lehren bezüglich der Milchsäurebildung

bei fremden Weinen und deren Beurteilung in Anwendung bringen. Nach den Verff. kann die Entstehung der Milchsäure in Weinen in folgender Weise gedacht werden: 1. Bildung geringer Milchsäuremengen bis zu etwa 2‰. 2. Bildung größerer Milchsäuremengen. A. Normale Bildung zufolge Überführung der Äpfelsäure in Milchsäure und Kohlensäure durch säurespaltende Bakterien. B. Krankhafte Bildung zufolge Überführung von Zucker oder Extraktstoffen in Milchsäure und Essigsäure oder sonstige Nebenprodukte, besonders wohl Buttersäure und andere höhere Fettsäuren, hauptsächlich durch Milchsäurebakterien. Verff. erörtern nun diese Verhältnisse der Milchsäurebildung bei gesunden und kranken schweizerischen und fremdländischen Weinen unter Anführung von Beispielen. Schließlich wird auch noch über die Bakterienflora kranker milchsäurehaltiger Weine ein Überblick gegeben. Verff. kommen zu folgenden Schlußsätzen: 1. Nach dem schweizerischen Lebensmittelbuch ist in den Fällen, in denen ein auffallend geringer Gehalt an nichtflüchtiger Säure festgestellt wurde, die Milchsäure zu bestimmen. 2. Über die Vorschrift des schweizerischen Lebensmittelbuches hinaus, wonach erst ein Gehalt von über 3‰ hinaus berücksichtigt werden soll, ist im allgemeinen schon ein solcher von 2‰ und unter Umständen sogar schon ein geringerer Gehalt in Rechnung zu ziehen. 3. Bei gesunden Weinen ist die Milchsäure der Hauptsache nach als Abbaustoff der Äpfelsäure zu betrachten. 4. Beim Vergleichen von verschiedenen Weinen empfiehlt es sich, die gesamte Milchsäure in freie Weinsäure umzurechnen und zur gesamten bzw. nichtflüchtigen Säure hinzuzuzählen. Die so erhaltenen Zahlen geben einen Annäherungswert des Säuregehalts vor dem biologischen Abbau. 5. Bei der Umwandlung der Äpfelsäure in Milchsäure und Kohlensäure nimmt das ursprüngliche Extraktgewicht um das Gewicht der gebildeten Kohlensäure und um die Hälfte des Gewichts der gebildeten Milchsäure ab. Der Extrakt milchsäurereicher Weine ist daher milder zu beurteilen. 6. Mit zunehmendem Gehalt an Milchsäure ist dagegen der Extraktrest strenger zu beurteilen, weil bei dessen Berechnung die Milchsäure als Weinsäure und daher mit einem zu geringen Werte in Rechnung gestellt wird. 7. Mit Rücksicht darauf, daß die Milchsäure viel schwächer dissoziiert ist als die Äpfelsäure, ist ein geringer Säuregrad milchsäurereicher Weine bei der Kostprobe weniger streng zu beurteilen. 8. Bei stark milchsäurehaltigen Weinen ist eine mikroskopische Untersuchung erwünscht, wobei besonders auf *Micrococcus malolacticus*, auf *Bacterium gracile* und auf einen noch nicht näher bekannten *Micrococcus* in Tetraden zu achten ist. 9. Bei kranken Weinen ist zur Wertung der Milchsäure eine ganz eingehende chemische und bakteriologische Untersuchung erforderlich. *A. Behre.*

Anleitung und Kennzeichen zur Beurteilung der Resultate von Weinanalysen. (Service de la Répression des Fraudes; Annal. des Falsific. 1911, 4, 357—361.) — 1. Verfälschungen durch Zusatz von Stoffen, deren Gebrauch verboten ist. Vor allem ist zu fahnden auf: Antiseptica; Salicylsäure, Borsäure, Benzoesäure, Flußsäure, frei und in Verbindungen, auf freie Mineralsäuren: Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Phosphorsäure, auf fremde Farbstoffe, künstliche Süßstoffe wie Saccharin und seine Derivate, auf Tresteranteile, Barium- oder Strontiumsulfate, die zum Entgipsen verwandt wurden, auf Dextrin, infolge Zusatz von Handelsglykose, endlich auf Saccharose oder Invertzucker aus zugesetztem Most oder Zucker. — 2. Verfälschungen durch Gebrauch gewisser Substanzen in höheren als den erlaubten Mengen: Sulfate mehr wie 2 g Kaliumsulfat im Liter entsprechend, Chloride über 1 g Kochsalz im Liter, schweflige Säure, frei und gebunden, mehr wie 0,350 g im Liter, Citronensäure mehr wie 0,50 g im Liter. — 3. Verfälschungen zur Erhöhung des Volumens. Hauptsächlich kommt hier die Wässerung in Frage, oft verdeckt durch Zusatz von Alkohol, Zucker, Weinsäure, Glycerin und verschiedener Extraktiv-

stoffe. Zur Erkennung solcher Zusätze ist es von Vorteil, den Ursprung des Weines zu kennen, um aus Vergleichswerten Schlüsse ziehen zu können. Ist der Ursprung nicht zu ermitteln, so urteilt man auf Grund folgender Kennzeichen: a) Grenzzahlen der verschiedenen Bestandteile: Absolute Grenzwerte lassen sich nicht aufstellen, da z. B. der Alkoholgehalt sehr schwankt. Andererseits schwanken auch gewisse andere Bestandteile mehr oder weniger mit dem Alkoholgehalt. Der Weinstein z. B. sinkt mit dem Steigen des Alkoholgehaltes, aber auch mit verschiedenen Krankheiten, welches sich wiederum oftmals durch Steigen der flüchtigen Säuren und durch das Vorkommen von Mikroorganismen anzeigt. b) Verhältnis Alkohol:Extrakt (100%). Das Verhältnis erhält man durch Division des wirklichen Alkoholgehaltes in g pro Liter $[\text{Vol.}\% \text{ Alkohol} \times 8 + (\text{Gewicht des Zuckers} - 1) \times 0,45]$ durch das Gewicht des bei 100° getrockneten Extraktes, vermindert um $\alpha)$ Gewicht der reduzierenden Substanzen (berechnet als Glykose) — 1; $\beta)$ Gewicht des Kaliumsulfats in g — 1; $\gamma)$ Gewicht der freien Weinsäure in g — 1 bei Weißweinen, — 0,5 bei Rotweinen; $\delta)$ Gewicht der fremden, nichtflüchtigen, durch die Analyse festgestellten Substanzen. Das Verhältnis schwankt von 2,5—4,5 bei Rotweinen, von 3,5—6,5 bei Weißweinen. Die Grenzen werden nur höchst selten überschritten, z. B. bei gezuckerten Mosten und gespritzten Weinen. Ist die Differenz zwischen dem bei 100° und im Vakuum getrockneten Extrakte geringer wie 0,55, so liegen gespritzte Weine vor. c) Summe Alkohol + nichtflüchtige Säure (A. Gautier) wird erhalten durch Addition des Gesamt-Alkoholgehaltes + (nichtflüchtige Säure + $\frac{1}{10}$ flüchtige Säure) unter Abrechnung von: $\alpha)$ 0,2 g pro g Kaliumsulfat über 2 g; $\beta)$ des Schwefelsäurewertes für freie Weinsäure — 0,5 g für Rotweine und 1 g für Weißweine; $\gamma)$ des Schwefelsäurewertes der anderen, etwa zugesetzten Säuren; $\delta)$ des scheinbaren Alkoholgehaltes, stammend aus der Spritung oder Zuckering, wenn das Verhältnis Alkohol: Extrakt bei Rotweinen höher wie 4,5, bei Weißweinen höher wie 6 ist. Die Summe Alkohol + nichtflüchtige Säure schwankt zwischen 13 und 17. Bei Rotweinen kann man auf eine Wässerung schließen, wenn sie unter 12,5 geht, bei sehr aromatischen Weinen unter 11,5. Diese Regel trifft auch auf fast alle Weißweine zu. — d) Verhältnis Nichtflüchtige Säure:Alkohol (Halphen). Dieser Index basiert auf der Beobachtung, daß der Säuregehalt eines Weines mit dem Alkoholgehalt fällt und steigt. Falls fremde Säuren zugesetzt sind, so müssen diese bestimmt, auf Schwefelsäure berechnet und in Abzug gebracht werden. Flüchtige Säuren sollen nicht mehr als 0,70 g Schwefelsäure vorhanden sein. Halphen hat eine Tabelle aufgestellt, woraus die Berechnung zu entnehmen ist. — Roos'sches Verhältnis. Es basiert auf der Beobachtung, daß das Verhältnis Alkohol:Extrakt mit kleinerem Alkoholgehalt fällt. Man erhält es durch Division der Summe Alkohol + nichtflüchtige Säure durch das Verhältnis Alkohol:Extrakt. Bei Rotweinen ist es meistens über 3,2, selten unter 3. Bei Weißweinen ist die unterste Grenze 2,4. Unterhalb derselben ist eine Wässerung erwiesen. — e) Verdorbene Weine. Das Verderben eines Weines ist charakterisiert durch die Anwesenheit von Mikroorganismen der verschiedensten Weinkrankheiten (Sauerwerden, Umschlagen etc.) und die chemischen Veränderungen, die durch diese hervorgerufen werden. Das Säuern kennzeichnet sich durch das Ansteigen der flüchtigen Säuren. Ein Wein ist als verdorben anzusehen, wenn er mehr wie 1,65 g flüchtige Säure, berechnet als Schwefelsäure, entsprechend 2,0 g Essigsäure, enthält.

C. Grimme.

Auszug aus den offiziellen Methoden der portugiesischen Staatslaboratorien zur Untersuchung von Wein, Weissessig und Olivenöl. (Annal. des Falsific. 1911, 4, 399—403.) — A. Belege zur Auslegung der Resultate von Weinanalysen. 1. Extrakt: Der Extraktgehalt portugiesischer Weine geht bei Rotweinen nicht unter 20 g, bei Weißweinen nicht unter 16 g pro

Liter. 2. Alkohol: Der Alkoholgehalt ist in der Regel bei reifen Weinen nicht unter 10⁰%, bei sauren Weinen nicht unter 7,5⁰%. Bei den jungen Minnoweinen kann er bis 5⁰% heruntergehen. 3. Das Verhältnis Alkohol (Gew.⁰%) : Trockenextrakt geht niemals unter 5,5. — 4. Die Asche ist stets über 1,6 g pro Liter. — 5. Flüchtige Säure: In gesunden, portugiesischen Weinen ist die auf Essigsäure berechnete flüchtige Säure stets unter 2 g pro Liter. Weine sind als verdorben anzusprechen, wenn die flüchtige Säure 2 g übersteigt und gleichzeitig Geschmack und mikroskopischer Befund darauf hinweisen. — 6. Extrakt — Gesamtsäure: Die Differenz Extrakt — Gesamtsäure (berechnet als Weinsäure) geht bei Rotweinen nicht unter 13, bei Weißweinen nicht unter 11. — 7. Extrakt — fixe Säure. Bei normalen portugiesischen Weinen beträgt diese Differenz stets 12 und darüber. — 8. Die Summe Alkohol + Säure schwankt zwischen 13 und 21. — 9. Für das Verhältnis Alkohol (Gew.⁰%) : Glycerin betragen die Grenzwerte 20 und 8,5. — 10. Gewässerte Weine. Ein Wein ist als gewässert anzusehen, wenn sein Extraktgehalt weniger wie 20 g (Rotwein) bzw. 16 g (Weißwein) pro Liter beträgt, wenn die Summe Alkohol + Säure weniger wie 13 ist, wenn der Alkohol bei gewöhnlichen Weinen unter 7,5 Vol.⁰%, bei sehr jungen Weinen unter 5 Vol.⁰% ist und wenn die Asche weniger wie 1,6⁰‰ beträgt. — 11. Gespritete Weine. Als solche sind die Weine anzusprechen, deren Verhältnis Alkohol (Gew.⁰%) : Glycerin höher ist wie 20 und bei denen das Verhältnis Alkohol (Gew.⁰%) : Extrakt höher wie 5,5 ist. — 12. Mit unreinem Alkohol gespritete Weine. Die bekannteren Verunreinigungen müssen sich chemisch nachweisen lassen. — 13. Mit Glycerin versetzte Weine (Scheelisation). Der Zusatz von Glycerin kennzeichnet sich dadurch, daß das Verhältnis Alkohol (Gew.⁰%) : Glycerin unter 8,5 liegt. Das Verfahren ist als gesundheitsschädlich anzusprechen. — 14. Tresterweine werden hergestellt durch Gärung von mit Wasser angerührten Trestern ohne Zuckerzusatz. Sie zeichnen sich durch das fast vollständige Fehlen reduzierender Zucker aus, durch das sehr niedrige Verhältnis Alkohol (Gew.⁰%) : Extrakt, durch erhöhten Gehalt an Weinstein, Weinsäure und Asche. Der Verkauf von Tresterwein ist in Portugal verboten, die Herstellung zum Hausgebrauch erlaubt. — 15. Zuckerweine. Das Produkt der Gärung von frischen Trestern, Rohrzucker und Wasser. Fast sämtliche Bestandteile sind in viel geringeren Mengen vorhanden wie im Wein. Der Weinsteingehalt ist ungefähr derselbe, das Verhältnis Alkohol (Gew.⁰%) : Extrakt ist stark erhöht. — 16. Gezuckerte Weine. Erhalten durch Zusatz von Zucker zum gärenden Most. Sie verhalten sich in ihren Eigenschaften wie die gespritzten Weine, ihre Herstellung ist durch Gesetz vom 18. IX. 1908 verboten. — 17. Rosinenweine. Sie zeichnen sich hauptsächlich durch äußere Merkmale aus; sie sind trübe oder opalisierend. Reduzierender Zucker, Extrakt und Asche sind etwas erhöht. Ihr Zusatz zu Naturweinen ist sehr schwer nachzuweisen. — 18. Mit Gummi oder Dextrin versetzte Weine. Der Zusatz von Gummi oder Dextrin, sowie aller anderer Substanzen zum Zwecke der Erhöhung des Extraktgehaltes ist verboten. — 19. Kranke Weine. Als ungeeignet zum Genuß und verdorben sind anzusprechen übermäßig saure, umgeschlagene und zäh gewordene Weine. — 20. Ein Gehalt an Spuren von Kupfer zieht keine Beanstandung nach sich. (Gesetz vom 17. XII. 1903.) — B. Belege zur Auslegung der Resultate von Weinessiganalysen. 1. Jeder Weinessig muß mindestens 4⁰% Essigsäure enthalten. 2. Geruch und Geschmack müssen ausgesprochen weinig sein. 3. Er muß klar sein und darf keine mit dem bloßen Auge sichtbaren Älchen oder andere Organismen enthalten. 4. Freie Mineralsäuren, fremde organische Säuren, giftige Metallsalze, Bitterstoffe und empyreumatische Stoffe müssen fehlen — C. Belege zur Auslegung der Resultate der Analysen portugiesischer Olivenöle. 1. Spez. Gewicht. Es beträgt bei 15⁰ 0,915—0,918 mit einem Mittel von 0,9166. — Höheres spez. Gew. deutet auf Verfälschung hin, da sämtliche anderen Öle mit Aus-

nahme des Rüböles ein höheres spez. Gewicht haben. — 2. Brechungsindex (Wollny-Zeiß. Er schwankt zwischen 1,4682 und 1,4660 mit einem Mittel von 1,4670. — 3. Freie Säuren. Die Säurezahl schwankt je nach der Fabrikation sehr. — 4. Jodzahl. Sie ist die beste Konstante zum Nachweis von Verfälschungen; sie schwankt zwischen 75 und 85 mit einem Mittel von 80,5. Die zur Fälschung in Betracht kommenden Öle haben alle eine Jodzahl von über 88. — 5. Verseifungszahl. Sie schwankt zwischen 182 und 202 mit einem Mittel von 194. Eine niedrigere Verseifungszahl spricht für eine Verfälschung mit Rüböl oder Mineralöl. — 6. Die Schwefelsäure-Thermalzahl ist 34—41,5° mit einem Mittel von 38,5°. Eine Erhöhung im Einklang mit der Erhöhung des Brechungsindex und der Jodzahl zeigt dieselben Verfälschungen an. Einwirkung von nitrosen Dämpfen. Bei der Elaidinreaktion wird Olivenöl zu einer festen, weißen oder grünlichen Masse. — 8. Erstarrungspunkt. Er schwankt zwischen 2 und 4° mit einem Mittel von 2,5°. — 9. Schmelzpunkt und Erstarrungspunkt der Fettsäuren. Ersterer beträgt 27—28,5°, letzterer 21,5—23°. — 10. Die Löslichkeit in absolutem Alkohol beträgt 43—48⁰/₁₀₀. — 11. Flüchtige Säuren (Reichert-Meißl'sche Zahl). Kommt für die Analyse kaum in Betracht, da schon geringe Mengen flüchtiger Säuren durch den Geruch erkennbar sind. — 12. Farbenreaktionen. Olivenöl soll klar sein und normalen Geruch und Geschmack besitzen. — Es darf keine Arachinsäure enthalten und keine Farbenreaktionen auf Sesam- und Baumwollsaatöl geben. *C. Grimme.*

Th. v. Feilenberg: Die Bestimmung der höheren Alkohole im Wein. (Mitteil. a. d. Gebiete d. Lebensmittelunters. und Hygiene, veröffentl. vom Schweizer. Gesundheitsamt 1912, **3**, 231—235.) — Nach Versuchen des Verf.'s kann man die höheren Alkohole colorimetrisch mit Salicylaldehyd und konc. Schwefelsäure bestimmen. Man hatte gehofft, durch die Bestimmung der höheren Alkohole einen Maßstab für die Erkennung von gallisierten Weinen, Tresterweinen und Kunstweinen zu gewinnen. Die vom Verf. angestellten Versuche haben indessen gezeigt, daß sich aus dem Gehalt eines Weines an höheren Alkoholen kein Schluß auf dessen Echtheit ziehen läßt. Die Bildung des Fuselöls scheint nicht dem Eiweißgehalte des Weines proportional zu laufen, sondern von verschiedenen Faktoren abzuhängen, z. B. der Art der Hefen- und Bakterienflora und der Gärtemperatur. Die vom Verf. gefundenen Werte bieten aber Anhaltspunkte über die Menge höherer Alkohole, die im Kognak zu erwarten sind. Der Gehalt an höheren Alkoholen schwankte bei 35 Naturweinen von 0,162 bis 0,455 (0,600)⁰/₁₀₀ des Weines oder 1,7 bis 4,30 (6,18)⁰/₁₀₀ des Alkohols. Der Fuselgehalt der Trockenbeerweine ist im Durchschnitt etwas niedriger als derjenige von Naturweinen; Tresterweine liefern dagegen normale Zahlen. Verf. stellte weiter bei einem Weine fest, daß bei der Destillation von 100 ccm des Weines die zuerst übergehenden 25 ccm 99,5⁰/₁₀₀, die zweiten 25 ccm aber die übrigenbleibenden 0,5⁰/₁₀₀ der höheren Alkohole enthielten. *A. Behre.*

Fernand Repiton: Bestimmung der Säuren des Weines. Untersuchungen über die verschiedenen Indikatoren. (Annal. des Falsific. 1911, **4**, 578—580.) — Von den untersuchten je 10 synthetischen und natürlichen Indikatoren empfiehlt Verf. Phenolphthalein und Fluorescein. Man löst einerseits 7 g Phenolphthalein kalt in 90 ccm neutralem 95⁰/₁₀₀-igem Alkohol, andererseits 1,2 g Fluorescein kalt in 100 ccm neutralem 95⁰/₁₀₀-igem Alkohol. Zur Bestimmung der Säure im Wein gibt man 5 ccm des klaren oder filtrierten Weines in ein breites Becherglas, versetzt mit 5 Tropfen Phenolphthaleinlösung und 3 Tropfen Fluoresceinlösung, erhitzt auf dem Wasserbade zum Sieden und verdünnt mit 5 ccm ausgekochtem und wieder erkaltetem destilliertem Wasser. Die Temperatur der Flüssigkeit geht dadurch auf etwa 50° zurück. Darauf wird sofort mit ¹/₂₀ N.-Kali- oder Natronlauge bis zum

Farbenumschlag titriert. Verbrauchte ccm Lauge $\times 0,49 =$ Gesamtsäure im Liter Wein, berechnet als Schwefelsäure.
C. Grimme.

André Kling und L. Gobert: Bestimmung der Weinsäure in Äpfelweinen, Birnenmosten, Essigen etc. (Annal. des Falsific. 1911, 4, 185—192.) — Die Verff. haben die Kling'sche Racematmethode (Z. 1912, 24, 653) bei zahlreichen Proben von Äpfelwein, Birnenmost, Weinessig und Wermutschnäpsen angewandt mit dem Erfolge, daß sie das Verfahren selbst zur exaktesten Bestimmung von Weinsäure empfehlen.
C. Grimme.

G. Warcollier: Bestimmung von Weinsäure in Äpfeln und Birnen, in Äpfel- und Birnenwein. (Annal. des Falsific. 1911, 4, 485—490.) — Vergleichende Bestimmungen von Weinsäure nach den verschiedenen Verfahren, erläutert an zahlreichen Tabellen. Verf. kommt zu folgendem Schlusse: 1. Die Bestimmung von Weinsäure in Äpfel- und Birnenwein nach den Verfahren von Berthelot und de Fleurieu, Pasteur und Reboul, Mestrezat und Muttelet ist ungenau. 2. Sehr gut brauchbar ist die Kling'sche Racematmethode. (Z. 1912, 24, 653.) 3. Äpfel und Birnen, natürlicher Äpfel- und Birnenwein enthalten keine Weinsäure.
C. Grimme.

Monimart: Die Bestimmung der schwefligen Säure in den Weißweinen. (Rep. de Pharmacie 1912, [3], 24, 149—150.) — Das Auffangen der schwefligen Säure in $\frac{1}{10}$ N.-Jodlösung eignet sich deswegen für die Praxis nicht, weil diese Jodlösung nicht haltbar ist. Unter Berücksichtigung der Formel $\text{Cr}_2\text{O}_7\text{K}_2 + 6 \text{KJ} + 14 \text{HCl} = 6 \text{J} + \text{Cr}_2\text{Cl}_6 + 8 \text{KCl} + 7 \text{H}_2\text{O}$ wird berechnet, daß man 1,96 g Kaliumbichromat pro Liter lösen muß, damit 50 ccm dieser Lösung 100 ccm $\frac{1}{10}$ N.-Jodlösung oder 0,254 g Jod entspricht. Durch Hinzufügen von 10 ccm Salzsäure und 5 ccm 10%-iger Jodkaliumlösung setzt man die entsprechende Jodmenge in Freiheit. Der zu untersuchende Wein wird zunächst mit 3 ccm Sodalösung stehen gelassen, dann mit 10 ccm verdünnter Schwefelsäure angesäuert und unter Zugabe von etwas Stärkelösung mit der obigen Jodlösung titriert. 1 ccm der Jodlösung entspricht 0,64 g schwefliger Säure.
A. Behre.

G. Hinard: Analyse von Flüssigkeiten, welche viel Weinsäure neben wenig Glycerin und Tannin enthalten. (Annal. des Falsific. 1911, 4, 391—397.) — Verf. berichtet über seine Versuche, ausgeführt in Gemeinschaft mit Magnier de la Source und Kling. Er empfiehlt folgende Methoden: 1. Trockensubstanz: Eine Krystallisierschale von 80 mm Durchmesser und 20 mm Höhe wird mit 4—5 g fein gepulvertem, ausgeglühtem Bimsstein beschickt, letzterer mit 5 ccm der zu untersuchenden Flüssigkeit getränkt und das Ganze zunächst im Vakuum über konc. Schwefelsäure bei gewöhnlicher Temperatur, dann über Phosphorsäureanhydrid bei 50° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. — 2. Glycerin: 100 ccm Flüssigkeit von bekanntem Säuregehalte werden mit N.-Kalilauge zwecks Bildung von Bitartrat halb gesättigt, letzteres abfiltriert und mit kaltem Wasser oder Alkohol ausgewaschen. Die vereinigten Filtrate werden in einer Schale von 250 ccm Fassungsvermögen mit einer wässrigen Anschwemmung von einigen Gramm frisch gefälltem Bleihydroxyd gut gemischt, die Mischung auf dem Wasserbade abgedampft und bei 50° getrocknet. Der Rückstand wird zerrieben, öfters mit wenig starkem Alkohol ausgekocht, schließlich nach dem Aufbringen auf ein Filter mit heißem Alkohol ausgewaschen. Die vereinigten alkoholischen Lösungen werden durch Kohlensäure entbleit, das Filtrat wird mit dem gleichen Volumen Äther versetzt, mit einigen Gramm ausgeglühtem Kaliumcarbonat durchgeschüttelt und bis zum anderen Morgen stehen gelassen, sodann abfiltriert und der Rückstand mit einer Mischung von Alkohol und trockenem Äther ausgewaschen; die vereinigten Filtrate werden bei 50° abgedunstet und der Rückstand

im Vakuum über Schwefelsäure oder Phosphorpentoxyd bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. — 3. Weinsäure und Tannin: 10 ccm der Flüssigkeit werden mit Wasser auf 100 ccm verdünnt und in 10 ccm der Lösung die Weinsäure wie im Wein bestimmt. Das Tannin wird nach dem Abstumpfen der Weinsäure mit Natriumbicarbonat nach dem Verfahren von F. Jean bestimmt. *C. Grimme.*

Spirituosen und Essig.

G. Heinzelmann: Zur Beurteilung des Fuselöles. (Deutsche Essigindustrie 1912, **16**, 434—437.) — Infolge der im letzten Jahre zurückgegangenen Spritfabrikation hat auch die Gewinnung des Fuselöls entsprechend abgenommen, und dieses ist teurer geworden; 100 kg mit dem handelsüblichen Gehalt von 10 % Wasser und Alkohol kosteten Ende Oktober bis 280 Mk. Im Institut für Gärungsgewerbe in Berlin ausgeführte Untersuchungen von Fuselölen des Handels führten mehrfach zu Beanstandungen und lehrten, daß man beim Einkauf von Rohfuselöl zurzeit besonders vorsichtig zu Werke gehen muß. Verf. gibt den Rat, ein Rohfuselöl nur nach seinem garantierten Gehalt an Amylalkoholen zu bezahlen und empfiehlt deren Bestimmung durch fraktionierte Destillation unter Verwendung eines nach Angabe des Verf.'s konstruierten Destillationsaufsatzes, des „Birektifikators“, der von den Vereinigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf in Berlin geliefert wird. Das Rohfuselöl ist ein Gemisch von Wasser mit den verschiedensten Alkoholen der homologen Reihe vom Äthylalkohol bis zu den Amylalkoholen, von denen hauptsächlich der optisch inaktive primäre Isoamylalkohol (Isobutylcarbinol, Siedepunkt 130—131°) und der optisch aktive Amylalkohol (Methyl-äthylcarbinol, Siedepunkt 127—128°) vorhanden sind; dem größeren oder geringeren Gehalt an letzterem verdankt der Gärungsamylalkohol sein mehr oder minder starkes Linksdrehungsvermögen. Außer diesen sind an sog. leichter siedenden Fuselölen der Propyl- und Isopropylalkohol, Butyl- und Isobutylalkohol zu nennen. Die Mengenverhältnisse der einzelnen Alkohole schwanken je nach den Rohstoffen, aus denen der zur Rektifikation gelangte Rohspiritus gewonnen war; der Gehalt an Amylalkoholen beträgt zwischen 45 und 70 % und ist am reichlichsten in Melassefuselöl. Das spez. Gewicht der Rohfuselöle schwankt zwischen 0,810 bis 0,850. Verf. empfiehlt, 1500 ccm Rohfuselöl unter Anwendung des erwähnten Destillationsaufsatzes aus einem Glaskolben über freiem Feuer langsam in folgende Fraktionen zu trennen: Fraktion a von 85—90°, b von 90—115°, c von 115—127°, d von 127—131°. Es wird auf einen 0,5—0,7 Vol.-% betragenden Destillationsrückstand von aus dem Rohspiritus stammendem Schmieröl zu rechnen sein. Fraktion a wird dann noch einmal für sich aus dem Wasserbade destilliert, aus dem im Kolben verbleibenden Rückstände mittels Kochsalz das Fuselöl ausgesalzen und im Scheidetrichter abgetrennt; ebenso wird mit Fraktion b verfahren. Die vereinigten Fuselölmengen werden nun erneut über offener Flamme fraktioniert. Verf. konnte so in einem Falle aus den Fraktionen a und b noch 175 ccm eines Destillats gewinnen, das einen Siedepunkt über 127° zeigte und sich somit als Amylalkohol erwies. *Fr. Hühn.*

X. Roques: Belege über die Zusammensetzung von Branntweinen aus Wein. (Annal. des Falsific. 1910, **3**, 286—290.) — Eine vergleichende Untersuchung von Weißweinen aus der Gegend von Charante und Armagnac sowie von daraus hergestellten Branntweinen. Die erhaltenen Resultate sind in mehreren Tabellen zusammengestellt, betreffs derer auf das Original verwiesen wird. *C. Grimme.*

G. Warcollier und Le Moal: Über die Zusammensetzung von Obstbranntweinen. (Annal. des Falsific. 1910, **3**, 530—532.) — Vollständige Analyse von 43 Äpfelbranntweinen, 9 Birnenbranntweinen und 8 Kunstprodukten. Aus den erhaltenen Resultaten lassen sich keine einheitlichen Grenzwerte ziehen.