Wie steht es nun mit den pathologisch-anatomischen Befunden? Auch hier wird man zu Zeiten bestehender Cholera-epidemien in typischen Fällen, wenn man einen schwappend gefüllten Dünndarm mit seiner hellrosig injicirten Serosa, wie den hier vorliegenden (Demonstration), und mit der die letztere in einem grossen Procentsatz der Fälle bedeckenden fadenziehenden, klebrigen Flüssigkeit vor sich hat, wenn man den mit Flocken untermischten, bald mehr reiswasser-, bald mehr mehlsuppenartigen Dünndarminhalt von stark alkalischer Reaction zu sehen bekommt, mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit sein Votum auf Cholera asiatica abgeben können. Aber, m. H., von diesem Bild kommen in zahlreichen Fällen so wesentliche Abweichungen vor, dass man, zumal in epidemiefreien Zeiten, mit seinem Urtheil wird zurückhalten müssen, ganz besonders, wenn es sich um die Begntachtung eines ersten, zur Obduction kommenden Falles handelt. Die klebrige Beschaffenheit der Serosa fehlt häufig genug, auch die bei einzelnen Individuen sehr ausgesprochene rosige Injection der Darmwandungen wird nicht selten vermisst, und ebenso bietet, wie die klinisch zu controllirende wechselnde Qualität der Dejectionen, so der Darminhalt keineswegs regelmässig die bekannte reis- oder mehlsuppenartige Consistenz und Färbung dar. Man findet schon bei innerhalb der ersten 24 Stunden im Choleraanfall Verstorbenen, und bei etwas längerer Dauer der Krankheit erst recht, mehr oder weniger stark hämorrhagische, dünnflüssige, nichts von flockigen Beimengungen enthaltende Massen im Dünndarm, und da der Befund an den übrigen Organen, sowohl der Bauch- als Brusthöhle, keinerlei als pathognomonisch anzusehende Veränderungen aufweist, würde man auch in Epidemiezeiten in einer sehr grossen Zahl der Fälle sich in Zweifel inbetreff einer genauen Diagnose befinden, wenn man nicht seit der Entdeckung des Kommabacillus durch R. Koch in der Lage wäre, in absolut sicherer Weise eine Entscheidung treffen zu können.

Wenn man sich auf den ätiologischen, allein als maassgebend anzusehenden Standpunkt stellt, dann kann man, es mag nur der klinische Verlauf und pathologisch-anatomische Befund in dem einen oder anderen Sinne zu verwerthen sein, nur dann die Diagnose auf Cholera stellen, wenn es gelingt, den Nachweis des Kommabacillus zu erbringen.

Zur Lösung dieser Aufgabe stehen uns zwei Mittel zu Gebote, die immer gleichzeitig in Anwendung zu ziehen sind: 1) die Untersuchung des (Dünn-) Darminhalts resp. der Dejectionen in gefärbten Deckglaspräparaten mittels des Mikroskops und 2) die Züchtung des Kommabacillus aus Darminhalt oder Dejectionen mittels des Plattenculturverfahrens.

In einer bestimmten Zahl von Fällen und gerade bei den ersten, so acut verlaufenden trifft man bei Entnahme geeigneter Partikelchen des Darminhalts zum Zweck der Anfertigung von Deckglaspräparaten in diesen so enorme Mengen des Kommabacillus [Demonstration], bisweilen ohne gleichzeitige Anwesenheit irgend welcher anderer Bakterien, dass man sich, wie ich dies bei dem ersten in dieser Epidemie von mir untersuchten Falle gethan habe, schon auf Grund der mikroskopischen Prüfung des Darminhalts für berechtigt halten kann, die Diagnose auf Cholera asiatica zu stellen.

Andere male sind die Koch'schen Vibrionen im Darminhalte auch in den für die Untersuchung besonders empfehlenswerthen flockigen Beimengungen viel spärlicher anzutreffen, erst recht dann, wenn der letztere makroskopisch nichts mehr von seinem charakteristischen Aussehen darbietet. Freilich gelingt es bei einiger Uebung, auch wenn nur ganz vereinzelte Individuen des Kommabacillus in den Präparaten vorhanden sind, diese herauszufinden und, selbst wenn zahlreiche andere Bakterienarten die Betrachtung erschweren, mit Sicherheit zu recognosciren.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass man neben den Koch'schen Kommabacillen im Darminhalte auch andere leicht gebogene Bakterien antrifft, die indess zu einer Verwechslung mit dem ersteren durchaus nicht führen können, da sie sich durch ihre beträchtlichere Länge, grössere Dünne und viel schwächere Imprägnirung mit Anilinfarbstoffen ohne weiteres von diesen unterscheiden lassen.

Ein viel feineres und schärferes Reagens als das Mikroskop, resp. die menschliche Netzhaut für den Nachweis des Kommabacillus ist die Culturplatte, auf der es mühelos gelingt, selbst eine einzige Colonie innerhalb der ersten 24–36 Stunden in sicherster und bequemster Weise zu entdecken. Von dem charakteristischen Aussehen der, bei durchfallendem Licht betrachtet, wie von Luftbläschen durchsetzt erscheinenden, bei auffallendem Licht inspicirt, zahlreiche kleinste, grubchenartige Einsenkungen darbietenden Gelatineplatte werden Sie sich an den mitgebrachten Demonstrationsobjecten unschwer überzeugen können. Eine solche Gelatineplatte zeigt ein so eigenartiges Bild, dass, wer sich dasselbe einmal eingepägt hat, es nie wieder vergessen und mit dem bei der Cultivirung irgend eines anderen Mikroben er-

III. Ueber die Diagnose der Cholera asiatica.¹⁾

Von Dr. Eug. Fraenkel.

M. H.! Der auf der heutigen Tagesordnung stehende Vortrag des Herrn Michael wird voraussichtlich zu einer eingehenderen Besprechung der Therapie der Cholera Anlass geben. Sie gestatten mir daher vielleicht, mit einigen Worten auf die diagnostische Seite der Krankheit einzugehen. Es wird das vielleicht manchem überflüssig erscheinen, weil im allgemeinen die Ansicht vorherrscht, dass die Cholera zu den leicht erkennbaren Krankheiten gehört. So bereitwillig ich nun auch zugebe, dass es kaum mit Schwierigkeiten verknüpft ist, zumal an Orten, wo eine Epidemie herrscht, die ausgesprochenen Fälle mit Erbrechen, Reiswasserstühlen und Muskel-, speciell Wadenkrämpfen als Cholera zu erkennen, so muss ich doch auf der anderen Seite betonen, dass man, insbesondere wenn es sich um den ersten Fall an einem nicht von einer Choleraepidemie heimgesuchten Ort handelt, und nun gar bei dem Vorhandensein weniger prägnanter Symptome, von denen das eine oder andere sogar fehlen kann, in arge Verlegenheit inbetreff der Deutung dieser Fälle und ihrer Unterscheidung von Cholera nostras kommen wird. Speciell was die Reiswasserstühle anlangt, möchte ich bemerken, dass diese häufig genug nicht zur Beobachtung gelangen, und dass man, wenn es sich um sehr stürmisch verlaufende Erkrankungen handelt, ausgesprochen blutige, andererseits bei weniger acut einsetzenden Processen gelbbraunliche, noch gallig gefärbte Dejectionen zu sehen bekommt. Besteht ansserdem kein Erbrechen, sind ferner Wadenkrämpfe nicht vorhanden, dann bieten derartige Fälle, auch in Cholerazeiten, der Erkenntniss die grössten Schwierigkeiten dar.

¹⁾ Vortrag, gehalten im ärztlichen Verein zu Hamburg am 20. September 1892.

zielten verwechseln wird. Es sind dabei nur zwei Momente zu beachten, einmal dass man zu den Culturen eine deutlich alkalisch reagirende Gelatine verwendet, und dass man die Platten einer Temperatur möglichst zwischen 20 und 24° C aussetzt. Unter Beobachtung dieser Cautelen gelingt es meist schon nach 20 Stunden, die kleinen, nicht scharf contourirten, an das Aussehen feinstgehackten Glases erinnernden Colonieen des Kommabacillus zu erkennen, welche nach 30—36 Stunden durch beginnende Verflüssigung der Gelatine das oben geschilderte, eigenartige Aussehen der Plattencultur herbeiführen; damit ist der exacte und allein ausschlaggebende Beweis für die Diagnose der Cholera asiatica im concreten Falle erbracht.

In gleicher Weise charakteristisch, wie das Aussehen der Gelatineplatte, ist dasjenige der Gelatinestichcultur, von denen ich Ihnen eine Anzahl, das Wachsthum des Kommabacillus aufs anschaulichste illustirender, 1—6 Tage alter Culturen herumreiche. Sie tragen zur Vervollständigung und weiteren Sicherung der Diagnose bei, sind aber für die Begründung derselben nicht erforderlich. Für diese genügt der mikroskopische Befund an mit Dünndarminhalt bestrichenen und in bekannter Weise gefärbten Deckglaspräparaten und das oben geschilderte Ergebniss der Plattencultur.

Von der Besprechung der anatomischen Veränderungen der Darmschleimhaut, namentlich in den späteren Stadien der Erkrankung, sehe ich für heute ab und möchte Ihnen zum Schluss noch eine Anzahl von Nieren an Cholera Verstorbenen vorlegen, an denen Sie alle Stadien der schweren, sich an diesen Organen abspielenden Prozesse aufs deutlichste erkennen können. Ich behalte mir für eine spätere Gelegenheit vor, auf diesen Gegenstand ausführlicher einzugehen und beschränke mich für heute darauf, zu bemerken, dass es gelingt, auch bei nur einige Stunden an Cholera erkrankt gewesenen, in rapidester Weise zu Grunde gegangenen Personen an den für das blosse Auge unverändert erscheinenden Nieren mittels des Mikroskops die Anwesenheit schwerer Degenerativzustände am Protoplasma der gewundenen Canälchen aufzudecken.