26, 544.) — Die Erfindung betrifft eine Neuerung in dem Verfahren zur Herstellung von Brot aus Getreide, wie Weizen, Roggen, Mais, Reis, Hülsenfrüchten u. s. w. unter Zuhilfenahme von Knollengewächsen, Kartoffeln, Rüben etc., und zwar soll das Vermengen dieser Nährstoffe in der Weise geschehen, daß die ganzen Körner der Getreidearten und Hülsenfrüchte mit den zerkleinerten rohen Knollenfrüchten und dergl. innig gemengt werden und der Saft der letzteren ausschließlich zum Quellen der ganzen Getreidekörner benutzt wird, derart, daß nicht nur die Nährsalze der Körner, sondern auch die der Knollenfrüchte in dem erzeugten Gemenge vollständig enthalten bleiben. Zu diesem Zweck werden die ganzen Getreidekörner oder die Körner der Hülsenfrüchte in einem Brei der rohen Knollenfrüchte oder in einem aus Wasser und aus ohne Verlust von Nährsalzen getrockneten Knollenfrüchten hergestellten Brei zum Quellen gebracht und das so zubereitete Gemenge zu Teig und Brot verarbeitet.

Charles Antoine Hendebort in Nanterre, Seine: Verfahren zur Herstellung eines kaseinhaltigen Brotes. D.R.P. 156797 vom 6. Januar 1903 (Patentbl. 1905, 26, 106). — Zur Herstellung des kaseinhaltigen Brotes bereitet man einen Teig aus an Gluten reichem Mehl, Hefe und Wasser, läßt den Teig etwa zwei Stunden treiben, setzt ihm dann ein Gemisch von demselben Mehl, Salz und Kasein zu und läßt nochmals gären. Das alsdann backfähige Brot enthält alle nährenden Bestandteile, welche der Organismus für seinen Unterhalt bedarf, in leicht assimilierbarer Form, in beschränktem Volumen und in geeigneten Verhältnissen.

Karl Aufsberg in Wiesbaden: Verfahren, eisenhaltige Backwaren herzustellen. D.R.P. 157307 vom 25. August 1903. (Patentbl. 1905, 26, 171.) — Die bis jetzt bekannt gewordenen Verfahren zur Herstellung von eisenhaltigen Backwaren, wie eisenhaltigem Brot, Biskuit, Kakes u. s. w. beschränken sich im wesentlichen darauf, dem Mehl oder Teig ein anorganisches Eisensalz beizumengen. Das Eisensalz ist in diesen Produkten aber in seiner ursprünglichen Form enthalten; eine wesentliche chemische Veränderung erleidet es durch die Teigbereitung oder den Backprozeß nicht. Nach vorliegender Erfindung werden nun dem Teig vor oder nach der Fermentierung Eisensaccharate oder andere Eisenkohlenhydrat-Verbindungen zugesetzt und der Teig dann in der üblichen Weise weiter verarbeitet. Diese genannten Verbindungen erleiden im Gegensatz zu den anorganischen Eisensalzen sowohl während der Teigbereitung als auch während des Backprozesses wesentliche chemische Veränderungen unter Bildung von Produkten, die in sehr naher Beziehung zu den Umänderungsprodukten stehen, die aus dem Mehle durch die Teigbereitung und den Backprozeß gebildet werden. Außerdem haben die fertigen Produkte den Vorzug, daß sie nicht nur ein einziges anorganisches Salz, sondern verschiedene organische, einander nahe verwandte Eisenverbindungen enthalten, wie Saccharate, Dextrinate und Saccharodextrinate, die das Produkt leicht verdaulich und assimilierbar machen.

Julius Kantorowicz in Berlin: Verfahren zur Herstellung von in kaltem Wasser quellender Stärke. D.R.P. 158861 vom 13. Oktober 1903. Zusatz zum Patent 157896 vom 3. Juli 1903. (Patentbl. 1905, 26, 602.) — In der Patentschrift 157896 ist ein Verfahren zur Darstellung neuer eigenartiger Stärkederivate beschrieben, die durch die Eigenschaft charakterisiert sind, bereits in kaltem Wasser zu einem Kleister aufzuquellen. Dieses Verfahren besteht im wesentlichen darin, daß man die Stärke in Gegenwart eines Gemisches von Wasser und einem mit Wasser mischbaren Alkohol mit Ätzalkalien behandelt. Die vorliegende Erfindung beruht nun auf der Beobachtung, daß sich an Stelle der Alkohole auch andere Flüssigkeiten verwenden lassen, die einerseits mit Wasser mischbar sind, andererseits mit Stärke keinen Kleister bilden, wie z. B. Aceton. Das Verfahren besteht dementsprechend darin, daß man fein pulverisierte Stärke mit Aceton verrührt, dieser Mischung Natronlauge von 30° B zusetzt, mit Essigsäure neutralisiert und das Produkt absaugt und trocknet

A. Oelker.

Gewürze.

Albert E. Leach: Die Normen für die Gewürze in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. — Gewürzuntersuchungen. (35. Jahresber. d. Gesundheitsamtes v. Massachusetts, Boston 1904, 497—499.) — Verf. teilt die in der Nordamerikanischen Union bestehenden Normen (standards) für die chemische Zusammensetzung der gebräuchlichsten Gewürze mit. Gewürz-Nelken: dürfen nicht weniger als 8% Gerbsäure, nicht mehr als 6% Mineralbestandteile, davon höchstens 0,5% in Salzsäure unlöslich, und nicht mehr als 25% Rohfaser enthalten. — Zimt: zulässiger Höchstgehalt an Gesamtasche 8%, an Sand 2%. — Cayennepfeffer Mindestgehalt an nichtflüchtigem Ätherextrakt 15%, Höchstgehalt an Gesamtasche

6,5 ‰, davon in Salzsäure unlöslich 0,5 ‰, an Stärke (nach der Diastasemethode) 1,5 ‰ und an Rohfaser 28 ‰. — Ingwer, ganz oder gemahlen: darf nicht weniger als 42 ‰ und nicht mehr als 46 ‰ Stärke (direkte Inversion) enthalten, ferner nicht mehr als 8 ‰ Rohfaser, 8 ‰ Gesamtasche, 1 ‰ Kalk und 3 ‰ in Salzsäure unlösliche Mineralbestandteile. — Senfpulver: zulässiger Höchstgehalt an Stärke (nach der Diastasemethode) 2,5 ‰ und an Gesamtasche 8 ‰. — Macis: darf nicht weniger als 20 ‰ und nicht mehr als 30 ‰ nichtflüchtigen Ätherextrakt, ferner nicht mehr als 3 ‰ Gesamtasche, davon in Salzsäure unlöslich nicht mehr als 0,5 ‰ und nicht mehr als 10 ‰ Rohfaser aufweisen. — Muskatnuß, gemahlen oder ganz, zulässiger Mindestgehalt an nichtflüchtigem Ätherextrakt 25 ‰, Höchstgehalt an Gesamtasche 5 ‰, davon 0,5 ‰ in Salzsäure unlöslich, und an Rohfaser 10 ‰. — Schwarzer Pfeffer: muß frei sein von beigemengten Pfefferschalen, Pfefferstaub und anderen Pfefferabfällen und darf nicht weniger als 6 ‰ nichtflüchtigen Ätherextrakt, 22 ‰ Stärke nach der Diastasemethode und 28 ‰ Stärke nach dem direkten Inversionsverfahren enthalten, ferner höchstens 7 ‰ Gesamtasche, wovon 2 ‰ in Salzsäure unlöslich, und 15 ‰ Rohfaser. 100 Teile des nichtflüchtigen Ätherextraktes müssen mindestens 3,25 Teile Stickstoff enthalten. — Weißer Pfeffer: soll nicht weniger als 6 ‰ nichtflüchtigen Ätherextrakt, 53 ‰ Stärke nach der Diastasemethode, 56 ‰ Stärke nach dem direkten Inversionsverfahren und 4 ‰ Gesamtasche enthalten; ferner nicht mehr als 0,5 ‰ in Salzsäure unlösliche Mineralstoffe und 5 ‰ Rohfaser. 100 Teile des nichtflüchtigen Ätherextraktes sollen zu mindestens 4 Teilen aus Stickstoff bestehen. — Von den vom Verf. mitgeteilten Gewürzfälschungen seien folgende angeführt: Von 184 Proben Gewürznelken waren 9 verfälscht, und zwar mit Weizenmehl, extrahiertem Ingwer, Kehrlicht und Schmutz. Ein Zimt bestand zu 30 ‰ aus Roggenmehl, Nußschalen und Curcuma. Eine Ingwerprobe enthielt 20 ‰ Curcuma. Senfpulver waren mit fremder Stärke, Curcuma und beigemengten Hüllen des Senfsamens verfälscht. Von 31 Macisproben waren nicht weniger als 18 verfälscht, meistens mit wildem oder Bombay-Macis. Eine Probe bestand zu mindestens 80 ‰ aus Roggen- und Weizenstärke und wildem Macis. Von 376 Pfefferproben erwiesen sich 43 als verfälscht; die gebräuchlichsten Fälschungsmittel waren hier Buchweizenmehl, Roggenstärke und Olivenkerne. Eine Probe bestand zu 20 ‰ aus Buchweizen-, eine andere zu 80 ‰ aus Roggenmehl.

C. A. Neufeld.

Eug. Collin: Über ein angebliches Pfeffersurrogat. (Répert. Pharm. 1904, [3], 16, 289—297 u. 337—338; auch Annal. chim. analyt. 1904, 9, 373—381 und Journ. Pharm. Chim. 1904, [6] 20, 241—244.) — Das angebliche Pfeffersurrogat ist ein Samenkorn, das von den Händlern mit dem Phantasienamen „Erviop“, dem Anagramm des französischen Wortes „Poivre“, bezeichnet ist. Es wird als ganze wie als gemahlene Ware angeboten; das Pulver kommt in zwei Marken vor, von denen die eine dem schwarzen, die andere dem weißen Pfeffer ähnlich sieht. Aus der eingehenden Untersuchung, welche der Verf. anstellte, ergab sich, daß das unter dem Namen Erviop angebotene Korn nichts anderes ist als der Same einer Leguminose, zum Genus Pisum oder Lathyrus gehörig. Das Korn, das von Natur aus glatt und fast geschmacklos ist, hat verschiedene Behandlungen erfahren, um ihm das runzelige Aussehen, die schwarze Farbe und die Schärfe des Geschmacks zu geben, welche die Pfefferfrucht charakterisieren. Die schwarze Oberfläche ist durch Behandeln derselben mit Eisensulfatlösung erzielt worden; die Gegenwart des Eisens läßt sich durch die gewöhnlichen Reaktionen leicht dartun. Der scharfe Geschmack wird dem Präparat durch Benetzen, Imprägnieren mit einer konzentrierten Tinktur von Capsicum oder einer Lösung von Capsicin beigebracht. Die Leichtigkeit, mit welcher diese künstliche Schärfe in Wasser übergeht, zeigt sofort das Kunstprodukt an. Die runzliche Oberfläche der Körner wird durch künstliches

Trocknen der so behandelten Ware erzielt und hält sich so lange als die Körner trocken bleiben. Die als Ervioppulver verkauften Produkte sind Gemenge der gepulverten ganzen Ware mit mehr oder weniger Beimischung von gepulverten Olivenkernen, von Capsicumsamenkörnern und anderen, nicht identifizierten Elementen. Die Erviopkörner werden auch zur Verfälschung der echten Pfefferkörner verwendet. Verf. hat den Bau der Samen und ihre anatomischen Elemente an der Hand von Zeichnungen erläutert.

H. Röttger.

Lythgoe: Untersuchung von echtem und Bombay-Macis. (35. Jahresber. d. Gesundh.-Amtes v. Massachusetts, Boston 1904, 498.) — Verf. stellte für die nichtflüchtigen Öle verschiedener Sorten von echtem Macis wie von Bombay-Macis folgende Brechungsindices bei 35° C fest: Banda-Macis 1,4747—1,4848; Batavia-Macis 1,4893—1,4975; Papua-Macis 1,4795—1,4816; Westindischer Macis 1,4766; dagegen Bombay-Macis 1,4615—1,4633. — Bei Zimmertemperatur bildet das nichtflüchtige Öl des Bombay-Macis ein dickes, zähflüssiges Fett, während es bei Penang- und anderen ersten Macisorten ein dünnes Öl darstellt.

C. A. Neufeld.

H. Schelenz: Feminell und Safranfälschung. (Pharm. Centralh. 1904, 45, 683—687.) — Verf. sucht in seiner Abhandlung die Frage zu beantworten: Was ist und was war Feminell? Er kommt zu dem Schlusse: Es ist jetzt sicher die geringfügige, beim Einsammeln kaum zu vermeidende Beimengung von gelben Griffeln, wie sie das D. A.-B. III auch ausdrücklich gestattete, und es war ein Verfälschungsmittel schwankender, kaum mehr festzustellender Art.

H. Röttger.

O. Linde: Feminell. (Pharm. Centralh. 1904, 45, 717.) — Verf. bemerkt zu der Abhandlung von H. Schelenz (vergl. vorstehendes Referat), daß es noch heute einen besonderen Handelsartikel Feminell gibt, der zum Fälschen von Safran benutzt wird; derselbe besteht aus Calendula-Blüten, die nach einem besonderen Verfahren präpariert und gefärbt sind. Diese Ware hat mit Safran eine derartige Ähnlichkeit, daß sie ohne weiteres, d. h. ohne Aufweichen in Wasser, aus echtem Safran nicht herauszufinden ist. Der Preis beträgt für 1 kg 10 Mark, während gewöhnliche Calendulablüten für 2,60 Mark zu haben sind.

Nach P. Süß (Pharm. Centralh. 1904, 45, 801) erwies sich der Farbstoff in der Linde'schen Probe als Methyloorange.

H. Röttger.

O. Linde: Zum Nachweise von Kurkuma. (Apoth.-Ztg. 1904, 19, 657—658.) — A. E. Bell (Pharm. Journ. 1902, 551) teilte mit, daß Kurkuma in Pulvermischungen mit Diphenylaminlösung (1 g Diphenylamin in 20 ccm 90 %-igem Alkohol und Zusatz von 25 ccm Acid. sulfuric. pur.) eine purpurrote Färbung gibt. E. Saul (Pharm. Journ. 1904, No. 1) berichtete sodann, daß diese Reaktion nicht dem Diphenylamin zukomme, sondern nur der Einwirkung von konzentrierter Schwefelsäure bei Gegenwart von Alkohol. Nach Verf. genügt Schwefelsäure für sich vollständig; die Reaktion ist indessen nicht neu. Sie ist bereits 1876 von O. Herrmann angewendet (A. Zimmermann's Botan. Mikrotechnik 1892, S. 103) und in dem anatomischen Atlas von Tschirch-Oesterle (1900, S. 93) heißt es: a) Mit konz. Schwefelsäure wird Kurkumarhizom tief orange gelb, dann vom Rande her orangerot; endlich erfolgt rotbrauner Niederschlag; die Säure bleibt farblos. b) Mit verdünnter Schwefelsäure (1 Tl. H₂SO₄, 2 Tle. H₂O) tritt im Kurkumarhizom partiell, vornehmlich in den Sekretzellen, karminrote Färbung auf, sonst gelbbraunliche; die Säure bleibt ungefärbt. — Bei der Untersuchung von Pulvern bringt man die Säure auf einen auf weißer Unterlage befindlichen Objektträger, trägt etwas Pulver auf und rührt um. Bei Anwendung von Alkohol-Schwefelsäure ist übrigens die Färbung eine schönere. Nach Linde genügt jedoch diese Reaktion für den sicheren Nachweis von Kurkuma nicht, weil auch andere vegetabilische Pulver mit Schwefelsäure Rotfärbung geben, so Cam-

pecheholz, Fernambukholz, Kubeben. Wahrscheinlich wird sich die Zahl der Drogen, welche die Reaktion geben, noch bedeutend vermehren lassen. *H. Röttger.*

Albert E. Leach: Nachweis von Curcuma. (35. Jahresber. d. Gesundh.-Amtes v. Massachusetts, Boston 1904, 498.) — Curcuma wird in Amerika vielfach zur Verfälschung von Senfpulver, gemahlenem Ingwer, Cayennepfeffer, Macis und anderen Gewürzen verwendet, wozu es sich wegen seiner intensiven tiefgelben Farbe namentlich eignet, wenn zugleich hellgefärbte Cerealienstärke als Fälschungsmittel beigemischt ist. Um Curcuma in einem gemahlenen Gewürze chemisch nachzuweisen, wird dieses mit Alkohol extrahiert. Der alkoholische Extrakt verleiht eingetauchtem Filtrierpapier eine gelbe Färbung, die — besonders nach dem Trocknen — auf Zusatz von Alkali in Rot umschlägt. Das getrocknete gelbe Filtrierpapier gibt nach dem Befeuchten mit Boraxlösung und Ansäuern mit Salzsäure die bekannte Rosafärbung, die mit verdünnter Alkalilösung in Olivenbraun übergeht. *C. A. Neufeld.*

Spirituosen und Essig.

A. Marbach: Über das neue Somló'sche Brennereiverfahren. (Zeitschr. Spiritusind. 1904, 27, 238.) — Nach den Untersuchungen des Verf.'s kann man Grünmalz durch Behandeln desselben mit heißem Wasser derart reinigen, daß man bei Verwendung solchen Malzes Gärungen von solcher Reinheit erhält, wie sie selbst bei sterilisierten Maischen nicht reiner sein können. Das Verfahren besteht darin, daß man das Malz einige Zeit hindurch in Wasser von etwa 44° R eintaucht und sodann mit kaltem Wasser nachwäscht; es wird hierdurch ein Teil der Bakterien von den Malzhülsen losgelöst und durch das nachfolgende Wasser weggeschwemmt; von den haftengebliebenen Bakterien aber werden die Sporen durch die günstigen Temperaturverhältnisse in der relativ nährstoffreichen Lösung des Malzwassers zum Auskeimen gebracht. Dadurch sind diese beim nachfolgenden Maischen in Form von vegetativen Zellen vorhanden, die schon bei Temperaturen von 59° C vernichtet werden. Die diastatische Kraft des Malzes erleidet durch diese Behandlung keinen Schaden. Da es indessen, um Reingärungen zu erzielen, nicht genügt, das Malz bakterienfrei zu erhalten, sondern auf dem Wege durch die Malzquetsche in das Einteiggefäß noch eine Gefahr der Infektion liegt, bedient sich Somló noch eines patentierten Apparates, um auch diese Infektionsquelle zu beseitigen. Derselbe besteht aus einer Zentrifugalmalzmühle und einem Malzeinteiggefäß, das hermetisch verschließbar ist und mit Dampf unter Druck sterilisiert werden kann. Durch dieses Verfahren nun gelingt es, Reingärungen zu erzielen, welche sogar die Reinheit der Flußsäuremaische übertreffen sollen. Das Verfahren bedingt außerdem die Gewinnung eines Alkohols von großer Reinheit und eine erhöhte Alkoholausbeute. *H. Röttger.*

G. Heinzelmann: Ein Beitrag zur Frage der Schwervergärbarkeit mancher Kartoffelsorten. (Zeitschr. Spiritusind. 1904, 27, 193.) — Nach den Versuchen des Verf.'s werden einige Kartoffelsorten zu scheinbar schwervergärenden erst durch die Behandlung mit Dampf bei ihrer Verarbeitung, indem mehr oder weniger Stoffe in Lösung gebracht werden, die später nicht vergärbar sind, jedoch die Alkoholausbeute nicht wesentlich herabsetzen. Von diesen Stoffen sind vielleicht in den einzelnen Kartoffelsorten geringere oder größere Mengen vorhanden, die sich auch noch bei verschiedenem Dampfdruck mehr oder weniger leicht auflösen oder zersetzen. Die Menge derselben ist jedenfalls in den einzelnen Jahren verschieden und sowohl vom Klima in der Vegetationszeit als auch von den Bodenverhältnissen sowie vom angewandten Dünger abhängig. Man soll daher bei schlechten Vergärungen bei einzelnen Kartoffelsorten die Kartoffeln möglichst schwach dämpfen und dann die vergorene Maische auf etwa noch vergärbare Zuckermengen untersuchen. Ist in der