XIX. Ein Fall von Lupus der Nase und Schleimhäute nach fünfwöchentlicher Behandlung mit Koch'schem Tuberkulin.

Von Prof. Dr. H. Krause, Berlin.

Meine Herren! Erlauben Sie mir, Ihnen einen Fall von Lupus der Nase, des Zahnfleisches, der Zunge und des harten und weichen Gaumens vorzustellen. Die Localisation ist nicht ganz gewöhnlich, und zum Theil deswegen, wie auch wegen des bisherigen prompten Heilungsverlaufs erlaube ich mir, vor Beginn der wichtigen Verhandlungen über das Koch'sche Verfahren den Fall zu demonstrieren, um Ihnen auch die Controlle des weiteren Verlaufes bei späterer Demonstration zu ermöglichen.

Die 22jährige Patientin leidet seit 4 Jahren an Lupus. Vor 2 Jahren war sie angeblich in Behandlung der hiesigen chirurgischen Universitätsklinik, wo die rechte Nasenhälfte mittels Ausschabungen behandelt worden ist, worauf es zu fast völligem Verschluss derselben gekommen ist. Dann kam sie am 10. Januar 1890 in unsere poliklinische Behandlung. Sie wurde mit Ausschabungen und tiefen Scarificationen nach Vidal behandelt, aber immer nur mit geringem Erfolge. Die lupösen Granulationen griffen so tief, dass an einer Stelle das Os palatinum freigelegt war, und was durch die Scarificationen zum Ausfall gebracht war, wurde nur theilweise zur Vernarbung gebracht, meist durch neue Wucherungen ersetzt. Sehr hartnäckig war die Affection am Zahnfleisch und an der Zunge, so dass selbst die wiederholten Scarificationen hier fast gar keinen Erfolg hatten. Am 12. Januar d. J. trat sie nun ein in die Behandlung nach Koch. Ich glaubte, da es sich um Schleimhautlupus handelte und bei der Wahrscheinlichkeit einer starken reactiven Volumenzunahme, vorsichtig sein zu sollen und begann mit einer Dosis von 5 mg. Die Reaction war aber doch eine sehr heftige, die befallenen Partien, die Zunge, der harte und weiche Gaumen, das Zahnfleisch und auch die Oberlippe schwellen mächtig an, rötheten sich, die Zunge bekam fast ganz das Aussehen einer Scharlachzunge. Auf den bisher nicht befallenen Partien zeigten sich neue, sehr schnell zerfallende Geschwüre, und da ausserdem das Fieber sehr hoch, über 40° stieg, Schwindelanfälle und Schlingbeschwerden eintraten, so war das Bild nach den ersten Einspritzungen ein ziemlich deprimirendes. Wir haben in der Folge die Injectionen 5 mal in gleicher Stärke wiederholt, bis zum fünften male immer mit einer darauffolgenden recht kräftigen Steigerung des Fiebers bis nahe an 40°. Bei der sechsten Einspritzung von 5 mg fiel die Temperatur bis auf 37,3 und stieg nachher, wie Sie aus der cursirenden Fiebercurve ersehen werden, nur noch einmal auf 38, um sich bis heute fast gar nicht wieder einzustellen. Bis heute, Ende der fünften Woche, sind 14 Injectionen gemacht und die Dosis von 0,06 erreicht worden.

Die nach den Injectionen beobachteten Veränderungen an den befallenen Partien waren recht charakteristische. Die alten erkrankten Partien schwellen ausserordentlich an, es traten auch Hämorrhagien auf, das Geschwür an der Zunge vergrösserte sich fast um das doppelte. Weiterhin wurden sämtliche kranke Partien nekrotisch und bedeckten sich überall mit grauen Belägen, nur die am Zahnfleisch nicht. Allmählich stiessen sich bis auf wenige die grauen Beläge ab, die Geschwüre reinigten sich, das Geschwür an der Zunge ist mit einer seichten Vertiefung glatt vernarbt. Indessen fühlt man hier in der Tiefe noch infiltrirte Knoten, die vielleicht ein chirurgisches Eingreifen erforderlich machen werden. In der Zwischenzeit hatte das Körpergewicht innerhalb 3 Wochen um 12 Pfund abgenommen, hat sich aber neuerdings wieder um 4 Pfd. gehoben. Die Gewichtsabnahme ist nicht ausschliesslich auf das Fieber zurückzuführen, sondern auch auf die behinderte Nahrungsaufnahme, weil in den ersten zwei Wochen infolge der Anschwellung der Zunge und der Fauces die Patientin kaum flüssige Gegenstände zu sich nehmen konnte. Am Gaumen sieht man augenblicklich an Stelle der lupösen Granulationen, genau die alten Contouren innehaltend, die tief eingesunkenen Narben, glatte Narben, wie man sie bei keiner anderen Behandlungsart von Lupus erzielen kann. Mitten in den Narben sieht man einen zackigen grauen Belag, der sich noch nicht abgestossen hat, aber nach dem bisherigen Vorgang zu schliessen, innerhalb einer Woche wohl vernarbt erscheinen wird. Etwas langsamer ist der Verlauf am Zahnfleisch. Obgleich von beiden

¹⁾ Vortrag, gehalten im Verein für innere Medicin am 16. Februar 1891.

Rändern her schon $1\frac{1}{2}$ cm nach der Mitte zu vernarbt sind, sind doch noch Geschwürsflächen vorhanden und auch noch zeitweise auftretende Knötchen. Es wird vielleicht, wenn es nicht möglich sein sollte, durch diese Behandlung vollständige Heilung zu erreichen, nothwendig sein, ausserdem noch Scarificationen vorzunehmen. Der Verlauf an der Nase ist der übliche. Ich habe an dem rechten Naseneingange die Verwachsung getrennt und bis jetzt offen gehalten; an einzelnen Stellen sieht man schon die gewöhnliche glatte Narbe.

Ueber den weiteren Verlauf behalte ich mir Berichterstattung vor.