zeitiges Vorhandensein von der dem Schweineschmalz ähnlichen Konsistenz, sowie dem Schweineschmalz ähnlichem Geruch und Geschmack“ — so werden Sie mir wohl zugeben, dass die Farbe, wenn nicht als Hauptmerkmal der Ähnlichkeit, so doch als Hauptkennzeichen der „Unähnlichkeit“ wirken kann.

Dies trifft nun bei dem soeben besprochenen Fettgemisch aus Kokosnussbutter, Rindsfett und Butterfarbe zweifellos zu — aber ebenso zweifellos trifft dann derselbe Unterschied, d. h. die Unähnlichkeit zu bei allen anderen Fettgemischen, die ungefärbt als „Kunstspeisefett“ im Sinne des Gesetzes zu gelten hätten, im gelbgefärbten Zustande aber mit dem Schweineschmalz nicht zu wechseln sind.

Darum könnte man den Kunstspeisefett-Fabrikanten den Rath geben: „Färbt Eure Fabrikate gelb — dem Butterschmalz ähnlich — dann macht Euch das Margarinegesetz keine Sorge mehr!“

„Margarine fabricirt Ihr nicht (Vergl. die gerichtlichen Entscheidungen!) — aber auch nicht Kunstspeisefett im Sinne des Gesetzes, denn als solche werden dort nur die dem Schweinefett ähnlichen, also weissen Zubereitungen, deren Fettgehalt nicht ausschliesslich aus Schweinefett besteht, verstanden.“

Dem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach fabricirte der erwähnte Fabrikant allerdings „Kunstspeisefette“ — ebenso wie der Margarinefabrikant nichts anderes als „Kunstspeisefett, oder Kunstbutter“ herstellt, und der Eine wie der Andere beginge keine Täuschung in Handel und Verkehr, wenn er seine Erzeugnisse so bezeichnen würde; — aber das Margarinegesetz will eben doch anders!

Es wird Sache der maassgebenden Stellen sein, dafür zu sorgen, dass die Absichten des Margarinegesetzes besser erreicht werden, als bisher.

Wiederholt muss ich erklären, dass es ganz verfehlt ist, immer und immer wieder auf Verschärfungen der Kontrolle zu dringen und damit Fabrikanten und Händler zu belästigen, ehe nicht die Lücken des Gesetzes, die thatsächlich bestehen, ausgefüllt sind.

Referate.

Fleisch, Fleischwaaren und diätetische Nahrungsmittel.

J. W. Mallet: Die physiologische Wirkung von Kreatin und Kreatinin und ihr Werth als Nahrungsmittel. — Chem. News 1899, 80, 43–45, 54–56, 69–71 und 77–78.

In Rücksicht auf den hohen Gehalt des Fleischextraktes an basischen Substanzen erschien es wünschenswerth, den Nährwerth derselben festzustellen, um so mehr als die Ansichten der Physiologen in dieser Hinsicht auseinander gehen. Der Verf. führt die einschlägige Litteratur und die von Munk, Meissen, Voit und Rubner ausgeführten Thierversuche an und berichtet dann über seine eigenen diesbezüglichen Arbeiten. Er ging aus von reinem, umkrystallisirten Kreatin und Kreatinin und stellte

zunächst einige Litteraturangaben, betreffend Eigenschaften und Verhalten dieser Basen richtig. Gegen Lackmus reagirt Kreatin neutral, Kreatinin äusserst schwach alkalisch. Mit einer salzsauren Lösung von Phosphorwolframsäure giebt Kreatin einen geringen, allmählich zunehmenden krystallinischen Niederschlag, während Kreatinin schneller und reichlicher ausfällt. Quecksilbernitrat giebt keine Fällungen mit den beiden Basen, während Harnstoff einen reichlichen Niederschlag mit dem Reagens liefert. Des Weiteren beschreibt der Verf. seine Methode zur Trennung von Kreatin, Kreatinin und Harnstoff im Urin. Dieselbe besteht in der Abscheidung der Phosphate durch salpetersauren Kalk, Fällung des Harnstoffs durch Quecksilbernitrat und Trennung des vom Quecksilber befreiten Filtrats nach dem Eindampfen mit 90%-igem Alkohol, welcher nur das Kreatinin aufnimmt. Das Letztere wurde dann schliesslich mit Chlorzink niedergeschlagen. Bei Versuchen mit künstlichen Mischungen von Harnstoff, Kreatinin und Kreatin mit Harn von bekanntem Gehalt wurden nach der vorstehenden Methode vom Harnstoff 96,4 %, vom Kreatinin 95 % und vom Kreatin 86,9 % wiedererhalten.

Die physiologischen Versuche wurden in der Weise ausgeführt, dass bestimmte Mengen Kreatin und Kreatinin eingenommen und im Harn diese Basen sowie der Harnstoff bestimmt wurden. Selbst Mengen von 15 g der Basen übten keinen besonderen Einfluss auf den Organismus aus. Die Untersuchungen des Verf.'s hatten das folgende Ergebniss: Der grösste Theil der Fleischbasen, wenn nicht alle, werden durch die Nieren wieder ausgeschieden. Kreatinin wird unverändert abgeschieden, während Kreatin gänzlich oder zum grössten Theil in Kreatinin übergeht. In den Fäces konnte keine der Basen nachgewiesen werden. Die Annahme, dass der Harnstoff sich hauptsächlich aus dem Kreatin des lebenden Muskels bilde, erscheint wenig wahrscheinlich. Von besonderer Wichtigkeit sind die Ergebnisse der Untersuchungen des Verf. für die Beurtheilung der Fleischextrakte. Da die Fleischbasen sehr stickstoffreich sind, so kann man zu ganz irrthümlichen Anschauungen über den Nährwerth derselben kommen, wenn man nur den Stickstoffgehalt zu Grunde legt. Nach der Ueberzeugung des Verf. sind die eiweiss- und peptonarmen Fleischextrakte eher als Gewürze und Genussmittel, denn als Nahrungsmittel anzusehen. *A. Hebebrand.*

Fürst: Der gegenwärtige Stand der Fleischextraktfrage. — Vortrag, gehalten in der Abtheilung „Hygiene und Bakteriologie“ auf der 72. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Aachen vom 16. bis 22. September 1900.

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über Fleischextrakt im Allgemeinen wies Redner nach, dass die von Bremer (Diese Zeitschrift 1899, 2, 793.) auf der vorjährigen Naturforscherversammlung zu München vertretene Behauptung bezüglich Gehaltes des Liebig'schen Fleischextraktes an wasserlöslichem Eiweiss und des dadurch bedingten Nährwerthes desselben durchaus irrig sei. Unter Zugrundelegung der Untersuchung von Jung, Bömer und König führte der Vortragende aus, dass der dem Fleischextrakt zugeschriebene Gehalt an Albumosen ein ganz minimaler, gleich Null sei. Was im Fleischextrakte hiervon vorkomme, rühre von Leim und Leimsubstanzen her, die aus den bei der Fabrikation vom Muskelfleische sich nicht vollkommen trennenden kleinen Sehnen und den interfibrillären Bindegeweben stammen und die zu circa 6–10 % im Fleischextrakt enthalten sind. Einen Nährwerth habe der Fleischextrakt hiernach nicht. Zu bedauern sei, dass in den grösseren Bevölkerungskreisen diese Thatsache noch viel zu wenig bekannt sei. Es komme dem Fleischextrakt in Folge seines Gehaltes

an Salzen und Extraktivstoffen nur der Charakter als anregendes Genussmittel zu. Leider gingen dem Nationalwohlstand in Folge der irrigen Ansicht des Publikums durch die kolossale Einfuhr des Fleischextraktes jährlich grosse Summen verloren. Namentlich dem Fleischergerwerbe werde grosser Schaden zugefügt, da sich der lohnende Verkauf des Suppenfleisches durch Verwendung des Fleischextraktes stark vermindert habe; auch die Viehzucht werde hierdurch indirekt geschädigt. Redner hält es für dringend erwünscht, sowohl im hygienischen wie auch in sozialpolitischen Interesse, dass die dem Fleischextrakte im neuen Fleischbeschauengesetze zugebilligte vollkommen ungerechtfertigte Ausnahmestellung vom Bundesrathe aufgehoben werde.

In der sich an den Vortrag schliessenden Diskussion wurde von Griesbach bemerkt, dass der Genuss des Fleischextraktes in Folge seines Nährsalzgehaltes einen erhöhten Blutdruck bewirke; hierdurch werde also der Fleischextrakt doch Nahrungsmittel, wenn auch keine Eiweisszufuhr durch denselben erfolge. Fürst entgegnete, dass dem Fleischextrakt, wie bereits bemerkt, kein direkter, sondern nur ein indirekter Nährwerth zukomme, insofern er als appetitanregendes Mittel wirke. *M. Junker.*

Schillings: Schmutzgehalt der Wurst. — Vortrag, gehalten in der Abtheilung „Hygiene und Bakteriologie“ auf der 72. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Aachen vom 16. bis 22. September 1900.

Ausgehend von der ersten Feststellung des Schmutzgehaltes in der Milch und der Bedeutung dieser Ermittlung für die Gesundheitspflege erbringt der Vortragende den Nachweis, dass auch die äussere Umhüllung der Wurst einen mehr oder minder grossen Schmutzgehalt aufweise. Die Reinigung der Därme sei vielfach nur sehr oberflächlich und es bleiben an denselben mancherlei Unreinigkeiten, Getreidespelzen und andere Stoffe haften, die nach der Einfüllung der Wurst mit denselben in den Magen gelangten. Vermehrt würden die bei der Reinigung zurückbleibenden Unreinigkeiten noch dadurch, dass die Därme, die heutzutage durch besondere Darmgeschäfte vertrieben würden, längere Zeit lagerten und aus der Umgebung, der Luft etc. noch Unreinigkeiten aufnahmen. Namentlich die Arbeiterklasse, die in den meisten Fällen Wurst auf die Arbeitsplätze mitnehme und dort Mittags verzehre, nehme auf diese Weise im Laufe des Jahres grosse Mengen Schmutz zu sich. Die Reinigung mit heissem Wasser sei wenig erfolgreich. Redner empfiehlt, die Anwendung von Papierdärmen zu versuchen. *M. Junker.*

Obst, Beerenfrüchte und Fruchtsäfte.

Balland: Ueber die Zusammensetzung und den Nährwerth der hauptsächlichsten Früchte. — *Compt. rend.* 1899, **129**, 622.

Verf. untersuchte folgende Früchte: Weintrauben, Orangen, Haselnüsse, Granatäpfel, Johannisbeeren, Nüsse, Feigen, Bananen, Oliven, Datteln, Aprikosen, Mandeln, Kirschen, Quitten, Erdbeeren, Himbeeren, Mispeln, Pfirsiche, Birnen, Äpfel und Pflaumen. Alle Früchte enthalten im reifen Zustand 72—92% Wasser, in den mehr oder weniger getrockneten Handelsfrüchten beträgt der Wassergehalt selten mehr als 33%, bei Mandeln, Wal- und Haselnüssen sogar oft unter 10%. Bei den Beerenfrüchten schwankt der Gehalt an Stickstoffsubstanzen (Pflanzeneiweiss von 0,25% in der Birne bis 1,45% in der Banane, bei den Steinfrüchten (Mandeln, Hasel- und Walnüsse) beträgt er in trockenem Zustand 15—20%. Die Menge des Fettes einschl.

aller in Aether löslichen Bestandtheile (ätherische Oele, Harze, Farbstoffe) ist gering, ausgenommen sind nur Oliven, Mandeln und die Hasel- und Walnüsse (58—68% Fett im Trockenzustand). Die Aschen enthalten bei den Feigen, Birnen und Pflaumen Spuren von Mangan. Der Aschengehalt ist ebenso wie der Gehalt an Cellulose gering, letztere findet sich in beträchtlicher Menge nur in den Quitten und den Mispeln. Den grössten Säuregehalt zeigten Himbeeren und Johannisbeeren mit 1,25%. Der Hauptbestandtheil der Beerenfrüchte besteht aus Zucker, Wasser und Extraktivstoffen (Stärke, Dextrin, Pektin, Gummi, verzuckerbare Cellulose, organische Säuren). Der Zucker, der vollständig assimilirbar ist, spielt bei der Ernährung eine Rolle; die Früchte, die davon am meisten enthalten, wie die Bananen, Datteln und Feigen, bilden wirkliche Kohlenhydrat-Nahrungsmittel. Die Früchte sind daher mit einigen Ausnahmen wenig nahrhaft und können als Nahrungsmittel nicht angesehen werden; ihre Säfte, die unseren Gaumen durch ihren Geruch, Geschmack und Säuregehalt erfreuen, spielen vielmehr nur die Rolle von Genussmitteln.

Max Müller.

E. Hotter: Ueber den Gehalt an Pflanzennährstoffen in Aepfeln und Birnen. — Zeitschr. Landwirthsch. Versuchswesen in Oesterreich 1900, 3, 583—585.

Durch zweckmässige Düngung der Obstbäume werden die Erträge bedeutend gesteigert. Ausserdem wird die Lebensdauer älterer Bäume verlängert und junge Bäume werden gekräftigt, um den Krankheiten und Feinden besser widerstehen zu können. Aepfel- und Birnenbäume entziehen durch je 100 kg Früchte dem Boden 70 g Stickstoff, 35 g Phosphorsäure, 170 g Kali und 14 g Kalk.

Verf. hat durch die chemische Untersuchung von zwanzig Sorten Aepfeln und dreizehn Sorten Birnen den mittleren Gehalt der wichtigsten anorganischen Pflanzennährstoffe bei steierischem Kernobst ermittelt.

Der Aschengehalt betrug im Mittel: a) bei Aepfeln in der frischen Substanz 0,336%, in der trockenen Substanz 2,24%; b) bei Birnen in der frischen Substanz 0,301%, in der trockenen Substanz 2,01%.

In den Aschen wurde ferner gefunden:

	Eisenoxyd (Fe ₂ O ₃)	Kalk (Ca O)	Magnesia (Mg O)	Kaliumoxyd (K ₂ O)	Phosphorsäure (P ₂ O ₅)	Schwefelsäure (S O ₃)	Kieselsäure (Si O ₂)
Aepfel	1,18 %	4,22 %	3,71 %	51,58 %	10,42 %	2,49 %	1,08 %
Birnen	0,98 -	4,73 -	4,29 -	52,88 -	11,92 -	5,02 -	1,55 -

Bei Birnen und Aepfeln ist demnach, abgesehen vom Schwefelsäuregehalt, keine wesentliche Verschiedenheit in der Zusammensetzung der Asche vorhanden. Die Aepfel sind je doch reicher an Gesamtasche und an Stickstoff.

A. Juckenack.

F. Stolle: Beitrag zur Kenntniss der chemischen Zusammensetzung der finnischen Moosbeere (*Vaccinium oxycoccus*). — Zeitschr. Ver. Deutsch. Zucker-Ind. 1900, [N. F.] 37, 609—610.

Der Saft der Moosbeere, welche in Finnland in grossen Mengen vorkommt und ein sehr geschätztes Nahrungsmittel bildet, wurde noch nicht untersucht. Verf. versuchte hauptsächlich den in der Frucht enthaltenen Zucker zu charakterisiren. 2329 g Beeren lieferten 1723 g Saft vom spec. Gew. 1,0373. Im Polarisationsapparate zeigte der Saft nach Zugabe von 10% ammoniakalischem Bleiessig im 200 mm-Rohr eine Ablenkung von — 0,6°.

Zur Isolirung des linksdrehenden Kohlenhydrates wurde der Saft mit ammoniakalischem Bleiessig entfärbt, mit Schwefelwasserstoff entbleit, wiederholt mit gereinigter

Thierkohle behandelt, eingedickt und über Schwefelsäure mehrere Wochen zur Krystallisation stehen gelassen. Hierbei schied sich eine absolut aschenfreie, seidenglänzende, zähe Masse vom Aussehen des aus Rohrzucker durch Inversion erhaltenen Invertzuckers ab, von der mit absolutem Alkohol und Aether ein Theil in trockner Form erhalten wurde. Sowohl das spec. Gew. der Lösung dieses Körpers als auch die spezifische Drehung, ferner der Reduktionswerth für Fehling'sche Lösung und der Schmelzpunkt und Stickstoffgehalt des Osazons liessen erkennen, dass der in der Moosbeere enthaltene Zucker reiner Invertzucker ist.

Verf. suchte ferner die Säure der Frucht rein darzustellen und zerlegte zu dem Zweck den gereinigten Bleiniederschlag mit Schwefelwasserstoff, entfärbte das saure Filtrat mit Thierkohle und dichte zur Syrupkonsistenz ein. Die Säure besass einen öligen Charakter und reduzierte Silberlösung, war also eine Aldehydsäure. Die Analyse des Kalksalzes sowie das Verhalten desselben beim Erhitzen, ferner das Verhalten der Säure gegen Phenylhydrazin liessen erkennen, dass als Säure in der Moosbeere die Glyoxylsäure vorliegt.

A. Juckenack.

G. Halphen: Nachweis von fremden Farbstoffen in Tomatenkonserven. — Journ. Pharm. Chim. 1900, [6], 11, 169—172.

1. Theerfarbstoffe. Zweckmässiger als das Ausschütteln des Tomatenmuses mit Amylalkohol ist das Ausziehen der unter Zusatz des gleichen Volumens Sand oder gefällter Kieselsäure getrockneten Konserve. Man durchfeuchtet die zerkleinerte, trockene Masse reichlich mit Eisessig, mischt gut durcheinander, giebt nach 10 Minuten das doppelte Volum Alkohol von 90 Vol.-Proc. hinzu, schüttelt um, filtrirt nach 10 Min. durch ein Faltenfilter, versetzt das Filtrat mit dem 10-fachen Volumen Wasser, giebt ein Stückchen weissen Seidenstoff hinzu und kocht mindestens $\frac{1}{4}$ Stunde. Bei Anwesenheit von Theerfarbstoffen färben diese die Seide, während letztere bei Abwesenheit derselben kaum gelblich oder schwach bräunlich wird.

2. Kochenille. Man verfährt wie bei dem Nachweise von Theerfarbstoffen, nur durchfeuchtet man die getrocknete Masse mit Salzsäure statt mit Essigsäure. Nach Zusatz von 10 Volumen Wasser zu dem Filtrate schüttelt man die Flüssigkeit mit soviel Amylalkohol, dass etwa 5 ccm davon ungelöst bleiben. Die oben schwimmende Amylalkoholschicht enthält die Karminsäure und eine gewisse Menge Tomatenfarbstoff. Zur Trennung der letzteren hebt man die Amylalkoholschicht ab, versetzt sie mit dem gleichen bis anderthalbfachen Volumen Schwefelkohlenstoff und dem 4- bis 5-fachen Volumen Wasser und schwenkt um. Die oben schwimmende wässrige Schicht wird filtrirt; bei Gegenwart von Kochenille in der Konserve ist das Filtrat rosa gefärbt. Beim Schütteln mit Amylalkohol nimmt dieser den Farbstoff mit gelbrother Farbe auf; nach Zusatz eines Tropfens einer konzentrierten Lösung von neutralem Uranacetat entsteht eine grüne Färbung.

K. Windisch.

W. Kaupitz: Weinsäuregehalt in ein Jahr altem Succus Rubi Idaei und deren Nachweis im Bodensatz des Rohsaftes. — Pharm. Centr. 1900, 41, 347—348.

Beim Lagern von Himbeerpresssaft, welcher frisch auf Weinflaschen abgezogen war und dann ein Jahr gelagert hatte, beobachtete Verf., dass sich in Folge der alkoholischen Gährung ein rothbrauner krystallinischer Bodensatz abgeschieden hatte. Die Untersuchung desselben ergab, dass neben ausgeschiedenem Farbstoff vorwiegend Weinstein und wenig äpfelsaurer Kalk vorlag. Da bisher im Himbeerpresssaft nur

Aepfelsäure und Citronensäure aber nicht Weinsäure beobachtet sein soll, lässt Kautz die Frage offen, ob sich die Weinsäure im Saft erst infolge der Gährung und Lagerung gebildet hat. Zugleich empfiehlt Verf. den Himbeerpresssaft wegen des erheblichen Verlustes an Farbstoff nicht länger als ein Jahr aufzuheben. *A. Juckenack.*

O. Langkopf: Nachweis von Kirschsaft im Himbeersaft. — Pharm. Centr. 1900, 41, 421—422.

Der Nachweis von Kirschsaft beruht darauf, dass bei der Herstellung von Kirschsaft stets die zerstoßenen Kerne mitvergohren werden, also auch immer geringe Mengen Benzaldehyd und Blausäure zugegen sind, welche, wie Vergleichsversuche lehrten, im Himbeersaft fehlen. Die Blausäure wird in dem Destillat des verfälschten Saftes durch die äusserst empfindliche Reaktion von G. Schaer nachgewiesen. Diese Reaktion beruht darauf, dass eine Mischung von einem Tropfen alkoholischer Guajakharzlösung mit etwas Kupfersulfatlösung (1:10 000) auf Zusatz der geringsten Spur Blausäure blau gefärbt wird. Ein geringer Zusatz von Alkohol begünstigt den Verlauf der Reaktion, mit der umgekehrt auch die geringsten Mengen Kupfer nachgewiesen werden können. Zum Nachweise von Kirschsaft im Himbeersaft destilliert man zweckmässig von 50 bis 100 ccm Saft einige Kubikcentimeter direkt in eine Mischung von Guajaktinktur, Kupfersulfatlösung und etwas Alkohol. Der Nachweis gelingt noch in einem Himbeersaft, der nur 5% Kirschsaft enthält. *A. Juckenack.*

Alex. Lonay: Ueber Syrupfabrikation. — Bull. assoc. Belg. chim. 1900, 14, 79—81.

Die belgische Syrupindustrie erstreckt sich vorwiegend auf die Gegenden um Limburg und Herve. Im Handel unterscheidet man: 1. Reine Fruchtsyrupe; 2. Fruchtsyrupe, d. h. Gemische von Frucht- und Zuckerrübensyrupen; 3. Syrupe, Erzeugnisse aus der Zuckerrübe. Bei der Herstellung finden hauptsächlich Verwendung: 1. Herbe Birnen zur Herstellung von Birnensyrup. 2. Eine Mischung von sauren und süßen Aepfeln für Apfelsyrup. 3. Eine Mischung von stark sauren Aepfeln mit Zuckerrüben für die gemischten Syrupe. Aus Mangel an frischen Früchten finden auch die Schalen und Abfälle der amerikanischen Aepfel, welche in Tonnen gepresst eingeführt werden, Verwendung. Bei der Herstellung der Syrupe werden die Früchte und die Zuckerrüben zunächst ausgekocht. Hierbei giebt man zu 1500 kg Rüben etwa 150 l Wasser. Darauf wird der Saft abgepresst und unter Umrühren über freiem Feuer eingedickt. Dem Rübensyrup setzt man hierbei etwas Oel oder Fett zu, da alsdann eine bessere Konsistenz und Farbe erzielt werden soll. Die Abkühlung der Syrupe hat später schnell zu erfolgen, da anderenfalls die Güte leidet. Die Ausbeute betrug bei Aepfeln und Birnen im Mittel 15%, bei der Zuckerrübe 16%. Verf. ist der Ansicht, dass die Verarbeitung der Rübe auf Syrup lohnender ist als auf Zucker.

Am Schluss wirft Verf. folgende Fragen auf: Wie ist der Boden für das Obst und die Rüben am besten zu behandeln? Wie sind die einzelnen Syrupe zusammengesetzt und welchen Nährwerth besitzen sie? Wie stellt man am besten aus Rüben für die Volksernährung bestimmte Syrupe her? *A. Juckenack.*

Ottomar Henzold: Eine neue Reaktion auf Gelatine und Hausenblase. Zeitschr. öffentl. Chem. 1900, 6, 292—293.

Verf. empfiehlt nachfolgendes Verfahren zum qualitativen Nachweis von Gelatine in Fruchtsäften, Gelées und Marmeladen: „Die Fruchtgelées, in denen man Gelatine

vermuthet, werden mit Wasser verdünnt und aufgeköcht. Die heisse Lösung wird nöthigen Falles filtrirt und ein Theil derselben in einem Probirrohr mit Kaliumbichromatlösung (1:10) im Ueberschuss versetzt, aufgeköcht und sofort wieder durch Einstellen in kaltes Wasser abgekühlt. Zu der erkalteten Lösung giebt man 2—3 Tropfen konc. Schwefelsäure (nicht mehr!). Der weisse feinflockige Niederschlag ballt sich nach einiger Zeit zusammen und setzt sich ab “

Die Reaktion tritt sowohl in verdünnten als concentrirten Lösungen ein. Pflanzengallertstoffe liefern bei gleicher Behandlung keinen Niederschlag. Zur quantitativen Bestimmung der thierischen Gelatinen ist das Verfahren jedoch nicht geeignet, da es nur etwa 63% Ausbeute liefert. *A. Juckenack.*

Patente.

Eugène Firminhac in Paris: Verfahren zum Konserviren von Früchten mittels Kälte. — D.R.P. 106 055 vom 18. December 1898. — Patentbl. 1900, **21**, 21.

Die Früchte werden zunächst einer Vorbehandlung mit Luft, welche mit Dampf gesättigt ist, bei einer Temperatur von etwa 2° unterworfen. Infolge der Berührung der Luft mit den zu konservirenden Früchten und mit den Wänden der Kammern, in welchen sich erstere befinden, steigt die Lufttemperatur um einige Grad.

Die Luft, die nun nicht mehr mit Wasserdampf gesättigt ist, entzieht den Früchten einen Theil ihres Wassergehaltes, so dass eine mässige Saftkonzentration eintritt. Die so behandelten Früchte werden sodann der Einwirkung trockner Luft von mindestens — 4° unterworfen, worauf sie sich nach der Herausnahme aus den Kammern mehrere Tage in unverändertem Zustand erhalten.

Fritz Dippel in Heidelberg: Schutzhülle aus vulkanisirtem Gummi für Eier und Früchte. D.R.P. 106 730 vom 12. Oktober 1898. — Patentbl. 1900, **21**, 202.

Das Konservirungsverfahren besteht darin, dass die Eier bzw. die Früchte, zwecks vollständigen Abschlusses gegen die umgebende Luft mit einer dünnen Hülle aus vulkanisirtem Gummi so umgeben werden, dass diese Hülle überall gleichmässig anliegt. *A. Oelker.*

Gährungserscheinungen.

R. Albert und E. Buchner: Hefepresssaft und Fällungsmittel I. — Wochenschr. Brauerei 1900, **17**, 49—51.

Neuere Versuche, durch Alkoholfällung gährwirksame Substanz aus dem Hefepresssaft zu isoliren, bestätigten die früher schon von E. Buchner gemachten Angaben. Verff. beabsichtigten festzustellen, ob sich eine derartige Fällung, ohne Verlust an Gährkraft zu erleiden, ausführen lasse und ferner, inwiefern dieselbe etwa geeignet sei, eine Trennung der Zymase von den übrigen Bestandtheilen des Presssaftes zu ermöglichen.

Bei der Ausführung der Alkoholfällung hat es sich von vorneherein als zweckmässig erwiesen, nicht mehr als 50 ccm Presssaft auf einmal anzuwenden. Eine längere Berührung des Niederschlages mit Alkohol beeinträchtigt die Gährkraft schon empfindlich. Der Niederschlag wird sogleich im Vakuum über Schwefelsäure getrocknet. Ein Verlust an Gährkraft tritt durch die Alkoholfällung nicht ein.

Um einwandfreie Resultate zu erhalten, wurde bei weiteren Versuchen in der Weise verfahren, dass die aus 50 ccm Saft erhaltene Fällung einige Zeit mit Wasser digerirt, darauf filtrirt und ein entsprechender Theil des Filtrates auf seine Gährkraft geprüft wurde. Hierbei tritt ein Verlust an Gährkraft ein, derselbe konnte auf die

Schwerlöslichkeit des Fällungsproduktes zurückgeführt werden, so dass ein längeres Digeriren vor dem Filtriren nothwendig erscheint. Versuche in dieser Richtung ergaben keine wesentliche Besserung.

Es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass die Zymase durch die wasserentziehende Wirkung des Alkohols in einen anhydridartigen Zustand übergeführt wird. Andererseits konnte die angewendete 40 %-ige Zuckerlösung ein geeigneteres Lösungsmittel sein als das Wasser. Versuche in letzterer Richtung führten keine Verbesserung herbei.

Ein günstiger Einfluss auf die physikalische Beschaffenheit des Niederschlages lässt sich dadurch erreichen, dass man statt absoluten Alkohols ein Gemenge von Alkohol und Aether zur Fällung verwendet.

Aus dem Umstande, dass zur vollständigen Ausfällung der Zymase ein 12-faches Volumen absoluten Alkohols erforderlich war, konnte man annehmen, dass es durch fraktionirte Fällung gelingen müsse, eine weitere Trennung der Zymase von den übrigen Bestandtheilen des Presssaftes zu erreichen.

Der mittelst 200 ccm Alkohol aus 50 ccm Saft gewonnene Niederschlag enthält schon einen erheblichen Theil der Zymase. Das Filtrat der Fällung mit 600 ccm Alkohol wirkte noch energischer. Es konnte hierbei gleichzeitig festgestellt werden, dass die Zymase, wie anzunehmen, nur einen äusserst geringen Theil des Niederschlages bildet, denn bezüglich der Gewichtsmengen der beiden Fällungen ergab sich keine Differenz. Weiter darf aus dem Versuche geschlossen werden, dass die Fällung des Enzyms nicht auf dessen Unlöslichkeit im Fällungsmittel beruht, sondern dadurch zu Stande kommt, dass die Zymase von den alkoholunlöslichen Bestandtheilen des Presssaftes mechanisch mit niedergerissen wird. Es besteht daher die Möglichkeit, durch Erzeugung irgend eines anorganischen Niederschlages in dem Presssaft die Zymase ausfällen zu können.

Gleichzeitig mit den Verff. hat R. Rapp in München Aceton als Fällungsmittel angewandt. Durch die Acetonfällung scheint ein beträchtlicher Theil der Gährkraft verloren zu gehen. Verff. erwähnen noch, dass sie auch Methylalkohol als Fällungsmittel angewendet haben. Hierdurch wird jedoch auffallender Weise die Zymase vollständig zerstört, denn die Fällung verhielt sich Saccharose gegenüber vollständig indifferent, auch konnte aus dem Filtrat kein gährwirksames Produkt mehr gewonnen werden.

H. Will.

R. Albert und E. Buchner: Hefepresssaft und Fällungsmittel. II. — Wochenschr. Brauerei 1900, 17, 189—190.

In der ersten Mittheilung wurde bereits nachgewiesen, dass durch Anwendung eines Gemisches von Alkohol und Aether aus dem Hefepresssaft eine Fällung erhalten wird, welche in Wasser suspendirt, dieselbe Gährkraft besitzt, wie der frische Saft, demnach die gesammte Zymase unverändert enthalten muss. Hingegen gelang es damals nicht, durch Wiederauflösen und Filtriren eine Lösung von gleich grosser Gährkraft zu erhalten. Bei weiteren Versuchen wurde eine wässrige Lösung von Glycerin zum Wiederauflösen der Alkohol-Aetherfällung angewandt und war das Resultat erheblich günstiger, indem hier nahezu 90% der Gährkraft erhalten blieben. Diese geringe Abnahme scheint lediglich durch die Schwierigkeiten bedingt zu sein, welche sich bei dem Filtriren ergeben.

Ausser 10 %-iger Glycerinlösung wurden gleichzeitig 20, 5 und 2 %-ige Lösungen zum Vergleich angewandt. Diese Glycerinlösungen unterscheiden sich von dem frischen

Safte dadurch, dass sie auch nach beendigter Gährung stets absolut klar bleiben, während der Presssaft sich, selbst wenn anfänglich vollständig klar, stets mehr oder weniger stark während der Gährung trübt.

Die Konzentration der Glycerinlösung ist ohne wesentlichen Einfluss; ferner werden für die Gährkraft der Glycerinlösung fast durchweg noch höhere Zahlen erhalten als für diejenige des frischen Saftes. Letztere Erscheinung ist wohl nur dadurch veranlasst, dass die Wirkung der Zymase zerstörenden peptischen Enzyme entweder durch die Alkoholfällung oder durch die Glycerinlösung beeinträchtigt wird. Ein Versuch scheint diese Annahme zu bestätigen, indem er zeigt, dass frischer Saft durch längeres Stehen unter gleichen Bedingungen seine Gährkraft schneller verliert als die Glycerinlösung der Alkohol-Aether-Fällung.

Durch Zusatz von Eiweiss kann die Gährkraft des Presssaftes erheblich gesteigert werden, indem die Zymase bis zu einem gewissen Grade vor der Zerstörung durch peptische Enzyme geschützt wird, wie dies früher von E. Buchner nachgewiesen wurde.

Eine Abnahme der Gährkraft tritt durch zweimalige Fällung nicht ein. Zu einer weiteren Isolirung der Zymase scheint demnach auch eine mehrmalige Fällung mit Alkohol-Aether nicht zu führen.

Auch die zweite Fällung lässt sich in derselben Weise wie die erste wieder in Glycerin lösen und zeigt auch deren Wiederauflösung nach dem Schütteln mit Kieselguhr und Filtriren die gleiche Gährkraft wie der frische Saft. Die Differenz zwischen der Gährkraft des frischen Saftes und der wiedergelösten zweiten Fällung ist auch hierbei so gering, dass sie lediglich analytischen Fehlern zuzuschreiben ist.

Schliesslich wurde noch durch zwei Versuche festgestellt, dass lebende Hefe durch eine kurze Behandlung mit dem zur Fällung von Presssaft verwendeten Alkohol-Aethergemisch sicher getödtet wird.

H. Will.

R. Albert und E. Buchner: Hefepresssaft und Fällungsmittel. — Ber. deutsch. chem. Ges. 1900, **33**, 266—271, 971—975.

E. Buchner berichtet in den vorliegenden Mittheilungen im Wesentlichen, theilweise in erweitertem Umfange über die gleichen Versuche, über welche R. Albert in der Wochenschr. für Brauerei berichtet hatte. (Vergl. die beiden vorstehenden Referate!)

H. Will.

P. Lindner: Die biologische Bedeutung der Zymase für die Hefe. — Wochenschr. Brauerei 1900, **17**, 173—174.

Es ist eine sehr auffällige Thatsache, dass für die meisten Kulturhefen einfache Eintrocknung bei gewöhnlicher Temperatur schon hinreicht, um einen sehr hohen Procentsatz von Zellen abzutöden. Nicht so empfindlich wie die Zelle ist die von ihr erzeugte Zymase.

Verf. wirft die Frage auf, ob durch die Wirkung der Zymase ein Vortheil für die noch wenigen lebend gebliebenen Zellen geschaffen wird. Dem ist in der That so. Wir wissen, wie schon geringe Mengen von Alkohol und Kohlensäure hinreichen, um geradezu lähmend zu wirken auf die Entwicklung namentlich von Fäulnisbakterien. Eine Würze, die mit getrockneter Hefe angestellt wird, in der keine Zymase mehr wirksam ist, fällt unfehlbar der Fäulnis anheim, selbst wenn noch ein paar lebende Hefezellen vorhanden sind, oder wenn man absichtlich noch mit wenig Hefe geimpft hätte.

Da, wo in der getrockneten Hefe die Zymase noch wirksam ist, sorgt diese dafür, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo die Sprossungen schon zahlreicher geworden sind und wo der Hefenachwuchs selbst schon die ersten Gährwirkungen ausüben kann, die Bakterien in Schach gehalten werden.

Nicht jede Hefenart ist gegen das Eintrocknen so empfindlich wie unsere Brauereihefen; die Kahlmefen, die Pastorianus-Arten und andere wilde Hefen sind sogar ziemlich widerstandsfähig. Das ist auch der gefahrvollste Punkt bei der Verwendung getrockneter Bierhefe.

Ob ausser der Zymase noch die anderen in der Hefezelle vorhanden gewesenen, beim Trocknen derselben aber jedenfalls noch nicht zerstörten Enzyme eine antibakterielle Wirksamkeit entfalten, ist nicht festgestellt. Dass solche Enzyme noch vorhanden sind, geht aus den Versuchen von Emil Fischler und Anderen hervor.

Aber auch in den Fällen, wo Hefen jahrelang in einer Kulturflasche aufbewahrt werden, können oft Enzymwirkungen noch festgestellt werden, wo die Zellen selbst schon abgestorben sind. So hatte Verf. von 4—5-jährigen Kulturen von Hefe „Saaz“ und „Frohberg“ Ueberimpfungen auf frische Würzelatinen gemacht, um zu sehen, ob noch Leben sich äussern würde; das war nicht der Fall, die Zellen, die sämtlich schon längere Zeit am Boden der verflüssigten Gelatine gelegen hatten, waren sämtlich abgestorben. Um so merkwürdiger war es, dass an den neuen Impfstellen sich tiefe Gruben in der frischen Gelatine bildeten, ohne dass ein Hefenwachstum zu erkennen war. Hier war also das Gelatine verflüssigende Enzym noch wirksam geblieben.

H. Will.

A. Rosenstiehl: Ueber die Vermehrung der Hefen ohne Gährung bei Gegenwart einer begrenzten Menge von Luft. — *Compt. rend.* 1900, **130**, 195—198.

Verf. hat bei der bakteriologischen Analyse von Cider mehrfach bei begrenzter Lüftung, bei welcher sich Kohlensäure hätte entwickeln sollen, eine Vermehrung ohne solche beobachtet.

Die Hefen, welche zu den Versuchen dienten, wurden aus gährendem Cider durch zwei aufeinander folgende Kulturen in sterilem Kartoffelsaft, der mit Gelatine oder Gelose versetzt und in Platten gegossen war, gezüchtet.

Die Kolonien wurden in verschiedene Würzen eingimpft. Dieselben versetzten künstliche Würze sehr gut in Gährung. Nach zwei oder drei Züchtungen in dieser Würze besitzen sie ihre volle Energie und sind im Stande, den Kartoffelsaft in Gährung zu versetzen. Entnimmt man die Hefen jedoch direkt den Plattenkulturen, so sind sie hierzu unfähig, sie fallen unthätig auf den Grund der Flüssigkeit. Es entwickelt sich kein Gas, der Absatz aber vermehrt sich sichtlich. Die Oxydasen des Kartoffelsaftes sind nicht die Ursache dieser verminderten Lebenskraft, dagegen geben Versuche der Vermuthung Raum, dass es der Gerbstoffgehalt der Kartoffel ist. Der Sauerstoff, welcher in diesen Versuchen für die Vermehrung verwendet werden konnte, war der in der Flüssigkeit gelöste. Es stand also nur eine begrenzte Menge von Luft zur Verfügung, welche der Gährung günstig ist. Im luftleeren Raum und bei Gegenwart von Wasserstoff findet weder Gährung noch Vermehrung statt, eine Thatsache, die unter anderen Bedingungen von Pasteur und M. Cochin festgestellt wurde.

Der günstige Einfluss der Gelatine ist nicht an den Stickstoff gebunden; sie bietet keinen Nährstoff. Dieselbe wirkt nicht durch ihre Substanz auf die in voller

Thätigkeit begriffene Hefe, sondern nur auf die Anregung der durch ihre Kultur in einem armen Substrat geschwächten Hefen, indem sie eine adstringierende Substanz aus dem Kartoffelsaft entfernt, unzweifelhaft einen Körper von der Natur des Gerbstoffes. Diese Auffassung wird dadurch bekräftigt, dass der Zusatz von Tannin zu einer künstlichen Würze nach Art des Kartoffelsaftes die Gährung mit diesen geschwächten Hefen hemmt. Um eine schlagende Demonstration der Vermehrung der Hefen ohne Entbindung von Gas zu geben, kann der Versuch in folgender Weise eingerichtet werden:

In eine Reagenzröhre, die 2%-iges, bis zur Verflüssigung erwärmtes Gelosewasser enthält, lässt man langsam sterilen Kartoffelsaft fließen. Sein grösseres spezifisches Gewicht lässt ihn auf den Grund sinken. Die Geloselösung schwimmt obenauf und bildet nach dem Erkalten der Flüssigkeit einen hermetisch schliessenden und durchsichtigen Pfropfen. Nach dem Erkalten impft man durch einen Stich eine Hefekolonie, entweder Apiculatus-Hefe oder eine elliptische Hefe, ein. An der Stelle, an welcher der Stich, nachdem er die Gelose passiert hat, den Kartoffelsaft berührt, sieht man allmählich eine Kolonie entstehen, welche wächst und sich der Flüssigkeit von oben nach unten bemächtigt.

Die Schlussfolgerung, welche sich ergibt, ist, dass von den beiden Lebensäusserungen die Fähigkeit der Reproduktion zuletzt erlischt, wenn die Lebenskraft einer Hefe geschwächt wird.

H. Will.

Arthur L. Stein: Ueber das Volumen von Zuckerlösungen vor und nach der Gährung. — Journ. Soc. Chem. Ind. 1900, 19, 127—128.

H. T. Brown zeigte sowohl durch den Versuch als auch durch Rechnung, dass eine geringe Abnahme des Volumens stattfindet, wenn Invertzucker vergohren wird. Th. Kosutány thut dar, dass keine Veränderung im Volumen stattfindet.

Verf. berechnet nun zunächst auf Grund der von anderen Forschern für die Umsetzungsprodukte bei der Gährung festgestellten Daten, dass bei einer 10%-igen Dextroselösung keine Veränderung im Volumen bei der Gährung stattfindet. Bei einer 20%-igen Lösung beträgt dieselbe 0,3%.

Bei einer 10%-igen Maltoselösung findet eine Kontraktion um 0,2%, bei einer 20%-igen um 0,5% statt.

Verf. stellte ausserdem selbst Versuche mit Dextrose- und Maltoselösungen an.

Die stärkere Kontraktion des Volumens bei der Vergährung der Maltose ist offenbar auf die Volumverminderung zurückzuführen, welche durch die Umwandlung der Maltose in Dextrose bewirkt wird. Schaltet man diese aus, dann ist die Volumverminderung einer 10%-igen Lösung durch die Gährung sehr klein (geringer als 0,1%), bei einer 15%-igen Lösung etwa 0,1%, bei einer 20%-igen Lösung wahrscheinlich zwischen 0,2 und 0,3%.

H. Will.

H. Will: Einige Beobachtungen über die Lebensdauer getrockneter Hefe. IV. Nachtrag. — Zeitschr. ges. Brauw. 1900, 23, 11—12.

Die beiden Holzkohlekonserven No. 9 und 10 haben sich von allen im Jahre 1886 mit den verschiedenartigsten Beimischungen angefertigten Hefekonserven als die haltbarsten erwiesen. Eine wiederholte Prüfung derselben im Jahre 1899, nach Verlauf von 13 Jahren und 2 Monaten, liess erkennen, dass auch jetzt noch nicht alle Hefezellen abgestorben waren.

Die nähere Untersuchung der aus Konserve No. 9 entwickelten Hefe ergab nur mehr die Gegenwart von Kulturhefe; Konserve No. 10 enthielt vorherrschend wilde Hefe und nur mehr in Spuren Kulturhefe. In einzelnen Kulturen fand sich vorherrschend, wenn nicht ausschliesslich, eine schon im II. Nachtrag erwähnte Hefe vor, welche dadurch charakterisirt ist, dass sie sich rasch zu grossen Klumpen zusammenballt.

Offenbar hatte also im Verlaufe des 13. Jahres die Aufbewahrung der Konserven bei Ausschluss von Luft und bei niederer Temperatur eine weitere Abnahme von lebens- und entwicklungsfähigen Hefezellen stattgefunden.

Die Hefekonservirung mittels Holzkohle zum Transport in überseeische Länder scheint nach den vorliegenden Mittheilungen in den letzten Jahren öfters in Anwendung gebracht worden zu sein und zwar selbst unter den schwierigsten Verhältnissen mit sehr günstigem Erfolg.

Mit Erfolg werden sich für diesen Zweck Hefekonserven auch in der Weise herstellen lassen, dass man als Hauptzusatz Holzstoff wählt, während pulverisirte Holzkohle nur in verhältnissmässig geringer Menge beigemischt wird. *H. Will.*

H. Will: Eine Mycoderma-Art und deren Einfluss auf das Bier. II. Mitthlg.
— Zeitschr. ges. Brauw. 1900, **23**, 185 — 190, 197 — 201, 209 — 216, 225 — 230 und 237 — 241.

Verf. giebt in dieser II. Mittheilung eine morphologische Beschreibung der von ihm studirten Mycoderma-Art, welche Krankheiten an obergährigem Bier veranlasst (Diese Zeitschr. 1900, **3**, 266.), wobei gleichzeitig die specielle Morphologie der Mycodermazelle, überhaupt die Form und Grösse der Zellen in jüngeren und älteren Kulturen, die Zellhaut und der Zellinhalt, speciell die Oelkörperchen in demselben, eingehend berücksichtigt werden.

Verf. berührt die von Fischer früher (Centralbl. Bakteriöl., I. Abtheilung, 1890, **14**, 653) gemachte Mittheilung über die angebliche „endogene“ Zellbildung bei Mycoderma und kommt auf Grund seiner eigenen Untersuchungen zu dem Schluss, dass von Seite Fischer's ein Beobachtungsfehler vorliegt.

Die Wachstumsform in Einzelkulturen, Plattenkulturen und Riesenkolonien, welche letztere auf einer Tafel dargestellt sind, wurden auf 5 Gelatinen von verschiedener Zusammensetzung studirt und zeigten sich hier speciell bei den Riesenkolonien charakteristische Unterschiede.

Bei der Vergleichung verschiedener Arten ist neben der Einsaatmenge auch noch das Alter der Kolonien anzugeben, überhaupt muss Werth darauf gelegt werden, etwaige Veränderungen an den Kolonien in der Zeit kennen zu lernen. Das Alter ist neben den äusseren Faktoren mitbestimmend für die Form der Kolonien. Allem Anschein nach kommen die specifischen Wachstumsformen der Kolonien auf den verschiedenen Nährböden erst in einem späteren Alter zum Ausdruck.

Mit fortschreitender Entwicklung treten bis zu einem gewissen stationären Zustand, der meist durch den Beginn der Verflüssigung gekennzeichnet ist, Veränderungen, wenn auch nur geringe, hervor, die jedoch immerhin zur Charakteristik der Wachstumsform beitragen. Aus diesem Grund wurde auch in den verschiedenen Versuchsreihen die Beobachtungsdauer verschiedene Zeit lang ausgedehnt. Die Wachstumsform als diagnostisches Merkmal hat also nur einen relativen Werth. Zum Schluss theilt Verf. noch einige biologische Beobachtungen mit.

Das mit einer Reinkultur von *Mycoderma* erhaltene Ergebniss bestätigt die schon früher gelegentlich gemachte Beobachtung, dass *Mycodermazellen* in trockenem Zustand sehr lang, im vorliegenden Falle mindestens zwei Jahre am Leben bleiben können. Jedenfalls ist auch hier, wie bei Hefe, niedere Temperatur für eine längere Lebensdauer in trockenem Zustand günstiger als höhere. Ob letztere allein nachtheilig auf dieselbe einwirkt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Ein Versuch im Exsikkator spricht gegen diese Annahme. Es müssen sich also noch andere Faktoren geltend machen. Nachdem die Einwirkung des Lichtes ausgeschlossen ist, kommt noch der Zutritt von Luft in Betracht. Letzterer dürfte aber nach dem Versuchsergebniss für sich allein nicht von ausschlaggebendem Einfluss sein. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Wassergehalt der getrockneten Zellen eine Hauptrolle spielt. Wird derselbe durch trockene Luft auf das möglichste Mindestmaass herabgedrückt, so wird wenigstens innerhalb eines verhältnissmässig kurzen Zeitraumes keine weitgehende Schädigung der Zellen eintreten.

H. Will.

L. Steuber: Beiträge zur Kenntniss der Gruppe *Saccharomyces anomalus*.

— Zeitschr. ges. Brauw. 1900, 23, 3–10, 17–25 und 33–36.

Keine Hefegruppe ist so scharf charakterisirt, wie die Gruppe *S. anomalus* Hansen. Die eigenthümlichen, hutförmigen Sporen, welche sehr grosse Uebereinstimmung mit denjenigen von *Endomyces decipiens* Reess zeigen, lassen wohl kaum einen Zweifel darüber aufkommen, dass es sich hier um eine natürliche Gruppe von Hefen handelt, während bei anderen diese Zusammengehörigkeit nicht so feststeht. Das Interesse für diese Hefegruppe muss sich vom praktischen Standpunkte aus erhöhen, nachdem Jörgensen eine *Anomalus*-Varietät beobachtete, welche in englischem Biere (obergähriges) Trübungen hervorgerufen hatte, also als Krankheitshefe aufgetreten war. Nach zahlreichen in der physiologischen Abtheilung der wissenschaftlichen Station für Brauerei in München gemachten Beobachtungen kommen diese Hefen durchaus nicht so selten in Bier und Bierhefen vor und scheinen die Vertreter derselben sehr weit verbreitet zu sein.

Unter den vier von Steuber näher untersuchten Varietäten befindet sich auch die von H. Will zu seinen Studien über Proteolyse verwendete (Diese Zeitschr. 1898, 1, 426.). Steuber hat die Wachstumsform der vier Varietäten in Einzelkulturen und in Riesenkolonien, sowie das Verhalten in Stiechkulturen bei Verwendung von 10%-iger Würzegeatine studirt. Weiter wurde die Abhängigkeit des Wachstums auf der Oberfläche (Hautbildung) von der Temperatur untersucht. Dieselbe giebt in gleicher Weise wie bei den anderen bisher in dieser Richtung untersuchten Hefen durchgreifende Unterscheidungsmerkmale ab.

Nur bei Varietät I treten Gährungserscheinungen auf und ebenso bildet dieselbe allein Essigäther wie der *S. anomalus* Hansen sowie der von Lindner aus Grünmalz isolirte. Die Zellen des Hefenabsatzes bei Varietät I haben das charakteristische Aussehen von „wilder Hefe“, während die Zellen der Oberflächenhaut mehr dasjenige von typischen *Mycodermazellen* besitzen. Bei den übrigen Varietäten scheint also diejenige Generation, welche alkoholische Gährung hervorzurufen vermag, mehr oder weniger verloren gegangen zu sein. Wie die Hautbildung, so giebt auch die Sporenbildung auf dem Gipsblock bei den untersuchten Varietäten von *S. anomalus* wie bei den anderen Hefenarten diagnostische Merkmale ab. Die Widerstandsfähigkeit derselben gegen Erhitzen in Würze und Wasser wurde von H. Will geprüft. Nach zahlreichen,

diesbezüglichen im physiologischen Laboratorium der wissenschaftlichen Station durchgeführten Beobachtungen gewinnt es den Anschein, als ob die Widerstandsfähigkeit gegen Erhitzen ein nicht unwichtiges diagnostisches Merkmal abgebe.

Sämmtliche 4 Varietäten verflüssigen Gelatine. Die verflüssigten Gelatinen reagierten ebenso wie alle Bierwürzen, in denen die *Anomalus*-Varietäten vegetiert hatten, schwach sauer. H. Will hat jedoch bei einer *Anomalus*-Art auch schwach alkalische Reaktion konstatieren können.

Sehr eingehend hat Steuber das Verhalten von *S. anomalus* zu verschiedenen Zuckerarten (Saccharose, Dextrose, Maltose, Lävulose, Laktose und Galaktose) untersucht. Ein Eingehen auf die interessanten Ergebnisse ist nicht möglich.

Nach allen Versuchen scheint nur *S. anomalus* I in chemisch-physiologischer Beziehung Hefecharakter zu besitzen, theilweise auch noch *S. anomalus* II; *S. anomalus* III und IV verleugnen den Hefecharakter in dieser Beziehung vollständig. Um so grössere Aehnlichkeit haben *S. anomalus* II, III und IV mit *Mycoderma*, denn sie sind im Stande, in einem sterilen Bier mit 3,70% Alkohol binnen 14 Tagen den Alkohol vollständig zu oxydiren. *S. anomalus* II und III erzeugten hierbei auch noch etwas Essig- und Buttersäure; bei *S. anomalus* IV wird unter diesen Umständen der Alkohol ohne Bildung von Fettsäuren verbrannt. Auch hier zeigt *S. anomalus* I die geringste Oxydationsfähigkeit.

Bei keiner der untersuchten Varietäten sind in untergährigem Bier bei zahlreichen Gährversuchen Geschmacksverschlechterungen beobachtet worden. Sie sind also als Krankheitserreger nicht zu fürchten, umsoweniger als bei den bei der Untergährung eingehaltenen Temperaturen diese Hefe in der Regel mehr oder weniger unterdrückt wird.

H. Will.

van Laer: Bier mit doppeltem Gesicht. — Compt. rend. 1900, 130, 53 und Ann. Inst. Pasteur 1900, 14, 82—101.

Zuweilen trifft man Biere an, welche im durchfallenden Licht klar und selbst absolut blank erscheinen, im auffallenden Licht dagegen trüb. Ihre Farbe ist, anstatt rein gelb oder braun zu sein, matt, wie wenn sie mit einer milchigen Flüssigkeit vermischt wären. Von oben betrachtet, scheinen die Flaschen eine trübe Flüssigkeit zu enthalten. Die Farbe ist schmutzigweiss mit einer charakteristischen gelben Fluoreszenz. Die Krankheit, welche sich sehr häufig beim Faro und Lambik, seltener und weniger intensiv bei Bieren, welche mit Hefe angestellt werden, findet, führt bei den Praktikern in Brüssel den Namen der Doppelsichtigkeit (*à double face*) oder „*tweeskinde*“, ein Ausdruck, der an das so verschiedene Aussehen erinnert, welches die Biere zeigen, je nachdem man sie im auffallenden oder im durchfallenden Lichte prüft. Der Fabrikationsfehler steht in enger Beziehung zu der schleimigen Gährung, deren Keime sich oft in den Faro- und Lambik-Würzen finden, so dass sich, wenn man diese Biere bei einer zu hohen Temperatur vergähren lässt, kaum ein einziges Fass findet, dessen Inhalt nicht mit einem Male fadenziehend und doppelsichtig würde. van Laer hat aus solchen Bieren einen *Bacillus* von 1,7—1,8 μ Länge und 0,5—0,8 μ Breite isoliren können, welchen er *B. viscosus bruxellensis* nennt. Während des Wachstums in Bierwürze vermehrt sich die Viskosität der letzteren bis zu einem Maximum, um alsdann wieder abzunehmen und auf den ursprünglichen Grad zurückzukehren. Der *Bacillus viscosus bruxellensis* entwickelt sich auf den meisten festen und flüssigen Substraten, welche in den bakteriologischen Laboratorien angewendet

werden. Unter gleichen Verhältnissen verursachen verschiedene Würzen nicht den gleichen Grad von Viskosität. Hochprocentige Würze und überhaupt die Lambik-Würzen werden viel stärker fadenziehend als andere. In gleicher Weise verhalten sich die Würzen, welche aus Luftmalz hergestellt sind.

Die Biere mit doppeltem Gesicht und die gleichen mit Zuckerzusatz hergestellten Biere zeigen in Beziehung auf die Menge und die Natur der Säuren, welche sie enthalten, nichts Besonderes; das Gleiche ist aber nicht der Fall in Beziehung auf ihren relativen Gehalt an Extrakt und Alkohol.

Die Zusammensetzung des Substrates in Beziehung auf die stickstoffhaltigen Substanzen spielt eine wichtige Rolle bei diesem fermentativen Process.

Die schleimige Masse kann als eine Mischung von stickstoffhaltigen und gummosen Substanzen betrachtet werden, von welchen die ersteren die Kapseln der Bakterien, die letzteren die gelatinöse Masse bilden, welche die Kapseln vereinigt und später verschwindet, indem sie in Säuren umgewandelt wird.

Mycoderma cerevisiae und gewisse Schimmelpilze verhalten sich Würzen gegenüber, welche fadenziehend gewesen waren, wie wenn letztere einen Zusatz von Pepton, Asparagin oder Harnstoff erhalten hätten. Die Kulturen werden wieder schleimig.

Der *B. viscosus bruxellensis* zersetzt ausserdem eine gewisse Menge von Kohlenhydraten, welche zu seiner Verfügung steht, und bildet sie in Milchsäure und Fettsäuren (Essig- und Buttersäure) um.

H. Will.

W. Henneberg: Zur Biologie des Essigaales. — Centrbl. Bakteriolog. II. Abth. 1900, 6, 180—184.

Verf. stellt zunächst aus der sehr umfangreichen Litteratur die wichtigeren Angaben über das Leben des Essigälchens zusammen. Der Essigaal ist noch heute eine der lästigsten Plagen der Gährungsessigindustrie. Es giebt keine Schnellessigfabrik und wohl auch keine grössere Wein- und Bieressigfabrik, die diese Thiere nicht in mehr oder weniger grossen Mengen beherbergt.

Unter normalen Bedingungen sind die erwachsenen Weibchen beständig trächtig. Die grösste Zahl an Jungen, welche bei einem befruchteten, isolirten Weibchen beobachtet wurde, war 45. Meistens waren innerhalb 8 Tage sämtliche befruchtete Eier reif geworden und die Jungen abgesetzt. Die jungen Thiere erlangen durchschnittlich in 4 Wochen die Geschlechtsreife.

Unter günstigen Bedingungen ist die Fortpflanzung eine ausserordentlich grosse: Nach 7 Monaten waren in Gefässen, in die nur ein trächtiges Thier gebracht war, unzählige Mengen vorhanden. Am 24. Tage konnten 68 Nachkommen von einem isolirten Thiere gezählt werden.

Essigälchen können in verschiedenen Flüssigkeiten ohne Essig, der für sie keine Nahrung ist, leben, sterben aber, sobald Fäulniss eintritt.

Es wurde vielfach festgestellt, dass Bakterien mit Vorliebe gefressen werden und zur Nahrung dienen können. In stärkehaltigen Flüssigkeiten gezüchtete Thiere zeigen im Darm aufgenommene Stärke. Grössere Körper, Hefezellen etc., können den engen Schlund nicht passiren, also auch nicht zur Nahrung dienen.

Alkoholische Gährung ertragen sie ohne Schaden. Die von Kahlhefen gebildeten Häute können sie durch ihre Bewegungen nicht zerstören, wohl aber die zarten Essigbakterienhäute. Wenn sie in grossen Mengen vorhanden sind, können sie daher den Essigfabriken (nach dem Orleans-Verfahren) empfindlichen Schaden

bringen. 15–16%-ige Essigsäure tötet die Thiere in 5 Stunden. Erst in 10%-igem Essig bleiben sie am Leben, vermehren sich aber nur sehr wenig. Gute Vermehrung findet erst in unter 6%-iger Säure statt, und zwar um so besser, je weniger Säure vorhanden ist. In dem Speiseessig (ca. 3–4%-ig) vermehren sie sich daher ausserordentlich gut. Die günstigste Temperatur liegt bei 20–29° C, das Maximum bei 34° und das Minimum bei 0,5°. Eine Vermehrung findet unter 14° nicht mehr statt. Eine Temperatur von 42–43° tötet sie in 5 Minuten, eine solche von 44° in einer Minute. Gegen Kälte sind sie unempfindlicher: ein 15-stündiger Aufenthalt in gefrorenem Essig tötet die Thiere nicht; in Wasser waren sie bei – 20° in 5 Stunden abgestorben.

Unter völligem Luftabschluss sterben die Aelchen in ca. 3 Tagen. Sobald die Gefässwände feucht sind, verlassen sie die Flüssigkeit und sammeln sich als weisse, schleimige Masse oder, indem sie eisblumenähnliche Figuren bilden, oberhalb derselben an. Gegen keine andere der bisher untersuchten Säuren sind die Aelchen so widerstandsfähig, wie gegen Essigsäure. Sehr giftig erwiesen sich anorganische Säuren. Besonders empfindlich sind sie gegen Natronlauge.

Ein Druck von einer Atmosphäre, sowie ein elektrischer Gleichstrom von 3 Ampère haben keinen schädigenden Einfluss gezeigt.

Menschlicher Magensaft tötet bei 38–39° C die Aelchen erst nach mehreren Stunden. Durch die hohe Temperatur sind sie aber so geschwächt, dass sie im Körper wohl kaum Störungen hervorrufen können. Hunger tötet sie sehr langsam.

Je nach dem Alter und der Ernährung schwankt die Grösse des Essigaales.

Die Essigälchen vermehren sich ungeheuer, wenn der Essig im Kaufaden zum Verkauf verdünnt wird (bis ca. 3,5%) und in halb gefüllten Fässern lagert. Dies tritt auch ein, wenn selbst das reinste Wasser dazu verwandt wurde und die Fässer sehr sauber gereinigt waren. Die Thiere können Trockenheit nicht vertragen, können daher durch Essigfliegen (*Drosophila fenestrarum* und *funbris*) etc. nicht aus einer Fabrik in eine andere übertragen werden. Die allgemeine Verbreitung des Essigälchens wird durch das Beziehen von „Ansäuerungsessig“ für jede neu einzurichtende Fabrik aus einer älteren inficirten Fabrik erklärt.

H. Will.

Alb. Klöcker: Ist die Enzyymbildung bei den Alkoholgährungspilzen ein verwerthbares Artmerkmal? — Centrbl. Bakteriol. II. Abtheilung 1900, 6, 241–245.

Dubourg hat angegeben (Compt. rend., 1899, 128, 440; diese Zeitschr. 1900, 3, 52); dass solche Alkoholgährungspilze, welche anscheinend keine Inversionsfähigkeit besitzen und „deshalb sich nicht in Saccharoselösung entwickeln und darin Gährung hervorrufen können“, dazu gebracht werden können, indem die Bildung von Invertin durch Züchtung in bestimmter Weise hervorgerufen werden soll. Ferner theilt Dubourg mit, dass er dasselbe Experiment mit Galaktose gemacht habe, und dass die von ihm geprüften Zuckerarten, „direkt invertirbar oder nicht“, allen den von ihm geprüften Hefenarten gegenüber sich in derselben Weise, wie oben angegeben, verhielten. Unter den Zuckerarten macht Laktose eine Ausnahme und unter den Alkoholgährungspilzen misslang der Versuch bei *Mucor alternans*.

Dubourg ist also der Meinung, eine Methode entdeckt zu haben, mittelst welcher die Alkoholgährungspilze im Allgemeinen (und darunter auch die Saccharomyceten) durch die von ihm angegebene Züchtungsmethode zur Entwicklung eines Enzyms, welches sie bisher nicht besaßen, gebracht werden können.

Ausser verschiedenen Unklarheiten hat Dubourg's Mittheilung auch den Mangel, dass diejenigen Arten, mit welchen er seine Versuche anstellte, nicht bekannt sind. Ferner bekommt man keine Aufklärung, inwieweit diejenigen Arten, mit welchen er experimentirte, vollständig ohne diejenigen Enzyme waren, in deren Besitz sie später kamen, oder dieselben nur in sehr geringer Menge entwickelt haben. Denn enthält die Hefenart das betreffende Enzym, wenn auch nur in sehr geringer Menge, so ist es an und für sich nicht merkwürdig, dass die Funktion eine Zeit lang wegen Abschwächung zurückgedrängt werden kann und dass umgekehrt die Menge des Enzyms durch eine kräftige Ernährung der Zelle erhöht werden kann.

Duclaux hat die Dubourg'schen Versuche in seinem „Traité de microbiologie“ T. III zu einem allgemein gültigen Satz erhoben und sie zur Bekräftigung der Anschauung benutzt, dass das Verhalten der Hefen den Zuckerarten gegenüber nicht als Charakter zur Unterscheidung benutzt werden kann. Die Untersuchungen des Verf. haben dagegen aufs Neue bekräftigt, dass wir hier einen der konstantesten Charaktere haben. Derselbe experimentirte mit *S. apiculatus*, einer neuen Species von einem typischen Saccharomyceten, welche in dem Magen einer Biene gefunden wurde, und mit *S. Marxianus*.

Die Versuche wurden genau nach den Angaben von Dubourg ausgeführt, jedoch konnte weder *S. apiculatus* noch die zweite Hefenart zum Invertiren der Saccharose gebracht werden. Ebenso vermag *S. Marxianus* die Maltose nicht zu vergähren, selbst wenn er im Voraus nach dem Dubourg'schen Verfahren gezüchtet wird.

Verf. ging sogar bei den Züchtungsversuchen noch einen Schritt weiter, indem er die Züchtung wiederholte und bei den beiden ersten Arten das Auswaschen unterliess. Nichtsdestoweniger wurden immer negative Resultate erhalten.

Die Angabe Dubourg's, dass Hefepilze bei dem von ihm angegebenen Verfahren zur Bildung eines Enzyms, welches sie bisher nicht besaßen, gebracht werden können, ist falsch. Infolgedessen ist die auf Dubourg's Untersuchungen gebaute Schlussfolgerung von Duclaux, dass das Verhalten der Alkoholgährungspilze zu den Zuckerarten nicht als Artmerkmal gebraucht werden kann, nicht stichhaltig. Im Gegentheil ist die Enzymbildung der Alkoholgährungspilze einer der am meisten konstanten Charaktere, welche wir besitzen.

H. Will.

Alfred Haury: Die Schimmelpilze und ihre industrielle Anwendung. — Oesterr. Chem. Ztg. 1899, 2, 605—611.

C. Wehmer: Chemische Leistungen der Mikroorganismen im Gewerbe. — Zeitschr. angew. Chem. 1900, 788—799.

Patente.

Hans Wegener in Mainlens: Verfahren zur Verwerthung von Hefe für Nahrungs- und Genusszwecke. D.R.P. 108 707 vom 21. Juni 1898. — Patentbl. 1900, 21, 466.

Das Verfahren bezweckt, die bei der Brauerei abfallende Hefe für Nahrungs- und Genusszwecke dadurch nutzbar zu machen, dass man dieselbe zunächst vollkommen geschmack- und geruchlos macht und dann mit aromatischen Stoffen imprägnirt.

Um dies zu bewirken, wird die Hefe, nachdem sie wiederholt gewaschen ist, entwässert, bei erhöhter Temperatur getrocknet, und dann mit geringen Mengen aromatischer Stoffe, wie z. B. Kaffee, Cichorien u. s. w. vermengt.

Paul Kropf in Chikago: Gährverfahren für Bier zur Beschleunigung der Klärung und Aromatisierung desselben unter Vermeidung einer Nachgährung. D.R.P. 106 487 vom 25. Oktober 1898. — Patentbl. 1900, 21, 100.

Man überlässt die in üblicher Weise hergestellte bzw. gekochte Bierwürze nach deren Abkühlung unter Zusatz von Hefe wie bisher der ersten oder Hauptgährung und presst dann vor Beendigung derselben, d. h. in der letzten Periode der Hauptgährung, einen Strom ozonisierter Luft während einer Zeitdauer von 4—6 Stunden durch die Würze hindurch. Hierauf wird das Bier, event. nach der Filtration, karbonisirt. Durch die ozonisierte Luft werden unter Unterdrückung der Gährung die Vorgänge der Eiweiss- und Hopfenharzabscheidung und der Bildung der im Biere nöthigen aromatischen Substanzen in erheblich kürzerer Zeit als bisher, vollendet.

A. Oelker.

Trink- und Gebrauchswasser.

Friedrich C. G. Müller: Apparat zum Schöpfen von Wasserproben aus beliebiger Tiefe. — Zeitschr. angew. Chem. 1900, 388—389.

Der in eine Bleiplatte A gelöthete Bügel B hängt mittelst einer Spiralfeder E und des Karabinerhakens F an dem Ringe einer Lothleine oder eines Messbandes (Fig. 39). Im Bügel kann eine Flasche D (gewöhnliche Medicinflasche von 400 ccm) mit Hülfe der Klemmvorrichtung C befestigt werden. Die Flasche wird mit einem doppelt durchbohrten Kautschukstopfen versehen und die beiden Bohrungen werden mit dem U-förmigen, aus einem Glasstäbchen hergestellten Stöpsel H verschlossen. Letzterer sitzt an der Kette J, welche durch die Spirale hängt und mit ihrem oberen Ende im Ringe von F befestigt ist. Wenn die Vorrichtung ins Wasser hinabgelassen ist, hat ein kurzer Ruck an der Leine das Herausziehen des Stöpsels H zur Folge. Nach Entfernung desselben dringt das Wasser durch das in der einen Bohrung steckende Röhrchen G ein, während die Luft durch die andere Bohrung entweicht. Nach spätestens 80 Sekunden kann die Flasche gefüllt emporgezogen werden. — Bei Tiefen über 100 m wird die Flasche mit Benzin gefüllt und Kork nebst Stöpsel nicht ganz dicht schliessend aufgesetzt. Im Uebrigen verfährt man wie beschrieben. Das Benzin entweicht aus der Flasche nach Beseitigung des Stöpsels fast ebenso schnell wie Luft.

Fig. 39.

C. A. Neufeld.

Julius von Weszelszky: Eine neue titrimetrische Bestimmung der Bromide neben Chloriden und Jodiden. — Zeitschr. anal. Chem. 1900, 39, 81—91.

Die Methode basirt auf dem Verfahren L. W. Winkler's, nach welchem die Jodide in saurer Lösung durch Chlorwasser oxydirt und die entstehende Jodsäure jodometrisch bestimmt wird, während das Brom ausscheidet. Zur Erzielung richtiger Resultate muss anwesendes Eisen und Arsen entfernt werden. Man kocht daher die Lösung vor Zusatz des Chlorwassers mit kohlensaurem Kali auf und entfernt das entstandene basische Eisenkarbonat durch Filtriren. Etwa vorhandenes Arsen und Antimon entfernt man mit Schwefelwasserstoff. — Bei der Bestimmung des Broms benutzt Verf., mit einiger Aenderung, den von Bunsen und Fresenius zur Analyse des Mangansuperoxyds empfohlenen Apparat. Der Kolben fasst 200—250 ccm, wodurch die mit vorheriger Krystallisation verbundenen Fehler vermieden werden. Statt der Kautschukverbindungen werden eingeschlifene Glasverbindungen benutzt. Zur Vermeidung des

Zurücksteigens der absorbirenden Lösung dient ein, am äusseren Ende mit einem Hahn verschlossenes, bis auf den Boden des Kolbens reichendes, dünn ausgezogenes Einführungsrohr. Als durchzuleitendes Gas dient Kohlendioxyd. Die Ausführung des Verfahrens geschieht folgendermaassen:

Enthält das zu untersuchende Material kein Jod, so giebt man zu der Lösung ungefähr 1 g Kaliumkarbonat und die entsprechende Quantität Chlorwasser, kocht die Lösung über freier Flamme vorsichtig bis zum Eintrocknen, löst dann den abgekühlten Rückstand in etwa 100–150 ccm Wasser und titrirt, nachdem man Kaliumjodid zugefügt und angesäuert hat. Die Zahl der verbrauchten Kubikcentimeter der $\frac{1}{10}$ -Normalnatriumthiosulfatlösung, mit 0,001333 multiplicirt, giebt die Menge des Broms. — Ist in der Lösung auch Jod enthalten, so wird sie in den oben beschriebenen Apparat eingeführt und nach dem Ansäuern so viel Chlorwasser dazu gegeben, dass es das Jod zu Jodsäure oxydirt und noch zur Oxydation des Broms zu Bromsäure genügt. Nachdem man den Apparat mit dem Absorptionsgefäss und das Einführungsrohr mit dem Kohlensäureentwicklungsapparat verbunden hat, giesst man in das Absorptionsgefäss so viel Wasser, welches 0,5–1,0 g Kaliumhydroxyd gelöst enthält, dass die Kugel der Retorte gerade abgesperrt wird. Jetzt fängt man an den Kolben zu erwärmen, beginnt, wenn die Destillation schon im Gange und der grösste Theil des Chlors und Broms übergangen ist, mit dem Einleiten des Kohlendioxyds und fährt damit fort, bis auch ein wenig Wasser abdestillirt ist und die Lauge sich vollständig in Karbonat verwandelt hat, beziehungsweise bis sie kein Kohlendioxyd mehr absorbirt. Nun wird unter das Ableitungsrohr ein Becherglas gestellt, welches ein wenig Wasser enthält, das Absorptionsgefäss behutsam weggenommen und das Glas so an seine Stelle gehalten, dass das darin befindliche Wasser das Ende des Ableitungsrohres verschliesst. Wenn man nun nicht weiter erhitzt und den Kohlendioxydstrom einstellt, so steigt das Wasser in Folge der Abkühlung in das Rohr, woraus es durch abermaligen Kohlendioxydstrom wieder herausgedrückt wird; dadurch kann man das Rohr ausspülen. Ausserdem wird auch die äussere in die Flüssigkeit reichende Seite des Rohrs abgespült; das Spülwasser wird mit dem Inhalte des Absorptionsgefässes vereinigt, eingetrocknet und dann wie oben verfahren. In der im Kolben zurückgebliebenen und mit Kaliumjodid versetzten Lösung bestimmt man nunmehr das Jod. Natürlich muss die zu untersuchende Lösung, wenn sie Eisen, Arsen oder Antimon enthält, in der oben beschriebenen Weise davon befreit werden. — Wie aus dem mitgetheilten Belegmaterial hervorgeht, ist diese Bestimmungsmethode des Jods und Broms bei Bestimmung kleinerer Quantitäten dieser Halogene, besonders in Mineralwässern, sehr vortheilhaft. C. A. Neufeld.

H. Erdmann: Ueber Trinkwasserprüfung mittelst Amidonaphtol-K-säure.

— Zeitschr. angew. Chem. 1900, 33–35. Vergl. auch Ber. Deutsch. Chem. Ges. 1900, 33, 210–215.

Man hat die salpetrige Säure als Stoffwechselprodukt zahlreicher, namentlich anaërober und pathogener Bakterien erkannt; nach des Verf. Erfahrungen handelt es sich bei Brunnen- und Grundwasser, welches als Trinkwasser Verwendung findet, um Nitritmengen, die bei sehr mässiger Verunreinigung mit thierischen Abgangsstoffen einer Millionstel-Normallösung entsprechen, während eine Hunderttausendstel-Normallösung bereits starke Mikrobenthätigkeit anzeigt. Auf geringere Gehalte als 0,01 g Nitritstickstoff im Kubikmeter braucht also keine Rücksicht genommen zu werden; bei Gehalten von 0,01 g bis hinauf zu 1 g im Kubikmeter ist aber eine wenigstens an-

nähernde quantitative Bestimmung unerlässlich um festzustellen, ob ein Wasser zu verwerthen ist, oder nur als weniger gut, als mehr oder minder verdächtig bezeichnet werden muss. Von praktischem Interesse ist daher die Bestimmung derjenigen Nitritmengen, welche als „Spuren“ bezeichnet werden. Gelingt es, die salpetrige Säure des Wassers ganz quantitativ in einen farbenkräftigen Azokörper überzuführen, so muss die erzielte Farbenintensität für vorliegenden Zweck zur qualitativen und quantitativen Prüfung vollkommen genügen. Verf. ist nach zahlreichen Versuchen dazu gelangt, die 1-8-Amidonaphtol-4-6-disulfosäure zu verwenden, welche aus der von ihm beschriebenen 1-3-5-Naphtalintrisulfosäure durch Nitriren, Reduciren und Erhitzen mit Natronlauge gewonnen wird. Die Ausführung der Prüfung geschieht folgendermaassen:

50 ccm des zu prüfenden Wassers werden mit 50 ccm einer salzsauren Sulfanilsäurelösung (2 g krystallisirtes sulfanilsaures Natrium im Liter) versetzt und nach 10 Minuten (in sehr verdünnter Lösung vollzieht sich die Diazotirung nicht momentan) etwa 0,5 g 1-Amido-8-naphtol-4-6-disulfosäure in fester Form (als saures Alkalisalz) zugegeben. Es tritt bei Anwesenheit von salpetriger Säure eine leuchtend bordeauxrothe Färbung ein, welche in einer Stunde ihre volle Intensität erreicht. Zur quantitativen Bestimmung vergleicht man nach Verlauf dieser Zeit die erhaltene Färbung in bekannter Weise mit den gleichzeitig hergestellten Kontrollfärbungen. Zu diesen bedient man sich einer Millionstel-Normalnitritlösung, einer Hunderttausendstel-Normalnitritlösung und einer Zehntausendstel-Normalnitritlösung. Zur kolorimetrischen Vergleichung kann auch eine Farbenskala auf Papier dienen. Bei genauen Bestimmungen sind diese Lösungen durch Verdünnen von Normalnatriumnitrit mit Wasser frisch zu bereiten, da sich in so dünnen Nitritlösungen bald Mikroorganismen ansiedeln, durch deren Thätigkeit der Gehalt an salpetriger Säure mit der Zeit abnimmt. Aus demselben Grunde findet man beim längeren Aufbewahren der inficirten Wässer eine Abnahme des Salpetrigsäuregehaltes. — Zum Schluss bespricht Verf. die zur Bestimmung des Nitritstickstoffes bei Gegenwart von Nitraten vorgeschlagenen Proben von Griess und Riegler, welche jedoch für den vorliegenden Zweck viel weniger geeignet sind, als das beschriebene Reagens. Proben von letzterem werden an Interessenten bereitwilligst und kostenfrei abgegeben, die Versendung dieser Gratisproben hat die Firma J. F. Schwarzlose Söhne (Berlin SW, Markgrafenstr. 29) übernommen. Verf. bittet, die mit dem Verfahren gemachten Erfahrungen ihm mitzuthemen; namentlich würden vergleichende bakteriologische und chemische Untersuchungen eines und desselben Wassers, dessen Gehalt an pathogenen Bakterien durch toxische Wirkung bewiesen ist, sehr erwünscht sein.

C. A. Neufeld.

H. Mennicke: Zum Nachweis von salpetriger Säure in Wasser mit Amidonaphtol-K-säure nach H. Erdmann. — Zeitschr. angew. Chem. 1900, 235—236.

Verf. gelangt auf Grund vergleichender Versuche mit obigem Reagens und Zinkjodid- und Jodkaliumstärkelösung mit Anwendung auf Trink-, Ab- und destillirtes Wasser zu folgenden Resultaten:

1. Die Reaktion tritt bei Anwesenheit von Nitritstickstoff stets auf. 2. Die Farbreaktion lässt keine Missdeutung zu und tritt unter keinen anderen Verhältnissen, z. B. bei Gegenwart von Eisenchlorid, Salpetersäure und anderen Oxydationsmitteln allein, auf. Sind diese, z. B. Eisenchlorid, in grösserer Menge vorhanden, so tritt die Reaktion desungeachtet ein, die Nüance ist nur mehr weinroth. 3. Der Grad der Empfindlichkeit für ein scharfes Auge geht bis 1:300 000 000 (auf Natriumnitrit be-

zogen; also 1 g NaNO_2 in 300 000 000 ccm). 4. Die Reaktionen sind bei nur Spuren von salpetriger Säure am besten bei Tageslicht auszuführen. 5. Die Reaktion ist empfindlicher als die mit den übrigen gebräuchlichen Reagentien; sie trat ein, wo andere völlig im Stich liessen. So lag die Grenze für Jodkaliumstärkelösung bei 1:1 000 000, auf Natriumnitrit bezogen. 6. Es wird als angenehm befunden, dass der qualitative Nachweis direkt mit einer quantitativen Bestimmung vereinbar ist, indem man den Farbenton nach 1 Stunde mit Verdünnungen von Normal-Nitritlösungen vergleicht. 7. Der Höhepunkt der bordeauxrothen Färbung war bereits nach $\frac{1}{2}$ Stunde erreicht. — Während Zinkjodid und Jodkaliumstärke in gewissen Fällen unzuverlässig sind, konnten störende Einflüsse, hauptsächlich oxydirende Verbindungen, bei Gegenwart von salpetriger Säure für deren Nachweis mit Erdmann's Reagens nicht konstatiert werden. Aus einer Anzahl von praktisch ausgeführten Beispielen weist Verf. nach, dass Erdmann's Reagens für den Nachweis von Nitrit ein positives, wenn auch schwaches, Resultat erzielte, wo z. B. Jodkaliumstärke vollständig versagte. Die Amidonaphtol-K-säure eignet sich wegen ihrer Eigenschaften speziell für Abwasseruntersuchungen.

C. A. Neufeld.

G. Romijn: Bestimmung von salpetriger Säure. — Chem. Ztg. 1900, **24**, 145 bis 146.

Verf. theilt seine Erfahrungen mit dem von Erdmann (Vergl. die beiden vorstehenden Referate!) angegebenen Reagens mit. Er bezog dasselbe durch die Firma Schwarzlose Söhne und erhielt eine Flüssigkeit, welche eine Lösung von sulfanilsaurem Natrium in Salzsäure darstellte, und eine feste Substanz, die als Mischung von saurem 1-Amido-8-naphtol-4-6-disulfosaurem Natrium mit Natriumsulfat angegeben wurde. Der erhaltene Farbstoff ist in Wasser viel leichter löslich, als derjenige, welcher bei der Reaktion von Griess erhalten wird, wenn auch letzterer löslich genug ist, um die kolorimetrische Bestimmung selbst im salzhaltigen und harten Meerwasser zu ermöglichen. Dagegen ist die Probe nach Griess nach des Verf.'s Erfahrungen viel empfindlicher, und ausserdem hat das neue Reagens in wässriger Lösung eine deutliche blaue Fluorescenz. Zum Schluss wendet sich Verf. scharf gegen die von Erdmann in der Gebrauchsanweisung zu seiner „Trinkwasser-Prüfungsmethode Bagdad“ aufgestellte Behauptung, „dass die salpetrige Säure in keinem Wasser fehle, welches mit kleinen Mengen thierischen Stoffen verunreinigt ist und daher zum Nährboden von Bakterien wurde“.

In Entgegnung auf vorstehenden Artikel bezeichnet H. Mennicke (Chem. Ztg. 1900, **24**, 243) die Angaben Romijn's als übertrieben und als zu ungenügend, um eine so scharfe vernichtende Kritik über die Erdmann'schen Reagentien zu fällen. Die Fluorescenz sei weder deutlich, noch veilchenblau und beeinträchtige die dem neuen Reagens charakteristische Färbung in keiner Weise. Der für die Laien berechneten Gebrauchsanweisung zur Trinkwasserprüfungsmethode „Bagdad“ sei ein rein wissenschaftlicher Werth nicht zuzuschreiben.

Im Anschluss an diese Entgegnung hält Romijn seine Behauptungen aufrecht und hält es für sehr bedauerlich, dass man den Laien Mittel an die Hand giebt, um auf Grund des Ausfalles einer einzigen Reaktion ein Wasser zu beurtheilen. C. A. Neufeld.

L. Spiegel: Die Bedeutung des Nitritnachweises im Trinkwasser. — Ber. Deutsch. Chem. Ges. 1900, **33**, 639–644.

Bei Prüfung des Erdmann'schen Reagenses fand Verf. die Empfindlichkeit desselben etwas geringer als Kaliumjodid-Stärke und als das Lunge-Ilosvay'sche Re-

gens, dagegen liefert dasselbe mit anderen Körpern weder eine ähnliche Reaktion, noch wird es durch solche beeinflusst. Verf. wendet sich dann gegen die in der Gebrauchsanweisung zu Erdmann's Wasserprüfungsmethode aufgestellte Behauptung, dass die Reaktion ausschlaggebend sei für die Beurtheilung von Trinkwasser; die Behauptung beruht auf unrichtigen Vorstellungen über die Bedeutung des Auftretens von Nitrit im Wasser. Wenn auch eine ganze Anzahl pathogener Bakterien unter geeigneten Umständen Nitrit produciren, so sind doch die auf solche Weise gebildeten Mengen vielfach so gering, dass ihre Entdeckung mittelst Erdmann's Verfahrens sehr zweifelhaft ist, lassen sich dieselben doch mit viel empfindlicheren Reagentien oft nicht einmal nachweisen. Es ist ferner durchaus verfehlt anzunehmen, dass vorwiegend pathogene Bakterienarten Nitrite bilden; diese Eigenschaft findet sich vielmehr unter den im Wasser, im Erdboden, selbst in der Luft vorkommenden saprophytischen Arten weit verbreitet. Vor Allem aber finden sich Quantitäten Nitrit, welche im Vergleich zu den durch pathogene Mikroorganismen erzeugten recht beträchtlich genannt werden müssen, in den meteorischen Niederschlägen, im Quell-, Fluss-, Teich-, Brunnen- und Drain-Wasser. Im Einklange damit steht der Gehalt, den Wasser z. B. im Laboratorium durch den Einfluss brennender Gasflammen u. dergl. annimmt. Lässt man gänzlich nitritfreies Wasser einige Tage in der Nähe eines brennenden Bunsenbrenners stehen, so erhält man eine Reaktion, welche nach Erdmann „einem höchst gefährlichen und gesundheitsschädlichen Wasser“ entsprechen kann. Zu ähnlichen Resultaten gelangte Verf., wenn das Wasser kurze Zeit mit Thierkohle geschüttelt wurde, eine Thatsache, die mit Rücksicht auf die vielfach in Haushaltungen zur Reinigung des Wassers im Gebrauche befindlichen Kohlefilter Beachtung verdient. Es kommt somit dem Nachweis von Nitrit weder im positiven noch im negativen Sinne die ausschlaggebende Bedeutung für die Wasserprüfung zu, welche Erdmann ihm beilegt. Seine ganze Methode scheint überhaupt für die Laien bestimmt zu sein. Will man diese aber zur Beurtheilung des Trinkwassers nach dem Nitritgehalt anleiten — was unter besonderen Umständen statthaft sein kann —, so empfiehlt sich jedenfalls ein Reagens, das eine sehr auffällige Reaktion erst bei einem wirklich verdächtigen Gehalt zeigt; die Reaktion darf natürlich durch andere Bestandtheile des Wassers nicht beeinflusst werden. Verf. schlägt als solches Guajakol oder Kreosot vor. Ersteres giebt in wässriger Lösung mit salpetriger Säure eine charakteristische Orangefärbung, letzteres eine mehr gelbliche. Verf. verwendet eine durch Schütteln von Guajakol mit Wasser und Filtriren hergestellte Lösung; das Gemisch derselben mit der zu prüfenden Nitritlösung wird mit einigen Tropfen verdünnter Schwefelsäure angesäuert. Bei $\frac{1}{100000}$ Normalnitritlösung tritt die Färbung sofort sehr deutlich auf und bei $\frac{1}{1000000}$ Normallösung entwickelt sie sich innerhalb $\frac{1}{2}$ –1 Stunde zu vollkommener Deutlichkeit. Oxydirende Agentien, wie Nitrate, Chlorate, Wasserstoffsperoxyd, rufen keine Färbung hervor und beeinträchtigen die Reaktion nicht. Eisenoxydsalze sind bei den praktisch in Betracht kommenden Concentrationen belanglos. — Zum Schluss betont Verf. noch, dass selbst gänzliche Abwesenheit von Nitriten die Unschädlichkeit eines Wassers nicht garantirt. C. A. Neufeld.

Christomanos: Ueber Wasseruntersuchung. Vortrag auf dem vierten internationalen Kongresse für angewandte Chemie Paris 1900. — *Revue générale des sciences pures et appliquées* vom 28. Juli 1900. S. 10.

Die chemische Untersuchung des Wassers kann durch den Nachweis von salpetriger Säure oder Ammoniak darüber Auskunft geben, wie weit es zu Genuss-

zwecken dienlich ist, ebenso kann sie Aufschluss über die Nothwendigkeit einer mikrobiologischen Untersuchung geben. Lepierre ist in der Diskussion der Ansicht, dass jedes Wasser mit mehr als 2—3 mg Kaliumnitrat im Liter als verdächtig anzusehen ist.

C. Mai.

H. Causse: Ueber den Nachweis, die Bestimmung und die Veränderungen des Cystins in den verdorbenen Wässern. — *Compt. rend.* 1900, **130**, 785 bis 78; *Chem. Centrbl.* 1900, I, 877.

Das zum Nachweis des Cystins verwendete Reagens wird in folgender Weise dargestellt: Eine Lösung von 50 g p-amidobenzolsulfonsaurem Natrium in 1 l Wasser wird entfärbt, filtrirt und mit 1 l einer gesättigten Quecksilberchloridlösung versetzt, der Niederschlag gewaschen und mit $\frac{1}{2}$ l einer gesättigten Kochsalzlösung übergossen, in welcher Lösung sich der Niederschlag in 2 Tagen auflöst. Die so bereitete, bei Abschluss organischer Substanzen monatelang haltbare Flüssigkeit wird mit einer Lösung von 4 g Natriumnitrit in 1 l Wasser diazotirt. 100 ccm des zu untersuchenden Wassers werden mit 5 ccm der Quecksilberchloridlösung, 2 ccm Kaliumnitratlösung und 15 Tropfen Normal-Salzsäure versetzt, geschüttelt und im Dunkeln aufbewahrt. Bei Gegenwart von Cystin entwickelt sich die orangegelbe Färbung, welche nach 6 Stunden ihr Maximum erreicht hat. Nach Zusatz von 25 ccm einer gesättigten Schwefligsäure-Lösung vergleicht man nach 2 Stunden die Farbe der Lösung zur Bestimmung des Cystins mit der Farbe, welche ein Wasser von bestimmtem Cystingehalte bei der Einwirkung des Reagenses zeigt.

In allen Brunnen der Häuser der betreffenden Stadttheile Lyons, in welchen Typhusfieber aufgetreten war, wurde Cystin nachgewiesen, und zwar scheint der Gehalt an Cystin mit der Schwere der Erkrankung in Beziehung zu stehen. Der Gehalt des Wassers an Cystin wechselt mit der Jahreszeit. Im September und Oktober wird das Maximum erreicht, allmählich findet dann bis Februar und März eine Verminderung statt. Vergl. auch das Referat auf S. 862.

C. A. Neufeld.

Francesco Abba: Ueber die Nothwendigkeit, die Technik der bakteriologischen Wasseruntersuchung gleichförmiger zu gestalten. — *Zeitschr. Hyg.* 1900, **33**, 372—386.

Die Vorschläge des Verf. bezwecken, eine Vereinfachung und mehr noch eine Gleichförmigkeit in der Technik der bakteriologischen Wasseruntersuchung zu erzielen, damit die Resultate aller Laboratorien die grösste Zuverlässigkeit erlangen und stets mit einander vergleichbar sind. — Auf Grund zahlreicher Versuche schlägt Verf. eine Gelatine von folgender Zusammensetzung als einfachste vor: 6 g konzentrierte Bouillon aus Liebig's Fleischextrakt, 150 g Fischleim (Gelatine), 1000 g destillirtes Wasser. Zusatz von Kochsalz, Pepton oder sonstigen Ingredienzien ist nicht nothwendig. Man kocht die Mischung $\frac{1}{2}$ Stunde lang in einem Koch'schen Topfe, alkalisirt, filtrirt und sterilisirt wie gewöhnlich. Diese Gelatine lässt auf ihrer Oberfläche die kleinsten Kolonien erkennen, lässt sich schneller herstellen und ist viel billiger als die Koch'sche. Zur Neutralisirung lässt man auf eine weisse Porzellanplatte einen Tropfen einer 3%-igen alkoholischen Phenolphthaleinlösung und gleich nachher auf diesen Tropfen einen Tropfen Gelatine fallen; bleibt dieser ungefärbt, so setzt man der Gelatinemasse etwas von einer gesättigten Natriumkarbonatlösung zu, schüttelt sie und wiederholt die Probe, bis man eine ganz leichte Rosafärbung erhält. Alsdann misst man die zu alkalisirende Gelatinemenge (die eine Temperatur von etwa 30° C. haben muss) ab und setzt

derselben 0,5 g festes Natriumkarbonat für jedes Liter zu, lässt noch 15 Minuten lang im Koch'schen Topfe kochen u. s. w. Aus beigegegebenen Tabellen geht hervor, dass in der Zahl der Kolonien kein bemerkenswerther Unterschied zwischen dieser und der Koch'schen Gelatine ist, während auf der Agar-Gelatine von Hesse und Niedner eine um $\frac{2}{3}$ geringere Anzahl Kolonien wächst. Um möglichst immer unter denselben Verhältnissen zu arbeiten, bereite man die Gelatine höchstens 2 oder 3 mal im Jahre; sorgfältig sterilisirt, vor Verdunstung geschützt und geeignet aufbewahrt, behält die Gelatine über ein Jahr lang ihre Nährkraft. — Als Züchtungsmethode empfiehlt sich die Koch'sche mit Anwendung von Petri-Schälchen grösseren Modelles und mit der Fischer'schen Abänderung. — Der Zusatz von 15% Fischleim zur Gelatine ist unveränderlich für jede Jahreszeit; dagegen setze man die Kulturen einer fast konstanten Temperatur aus. Zu diesem Zwecke hat Verf. einen Brutschrank konstruirt, welcher 32 Petri-Schälchen fasst und in welchem durch cirkulirendes Wasser eine Temperatur von 18–19° C. erhalten wird. — Verf. empfiehlt die Inkubation der Kulturen möglichst lange fortzusetzen, wenn thunlich bis zum 15. Tage, und falls die Zählung der Kolonien vor genanntem Termin vorgenommen werden muss, zu den wirklich konstatirten Zahlen einen Allen bekannten und von Allen angewendeten entsprechenden Procentsatz hinzuzufügen. — Die bakteriologische Untersuchung ist stets in einem (wenn auch improvisirten) Laboratorium vorzunehmen, nie am Orte der Probeentnahme. Die Wasserproben sind zum Transporte vom Orte der Entnahme stets in schmelzendem Eise aufzubewahren; zu diesem Zwecke hat Verf. ein sehr zweckmässiges, auch auf dem Rücken tragbares Kästchen konstruirt, in welchem 6 Wasserproben zu je 200 ccm transportirt werden können. — In den Berichten über bakteriologische Wasseruntersuchungen wäre, zur Erzielung einer gleichförmigen und Allen verständlichen Ausdrucksweise, stets die, konstatirte oder ausgerechnete, definitive Zahl der in 1 ccm Wasser angetroffenen Bakterien anzugeben. Die Untersuchung von Wässern von unbekannter Herkunft oder von denen die Proben nicht durch eine Vertrauensperson entnommen wurden, ist abzulehnen, oder zum wenigsten ist aus den erhaltenen bakteriologischen Daten allein kein Schluss bezüglich der Trinkbarkeit oder Nicht-Trinkbarkeit eines Wassers zu ziehen.

Der Kongress der italienischen Hygieniker in Como, dem die Abba'schen Vorschläge unterbreitet waren, stimmte dafür, „dass die Bakteriologen sich über die Technik der bakteriologischen Trinkwasseruntersuchung und die den erhaltenen Resultaten zu gebende Deutung einigen mögen, damit die Resultate mit einander vergleichbar seien“.

C. A. Neufeld.

E. Levy und Hayo Bruns: Zur Hygiene des Wassers. — Arch. Hyg. 1900, **36**, 178–202.

Zur Beantwortung der Frage, ob eine bereits bestehende Wasseranlage den Anforderungen entspricht, welche man heutzutage an eine rationelle Wasserversorgung stellt, oder zur Entscheidung, ob eine epidemisch auftretende Krankheit auf den Genuss eines bestimmten Wassers zurückzuführen ist, reicht die Lokalinspektion allein ebensowenig aus, wie die chemische oder bakteriologische Untersuchung. In einer Reihe von Beispielen legen Verff. ihre im Laufe von 10 Jahren gewonnenen Erfahrungen über die hygienische Beurtheilung des Wassers nieder und warnen besonders vor Ueberschätzung der lange vernachlässigten, in letzter Zeit aber von manchen Forschern über Gebühr in den Vordergrund gedrängten Okularinspektion. Einen An-

haltspunkt erblicken die Verff. in der Pathogenität gewisser in einem Wasser vorkommender Bakterien, namentlich der Coli-Arten. Sie führen den Pathogenitätsnachweis folgendermaassen: 100 ccm des zu prüfenden Wassers werden mit 1 % Pepton und Kochsalz versetzt und als Anreicherungskulturen 48 Stunden im Brutofen bei 37° gehalten. Nach Ablauf dieser Frist erhalten Meerschweinchen intraperitoneal 1–2 ccm, Mäuse subcutan 0,2–0,5, Kaninchen intravenös 2–3 ccm. So geprüft liess hygienisch tadelloses Wasser nach den bisherigen Erfahrungen der Verff. die Thiere immer am Leben. Gingen Thiere ein, so vermochten Verff. bei der Autopsie immer virulentes *B. coli*, oft mit anderen konkomitirenden Bakterien gemischt, oder in selteneren Fällen hochgradig virulente *Proteusspecies* herauszuzüchten. Diese Pathogenitätsprüfung ist indessen, namentlich wenn dieselbe negativ ausfällt, kein untrügliches Verfahren für die hygienische Wasserbeurtheilung. Verff. sagen nur, dass zahlreichen und zwar immer tadellosen Wässern im Thierexperiment eine schädliche Wirkung abgeht, dass also die pathogenen Bakterien, auch die von der Coli-Gruppe, und wohl auch von der *Proteus*-Gruppe, zu den regelmässigen Wasserbewohnern nicht zu zählen sind. Treffen wir sie in einem Wasser, so dürfen wir mit Wahrscheinlichkeit behaupten, dass sie vor nicht allzulanger Zeit von aussen in das Wasser hineingelangt sind, dass es sich in der Mehrzahl der Fälle um verunreinigtes Wasser handelt. In diesem Sinne aufgefasst leistet die Pathogenitätsprüfung entschieden werthvolle Dienste; sie soll sich als ergänzend zur Okularinspektion und zur chemischen Untersuchung hinzugesellen und einen weiteren Anhaltspunkt für die hygienische Beurtheilung des Wassers abgeben.

C. A. Neufeld.

P. Carles: Das Wasser der Seen für die Wasserversorgung. — *Rép. de Pharm.* 1900, [3], 12, 103–108.

In Frankreich spielt das Wasser der Binnenseen eine grosse Rolle bei der Wasserversorgung der Städte. Ein Theil der Seen liegt in den Gebirgen — den Pyrenäen, Alpen und Vogesen — ein anderer in den grossen Ebenen — besonders den Landes der Gascogne. Die Gebirgsseen bestehen aus Gletscherwasser, welches auf seinem Laufe Granit und ähnliches undurchlässiges und schwer lösliches Gestein passirt. Die Seen der Landes liegen in sandigem, eisenhaltigem Gelände. Das Wasser beider Arten von Seen ist arm an mineralischen Stoffen, namentlich an Sulfaten und Karbonaten der alkalischen Erden. Aus diesem Grunde, und wegen des Auftretens freier Kohlensäure und Salpetersäure besitzen diese Wässer in hohem Grade die Eigenschaft, Bleiröhren anzugreifen. Hierauf ist bei der Verwendung als Trinkwasser Rücksicht zu nehmen (Behandlung mit Thierkohle; Filtriren). Was die Verunreinigungen anbelangt, die durch die Nähe bewohnter Stätten und Ansiedelungen unvermeidlich in die Seen hineingelangen müssen, so spielt die Selbstreinigung hier eine grosse Rolle. In den Gebirgsseen wird das Wachsthum schädlicher Mikroorganismen durch die tiefe Temperatur verhindert, während andererseits das Licht und die Luft ihre baktericide Wirkung ausüben. In den Seen der Landes sind die Eisenverbindungen des Bodens und die Algen neben Licht und Luft die Hauptfaktoren der Selbstreinigung.

C. A. Neufeld.

Intze: Ueber Thalsperrenwasser als Trinkwasser. — *Centrbl. allg. Gesundh.* 1900, 19, 1–14 und 47–53.

Bei der wachsenden Zunahme des Wasserverbrauches ist die Frage einer Versorgung mit gutem und reichlichem Wasser für viele Städte eine sehr brennende.

Dies war namentlich in mehreren rheinischen Städten der Fall, wo die mit Lette überlagerten Felsen undurchlässig sind und kein natürliches Grundwasserreservoir sich bilden kann. Man muss dann die Zuflucht zu sichtbarem Wasser nehmen und durch Errichtung von Thalsperren künstliche Becken bilden. Je mehr sich aber die Grösse eines solchen der gesammten Wassermenge, die überhaupt aus dem Gebiet herausgeholt werden kann, nähert, um so schwieriger wird die Frage der Erhaltung einer guten Beschaffenheit des Wassers. Verf. theilt auf Grund seiner Erfahrungen an den Anlagen in Remscheid, Lennep, Ronsdorf u. a. Mittel zur Reinhaltung des Wassers mit. Zu Zeiten, wo die Zuflüsse und Quellen oberhalb des Sammelbeckens (welche schon in geschlossene Rohrleitungen abgefangen sind) nicht mehr ausreichen um den Bedarf zu decken, entnimmt man dem Sammelbecken selbst Wasser; dieses wird durch einen besonderen Springbrunnen mit der Luft in Berührung gebracht, fliesst in einen flachen Teich und gewinnt dadurch an Aussehen und Eigenschaften. Dann sinkt es durch den flachen Teich und durch Berieselung von Wiesenflächen in Filterschlütze und kommt durch diese wieder in dem Brunnen zum Vorschein. Eine weitere Einrichtung zur Reinhaltung des Wassers ist in einer Filteranlage in der Nähe der Pumpstation zu bieten; man nimmt gewöhnlich Sandfilter. Um schnell und möglichst dauernd vorzügliches Wasser im Sammelbecken zu haben, ist es wünschenswerth, vor Füllung des Beckens alle Pflanzentheile etc. zu beseitigen. Beim Vergleich der vom Verf. mitgetheilten Analysen mit denjenigen, die man bei Brunnenwasser erzielt hat, ergiebt sich, dass man bei Anwendung der nöthigen Vorsichtsmaassregeln wohl berechtigt ist, grosse Wassermassen aus dem Gebirge durch Anlage von Sammelbecken zur Wasserversorgung von Ortschaften zu benutzen. —

In der sich an diesen Vortrag anschliessenden Diskussion wirft Kruse die Frage auf, ob überhaupt grössere Mengen Bakterien im Thalsperrenwasser vorhanden sein können und wie häufig das vorkommt. Intze entgegnet, dass die seit 8 Jahren in Remscheid regelmässig allmonatlich ausgeführten chemischen und bakteriologischen Untersuchungen, und besonders auch diejenigen der kritischen Zeit im Sommer ergeben haben, dass das Wasser vom Brunnenwasser fast nicht zu unterscheiden, theilweise sogar viel reiner war.

C. A. Neufeld.

H. Kruse: Typhusepidemien und Trinkwasser. — Centrbl. allg. Gesundh. 1900, 19, 34–46.

Verf. beschreibt zwei Fälle von Typhusepidemien, die auf Trinkwasserverseuchung zurückzuführen waren. Der eine derselben bestätigt aufs Neue, dass man der Filtrationskraft des Bodens nicht allzuviel zutrauen darf. Im zweiten Falle lag der ursächliche Zusammenhang der Epidemie mit der Verseuchung eines Quellwassers durch unterirdischen Zufluss von Schmutzwasser aus einem Hause, in welchem kurz vorher ein Typhusfall vorgekommen war, klar zu Tage. Jedoch waren hier alle Versuche, den Typhusbacillus nachzuweisen, umsonst, weil dieselben — wie gewöhnlich — zu spät angestellt wurden: seitdem die Bacillen vermuthlich in die Quelle gelangten, waren schon etwa 6–8 Wochen verflossen, das Wasser war nicht mehr infektiös. Das Einzige, was sich bei der bakteriologischen Prüfung fand, waren u. A. Keime aus der Gruppe des *Bact. coli*, welches sich bekanntlich auch in Wässern findet, die nie mit Fäkalien verunreinigt worden sind. Zur Vorsicht wurde sodann das Wasser mittelst eines Berkefeld-Filtertopfes (15 Kieselguhr-Kerzen) filtrirt. Das filtrirte Wasser war nur kurze Zeit wirklich keimfrei, weil Wasserbakterien bald das Filter durchwuchsen.

Trotzdem hält Verf. den Filtereffekt auch im Ernstfalle, d. h. beim Vorhandensein von Typhusbacillen für genügend, weil auch die Kolibakterien stets im Filtrate fehlten, während sie im unfiltrirten Wasser nachweisbar blieben. *C. A. Neufeld.*

H. Kruse: Ueber die Einwirkung der Flüsse auf Grundwasserversorgungen und deren hygienische Folgen. — Centrbl. allg. Gesundh. 1900, **19**, 113—149.

Unter normalen Bedingungen, d. h. bei den gewöhnlichen Wasserständen tritt eine Schädigung der Grundwasserwerke durch die Flüsse nicht ein. Auch bei Werken, die neben echtem Grundwasser mehr oder weniger grosse Mengen „natürlich filtrirten“ Flusswassers pumpen, wird, wie langjährige Erfahrung gelehrt hat, das aus dem Flussbett in den Untergrund eintretende Wasser durch den Einfluss des Bodens seiner gefährlichen Eigenschaften, d. h. seiner Bakterien beraubt. Bei plötzlichem Steigen der Flüsse und bei Hochwasser kann indessen eine Verschlechterung der Wasserbeschaffenheit mehr oder weniger leicht erfolgen, einerseits durch direktes Eindringen von Flusswasser, andererseits weil die Filtration des Flusswassers in stürmischer Weise und in einem mit Luft gefüllten, also durchlässigen Boden vor sich geht. Hierfür giebt Verf. zahlreiche Belege und schlägt Maassregeln zur Abhülfe des durch Hochwasser hervorgerufenen Schadens vor. Demnach sind die Fassungen so tief wie möglich, die Brunnen nur im Boden durchlässig anzulegen, die Entnahmestellen über ein möglichst grosses Terrain zu vertheilen und nicht zu nahe an die Flussufer heranzugehen. Ferner sind solche Plätze die geeignetsten, wo der Wasserspiegel des Flusses die geringsten Schwankungen erfährt, also z. B. die Nachbarschaft eines Wehres. Für schon bestehende Werke empfiehlt sich ein vorsichtiger Betrieb in Hochwasserperioden; die am meisten gefährdeten Theile der Anlage müssen ganz ausgeschaltet werden. Wo kein Wehr besteht, wird es oft angängig sein, ein solches in den Fluss einzubauen und dadurch den Wasserstand im Fluss zu erhöhen und stabiler zu machen. — In Beantwortung der Frage, ob die durch Hochwasser in manchen Grundwasserversorgungen (z. B. im Ruhrthale u. A.) hervorgerufenen Keimvermehrungen die Ursache von Typhus-epidemien gewesen seien, gelangt Verf. auf Grund verschiedener Erwägungen zu dem Ergebnisse, dass die Wasserversorgungen an der höheren Sterblichkeit von früher keinen Antheil gehabt haben können, vielmehr einen günstigen Einfluss auf die Eindämmung des Typhus ausgeübt haben müssen. Daneben haben selbstverständlich noch andere günstige Umstände mitgewirkt. Da nun die — bisherigen — Erfahrungen für die Gefahr der Typhusverbreitung durch die Grundwasserversorgungen bei Hochwasser keinen klaren Beweis gebracht haben, darf man vorläufig die Frage, ob eine Einleitung von Kanalwässern in die Flüsse gestattet ist, nicht von diesem Gesichtspunkt aus verneinen. Unendlich viel wichtiger als die Reinhaltung der Flüsse scheint die Untersuchung und Ueberwachung der in den Flussthälern liegenden Wasserwerke darauf hin, dass nicht Anlagen dauernd oder zeitweilig in Betrieb genommen werden, welche den Filtrationsvorgang im Boden ausschalten und beeinträchtigen. Dazu gehören: 1. Filterrohrstränge und Brunnen, die zu nahe neben oder unter dem Flussbett angelegt sind. 2. Gräben, die in offener Verbindung mit dem Fluss parallel oder senkrecht zu den Filtergalerien und Brunnen eines Werkes angelegt werden, um den Grundwasserstrom künstlich zu verstärken. 3. Berieselung von Flächen, deren Untergrund zur Wasserversorgung dient. 4. Unmittelbare Einleitung von Oberflächenwasser in die Saugbassins der Wasserwerkspumpen. — Nach einer weiteren Besprechung der

Schädigungen, die ausser dem Typhus der öffentlichen Gesundheit durch die Verschlechterung des Leitungswassers bei Hochwasser erwachsen können, kommt Verf. zu dem Schlusse, dass auch Grundwasserversorgungen Zufällen ausgesetzt sein können, in gewisser Beziehung ähnlich denen, die wir schon länger bei Wasserwerken mit Sandfiltration kennen. Nur muss man sich hier bei der ausserordentlichen Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse noch mehr wie sonst vor einer schematischen Beurtheilung hüten. Erst die sorgfältigste Prüfung des Einzelfalles gestattet festzustellen, ob überhaupt im Gefolge von Hochwässern das Wasser einer Grundwasserleitung verschlechtert wird, in welchem Umfange das geschieht, und welche hygienische Bedeutung die Wasserverschlechterung hat.

C. A. Neufeld.

George A. Soper: Reinigung des Trinkwassers durch Ozon. — Gesundheits-Ing. 1900, 23, 21—25.

Verf. giebt eine Beschreibung der Versuche von Tindal zur Reinigung des Trinkwassers durch Ozon, dessen System in Belgien und Frankreich bereits Anwendung findet. Zur Darstellung des Ozons dient die sogenannte funkenlose oder geräuschlose Entladung von hochgespannten elektrischen Strömen. Bezüglich der technischen Einzelheiten sei auf die Originalarbeit verwiesen. — Die Versuche ergeben die Thatsache, dass Trinkwasser durch Ozon sterilisirt werden kann. Die Wirkung des Ozons auf das Wasser ist eine chemische, sie ist also anderen Reinigungsmethoden mit mechanischer oder biologischer Wirkungsweise unähnlich. Durch Einwirkung des chemisch aktiven Sauerstoffs auf die oxydirbaren Unreinigkeiten im Wasser erfahren diese eine Umformung in mehr stabile Verbindungen. Hingegen werden durch Ozon keine schwimmende oder schwebende Verunreinigungen entfernt oder zerstört, ausgenommen die Bakterien. In dieser Beziehung unterscheidet sich die Ozonisierung wesentlich von der Ablagerung und der Filtration. Folglich muss durch Ozon sterilisirtbares Wasser frei von organischen Bestandtheilen sein. Besonders eignet sich hierzu also klares, gefärbtes oder faulriechendes Oberflächen- und Grundwasser und das Filtrat von ungenügend arbeitenden Filtern. Ozonisierung hat demnach den Zweck, die Bakterien im Wasser zu tödten und unangenehme Farbe oder schlechten Geruch organischen Ursprungs zu zerstören. Indem sie mit der Möglichkeit einer Unwissenheit oder Sorglosigkeit der Filteraufseher rechnet, verschiebt die Ozonisierung die Verantwortlichkeit in die Hände der Elektriker und Maschineningenieure, deren Vertrautheit mit den erforderlichen Apparaten diese ermächtigt, die mechanischen Details des Processes zu handhaben und zu leiten. Die geeignete Ozonmenge wird an der Gegenwart oder Abwesenheit des specifischen Ozongeruches erkannt. In den meisten Fällen ist bei Ozonisierung vorherige Filtration unvermeidlich. Von besonderer Wichtigkeit ist die Vollkommenheit, mit welcher Ozon unangenehme Gerüche des Wassers zerstört. Es erscheint sicher, dass Wässer, in welchen Fasern, Häute, Algen u. s. w. einen fischigen, scharfen, aromatischen oder widerlichen Geruch oder Geschmack verursachen, nach Beseitigung jener Organismen durch Filtration, mittelst der Ozonisierung zu ihrer früheren Brauchbarkeit zurückgeführt werden.

C. A. Neufeld.

F. Malméjac: Reinigung der Wässer durch die Halogene. — Journ. Pharm. Chim. 1900, [6], 11, 364—368.

Der Verf. hat in Bestätigung der Arbeiten anderer Forscher gefunden, dass die Halogene in sehr verdünnter Lösung (0,0001 g auf 1 Liter Schmutzwasser) stark auf die Bakterien einwirken, deren Zahl und Lebensfähigkeit sie ausserordentlich herabsetzen.

Dagegen war die Verminderung der organischen Substanz und des Albuminoidstickstoffs nur eine geringe, so dass von einer Reinigung der Wässer nicht die Rede sein kann.

A. Hebebrand.

Berger: Die Sterilisation von Trinkwasser mit Chlorperoxyd. Vortrag auf dem vierten internationalen Kongresse für angewandte Chemie Paris 1900. — *Revue générale des sciences pures et appliquées* vom 26. Juli 1900, S. 9.

Berger hat festgestellt, dass 1 mg Chlorperoxyd genügt, um 1 l Wasser keimfrei zu machen. Die Zusammensetzung des Wassers erfährt dabei keine nennenswerthe Veränderung, indem nur eine kaum wahrnehmbare Vermehrung der Chloride stattfindet. Dagegen tritt eine Verminderung der organischen Substanz ein.

C. Mai.

J. Henry: Sterilisation des Wassers durch das Lapeyrère-Filter. *Revue d'Hygiène* 1900, **22**, 233; *Chem. Ztg.* 1900, **24**, Rep. 123.

Das Verfahren beruht auf einer Kombination von Sterilisation und Filtration. Zur Sterilisation dient „Aluminiumkalkpermanganatpulver“, bestehend aus 3 Theilen Kaliumpermanganat, 10 Theilen getrocknetem und pulverisirtem Natriumalaun, 9 Theilen ebenso behandeltem Natriumkarbonat und 3 Theilen gelöschtem Kalk. 25 g oder höchstens 50 g dieses Pulvers genügen zur sicheren Sterilisation von 100 l Wasser, welches dadurch dauernd roth gefärbt werden muss. Zur Entfernung der ursprünglich vorhandenen wie der bei der Oxydation entstandenen Trübung und gleichzeitig des Permanganatüberschusses dient ein reducirendes Filter, dessen Material Torffaser oder langhaariges Wollgewebe bildet. Das Verfahren soll eine absolut einwandfreie Wasserversorgung gewährleisten. Die Filter werden in allen Grössen vom Taschenapparat bis zu den für den Bedarf von Schulen und ähnlichen Anstalten erforderlichen angefertigt.

C. A. Neufeld.

Gärtner: Amerikanische Versuche über Sandfiltration. — *Journ. Gasbel. u. Wasservers.* 1900, **43**, 42–46.

Die Stadt Cincinnati wird mit Ohio-Wasser versorgt, welches zu Zeiten des häufig eintretenden Hochwassers enorme Mengen suspendirter Substanzen — bis 2,0 g pro Liter — führt; dieselben bestehen hauptsächlich aus Thontheilchen. Zur Klärung des Wassers wurden Versuche mit verschiedenen Filtrations-Systemen angestellt. Die Kläreinrichtung wurde so getroffen, dass das Wasser zunächst ca. 3 Tage in 3 Stahleylindern stand. Von dort gelangte es in eine Anzahl Filterbottiche aus Holz, auf deren Boden eine Kiesschicht von etwa 4,6 Zoll Höhe und über derselben eine Sandschicht von 1,3 bis 5 Fuss Stärke sich befand. Die Filter sind mit Sand von verschiedenen Korngrössen gefüllt. Diese Filtration nach sog. englischem System erwies sich für das Ohiowasser als mangelhaft wegen der Abwesenheit von organischen Stoffen, welche die einzelnen Sandkörner mit einer gelatinösen Hülle umgeben. Auch fehlt das Material zur Bildung der filtrirenden Schmutzdecke, welcher bei unseren meisten Filtern der Haupteffekt zuzuschreiben ist; infolgedessen drangen die Thontheilchen tief in die Filter hinein. Bei dieser Filtration war von grösstem Einfluss der Zustand des sedimentirten Rohwassers; das Filtrat war „blank“, wenn in jenem nicht mehr als 10 Theile Thon auf 1 Mill. Theile Wasser waren (10 mg im Liter), schon bei 20 mg im Liter war das Filtrat leicht trübe, bei 150 mg im Liter zeigte das Rohwasser einen bräunlichen Ton. Im Allgemeinen wurden gegen 90 % des Thons entfernt. Die Filter wirkten auch in geringem Maasse auf die Entfernung der organischen Substanz; feiner Sand, dicke Schicht und langsames Filtriren hatte die besten Erfolge; doch sei diese Sub-

stanz von keinem wesentlichen hygienischen Interesse, eine Auffassung, der man nur beitreten kann. Die Einwirkung auf Bakterien war eine gute. Die geeignetste Filtergeschwindigkeit ist 156 mm pro Stunde. — Da jedoch der Ohio vielfach Trübungen führt, die durch die erwähnten Filter nicht genügend entfernt werden konnten, so wurde ein anderes, das sog. „modificirte englische“ System in Anwendung gebracht, d. h. es wurde zu den Zeiten, wo das Wasser stark trüb war, ein koagulirendes Mittel, Aluminiumsulfat, zugesetzt. In Gegenwart von Karbonaten, die in genügender Menge vorhanden waren, eventuell auch durch Zusatz von Soda leicht vermehrt werden können, geht die Schwefelsäure an das Calcium und Magnesium, die Kohlensäure entweicht und es entsteht das weisse grobflockige gelatinirende Aluminiumhydrat. Aus der grossen Reihe der Versuche folgt, dass der Zusatz von Aluminium zu dem stagnirenden Wasser einen grossen Effekt hatte, so dass nun durch die Filter geklärt werden konnte. Bis zu 400 mg im Liter liess sich durch einfaches Absitzenlassen die Menge der Schwebstoffe herunterbringen. Die durch den Zusatz bewirkte Steigerung der schwefelsauren Verbindungen war minimal und vom gesundheitlichen und technischen Standpunkt völlig belanglos. Die Zahl der Bakterien wurde durch diesen Process bis zu 99 % vermindert. Die Menge der suspendirten Substanzen sank auf 7 bis 1 mg pro 1 Mill. Theile herab. — Weitere sehr ausgedehnte Versuche wurden dann mit der sog. „amerikanischen Methode“ gemacht: Durch Stehen vorgeklärtes Wasser wurde in Tanks gegeben, in welchen durch Scheidewände das Wasser sich zwangsläufig bewegte. Dem Wasser wurde, ohne Rücksicht auf seine Klarheit, Aluminiumsulfat zugesetzt, und dasselbe dann nach 6 stündigem Zusammensein mit diesem Koagulationsmittel auf die Filter gegeben. Letztere bestanden aus Sand von geringer und mittlerer Korngrösse und waren mit entsprechender Wasch- und Rührvorrichtung verbunden. Als Maassstab für die Wirksamkeit der Reinigung nach diesem System diente allein die Einwirkung auf die Bakterien, weil sich herausstellte, dass die Klarheit, d. h. die Einwirkung auf die suspendirten Substanzen, nur auf das Verschwinden der gelösten organischen Substanz mit der Wirkung auf die Bakterien stieg und fiel, ein Verhältniss, welches bei den englischen Methoden nicht so ausgeprägt war; es schien, als ob die Koagula bei der amerikanischen Methode die feineren Thontheilchen besser einschliessen. Die Filtration durch die amerikanischen Filter ist 30—40 mal so rasch als durch die gewöhnlichen Sandfilter und ist billiger und leichter zu handhaben. — Im Anschluss an diese Versuche errichtete die Ohio Sanitary Engineering Company eine Versuchsanlage nach ihrem System. Dasselbe besteht in Zusatz von gesättigtem Kalkwasser zum Flusswasser, dem Niedergehen des grössten Theiles der suspendirten Massen durch Aufwärtssteigen durch einen Tank hindurch, welcher die für 12 Stunden erforderliche Wassermenge fassen kann, der Filtration des aufgestiegenen Wassers durch ein Sandfilter mit Rühr- und Waschapparat und abermaliger Filtration durch ein Filter, bestehend aus Sand und Polarite u. s. w. wie beim Sandfilter. Dem zu reinigenden Rohwasser, dem nach dem Passiren des Niederschlagstanks kommenden und in das Polaritefilter übertretenden Wasser, wird Kohlensäure zugefügt. Das Verfahren wirkt sehr gut. Die Wirkung des Kalks auf die Bakterien, von denen 99 % entfernt wurden, beruht nicht auf seiner desinfektorischen, sondern auf seiner koagulirenden Kraft. Durch den Kalkzusatz wurden die Kohlensäure und die Bikarbonate des Kalks und der Magnesia aus dem Wasser entfernt.

Jedenfalls zeigen die sämmtlichen Versuche, dass man sich in Amerika nicht vor der Anwendung von Chemikalien zur Wasserverbesserung im Grossen scheut,

während man in Deutschland hiergegen noch eine starke Abneigung hat. Letztere ist nicht gerechtfertigt; denn wir erreichen durch Zusatz von Chemikalien auf demselben Wege in kurzer Zeit das, was die Natur in gleicher Weise, aber in längeren Zeiträumen bewirkt.

C. A. Neufeld.

G. P. Moore: Algen als Ursache der Verunreinigung von Trinkwasser. — Amer. Journ. Pharm. 1900, 72, 25—36.

Die Nothwendigkeit der biologischen Untersuchung neben der chemischen bei Wasserverunreinigungen wird immer deutlicher erkannt. Neben den Bakterien sind es Algen, welche in vielen Fällen ein Wasser ganz unbrauchbar machen. Aber nicht die in dichten Vegetationen wachsenden, durch Grösse und Wachstum ausgezeichneten Algenarten hat Verf. im Auge —, denn diese rufen nur mechanische Störungen hervor, während sie andererseits durch Assimilation vieler im Wasser gelöster Verunreinigungen wohlthätig wirken — seine Untersuchungen erstrecken sich auf die mikroskopischen Formen. Die hauptsächlichsten von ihm beschriebenen Arten seien nachstehend aufgeführt. Schizophyceen: Sie sind in Wachstum und Fortpflanzung den Bakterien sehr ähnlich und bilden gelatinöse Massen von meist blaugrüner, oft aber auch von olivengrüner, gelber und brauner Farbe. Das rothe *Trichodesmium erythraeum*, welches dem Rothen Meere seinen Namen verleiht, gehört hierher. Die Struktur ist sehr einfach. Viele Arten bestehen aus einer einzelnen Zelle, welche sich durch Theilung vermehrt. Andere bestehen aus Reihen von Zellen, welche durch eine gelatinöse Masse zusammengehalten werden. Neben der einfachen Theilung bilden einzelne Arten der Schizophyceen dickwandige Sporen; dies ist der Grund, weshalb solche nach einigem Bestehen in einem Wasser auf einmal verschwinden, um plötzlich nach mehreren Jahren wieder aufzutreten. Diese Algen bilden sich in seichten, stagnirenden Wässern von relativ hoher Temperatur. Sie verleihen dem Wasser unangenehmen Geschmack und Geruch, welche von der Zersetzung höherer organischer Schwefel- und Phosphorverbindungen herrühren. Die Schizophyceen zerfallen in zwei Gruppen, Kokkogoneen und Hormogoneen, von denen erstere einzellig, letztere vielzellig sind. Zu den Hormogoneen gehört u. A. auch *Nostoc*. — Diatomaceen: Sie enthalten viel Kieselsäure und vermehren sich durch Theilung in eigenthümlicher Weise, indem das neue Individuum in seinem engeren Theile schachtelartig vom älteren umschlossen ist. Nur wenige Arten bewirken Verunreinigungen des Wassers, diese kommen aber häufig und in grossen Massen vor. Ein derartiges Wasser nimmt einen unangenehmen Fisch- oder geraniumartigen Geruch an, welcher es zum Gebrauche untauglich macht. Wegen des in den Diatomeen enthaltenen grünlichbraunen Farbstoffs ist solches Wasser auch unbrauchbar für Papierfabriken und Wäschereien. Die Diatomaceen entwickeln sich nicht in ruhigem stehenden Wasser, dagegen sehr kräftig in lebhaft bewegtem oder herabstürzendem Wasser, welches eine starke Zufuhr von Luft und Nitraten hat. — Syngeneticeen: Sie stehen auf der Grenze zwischen pflanzlichen und thierischen Organismen. Eine einzige Art, *Uroglena*, bewirkt Wasserverunreinigung, diese aber in stärkerem Maasse, als irgend ein anderer Organismus. Dieselbe findet sich in Neu-England und Indiana. Sie besteht aus kugelförmigen Kolonien von 0,5 Durchmesser, die aus zahlreichen kleinen grünlichen Zellen zusammengesetzt sind. Ausserdem finden sich in einer solchen Kolonie eine Anzahl von Oeltröpfchen; durch dieses Oel wird dem Wasser ein höchst unangenehmer fischartiger, öligler Geschmack und Geruch mitgetheilt. Ueber die Natur dieses Oeles ist noch

nichts Näheres bekannt; es scheint dem Oel der Diatomeen und der blaugrünen Algen zu ähneln. Da die Kolonien leicht zerstörbar sind, und das Oel mechanisch an die Oberfläche des Wassers steigt, so kann man letzteres durch kräftiges Pumpen von dem Oel befreien. Die Uroglena vermehrt sich sehr schnell durch eigenthümliche Zelltheilung, ausserdem bildet sie Sporen. In Amerika gedeiht sie am besten bei niederen Temperaturen, während sie in Europa nur während der heissen Jahreszeit vorkommt; in letzterem Falle handelt es sich augenscheinlich um eine andere Art. Zu den Syngenticeen scheinen auch die Algen Synura und Uvella zu gehören, von denen erstere dem Wasser einen Geruch nach frischen Gurken, letztere einen überaus unangenehmen säuerlichen Geschmack verleiht. —

Was die Reinigung der Wässer von diesen Algen anbelangt, so richtet sich dieselbe ganz nach den Lebens- und Wachstumsbedingungen einer jeden Art; es ist in hohem Grade wünschenswerth, in dieser Beziehung noch wissenschaftliches Material zu sammeln. Andererseits können allgemeine Maassregeln anempfohlen werden wie Entfernung der oberen Bodenschicht, Anlage neuer Reservoirs, Lichtabschluss vom Grundwasser u. s. w. Zum Schluss betont Verf. die Nothwendigkeit, bei Anlage einer Wasserversorgung neben der chemischen Untersuchung eine eingehende mikroskopische Prüfung des Wassers vorzunehmen, und zwar nicht nur in bakteriologischer Richtung, sondern auch in Bezug auf andere schädliche Organismen. *C. A. Neufeld.*

H. Dirksen und Oscar Spitta: Erwiderung auf G. Frank: Das Wasser der Spree innerhalb der Stadt Berlin im Jahre 1886 und im Jahre 1896 in bakteriologischer und chemischer Beziehung. — Zeitschr. Hyg. 1900, **33**, 363—371.

Frank (Zeitschr. Hyg. 1899, **32**, 187—204) stellt 5 Punkte zusammen, in denen er entgegengesetzter Ansicht ist, als die Verff. Da No. 3 und No. 5 wörtlich miteinander übereinstimmen und beide ausserdem in No. 1 und No. 2 enthalten sind, so bleiben nur 3 Schlussfolgerungen übrig. 1. Die Spree war im Jahre 1896 an der Oberbaumbrücke mit Bakterien reicher beladen als 1886. Diese Thatsache und die Gründe dafür hat Frank der Arbeit der Verff. entnommen, welche darin mit ihm einer Meinung sind. Verff. geben die von Frank ausgesprochene Möglichkeit der Verschmutzung der Oberspree durch Be-theiligung der Drainwässer der nördlichen Rieselfelder für Regentage zu; dieser Einfluss ist aber in der Oberspree kaum zu erkennen. 2. Eine wesentliche Aenderung d. h. Besserung der Spree in bakteriologischer Beziehung im Jahre 1896 gegenüber dem Jahre 1886 lässt sich nicht feststellen. 3. Verff. haben nie bestritten, dass das Wasser der Spree bei Sarcow im Jahre 1896 in allen Fällen weniger Keime enthielt als das Wasser an der Oberbaumbrücke, da der Keimgehalt an letzterer im Jahre 1896 von vornherein ein viel höherer war als 1886. Verff. sehen keinen zwingenden Grund dafür, dass diese Erscheinung mit einer geringeren Verunreinigung der Spree in und unterhalb Berlins zusammenhängt, zumal die letzten beiden Punkte für sie nicht erwiesen sind. Die Einflüsse der Kanalabgänge und Nothauslässe werden nach ihrer Meinung von Frank überschätzt. Trügen diese wirklich die Hauptschuld, so hätten die wichtigen, erst nach Abschluss der Frank'schen Arbeit fertig gewordenen, Arbeiten, wie die Anlage von steinernen Ufermauern, die Beseitigung der Schlamm Massen durch Ausbaggerung, im gleichen Sinne bessernd wirken müssen. Verff. haben nach Allem keinen Anlass, von ihren Schlussfolgerungen auch nur eine zurückzunehmen oder zu modificiren. *C. A. Neufeld.*

H. Causse: Ueber das verdorbene Brunnenwasser der Stadttheile la Guillotière und les Brotteaux in Lyon. — Compt. rend. 1900, **130**, 579 — 581; Chem. Centrbl. 1900, II, 732. Vergl. auch das Referat S. 852!

Verf. konnte in Brunnenwasser, welches mehrfach Typhus mit theilweise tödlichem Ausgang hervorgerufen hatte, Cystin nachweisen. Wasser, welches letzteres enthält, giebt mit dem Chlormerkurat des p-diazosulfonsauren Natriums eine orange-gelbe Färbung, deren Intensität dem Gehalte an Cystin proportional ist. Die Färbung wird bei Einwirkung von schwefliger Säure schwächer. 25 Liter eines solchen Wassers, welches mit dem genannten Salze eine starke Färbung gab, wurden mit 400 ccm gesättigten Barytwassers, welche 5 g Kalk enthielten, versetzt. Der manchmal erst nach 48 Stunden sich absetzende Niederschlag wurde nach dem Waschen mit reiner 1 %-iger Kalilauge unter Einleiten eines Wasserstoffstromes 2 Stunden erhitzt und der beim Filtriren des Reaktionsproduktes erhaltene Rückstand nochmals mit Kalilauge behandelt. Die Filtrate wurden vereinigt. Dieselben sind eine alkalische Lösung von Eisencystinat, $C_3H_5NO_2SFe$. Beim Eindampfen von 25–30 ccm dieser Lösung, Aufnehmen des Verdampfungsrückstandes in Wasser und Neutralisiren mit Essigsäure scheidet sich das Cystin in regelmässigen, hexagonalen Tafeln aus. C. A. Neufeld.

S. W. Schidlowski: Ueber die Verunreinigung des Wassers der Wolga durch den Transport von Naphta. — Protokoll d. Sitz. d. Gesellsch. zur Wahr. d. Volksgesundheit zu St. Petersburg v. 11./23. Jan. 1900; Chem. Ztg. 1900, **24**, Rep. 77.

Eine Regierungskommission hat im verflossenen Sommer die Strecke von Nishni-Nowgorod bis Astrachan befahren. Das Wasser auf derselben ist trübe, mit einem Häutchen, welches in verschiedenen Farben schillert, bedeckt, besonders stark natürlich an Stellen, wo Naphta-Tankschiffe stehen. In Zarizyn soll zeitweise so viel Naphta im Wasser vorhanden sein, dass die Fische den Geschmack darnach annahmen (?). Auf der Strecke wurden Wasserproben in verschiedenen Tiefen, sowie Grundproben und Erde der Ufer genommen, die auf ihren Gehalt an Naphta untersucht wurden. Die Arbeiten der Kommission ergaben folgende Schlussfolgerung: Die Untersuchungen stellen die Schädlichkeit der Naphta für Pflanzen, Insekten, Thiere und Menschen fest, sowie eine faktische Verunreinigung des Flusswassers durch Naphtaprodukte. Die mehr oder weniger schädliche Aeusserung erfolgt durch die Ständigkeit und den Grad der Verunreinigung. Obgleich die Oberfläche des Wasserlaufes der Wolga von Nishni bis Astrachan eine gewaltige ist, sind die Verunreinigungen durch Trübung des Wassers und ölige Flecken auf demselben deutlich. Die Verunreinigung ist nicht nur auf die Oberfläche des Wassers beschränkt, sondern es kann durch die Bewegung desselben und Lösung der Naphta auch das ganze Flussbett verunreinigt werden, was auf die Vermehrung und das Leben der Fische einen nachtheiligen Einfluss hat. Durch beständig hinzukommende Mengen von Naphta wird die Verunreinigung mit jedem Jahr grösser. Unverzügliche Schutzmaassregeln sind daher nicht nur für den Flusslauf der Wolga, sondern auch für andere Flüsse dringend geboten, sowohl vom allgemeinen hygienischen Standpunkt, als auch der Fischzucht wegen. C. A. Neufeld.

A. P. Dianin: Nachweis von Naphta im Wolgawasser. — Protokoll der Sitzung d. Vereins z. Wahrung der Volksgesundheit. 11./23. Januar 1900; Chem. Ztg. 1900, **24**, Rep. 77.

Die Reaktion beruht auf dem Verhalten der Naphta gegen Schwefelsäure. Wird destillierte farblose Naphta mit konc. Schwefelsäure gemischt und erhitzt, so färbt sich

die Mischung anfangs gelb, geht dann in Orange, Rosa und zum Schluss in Braun über. Die Reaktion wird auf folgende Weise erhalten: Naphta wird mit 20 Theilen reiner konc. Schwefelsäure geschüttelt und 6–12 Stunden in einen Trockenschrank gestellt. An der Luft treten alsdann die Farbenerscheinungen auf, welche, je nach der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit, 10–12 Stunden, sogar Tage lang bestehen bleiben. Zum Schluss bleibt eine blaue Färbung zurück. Der chemische Körper, der diese Erscheinung bedingt, ist unbekannt. Eine Reihe von Versuchen aber zeigte, dass der Körper in allen Destillationsfraktionen der Naphta enthalten ist, mit Ausnahme der letzten schwersten, am meisten in den ersten Destillationsantheilen. Wird die Naphta zuerst mit alkoholischem Aetzkali und dann mit Schwefelsäure behandelt, so wird die Reaktion entweder gar nicht oder nur schwach erhalten; der Körper wird durch alkoholische Lauge zerstört oder verflüchtigt sich mit Alkohol. Das Destillat der Wasserproben hatte ein sehr dünnes Häutchen an der Oberfläche, welches, unter dem Mikroskop gesehen, aus mikroskopischen Tröpfchen bestand. Wird das Wasser mit Aether ausgeschüttelt und letzterer verdunstet, so erhält man im Rückstand die Farbenreaktion. Die Reaktion allein dürfte noch kein positiver Nachweis sein, andere Nebenumstände müssen aber mit in Betracht gezogen werden.

C. A. Neufeld.

G. Popp: Natürliches Mineralwasser. — Zeitschr. öffentl. Chem. 1900, 6, 124–127.

In den Vereinbarungen deutscher Nahrungsmittelchemiker (Heft II, S. 182) werden die Mineralwässer in 4 Gruppen getheilt: 1. natürliche unveränderte, 2. durch Ausscheiden einzelner Stoffe veränderte, 3. durch Vermehrung vorhandener Bestandtheile veränderte, 4. nachgeahmte (künstliche) Mineralwässer. Dadurch ist dem Einzelbeurtheiler überlassen, ob er die nur sub 1 oder aber auch die sub 2 und 3 genannten Wässer als natürliche gelten lassen will. Verf. hat eine grosse Reihe der halbnatürlichen rheinischen, nassauischen und Harzer Fabrikate neben künstlichem Selterswasser und mehreren natürlichen kohlensauern Tafelwässern verglichen und machte dabei folgende Beobachtungen: Die natürlichen, stark kohlensauernden Mineralwässer schieden die Kohlensäure beim Ausgiessen in das Glas in gleichmässigen kleinen Bläschen erst allmählich aus. Dieselben beschlugen die Glaswände wie mit einem feinen Thau, schmeckten schwach prickelnd und adstringirend, aber nicht sauer, und liessen den eigenthümlichen Mineralcharakter deutlich wahrnehmen. Die halbnatürlichen, mit Kohlensäure stark übersättigten Mineralwässer entbanden dagegen die Kohlensäure mehr explosiv. Die Gasblasen waren grösser, stiegen rasch an die Oberfläche und setzten sich nicht so gleichmässig thauartig an die Glasfläche. Die meisten derartigen Wässer zeigten keinen Mineralgeschmack, sondern sie schmeckten salzig oder nur nach Kohlensäure und einige empyreumatisch. Die Proben von künstlichem Mineralwasser unterschieden sich kaum von den erwähnten Halbfabrikaten. Es ist hieraus ersichtlich, dass in dem unveränderten natürlich-kohlensauern Mineralwasser die Kohlensäure fester gebunden ist, als in dem mit Luft in Berührung gewesenen und in seinen Mineralbestandtheilen veränderten Wasser. Die mit den sog. Halbfabrikaten vorgenommenen Manipulationen kennzeichnen diese Wässer gegenüber dem Naturprodukte als Fabrikate und lassen sie in vielen Fällen als minderwerthig erscheinen. Man ist berechtigt anzunehmen, dass mit der Entziehung von Stoffen einerseits und dem Zusatz von Salzen andererseits der ionale Zustand eines Mineralwassers geändert wird, also auch der innere und physiologische Werth des Wassers ein anderer wird. — Weiterhin hat Verf. die Beobachtung gemacht, dass die Halbfabrikate stets mehr

oder weniger Mikroorganismen enthalten, die während der oft wochenlangen Behandlung aus der Luft, aus Geräthen und Salzen in das Wasser gelangten, während die besseren natürlichen Mineralwässer keimfrei sind. — Aus allen Erwägungen geht hervor, dass den Halbfabrikaten nicht die Eigenschaften der natürlichen Mineralwässer eigen sind, sondern dass dieselben durch das Fabrikationsverfahren eine Verschlechterung erfahren haben. Die Bezeichnung eines Halbfabrikates als natürliches Mineralwasser aus einer bestimmten Quelle involviret demnach ein Vergehen gegen § 10 des Nahrungsmittelgesetzes (Täuschung durch Verschweigung einer Verschlechterung durch Entnehmen oder Zusatz von Stoffen). Verf. fordert daher, den Begriff „natürliches Mineralwasser“ dahin zu definiren, dass unter „natürlichem“ Mineralwasser nur solches Wasser zu verstehen ist, das ohne willkürliche Veränderung seiner Mineralbestandtheile so in Flaschen oder Krüge gefüllt wird, wie es die Mineralquelle liefert. Alle anderen Mineralwässer sind ihrer Herstellungsweise entsprechend zu bezeichnen.

C. A. Neufeld.

Christomanos: Ueber künstliches Eis. Vortrag auf dem vierten internationalen Kongresse für angewandte Chemie Paris 1900. — *Revue générale des sciences pures et appliquées* vom 27. Juli 1900. S. 9.

Christomanos hat gefunden, dass sich bei der Eisbildung sowohl die organischen wie die anorganischen Verunreinigungen des Wassers wie auch die Mikroben in der Mitte des Eisblockes ansammeln. Für die Chloride gilt dies indessen nur bei sehr raschem Gefrieren. Trübes und leicht zerbröckelndes Eis ist stets als verdächtig anzusehen und sollte zu Genusszwecken keine Verwendung finden.

C. Mai.

J. C. A. Simon Thomas: Die flüssige Kohlensäure des Handels. — *Zeitschr. angew. Chem.* 1900, 386—388.

Die flüssige Kohlensäure des Handels wird auf vier verschiedene Weisen fabrikmässig hergestellt: nämlich aus der natürlichen Kohlensäure, welche in verschiedenen vulkanischen Gegenden der Erde entströmt; aus Karbonaten, wie Magnesit und Kalkstein; durch Verbrennung von Koks, nach dem Verfahren von Ozouf; aus der Kohlensäure, welche bei der Gährung entsteht. Verf. untersuchte Flaschen flüssiger Kohlensäure, die den ersten drei Verfahren entstammte. Die nach dem vierten bereitete scheint bisher auf dem europäischen Kontinent noch nicht im Handel zu sein. — Der Gang der Untersuchung war im Allgemeinen folgender: Zunächst wurde qualitativ geprüft, ob das ausströmende Gas in Natronlauge nicht lösliche Gase enthielt, und eventuell welcher Natur dieselben waren. Dann wurde das Gas während einiger Stunden durch Jod-Jodkaliumlösung geleitet, um auf Schwefligsäure, durch saure Bleiacetatlösung, um auf Schwefelwasserstoff zu prüfen, und nach dem Verfahren von Grünhut durch konc. Schwefelsäure und durch saure und alkalische Kaliumpermanganatlösung, um organische Verunreinigungen aufzufinden. Sämmtliche drei Prüfungen ergaben übrigens in keinem Falle ein positives Resultat. — Zur quantitativen Analyse wurde durch Auffangen über Quecksilber in einer Messröhre und Absorption der Kohlensäure durch Natronlauge die Menge des in N.-Natronlauge unlöslichen Gases bestimmt. Die Wasserbestimmung wurde wie bei der Elementaranalyse ausgeführt. Die Resultate der Untersuchung sind folgende:

Flasche	Ursprung der Kohlensäure	Wasser- gehalt	Gehalt an in N.-Natronlauge unlös. Gasen	Natur des Gases
I.	Aus Koks nach d. Verfahren von Ozouf	0,07 %	2,0 Vol.-%	Luft.
II.	Natürliche	0,10 -	0,8 -	Luft.
III.	Aus Magnesit	0,13 -	4,0 -	Kohlenoxyd.
IV.	Künstlich bereitet (ohne nähere Angaben)	0,03 -	3,4 -	Kohlenoxyd.
V.	Aus kohlenensäurehaltigen Gesteinen . .	0,17 -	5,7 -	Luft.

Die Menge der Kohlensäure in den Flaschen und die Rückstände betrugen:

Flasche	Inhalt	Rückstand	Natur des Rückstandes
I.	10,0 kg	0,5 g	Wasser und Spur suspendirtes Eisenoxyd.
II.	10,3 -	520,0 g	517 g Wasser und 3 g Eisenoxyd.
III.	10,1 -	1,0 g	Wasser und Spur suspendirtes Eisenoxyd.
IV.	8,0 -	nichts	—
V.	9,9 -	8,5 g	Wasser und Spur suspendirtes Eisenoxyd.

Im Allgemeinen ist demnach die Reinheit der flüssigen Kohlensäure des Handels eine recht gute. Nur erscheint das Vorkommen von Kohlenoxyd in dem aus Magnesit bereitetem Gase für viele Verwendungen (z. B. in den sehr begrenzten Räumen von Schiffen) bedenklich. Der hohe Wassergehalt bei der natürlichen Kohlensäure dürfte auf ein versehentliches Zurückbleiben von Spülwasser in den Flaschen zurückzuführen sein.

C. A. Neufeld.

Otto Nebel: Schwefelwasser aus einer Quelle bei Tanc. - Pharm. Ztg. 1900, 45, 385—386.

Abwasser.

F. Russig: Mittheilungen über ein neues Verfahren zur Verarbeitung und Verwerthung der Kanalwässer der Städte. — Zeitschr. angew. Chem. 1900, 126—129.

Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt sind diejenigen Verfahren zur Beseitigung der Abwässer die besten, welche eine Wiedergewinnung der Abfallstoffe mit geringen Kosten ermöglichen in einer zu neuer Verwendung fähigen Form; wo das nicht angängig ist, bleibt die Beseitigung durch Fällung am rationellsten, während die Vernichtung der Verunreinigungen durch Oxydation am theuersten und unrationellsten ist. Theoretisch am richtigsten wäre, die Abwässer zu verdampfen und den Flussläufen nur als destillirtes Wasser zuzuführen, während die festen und gelösten Stoffe gewonnen werden. Für gewöhnlich würde dieses Verfahren an den grossen Kosten scheitern. Ein dem Apotheker H. Stitz in Halle patentirtes Verfahren hat anscheinend das Problem in befriedigender Weise gelöst; dasselbe beruht auf steter Wiedergewinnung der zur Verdampfung benötigten Wärmemengen. Mit einem Kilogramm Dampf mittlerer Spannung soll es nach diesem Verfahren möglich sein, etwa 140 kg Wasser zu verdampfen.

Das Verfahren beruht (nach den Mittheilungen des Erfinders) darauf, dass das Kanalwasser in geschlossenen Kammern aus Stampfbeton unter Luftverdünnung durch Dampfheizung in Gasform übergeführt, und der verringerte Luftdruck durch einen

Dampfstrahl-Saugapparat erzeugt wird, welcher gleichzeitig den entstehenden Dampf abfängt, wobei sich der abgesaugte Dampf mit dem dem Strahlapparate zugeführten Dampf mischt. Diese Dämpfe werden in einer Rohrleitung den Heizkörpern, Rippenheizrohren zugeführt und in denselben wieder zu Wasser verdichtet. Die Rippenheizrohren vermitteln die Abgabe der Wärme des entstandenen und zugeführten Dampfes an das zu verarbeitende Wasser und die verdichteten Dämpfe fließen aus den Rippenheizrohren als gereinigtes destilliertes Wasser aus. — Verf. theilt dann eingehend die technischen Einzelheiten des Verfahrens mit und erläutert dieselben durch Skizzen. Die Gesamtkosten einer Anlage, welche innerhalb 24 Stunden 20 000 cbm Kanalwasser verarbeiten soll (berechnet für eine Stadt von etwa 100 000 Einwohnern), werden vom Erfinder auf 720020 Mk. berechnet, wozu die Kosten für Grund und Boden hinzurechnen wären. Aus der Verwerthung bezw. dem Verkauf des gewonnenen Düngers berechnet der Erfinder einen verbleibenden Reingewinn. Nach Ansicht des Verf. scheint das Verfahren von Stitz dazu berufen zu sein, die Wiedergewinnung der Abfälle in brauchbarer Form und auf billigem Wege zu ermöglichen. C. A. Neufeld.

Luft.

Leonard P. Kinnicut und **Georg R. Sauford**: Die jodometrische Bestimmung kleiner Mengen von Kohlenoxyd. — Journ. Americ. Chem. Soc. 1900, **22**, 14—18.

Die Methoden zur Bestimmung geringer Mengen Kohlenoxyd kann man in 2 Klassen theilen, in diejenige, bei der Kohlenmonoxydhämoglobin gebildet wird, und in die, bei der das Oxyd zu Dioxyd oxydirt wird. Die Methoden der ersteren Klasse müssen sämmtlich als Abänderungen der von Hoppe-Seyler zuerst angegebenen Bestimmung angesehen werden (Zeitschr. analyt. Chem. 1864, **3**, 439). Von diesen Methoden, die auf Oxydation des Kohlenoxyds zu Dioxyd beruhen, sind diejenigen am brauchbarsten, die sich des Jodpentoxyds als Oxydationsmittel bedienen. Ditte zeigte bereits 1870 (Bull. Soc. Chim. 1870, **13**, 318), dass bei Temperaturen zwischen 150—200° Jodpentoxyd durch Kohlenoxyd zerlegt wird unter Bildung von freiem Jod und Kohlensäure, nach der Gleichung: $J_2O_5 + 5 CO = J_2 + 5 CO_2$. Diese Wahrnehmung Ditte's wurde zuerst von C. de la Harpe und Réverdine (Chem.-Ztg. 1888, **12**, 1726), ferner von Nicloux (Compt. rend. 1898, **126**, 746; diese Zeitschr. 1898, **1**, 656.) und Gautier (Compt. rend. 1898, **126**, 931; diese Zeitschr. 1898, **1**, 658.) zur Bestimmung kleiner Mengen Kohlenoxyd verwandt. Nicloux bestimmte das frei gewordene Jod kolorimetrisch in einer Chloroformlösung, während Gautier die Menge der gebildeten Kohlensäure mass. Die Verff. konnten nach keiner der beiden Methoden bei Bestimmungen kleiner Mengen Kohlenoxyd gut übereinstimmende Ergebnisse erhalten. Dagegen gelang ihnen dies, wenn sie das bei der Oxydation frei gewordene Jod mit $\frac{1}{1000}$ Norm. Natriumthiosulfat titrirten. Die Verff. benutzten dabei die von Nicloux beschriebenen Apparate und brachten 25 g Jodpentoxyd in eine kleine U-Röhre. Diese befand sich in einem auf 150° gehaltenen Oelbad und war mit einer Wolff'schen Absorptionsröhre verbunden, die in Wasser gelöstes Kaliumjodid enthielt (0,5 g in 5 ccm). Um die zu untersuchende Luft vor ihrer Berührung mit Jodpentoxyd von reducirenden Verbindungen (Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxyd) zu befreien, wurden der das Jodpentoxyd enthaltenden Röhre 2 andere U-Röhren vorgelegt, von denen die eine mit

Schwefelsäure, die andere mit Kalilauge beschickt war. Hierdurch wurde eine vollständige Absorption der reducirenden Gase erzielt. Bemerkt sei noch, dass Wasserstoff und Sumpfgas keinen Einfluss auf das Pentoxyd ausübten. Verff. waren im Stande, nach dieser Methode 0,025 ccm Kohlenoxyd in 1000 ccm Luft genau zu bestimmen.

Max Müller.

Gebrauchsgegenstände.

Technische Fette und Oele, Seifen, Harze, Wachse.

W. E. Tistschenko: Untersuchung von Rennthiertalg. — Zeitschr. angew. Chem. 1900, 167.

Man hat erkannt, dass das Rennthier, welches im günstigsten Falle eine jährliche Vermehrungsziffer von 20 % aufweist, bei rationeller Zucht besonders durch sein Fett und sein Fell einen wichtigen Handelsartikel geben muss. Es hat sich ein Konsortium, „Nordische Gesellschaft für Rennthierzucht“, gebildet, mit der Absicht, die rationelle Zucht in die Hand zu nehmen. Man giebt sich der Hoffnung hin, einen grossen Theil des inländischen Bedarfes an Talg aus diesen Quellen zu decken. Der im St. Petersburger Universitätslaboratorium untersuchte Rennthiertalg gab folgende Konstanten: Schmelzpunkt 48°, Titer 45,73, Jodzahl 35,8, Verseifungszahl 194,7; er enthielt 60% Stearinsäure, 38,5% Oleinsäure und 1,5% Palmitinsäure. — Es steht dieses Fett dem Hammeltalg am nächsten, nach einmaligem Schmelzen und Filtriren resultirte beim Erstarren eine sehr saubere, weisse Masse.

A. Hasterlik.

W. Lippert: Ueber den Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Sauerstoffabsorption der Oele. — Zeitschr. angew. Chem. 1900, 133–138.

Nach den Beobachtungen Wegers trocknen Blei- und Bleimanganfirnisse in feuchter Luft schneller, Manganfirnisse dagegen langsamer als in trockener. Verf. unternahm es, eine Reihe von Versuchen zur Klärung dieser Frage anzustellen. Als lufttrockener Raum diente ein Scheibler'scher Exsikkator (Fig. 40) in der in der Figur angedeuteten Weise.

Durch den Seitentubus trat die vorher zweimal mittelst Schwefelsäure und einmal durch Phosphorsäureanhydrid getrocknete Luft ein und passirte dann noch einmal die am Boden des Exsikkators befindliche starke Schicht Phosphorsäureanhydrid, um dann nach Durchstreichen des Exsikkators durch die obere Oeffnung in die Saugvorrichtung, die ihrerseits von dem Exsikkator durch eine Woulff'sche Flasche mit Schwefelsäure getrennt war, abgesaugt zu werden. Die Glastafel, auf die der Firniss gestrichen werden sollte, wurde jedesmal etwa 24 Stunden vor Anstellung des Versuches im Exsikkator getrocknet, und nach dem Bestreichen sofort gewogen und dann vorsichtig auf das Porzellangestell gelegt. Hierauf wurde sofort trockene Luft eingeleitet. Das Ergebniss der Versuche war, dass im trockenen Raume die stark manganhaltigen Firnisse — neue ebenso wie alte — sowohl ein schnelles Antrocknen, als auch schnelles Austrocknen zeigten.

Auffallend ist ferner der Unterschied zwischen der in einem Firniss befindlichen Manganmenge und dem Feuchtigkeits-Zustande der Atmosphäre. Je reicher ein Firniss

Fig. 40.

an Mangan ist, desto schneller findet das Trocknen im trockenen Raume statt, und je ärmer ein Firniss an Mangan ist, desto schneller erfolgt das Trocknen im feuchten Raume. Manganarm ist ein Firniss mit einem Gehalt von 0,05% Mangan, die Manganfirnisse des Handels enthalten ca. 0,2% Mangan.

A. Hasterlik.

K. Charitschkoff: Zur Frage der Verfälschung von Firnissen. — Chem. Rev. Fett- u. Harz-Ind. 1900, 7, 1 — 2.

In russischen Firnissen konnte Verf. zweimal eine Verfälschung mit Solaröl nachweisen, die sich bis zu 10% erstreckte. Solche Firnisse waren in ihrer Trockenfähigkeit ganz bedeutend herabgedrückt, so dass das Eintrocknen auf einer Glasplatte erst nach 5 Tagen beendet war und die erhaltene Schicht überdies weich blieb. Proben so verfälschter Firnisse zeigten überdies ein niedriges spec. Gew. 0,9217—0,9227; echte Firnisse zeigen ein spec. Gew. von 0,939—0,940. Die Jodzahl schwankt zwischen 130 bis 140, nur in einem Falle, wo es sich um einen Zusatz von ungekochtem Oele handelte, stieg die Jodzahl auf 150.

Zum Nachweis von Harzöl wird empfohlen, den Firniss in einer Kältemischung auf 5—6° C. abzukühlen, es scheide sich sodann das Harzöl als kompakter Niederschlag ab. Die Anwendung dieser Ausfriermethode giebt nach Verf. keine brauchbaren Resultate. Zum Nachweis von Kolophonium empfiehlt man, den Firniss mit 70%-igem Alkohol zu behandeln. Beträgt die ausgezogene Masse mehr als 2,5%, so ist der Firniss als mit Kolophonium versetzt anzusehen. Nach vergleichenden Versuchen kommt Verf. zu dem Schlusse, einen Firniss nur dann mit Kolophonium verfälscht zu betrachten, wenn er mehr als 3,5% in Alkohol löslicher Substanz enthält. Gegenüber in Firniss gelöstem Harzöl verhält sich der Alkohol nicht so charakteristisch wie bei Kolophonium. Wohl kann man mit Hilfe von Alkohol qualitativ Harzöl in Firniss nachweisen, wenn er in beträchtlicherer Menge vorhanden ist. Für die Untersuchung von Firnissen sind konventionelle Methoden nach dem heutigen Stand der Wissenschaft unentbehrlich.

A. Hasterlik.

F. Jean: Gehaltsbestimmung des Glycerins in den Fetten und Seifen. — Rev. chim. ind. 1900, 11, 34; Chem. Ztg. 1900, 24, Rep. 73.

Zur Gehaltsbestimmung des Glycerins in Waschseife oder Schmierseife löst Verf. 10 g der Seife in heissem Wasser und fällt die Seifenlösung durch conc. Zinksulfatlösung, welche er vorsichtig so lange zugiebt, bis sich kein Niederschlag mehr bildet. Hierauf wird die unlösliche Zink-Seife abfiltrirt und mit heissem Wasser ausgewaschen. Das Filtrat und die Waschwässer werden mit 10 Tropfen Schwefelsäure versetzt und in einem Kolben auf dem Sandbade abgedampft. Wenn nur noch 2—3 ccm Flüssigkeit im Kolben vorhanden sind, führt man die Bestimmung des Glycerins nach dem Verfahren von Laborde aus. Zu diesem Zweck giebt man in den Kolben 5—6 ccm conc. Schwefelsäure und schliesst den Kolben mit einem Gummistopfen. Dieser trägt ein offenes Rohr von 50 cm Höhe. Man erhitzt auf dem Sandbade bis gegen 150° C. Die Masse wird schwarz und entwickelt weisse Dämpfe von Wasser und schwefliger Säure, die Temperatur steigt bis gegen 200° und hält sich ungefähr auf dieser Höhe. Wenn die verkohlte Masse auf der Säure schwimmende Klümpchen bildet, entfernt man das Feuer, lässt erkalten, giebt in den Kolben 5 ccm zur Hälfte verdünnte Salzsäure und erhitzt von Neuem auf dem Sandbade, bis wiederum weisse Dämpfe auftreten. Nach dem Erkalten giesst man ungefähr 100 ccm

Wasser in den Kolben, erhitzt zum Kochen und filtrirt durch ein glattes Filter. Die zurückbleibende Kohle wäscht man zur Entfernung der Säure mit kochendem Wasser aus. Hierauf durchstösst man das Filter, spült mit heissem Wasser die Kohle in eine gewogene Platinschale, giebt einige Tropfen Ammoniak hinzu und verdampft den Ueberschuss an Wasser im Ofen oder auf dem Sandbade. Der trockene Rückstand wird bis nahe zur Rothgluth erhitzt und dann gewogen. Das Gewicht der erhaltenen Kohle giebt mit 2,56 multiplicirt das Gewicht des Glycerins. — Um das Glycerin in einem Oele, Talg oder Fett zu bestimmen, verseift man 10 g mit Natriumhydrat und Alkohol, nimmt die trockene Seife mit Wasser auf und führt die Gehaltsbestimmung des Glycerins nach dem eben beschriebenen Verfahren aus. *A. Hasterlik.*

Franz Freyer: Die Bestimmung des Zuckers in Glycerinseifen. — Oester. Chem. Ztg. 1900, 3, 25–26.

Mit dem Namen Glycerinseifen werden im Handel gewöhnlich alle durchscheinenden Toiletteseifen bezeichnet, auch wenn dieselben kein Glycerin als Füllmaterial enthalten. Die für den Orient gefertigten Seifen enthalten fast durchwegs Rohrzucker statt Glycerin, da nach Angabe der Fabrikanten die mit Zucker hergestellten Seifen eine höhere Temperatur gut vertragen ohne Flüssigkeit auszuschwitzen, was bei den wirklichen Glycerinseifen nicht der Fall ist. Der Rohrzuckergehalt bewegt sich zwischen 10–15%. Aus finanztechnischen Gründen ergab sich das Bedürfniss nach einer leicht ausführbaren Methode. Als solche erwies sich die polarimetrische Bestimmung unter Berücksichtigung des eventuellen Vorhandenseins von Stärkezucker und Dextrin. Verf. beschreibt das Verfahren wie folgt: Man löst 16,28 g Seife (entsprechend $\frac{1}{4}$ des Normalgewichtes für 250 ccm) in ca. 50–100 ccm Wasser auf dem Wasserbade und versetzt die heisse Lösung unter starkem Umrühren mit 10%-iger Chlorbaryumlösung in geringem Ueberschusse. Man verbraucht ca. 40 ccm davon und erkennt die beendete Ausfällung leicht an dem Aufhören der Schaumbildung beim Umrühren. Man filtrirt die Masse unter erschöpfendem Auswaschen mit heissem Wasser ab, bringt das Filtrat auf 250 ccm und polarisirt. Bei dem grossen Volumen des Barytniederschlags reicht man mit dieser Flüssigkeitsmenge schwer aus; man muss also entweder eindampfen oder man muss, nachdem man 250 ccm Filtrat erhalten hat, das weitere Waschwasser auf ein bestimmtes Volumen bringen und eine Drehung zur ersten addiren. Am besten ist es, wenn man Flüssigkeit sammt Niederschlag in einen Kolben von 250 ccm bringt und das Volumen des Barytniederschlags zu 10 ccm annehmend auf 260 auffüllt. Man begeht dabei keinen grossen Fehler. Das klare Filtrat kann direkt polarisirt werden. Zur weiteren Untersuchung prüft man das Filtrat mit Fehling'scher Lösung qualitativ auf das Vorhandensein von reducirendem Zucker. Ferner invertirt man 50 ccm mit 5 ccm Salzsäure (1.125) durch 5 Minuten langes Erhitzen auf 70°. Die nach dem Abkühlen auf 20° C. polarisirte invertirte Lösung muss eine Linksdrehung zeigen, welche unter Berücksichtigung der Verdünnung durch die Salzsäure mit der vor der Inversion gefundenen Rechtsdrehung in Uebereinstimmung steht. Theoretisch soll einer Rechtsdrehung von 100 nach der Inversion eine Linksdrehung von 31,7 entsprechen, man findet jedoch in Wirklichkeit immer eine geringe Drehung zwischen 25–30. Man wird daher nur dann auf die Anwesenheit von Dextrin resp. Stärkezucker schliessen, wenn die Linksdrehung erheblich weniger als 31 auf 100 Rechtsdrehung beträgt. *A. Hasterlik.*

A. C. Geitel und G. van der Want: Ueber das Japanwachs. — Journ. prakt. Chem. 1900, [N. F.], 61, 151—156.

Verff. untersuchten mehrere Kuchen möglichst reiner hellfarbiger Handelswaare, die mit den charakteristischen weissen Auswitterungen überzogen waren. Die einzelnen Werthe zeigten folgende Schwankungen: Säurezahlen 21,7—32,6; Verseifungszahlen 217,5—237,5; Jodzahlen 8,3—8,5; unverseifbare Bestandtheile 1,48—1,63%. Ferner betrugen in 2 Mustern: Die Gesamtfettsäuren 96,58 und 95,92%; die unlöslichen Fettsäuren 90,62 und 90,66%; die löslichen Fettsäuren 5,96 und 4,66%. Die löslichen Fettsäuren besaßen schmalzähnliche Konsistenz und gaben schwer lösliche Baryum- und Calciumsalze. Die Säurezahl derselben betrug 345,2, das mittlere Mol.-Gewicht 162,0. Das Kupfersalz lieferte 32,3% CuO. (Korksäurem Kupfer würden 33,6% CuO entsprechen.) Dieses Fettsäuregemenge scheint sich theilweise durch die bei der Bleichung Verwendung findenden starken Oxydationsmittel zu bilden. In der Seife des Japanwachses wurde ferner Glycerin nachgewiesen. Es liegt somit kein eigentliches Wachs, sondern ein Talg vor. Die unlöslichen Fettsäuren ergaben folgende Werthe: Säurezahl 212,2—215,7; Mol.-Gewicht 262—263; Jodzahl 10,6. Schon Eberhardt (Inaug.-Diss. Strassburg 1888) hatte unter den unlöslichen Fettsäuren eine der Oxalsäurereihe angehörige Fettsäure von der Formel $C_{18}H_{36}(COOH)_2$ vermuthet. Geitel und van der Want gelang es nun aus dem Fettsäuregemisch eine Fettsäure zu isoliren, die als Japansäure bezeichnet wurde. Dieselbe bildet aus Alkohol und Chloroform krystallisirt weisse Blättchen, die bei 117,7—117,9° schmelzen. Jod wurde nur in Spuren aufgenommen. Die Säure war also gesättigt. Die nach verschiedenen Methoden vorgenommenen Molekulargewichtsbestimmungen ergaben, dass die Eberhardt'sche Formel zu verwerfen ist, da der Japansäure die Zusammensetzung $C_{20}H_{40}(COOH)_2$ zukommt. Bei 115—120° lässt sich die Säure ohne Gewichtsverlust trocknen, bei höherer Temperatur tritt zunächst Wasser- und schliesslich Kohlensäure-Abspaltung ein. Dieser Process erklärt sich wie folgt:

Dieses Keton zeigt einen Schmelzpunkt von 82—83° und gleicht in der Zusammensetzung (81,81% Kohlenstoff und 12,97% Wasserstoff) dem auch von Eberhardt isolirten Körper. Die Japansäure dürfte demnach der Bernsteinsäurereihe angehören. Schliesslich wurden noch Versuche angestellt, die in Erfahrung bringen sollten, in welcher Form die Japansäure im Japanwachs vorkommt. Nach den Ergebnissen derselben ist als sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass im Japanwachs ein Glycerid aus 1 Mol. Japansäure und 1 Mol. Palmitinsäure vorliegt, da diesem eine Aetherzahl von 253,4 zukommen würde, während aus Japanwachs durch Entfernung der freien Säuren mit Alkohol und wiederholtes Umkrystallisiren aus Benzol eine wachsartige Substanz erhalten wurde, welche einen Schmelzpunkt von 43—45° und die Aetherzahl 252,6 zeigte. *A. Juckenack.*

G. Bornemann: Die Entwicklung der Fett-Industrie im 19. Jahrhundert. — Chem. Rev. Fett- u. Harz-Ind. 1900, 7, 41—45 und 65—68.

Patente.

Otto Hering in Berlin: Verfahren zur Darstellung basischer Oele. D.R.P. 102 533 vom 4. Februar 1898. — Patentbl. 1899, 20, 355.

Den Gegenstand der Erfindung bildet die Herstellung eines stets wirksamen Rostschutz-

mittels durch Auflösung solcher Substanzen in Oel, die demselben ausgesprochene basische Eigenschaften verleihen. Zu diesem Zwecke werden Mineralöle oder fette Oele mit Ammoniakgas bei gewöhnlicher Temperatur gesättigt oder es werden in ihnen organische Basen gelöst. Für die Praxis empfiehlt sich eine Kombination der beiden Methoden dahin, dass die Oele mit organischen Basen versetzt und dann noch mit Ammoniakgas gesättigt werden. Der Vorzug des neuen Rostschutzmittels besteht darin, dass es keine Feuchtigkeit enthält und ausserdem aus solchen Substanzen zusammengesetzt ist, die im Stande sind, bereits vorhandene Ursachen zur Rostbildung zu beseitigen.

Gustav Gartzke in London: Schmiermittel. D.R.P. 102 459 vom 30. April 1898. — Patentbl. 1899, 20, 355.

Das neue Schmiermittel wird in der Weise hergestellt, dass Eisenglanz mit Mineralöl oder thierischem Fett gemischt wird. Das Schmiermittel hat den Vorzug, dass der Eisenglimmer nicht zerrieben werden kann und in Folge der Beweglichkeit und Verschiebbarkeit eine gleichmässige Schmierschicht gebildet wird.

Carl Schmidt in Magdeburg-Buckau: Verfahren zur Verarbeitung von Wollfett auf Fettsäuren und Seifen einerseits und Fettalkohole bzw. Lanoglycerin andererseits. D.R.P. 107 732 vom 26. Februar 1897. — Patentbl. 1900, 21, 194. (Zusatz zum Patente 99 502 vom 29. Juli 1896; Patentbl. 1898, 19, 816).

Destillirtes Wollfett oder beliebige Fraktionen desselben werden mit alkoholischen Alkalien behandelt, wobei der grösste Theil der Fettsäuren in Lösung geht, während sich an der Oberfläche der Flüssigkeit ein Oel abscheidet, welches die unverseifbaren Substanzen enthält.

Die Seifenlösung wird abgezogen, durch Destillation von Alkohol befreit und für sich oder im Gemisch mit anderen Fetten auf Seifen oder Fettsäuren verarbeitet. Das ungelöst gebliebene Oel wird durch weitere Behandlung mit alkoholischen Alkalien von etwa noch vorhandenen Fettsäuren befreit und der Rückstand in Aether, Benzin oder dergl. gelöst. Man kann auch so verfahren, dass das mit alkoholischen Alkalien behandelte Oel mehrfach mit Chlorcalciumlösung und heissem Wasser ausgewaschen und nach dem Trocknen durch Filtriren, Centrifugiren oder auf anderem mechanischen Wege von etwa suspendirten Seifen befreit wird.

Antoine Badoil und **Paul Graziani** in Marseille: Verfahren zur Herstellung eines Schmiermittels für Leder u. dergl. D.R.P. 112 339 von 3. Juni 1899. — Patentbl. 1900, 21, 992.

Das Verfahren besteht darin, dass Flachsstengel zunächst längere Zeit mit Seifenwasser bei einer Temperatur von 70–80° ausgelaugt und dann nach Zusatz von 3 l Salzsäure auf 1000 l Lauge bei einer Temperatur von 60° weiter behandelt werden. Die von den Faserstoffen getrennte Lauge wird sodann an der Luft oder im Vakuum so lange eingedampft, bis als Rückstand ein weicher Teig verbleibt. Dieser Teig soll sich allein oder mit Oel vermischen vorzüglich zum Schmieren von Leder eignen.

A. Oelker.

Geheimmittel.

Aufrecht: Untersuchungen neuerer Arzneimittel u. s. w. — Pharm. Ztg. 1900, 45, 558.

Taeschner's Pertussin, von E. Taeschner in Berlin, als Mittel gegen Keuchhusten, Asthma und dergl. empfohlen, ist eine bräunliche, neutral reagirende, syrupartige Flüssigkeit von süssem, hinterher bitterem Geschmack und aromatischem, thymianartigem Geruch. Sie enthält 50,68% Trockensubstanz, 49,32% flüchtige Stoffe und 0,65% Asche. Die Trockensubstanz besteht hauptsächlich aus Rohrzucker, die

flüchtigen Substanzen aus 14,8 Alkohol, 34,4 Wasser und 0,2 ätherischem Oel. Die Asche enthält 0,5 Bromnatrium neben geringen Mengen Kali, Kalk, Chlor und Phosphorsäure. Das Mittel ist daher wahrscheinlich zusammengesetzt aus 0,5 Bromnatrium, 25 Thymiantinktur, 75 einfachem Syrup und 0,2 Thymianöl.

Chokolade für Diabetiker ist zusammengesetzt aus 500 Kakaopulver, 200 Lävulose, 280 Weizenmehl, 5 Saccharin, 15 aromatischen Stoffen. Sie enthält 10,07 Stickstoffsubstanz, 25,47 Fett, 25,19 Stärke und Cellulose, 14,54 sonstige stickstofffreie Substanz und 2,15 Asche.

Liparin-Chokolade enthält 42,38% Fett, 8,07 Stickstoffsubstanz, 2,7 Stärke, 31,44 Zucker, 18,19 sonstige stickstofffreie Substanz, 0,68 Asche, sowie aromatische Stoffe, Vanillin, Perubalsam.

C. Mai.

Heider's Gebirgskräuterthee enthält: Sassafrasholz 10, Süssholz 5, Huflattich 45, Lavendelblüthen 5, Sennesblätter 30, Lungenmoos 5.

(Pharm. Centralh. 1900, **41**, 451.)

C. Mai.

Vitafer, Sauerstoff-Heilverfahren nach Dr. Oppermann in Berlin unter angeblicher Verwendung von Magnesiumsuperoxyd. Die von einer Gesellschaft m. b. H. vertriebenen Sauerstoffpräparate „Patentirtes Magnesiumsuperoxyd mit Milchzucker und Kakaobutter, Magnesiumsuperoxyd mit Brausepulver, sowie mit Milchzucker, Honig, Salmiak und Anisöl, Wundpulver, Wundsalbe“ enthalten nach den Untersuchungen des chemischen Staatslaboratoriums in Bremen keine Spur aktiven Sauerstoff und kein Magnesiumsuperoxyd, sondern lediglich gebrannte Magnesia.

(Pharm. Ztg. 1900, **45**, 558.)

C. Mai.

Fritz Westphal's Kräuterthee, Lichen islandic., Carrageen, Lichen Pulmon., Herb. Hepatic., Succ. Liquir. dep., Fruct. Anisi stell., Herb. Absinth. Fruct. Juniperi, Cort. Quercus, Rad. Consolid., Rhizom. Zingiber je 20; Malti 30 Theile.

Pagliano-Syrup enthält: Wasser 65,53, Alkohol 14,38, Süssholzsafte 16,79, Sennesblätter 2,63, Scammoniumharz 0,37, Jalapenharz 0,3.

Seebald's Haartinktur: Resorcin 4, Caramel 0,6, Ol. Citri 2,5, Bals. Peruvian. 1,5, Spiritus (80%) 92.

Vésicatoire liquide de Bidet wird erhalten durch Percolation von 50 g Kantharidenpulver mit einer Mischung von je 50 g Aether und Essigäther, Abdampfen auf 75 g und Vermischen mit 25 g Collodium elasticum.

(Pharm. Post 1900, **33**, 408.)

C. Mai.

Mittel gegen Schwindelsucht, von einem Privatlehrer angepriesen, bestand aus einer mit wenig Zucker versetzten schwachen Abkochung von Brustthee; Preis einer Flasche von 300 g = 1 Mk.

Haarfärbemittel war eine mit Schwefel und Glycerin versetzte Bleiacetatlösung.

Fleischkonservierungsflüssigkeit stellte eine Lösung von Natriumsulfit neben wenig -sulfat vor, mit einem Gehalt von 5,9% schwefliger Säure (SO₂).

(Jahresbericht 1899—1900 des chemischen Untersuchungsamtes der Stadt Altona, S. 23.)

C. Mai.

Pulver gegen Wassersucht, von einer norddeutschen Apotheke für 5 Mark versandt, bestand aus Kümmel-, Fenchel-, Wachholder- und Petersilienfrüchten, Hohl-lunderblüthen, Meerzwiebel und Kreide; Werth 60—80 Pfg.

Bandwurmmittel, bestand aus Kupferoxyd, Arekanuss und Zuckerpulver; Preis 4 Mk., Werth 1 Mk.

Mittel gegen Ungeziefer war Weizenmehl mit Euphorbiumharz vermischt.

Fermelin, Hilfsmittel für die Bäckerei, von Kuhlmann und Havemann in Hamburg, ist feingemahlenes Malz.

Katharein zur Reinigung von Bierdruckapparaten, ist kaustische Soda, die zum 10-fachen Preis verkauft wird.

(Bericht 1898—1900 des chemischen Untersuchungsamtes der Stadt Ulm a. D.)

C. Mai.

Gesetze, Gesetz-Entwürfe, Verordnungen u. s. w., Gerichts-Entscheidungen.

Fleisch und Fleischwaaren.

Preussen. Rechtsprechung. Urtheil des Kammergerichts, Mehlsatz zu Wurst betr. Vom 31. Mai 1897. — Veröffentl. Kaiserl. Gesundh. Beil. 1900, 5, 97.

Eine Polizei-Verordnung, welche den Mehlsatz zu Wurst verbietet, ist rechtsgiltig, denn sie ist materiell durch § 6 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 begründet und steht andererseits mit dem Nahrungsmittelgesetz, dessen Motive den Erlass landesgesetzlicher Bestimmungen über die in den §§ 5 und 6 bezeichneten Gegenstände ausdrücklich vorsehen, nicht im Widerspruch. Sie enthält auch keine unzulässige Beschränkung der Gewerbefreiheit, sondern beschränkt vielmehr im öffentlichen Interesse nur die Art der Ausübung des Gewerbebetriebes.

Milch und Käse.

Deutsches Reich. Rechtsprechung. Urtheil des Reichsgerichts, Verkauf von gewöhnlicher Vollmilch als Kindermilch betr. Vom 21. April 1898. — Veröffentl. Kaiserl. Gesundh. Beil. 1900, 5, 113*—114*.

In einer Molkerei-Genossenschaft war regelmässig gewöhnliche Vollmilch zu einem höheren Preise als Kindermilch verkauft worden, so dass letztere sich von der gewöhnlichen Milch lediglich durch die Etikette und den höheren Preis unterschied. Dagegen war als erwiesen erachtet worden, dass als Kindermilch allgemein diejenige Milch angesehen wird, die besonders sorgfältig behandelt wird und von Kühen stammt, die besonders gute, insbesondere nur Trockenfütterung erhalten und in Bezug auf ihren Gesundheitszustand einer besonderen ärztlichen Kontrolle unterstehen. Die gegen eine Verurtheilung wegen Betrugs eingelegte Revision wurde vom Reichsgericht verworfen. Die Abnehmer der Milch hätten eine minderwerthige Waare erhalten, wenn sie dieselbe Milch, welche überall für 0,20 M. pro Liter verkauft würde, um deshalb mit 0,30 M. bezahlt hätten, weil sie die mehrwerthige Eigenschaft der Kindermilch hätte haben sollen. Nicht durch den Verkauf derselben Milch zu verschiedenen Preisen sei die Vermögensbeschädigung herbeigeführt, sondern dadurch, dass die Angeklagten denen, die thatsächlich einen höheren Preis gezahlt, die falsche Thatsache vorgespiegelt hätten, dass die von ihnen gekaufte Milch die mehrwerthige Kindermilch sei.

Preussen. Rechtsprechung. Urtheil des Oberlandesgerichts zu Köln, betr. Verkauf zusammengessener Milchreste als Vollmilch. Vom 14. Oktober 1898. — Veröffentl. Kaiserl. Gesundh. Beil. 1900, 5, 101*.

Der Begriff der Verfälschung im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes ist vom Vorderichter keineswegs verkannt; wenn dieser bei der als Vollmilch verkauften Milch davon ausgeht, dass eine Verfälschung auch dann vorliegen könne, wenn eine Qualitätsverschlechterung eines Nahrungsmittels ohne Zusatz fremder Stoffe zum Zwecke der Täuschung bewirkt wird,