BEILAGE

ZU N^o 708. DER ASTRONOMISCHEN NACHRICHTEN.

Zeiten und Oerter der Oppositionen des Uranus von 1781 bis 1837.

(Beschluss von No. 708 der A. N.)

Moment der Opposition Mittl. Par. Zeit.						Heliocentr. u. geocentr. Länge vom mittl. Aequinoctium.		Geocentr. Breite.	Δz im Mittel.	Zahl d. Beobb.	Δδ im Mittel.	Zahl d. Beobb.	Beob.- Ort.
1822	Juni	27	5 ^h 2' 55" 86	+24" 144d	275° 23' 22" 31	—0,041 d	—18' 33" 35	+ 0" 49	7	— 4" 81	7	K.	
			2 53,93		22,23		27,65	0,81	1	10,53	1	Gr.	
1823	Juli	1	21 13 47,76	24,147	279 36 40,54		21 52,37	1,93	2	2,74	2	K.	
			15 25,09		42,51		47,65	0,07	2	7,60	2	Gr.	
1824	—	5	12 31 34,62	24,166	283 48 14,77		24 59,11	4,49	5	4,05	5	K.	
1825	—	10	3 22 30,21	24,141	287 58 14,57		27 57,59	7,89	5	3,84	5	K.	
			22 18,62		14,11		54,07	8,98	2	7,52	2	Gr.	
1826	—	14	17 24 8,61	24,145	292 6 49,72	—0,040 d	30 47,12	9,60	7	3,51	7	K.	
			25 0,28		51,77		41,61	8,28	4	9,29	4	Gr.	
1827	—	19	6 46 22,36	24,131	296 14 7,22		33 20,61	12,26	6	8,06	6	Gr.	
1828	—	22	19 35 54,00	24,118	300 20 8,07		35 52,72	19,23	7	1,99	7	K.	
1829	—	27	8 1 43,63	24,091	304 25 8,25		38 6,27	21,72	9	4,15	9	K.	
			2 6,53		9,16		5,37	20,97	9	5,25	9	Gr.	
1830	—	31	19 37 46,75	24,077	308 29 3,42		40 9,62	24,34	9	3,68	9	K.	
			39 3,80		6,49		8,07	21,51	3	6,01	3	Gr.	
1831	Aug.	5	6 57 4,18	24,034	312 32 3,55		42 1,10	24,25	11	3,63	11	Gr.	
1832	—	8	17 37 1,20	24,021	316 33 55,54		43 40,45	33,67	3	+ 0,34	3	K.	
			38 23,11		58,81		39,74	30,50	3	— 1,36	3	Gr.	
1833	—	13	3 51 30,73	23,969	320 34 53,80		45 5,86	38,24	5	+ 2,43	5	K.	
			52,30		54,66		4,20	37,91	7	0,57	7	Gr.	
1834	—	17	13 28 3,86	23,947	324 34 54,54		46 15,62	45,00	1	3,48	1	K.	
			27 54,76		54,18		15,68	45,35	4	3,66	4	Gr.	
1835	—	21	22 31 38,80	23,896	328 34 5,00		47 16,01	49,39	11	8,68	11	K.	
			32 21,10		6,70		13,21	48,69	4	5,44	4	Gr.	
1836	—	25	7 13 4,73	23,867	332 32 34,31		48 0,13	54,38	5	11,55	5	K.	
			12 39,33		33,29		47 59,28	56,17	6	9,96	6	Gr.	
1837	—	29	15 32 43,10	23,803	336 30 30,35		48 28,33	61,50	8	13,30	8	K.	
			32 15,96		29,26		—48 27,84	+62,76	14	+13,27	14	Gr.	

Beobachtungen am Fraunhofer'schen Kreismicrometer auf der Sternwarte zu Copenhagen.

Neptun.

1849	Mittl. Copenh. Zt.	AR. Neptun.	Decl. Neptun.	Vergl.
Aug. 30	9 ^h 11 ^m 16 ^s 5	22 ^h 22 ^m 1 ^s 72	—10° 58' 43" 3	7 mit a
31	9 6 4,4	— 21 55,41	10 59 31,8	12 „ „
Sept. 2	8 48 11,1	— 21 43,20	11 0 40,7	8 „ „
3	8 49 53,1	— 21 36,74	11 1 16,2	11 „ „
4	8 50 58,1	— 21 30,67	11 1 54,9	13 „ „
5	8 38 32,6	— 21 24,91	11 2 31,7	10 „ „
7	8 54 22,8	— 21 12,59	11 3 38,9	11 „ „
8	8 39 43,5	— 21 6,81	11 4 15,9	8 „ b
10	10 17 18,8	— 20 53,89	11 5 23,3	5 „ „

Mittlere Oerter der Vergleichsterne zu Anfang des Jahrs 1849:

α (9½.9)	AR. 22 ^h 21 ^m 44 ^s .365	Decl. —10°48' 52 ^u 87	B. A. C. No. 43901, Weisse No. 462.
δ (5.6)	„ 22 22 39,37	„ —11 26 56,38	—— No. 43940, — No. 480.

M e t i s.

1849	Mittl. Zt. Copenh.	AR. Metis.	Decl. Metis.	Vergl.
Aug. 25	11 ^h 7 ^m 22 ^s .1	22 ^h 17 ^m 19 ^s .91	—20°50' 41 ^u 5	5 mit α
29	10 59 11,6	— 13 25,04	21 11 41,4	10 „ β
30	10 40 55,3	— 12 27,47	21 16 21,4	9 „ „
31	10 42 5,5	— 11 29,57	21 20 59,9	4 „ „
Sept. 3	10 40 38,3	— 8 38,21	21 34 15,8	3 „ „
4	10 9 56,2	— 7 43,75	21 38 9,1	7 „ γ
5	9 41 50,0	— 6 48,47	21 41 48,7	2 „ „
6	10 6 23,1	— 5 53,43	21 45 36,3	11 „ „
7	9 46 30,8	— 5 0,30	21 48 57,4	9 „ „
8	9 58 28,5	— 4 7,09	21 52 8,9	7 „ „
10	9 12 42,9	— 2 25,31	21 57 46,0	8 „ δ

Mittlere Oerter der Vergleichsterne zu Anfang des Jahres 1849:

α (7.8)	AR. 22 ^h 17 ^m 32 ^s .985	Decl. —21° 0' 5 ^u 14	B. A. C. No. 43742 et 43
β (7)	„ 22 10 16,14	„ —21 29 29,04	„ 43510 et 12
γ (5)	„ 22 5 57,501	„ —21 49 29,31	„ 43343 et 44
δ (6)	„ 22 2 38,977	„ —21 58 17,27	„ 43225.

J. Sievers.

Druckfehler in der Abhandlung „Ueber den Gebrauch des Passagen-Instruments überhaupt“ von Herrn Professor Hansen, Band 6 der Astronomischen Nachrichten.

Pag. 439 steht $\tan g p^a = \frac{\tan g \theta}{\cos m}$ für $\tan g p^a = \frac{\tan g f}{\cos m}$.

„ 449 „ $\frac{\sin(p' - \zeta) \sin \delta}{\sqrt{(\sin^2 p + \sin^2 \zeta + \sin p' \sin \zeta \cos(p' - \zeta))}}$ für $\frac{\sin(p' - \zeta) \sin \delta}{\sqrt{(\sin^2 p' + \sin^2 \zeta + 2 \sin p' \sin \zeta \cos(p' - \zeta))}}$

„ 451 „ $\pm \sin \frac{1}{2} \zeta \cos \delta \sin p \cos \zeta$ für $\pm \sin \frac{1}{2} \zeta \cos \delta \sin p \cos \xi$

„ 453 „ $\frac{1}{2}(a' - a) = s$ für $\frac{1}{2}(a' - a) = s$

447 in der Formel $-dp \frac{\cos p^a \sin p' \cos \mu \tan g f \tan g g' \sin m}{\cos m \cos(\mu - m)}$ steht $\tan f f$ für $\tan g f$

August Sonntag.

I n h a l t.

(Zu Nr. 705, 707, 708). Reduction der in Greenwich, Paris und Königsberg gemachten Beobachtungen des Uranus, von 1781—1837. p. 145—192. —

(Beilage zu Nr. 708). Reduction der in Greenwich etc. gemachten Beobbb. des Uranus (Beschluss) p. 193. —
Beobachtungen auf der Copenhagener Sternwarte von Sievers p. 193.
Berichtigungen p. 195. —