In diesem Sinne halte ich die Veröffentlichung des folgenden Falles für wichtig, bei dem erst secundär eine Veränderung am Herzen auftrat, bei dem ferner die Verletzung in einer sehr seltenen Veranlassung bestand und die ersten Erscheinungen auf eine direkte Läsion eines lebenswichtigen Nerven hinwiesen. Ich habe in der Litteratur vergeblich nach einem analogen Falle gesucht, wenngleich ich überzeugt bin, dass ähnliche Beobachtungen schon vorgekommen sein müssen, wenn anders der sprichwörtlichen Redensart „Ich habe mich halb todt gelacht“ eine ernste Bedeutung zugrunde liegt.

Käthe P., ein kräftiges, gut entwickeltes Mädchen von dreizehn Jahren, seit einem halben Jahre menstruiert, von lebhaftem Temperament, Zögling einer Waisenanstalt, war bis dahin stets gesund gewesen. Am 19. November 1895 erzählte sie abends in dem mit mehreren Mädchen gemeinschaftlich bewohnten Schlafräume fast eine Stunde lang laut und eifrig lustige Geschichten, über die die Anderen und sie selbst am meisten lachten. Trotz dem Verbote der Erzieherin, die sich im Nebenzimmer aufhielt, setzte sie ihre Erzählung weiter fort und hörte auch mit dem Lachen nicht auf. Plötzlich verwandelte sich das anhaltende, heftige, fast krampfartige Lachen in ein schmerzhaftes Stöhnen und Weinen, so dass die Erzieherin geängstigt herbeilief und verschiedene vergebliche Versuche machte, das junge Mädchen zu beruhigen. Ich gebe zunächst die Schilderung der Erzieherin, die diese am Tage nach dem Anfall auf meinen Wunsch niedergeschrieben hat. „Um 10 Uhr nach anhaltendem Lachen zuerst unter heftigem Weinen Stiche in der Brust, verbunden mit Hustenreiz. Dann Zuckungen, heftige Stiche in der Herzgegend und Luftmangel. Der Anfall dauerte bis 1/2 2 Uhr; darauf unruhiger Schlaf bis gegen 6 Uhr, wo sich dieselben Erscheinungen wiederholen und bis 8 Uhr andauern. Im Laufe des Vormittags anhaltende Schmerzen beim Athmen und von 10–11 3/4 Uhr ununterbrochene, mit heftigen Zuckungen verbundene Anfälle von schmerzhaften Herzbeklemmungen und Athemnoth. Von da ab wiederholen sich die Anfälle mit ein- bis zweistündigen Pausen unter abnehmender Dauer von einer Stunde bis zu zehn Minuten. Der letzte Anfall an diesem Tage (den 20. November) Abends 10–10 1/2 Uhr, worauf bis 4 Uhr ruhiger Schlaf. Im Laufe des nächsten Tages bis 2 Uhr vier kürzere Anfälle mit geringeren Schmerzen. Dazwischen ruhiger Schlaf. Während der ganzen Zeit grosse Empfindlichkeit, Gefühl von Schwere in den Gliedern, Appetitlosigkeit und Kopfschmerz.“

Als ich in der Nacht vom 19. November zu der Patientin gerufen wurde, fand ich sie mit bleichem, verstörtem Gesicht, mit ängstlichem Ausdruck und bläulichen Lippen aufrecht im Bette sitzend, stöhnend und heftig nach Athem ringend. Sie klagte über grosse Schmerzen in der Herzgegend, der Puls war äusserst frequent und kaum als Faden fühlbar. Am Herzen bestand keine Vergrösserung. Die Herzaction war schwach und beschleunigt. Die Töne waren undeutlich wahrnehmbar, ein Geräusch nicht vorhanden. Sie machte somit den Eindruck einer Patientin, die von einem sthenocardischen Anfall befallen worden war. Ich verabfolgte gleichzeitig Campher- und Morphinumjectionen, ohne einen Erfolg zu erzielen. Denn bis zum Morgen dauerte der Anfall fast ohne Unterbrechung fort. Im Laufe des Vormittags bat ich Herrn Geh. Rath Professor Senator, das Mädchen anzusehen. Auf seinen Rath verordnete ich in einigen kleinen Dosen Phenacetin, wodurch — wie mir schien — auf den Zustand der Patientin ein günstiger Einfluss ausgeübt wurde. Am 20. traten nur vier Anfälle auf, die rascher vorübergingen. Im Verlaufe der nächsten vierzehn Tage traten die Anfälle noch täglich auf. Dann erschienen sie seltener, blieben oft einige Wochen, später mehrere Monate fort und haben sich jetzt seit einem halben Jahre gar nicht mehr gezeigt. In dem letzten Jahre schien es, als ob körperliche Anstrengungen und seelische Erregungen die Anfälle auslösten. Sie traten stets plötzlich auf und bestanden in Weinkrämpfen, grosser Blässe, Abgeschlagenheit, Angstgefühl und Athemnoth. Sie gingen gewöhnlich nach einer Stunde vorüber; doch bestand noch mehrere Tage hindurch grosse Mattigkeit. Während ich nun in der ersten Zeit am Herzen nichts nachweisen konnte, fand ich bei den Anfällen des letzten Jahres regelmässig nach der Attacke eine deutliche Verbreiterung des linken Ventrikels über die linke Mamillarlinie, Dämpfung auf dem Sternum rechts bis zur rechten Parasternallinie, eine Verstärkung des zweiten Pulmonaltönen und ein lautes systolisches Geräusch. Beides, Dilatation und Geräusch, verschwanden im Verlaufe einer Woche. Jetzt, nachdem die Anfälle, wie erwähnt, seit einem halben Jahre nicht mehr aufgetreten sind, ist der Herzbefund vollkommen normal, und das Befinden des jungen Mädchens ein durchaus gutes.

Die Deutung dieses bemerkenswerthen Falles glaube ich nun folgendermassen geben zu dürfen. Auf Grund des übermässigen Lachens hat sich durch die krampfhaft angestrenzte Thätigkeit des Zwerchfells zuerst eine Reizung des durch dasselbe hindurchtretenden Nervus vagus und dann eine Parese desselben entwickelt. Dafür scheint mir die Schmerzhaftigkeit des ersten Anfalls, der Hustenreiz, die Athemnoth, die enorm beschleunigte, einer Asystole gleichkommende geschwächte Herzaction zu sprechen. Die Parese des lebenswichtigen Nerven besserte sich von Tag zu Tag zusehends; doch traten vorübergehend immer wieder die Erscheinungen des ersten Anfalls infolge der Reizbarkeit des verletzten

Aus der ärztlichen Praxis.

Erkrankung des Herzens infolge übermässigen Lachens.

Von Dr. Leopold Feilchenfeld in Berlin.

Seit einer Reihe von Jahren hat man den durch Verletzung entstandenen Erkrankungen des Herzens besondere Beachtung geschenkt. Bernstein¹⁾ hat eine grosse Anzahl der in der Litteratur bekannten Fälle zusammengestellt, bei denen fast ausschliesslich eine Contusion, ein direkter Stoss oder eine Quetschung in der Herzgegend die Ursache abgab. Eine geringere Bedeutung spielt die indirekte Veranlassung, eine gewaltige Erschütterung des ganzen Körpers oder einzelner, vom Herzen entfernterer Theile. Die gleichmässige Erschütterung des Körpers, zum Beispiel bei einem Fall aus grosser Höhe, lässt immer noch eine direkte Verletzung des Herzens möglich erscheinen, eine Zerreissung des Pericards, Myocards oder des Endocardiums. Die indirekte Entstehung der Herzerkrankungen bedarf aber bei allen übrigen Arten der Verletzung in jedem einzelnen Falle einer besonderen Erwägung und Erläuterung.

¹⁾ Ueber die durch Contusion und Erschütterung entstehenden Krankheiten des Herzens. Zeitschrift für klinische Medicin Bd. XXIX.

Nerven auf, bis dieser sich vollständig erholte. Inzwischen war aber durch die häufigen Attacken der Herzmuskel in gewissem Sinne alterirt worden; eine leichte äussere Einwirkung löste noch öfter die nervösen Zufälle aus, und diese verursachten jetzt eine Erschlaffung des Herzmuskels, der mit der Zeit seine Widerstandsfähigkeit eingebüsst hatte. Mit dem Fortbleiben der nervösen Zufälle blieben auch die Erscheinungen der intermittirenden Herzerschlaffung fort.