R. Kobert: Über Saponine. (Unna-Festschrift 1, 161—183; Chem. Zentralbl. 1911, I, 1589)

P. A. Boorsma: Organisch gebundene Phosphate. (Van Bemmelen-Festschrift 210—213; Chem. Zentralbl. 1911, I, 496.)

Honig.

H. Witte: Honiguntersuchungen. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1912, 18, 362—373 und 390—397.) — Verf. geht zunächst auf die vom Kaiserlichen Gesundheitsamt (Verff.: Fiehe und Stegmüller) über Honig veröffentlichten Untersuchungsergebnisse näher ein, an denen er auszusetzen hat, daß die untersuchten ausländischen Honige nicht billige, sondern bessere Importhonige waren, während der größte Teil des eingeführten Honigs billige, „reinigungsbefürftige“ Ware ist. — Dem „Nichtzucker“ will Verf. nicht die gleiche Bedeutung beimessen, wie es Fiehe und Stegmüller getan haben. Das gleiche gilt vom Aschengehalt. Bei Hawaii-Honigen beobachtete Verf. 0,14 und 0,19% Kochsalzgehalt, doch zweifelt er selbst an den Angaben über die Echtheit dieser Honige. Verf. beobachtete Krystalle von Calciumoxalat im Honig. Bei der Feststellung des Saccharosegehalts genügt nach Verf. für die Orientierung die Berechnung aus der Polarisation. Er wünscht auch, daß die Reaktion nach Ley und die Fällung nach Lund mit in den „Entwurf zu Festsetzungen über Honig“ aufgenommen werden. Bei dem Nachweis von Invertzuckerzusätzen ist damit zu rechnen, daß neuerdings mit Saccharoselösungen gefälscht wird, die durch die Honigfermente selbst invertiert werden, wobei die Reaktion nach Fiehe negativ ausfällt. Daß die Bienen in irgendwie größerem Umfange mit Invertzucker gefüttert werden und daß darauf die positive Fiehe'sche Reaktion der Handelshonige oftmals zurückzuführen wäre, hält Verf. nicht für wahrscheinlich. Die Fiehe'sche Reaktion ist noch immer das beste Mittel zum Nachweis von Verfälschungen mit Invertzucker, wenn auch nicht ein unfehlbares. Bei den Auzinger'schen Reaktionen redet Verf. der sogenannten Para-Reaktion das Wort zur Erkennung reiner nicht erwärmter Schleuderhonige. Auch der Katalase-Probe wird Wert beizumessen sein als Kriterium für in Gärung begriffene oder mit Säften von zerquetschten toten Bienen, Bienenbrut usw. verunreinigte Honige. Von 13 in einer früheren Arbeit des Verf.'s erwähnten beanstandeten Proben entsprach die Präzipitin-Reaktion nach Thöni nicht dem sonstigen Analysenbilde. Diese Reaktion ist im Rahmen der übrigen Analyse mit Erfolg mit zur Begutachtung heranzuziehen. Verf. gibt schließlich die Analysenergebnisse von im Jahre 1911 und 1912 von ihm untersuchten 29 Honigproben wieder, unter denen sich nur 8 unverfälschte bzw. unbeanstandete Proben befanden. — Im übrigen ist die Arbeit eine Zusammenfassung und Besprechung der meisten der in letzter Zeit auf diesem Gebiet veröffentlichten Arbeiten. A. Behre.

A. Gottfried: Der Mangan- und Phosphorsäuregehalt von Honigen. (Pharmaz. Zentralh. 1912, 53, 1440—1442.) — Verf. hat seine früheren Untersuchungen (vergl. Z. 1912, 23, 625) fortgesetzt und ist auch zu ähnlichen Ergebnissen gelangt. Bei hoher Albuminfällung nach Lund wird stets auch ein hoher Mangangehalt beobachtet. Dieser fällt auch mit dem guten Geschmacke der Honige zusammen. Zur Feststellung des Mangangehalts wurde wieder die colorimetrische Methode von Marshall angewendet. Bei 14 Imkerhonigen schwankte der Mangangehalt zwischen 0,3—4,0 (Mittel 1,0) mg-%, bei 21 Handelshonigen betrug er im Mittel 0,127 mg-%; auf Prozente der Asche berechnet, bei den Imkerhonigen 0,222 %, bei den Handelshonigen 0,0545 %. Das Mangan kann nur dann zur Beurteilung herangezogen werden, wenn seine Abwesenheit festgestellt worden ist. Aber selbst Kunsthonige enthalten noch Spuren Mangan. — Die Phosphorsäure wurde in 25 g Honig nach dem titrimetrischen Verfahren von Fiehe und Stegmüller bestimmt. Der Gehalt an Phosphorsäure war bei den untersuchten Proben großen

Schwankungen unterworfen; oftmals betrug er ein Zehntel der Asche und war sehr gering bei den Zuckerfütterungshonigen und bei den Kunsthonigen ohne Stärke- und Zuckergehalt. Daher soll die Bestimmung der Phosphorsäure bei mit Invertzucker versetzten Honigen von Wert sein. Stärkesirup dagegen erhält erhebliche Mengen Phosphorsäure. Im allgemeinen ist die Zusammensetzung der Honigaschen eine sehr verschiedene. *A. Behre.*

L. van Giersbergen: Eigenschaften und äußerliche Beurteilung von Honig. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1910, 16, 369—375.)

G. L. Voermann: Chemische Beurteilung von Honig (Zeitschr. öffentl. Chem. 1910, 16, 401—407.)

Spirituosen und Essig.

A. Bono: Zur Ermittlung des Methylalkohols in Äthylalkohol und in alkoholischen Getränken. (Chem.-Ztg. 1912, 36, 1171.) — In einen etwa 200 ccm fassenden Kolben werden durch ein Trichterrohr 25 ccm der zu untersuchenden Flüssigkeit und 50 ccm destilliertes Wasser einfließen gelassen. Ein mit diesem Kolben in Verbindung stehender anderer Kolben von demselben Inhalte enthält 50 ccm einer oxydierenden Bichromatmischung, d. h. einer kaltgesättigten Kaliumbichromatlösung, welche 60 ccm Schwefelsäure im Liter enthält. Dieser Kolben steht mit einem Kühler in Verbindung. Die Flüssigkeit im ersten Kolben wird zum Sieden erhitzt. Bei dem Stoßen der Dämpfe des Äthyl- bzw. Methylalkohols auf die oxydierende Mischung dürfte zunächst nur Äthylalkohol zu Aldehyd oxydiert werden; der Methylalkohol wird zum größeren Teil von der Mischung als ein Zwischenoxydationsprodukt (vielleicht als Acetal) zurückgehalten, sodaß in den ersten 25 ccm des Destillates wohl Acetaldehyd, kaum aber Formaldehyd nachweisbar ist. Wenn daher das Destillat 25 ccm erreicht hat, wird die Vorlage gewechselt und noch 10 ccm Destillat aufgefangen. In diesem prüft man dann auf Formaldehyd. Als empfehlenswerteste Reaktion gibt Verf. folgende an: 2 ccm Destillat werden in einem Glasrohre mit 10 Tropfen einer wässrigen $\frac{1}{2}$ 0/0-igen Phenylhydrazinchlorhydratlösung, 1 Tropfen einer $\frac{1}{2}$ 0/0-igen Natriumnitroprussidlösung und 10 Tropfen einer 10 0/0-igen Natronlauge behandelt. Bei Anwesenheit von Formaldehyd im Destillate erscheint die charakteristische blaue Färbung, die alsbald in eine grünliche und dann in eine gelbliche übergeht. Die Bildung von Formaldehyd beweist die Anwesenheit von Methylalkohol in der untersuchten Flüssigkeit. Die Empfindlichkeit dieses Nachweises erreicht 2—1 0/0 Methylalkohol. *P. W. Neumann.*

A. Schlicht: Nachweis und Bestimmung von Methylalkohol in weingeisthaltigen Flüssigkeiten. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1912, 18, 337—340.) — Die Methode des Verf.'s für die Prüfung weingeisthaltiger Flüssigkeiten auf Methylalkohol baut sich auf dem Unterschied in dem Verhalten der Ameisensäure und Essigsäure den Oxydationsmitteln gegenüber auf. Während Ameisensäure in wässriger Lösung durch Chromsäure bereits in der Kälte zu Kohlensäure und Wasser oxydiert wird, bleibt Essigsäure bei gleicher Konzentration der Lösung sogar beim Erhitzen unverändert. Es ist also die Oxydation der Alkohole bis zu den Säuren durchzuführen. Zur Oxydation verwendete Verf. eine Lösung von 5 g Kaliumbichromat in 30 ccm verdünnter Schwefelsäure (1 + 2). Den zu untersuchenden Alkohol verdünnt man im Verhältnis 5 : 100 mit Wasser und gibt ihn in die abgekühlte Oxydationslösung. Bei Verwendung von 0,5 ccm Alkohol auf das angegebene Oxydationsgemisch ist in der Kälte nach einer Stunde die Oxydation des Methylalkohols zu Ameisensäure, des Äthylalkohols zu Essigsäure erfolgt. Beim weiteren Erhitzen entsteht aus der Ameisensäure Kohlensäure, die man durch Einleiten in Kalk- oder Barytwasser nachweisen kann. Auf diese Weise konnte Verf. 0,0025 ccm = 0,5 0/0 Methylalkohol nach-