und in wie fern muss dessen Anwendung als gefährlich betrachtet werden? *b* In welchem Verhältnisse steht das Wachs dieser Pflanze zu den andern bekannten Wachsorten? — Endlich, da man bei den bisher vorgenommenen Untersuchungen über die Reife von Früchten sich zunächst mit solchen Früchten beschäftigt hat, welche im reifen Zustande mehr oder weniger Zucker enthalten, dagegen man noch keine befriedigenden Untersuchungen über die Reife solcher Früchte und Samengattungen, welche zur Oelgewinnung angewendet werden, angestellt hat, so bestimmt die Gesellschaft eine Prämie von 200 Rbth. für eine auf Versuche gegründete Beantwortung folgender Fragen: *a*. In welchem Grade nimmt die ganze Pflanze an dem Reifungsprozess Theil, wobei das Oel, besonders bei Lein- und Reys, hervortritt und in welchem Grade könnte in dem unreifen Samen, ohne Mitwirkung der übrigen Theile der Pflanze, eine vermehrte Oelbildung erwirkt werden? *b*. Findet sich Oel in den Fasern des Flachses nach der Röste? *c*. Wie ferne ist die Annahme begründet, dass die Reife der Samen einen solchen Einfluss auf die Güte des Flachses haben kann, dass die Fasern dadurch weniger Fettstoff als Fasern von Pflanzen enthalten, welche, während der Same noch unreif war, ausgerissen worden sind? Die Preisschriften sind vor Ende August 1852 der Gesellschaft einzusenden. In den dänischen Staaten wohnende Mitglieder der Gesellschaft nehmen nicht an der Bewerbung Theil.

Personalnotizen.

— Johann Bapt. Zahlbruckner, Privat-Secretär Sr. kais. Hoheit des Herrn Erzherzogs Johann, Mitglied mehrer gelehrten, industriellen und landwirthschaftlichen Vereine, bekannter und gefeierter Botaniker ist am 2. April nach einer schmerzlichen Krankheit im 78. Jahre seines Lebens in Graz verschieden.

— Professor Dr. Georg Bill hat seine Vorlesungen aus der Botanik am Joanneum in Graz den 26. März begonnen.

Correspondenz.

Posseg in Slavonien, im April. — *Erythronium Dens canis flore candido* hat beinahe ganz verblüht. — Diese schöne Varietät befindet sich hier nur in einem einzigen, eine Stunde Weges langen, aber schmalen, Jagodnjak genannten, nach Norden sich öffnenden Thale, in grosser Menge, am meisten gemeinschaftlich mit *Isopyrum thalictroides*; merkwürdig ist, dass man das andere, mit purpurrothen Blumen in diesem Thale nirgends antreffen kann, während es auf allen übrigen Hügeln und Bergen häufig, aber auch ausschliesslich für sich allein vorkommt. — Die Ursache, warum jenes gerade in dem einzigen Jagodnjaker Thale vorkommt, dürfte wohl meistens in der Eigenthümlichkeit des Bodens zu suchen sein, indem die Gebirgsmasse des Pöseger Comitates nur zur tertiären und Alluvial-Formation zu rechnen, und mit Ausnahme einiger, auf der Oberfläche Mergel und dichten Kalkstein zeigenden Gegenden, meistens aus verschiedenen Thonsteinarten mit zwischenlaufenden Schichten eines alabasterweissen Quarzes besteht. — Diese Thonstein-Masse ist überall mehr oder weniger, aber im Thale Jagodnjak am meisten mit

Eisenocher durchdrungen, — welcher vielleicht auf die Hervorbringung dieser permanenten Abart einen wesentlichen Einfluss ausüben dürfte, insoweit dass dasselbe weisse *Erythronium* in Gärten, mit der andern rothen Varietät vermengt, versetzt, sich immer rein erhält. — *Eranthis hyemalis* kommt hier in der Ebene häufig vor, aber auch auf der Spitze des Papuger Berges 2800' hoch. — *Helleborus dumetorum* hat im vorigen Winter im März und April viel gelitten und zeigt sich heuer viel weniger. — *Helleborus viridis* hat im Monate November vorigen Jahres in Menge geblüht, und ist uns hierdurch wahrscheinlich ein Vorbote eines kurzen und milderen Winters geworden.

Dr. Anton Pavich.

Lienz in Tirol, im April. — Der Winter war in diesem Jahre bei uns sehr milde, da wir eine Mitteltemperatur von — 2,6° R. hatten, nur an zwei Morgen zeigte das Thermometer — 13,5°, während es im Februar schon auf 5,5° stieg, so dass wir im letzteren Monate nur 3 volle Frosttage zählten. An 57 Tagen erfreuten wir uns des herrlichsten Sonnenscheines und nur an 3 Tagen fiel kaum so viel Schnee, dass für ein paar Wochen leidliche Schlittenbahn im Thale war; auch das Gebirge trägt diessmal keine bedeutenden Schneemassen. Eben so milde zeigte sich der erste Monat des Frühlings und selbst in den ersten Tagen, über deren Kälte so bittere Klagen aller Orten geführt ward, konnten wir bloss — 7,8° aufzeichnen; vom 9. an fiel das Quecksilber auch des Nachts nie mehr auf 0, zeigte dagegen einigemal 11 und 12 Gr. Wärme im Schatten. Der Schnee ist (bis 2500' Höhe) ganz weggeschmolzen und dieser Tage donnerten von allen Seiten Lawinen herab. Die Entwicklung der Vegetation schreitet rasch vorwärts. *Corylus Arellana* blühte (3000') am 20. Februar, *Alnus incana* den 27. desselben Monates. Mitte März konnten wir schon blühend sehen *Draba verna*, *Alsine media*, *Lamium purpureum*, *Viola arvensis*, *Sisymbrium Thalianum*, *Viola hirta*, *Anemone hepatica* etc. *Crocus vernus* überzieht in tausenden von Exemplaren, besonders der weissblühenden Varietät die Bergwiesen bis zu 2600' herab und *Erica carnea* prangt auf dem Hute des Tirolers in schönster Blüthe.

Franz Keil.

Literatur.

Die Pflanzenreste im Salzstocke von Wieliczka.

Von Prof. Dr. F. Unger.

Aus dem 1. Bande der Denkschriften der math. naturwissenschaftl. Classe der k. Akademie der Wissenschaften.

Die Salzlager zeigen selten Spuren von organischen Einschlüssen. In Wieliczka aber ist man auf ein Salzlager gestossen, das zahlreiche Anhäufungen vegetabilischer und animalischer Körper enthält. Die Pflanzenreste dieses Lagers haben das Aussehen der Braunkohle, und sind in der Regel sehr wohl erhalten. Die Holztrümmer sind von feinen Haarspalten durchzogen, die mit Salzkrystallen ausgefüllt sind. Diese Haarspalten laufen auch der Quere nach, was darauf hindeutet, dass sie erst nach der Einschliessung in den Salzstock entstanden sind. Das Holz schwimmt Anfangs auf dem Wasser, ist aber sein Gefüge