V. Ueber die Krönig'schen Schallfelder bei der Lungenspitzentuberkulose und über den Perkussionsschall der Wirbelsäule.

Von Dr. Bruno Alexander in Bad Reichenhall.

Trotz aller bisherigen Enttäuschungen wird der Kampf gegen die Tuberkulose in edlem Wettstreit der Nationen fortgeführt; immer tiefer ist in das Bewusstsein der Völker die Erkenntniss gedrungen, dass das Aufgeben des Kampfes gleichbedeutend wäre mit der Preisgabe, dem Ruin der Kultur. So ist es nicht wunderbar, dass für ein Ziel, das nach den jetzigen Anschauungen allein noch Aussicht auf Erfolg gewährt, — für die Behandlung des Anfangsstadiums der Lungentuberkulose — alle Kräfte gesammelt werden und die Mittel dazu reichlich fliessen. Eine geradezu selbstverständliche Voraussetzung für diese Bestrebungen ist die absolute Zuverlässigkeit der ärztlichen Diagnose! Dass der physikalischen Untersuchungsmethode von den Aerzten nicht das absolute Vertrauen zur recht- und frühzeitigen Stellung der Diagnose entgegengebracht wird, geht aus der häufigen Verwendung der Tuberkulinreaktion zu diagnostischen Zwecken hervor. Diese Methode hat doch zum mindesten den Nachtheil, dass erst eine weitere Beobachtung zur Diagnose nothwendig ist. Gleichwohl würde dem Gebrauch derselben nichts im Wege stehen, wenn nicht von namhaften Autoren die Zuverlässigkeit dieser Methode in Frage gestellt wäre. So sind die Aerzte gezwungen, die physikalische Untersuchungsmethode zu vervollkommen, damit wir selbst die geringen Veränderungen des Anfangsstadiums erkennen und für die Diagnose verwerten können. Wintrich, Ziemssen, Baccelli u. v. A. haben durch die lineare Bestimmung des Höhenstandes der Lungenspitzen beginnende Infiltration zu diagnostizieren gesucht. Noch jetzt muss zugegeben werden, dass das Perkussionsergebniss für die Frühdiagnose ausschlaggebend ist. Unter den diagnostischen Merkmalen müssen

wir zuerst Allgemeinsymptome — die hauptsächlich dem Symptomencomplex der Chlorose, beziehungsweise Anämie angehören — ins Auge fassen — sie können den erfahrenen Arzt schon lange, bevor die Lungenerkrankung manifest wird, auf die Diagnose führen —, dann auskultatorische Zeichen und schliesslich vielleicht auch schon eine Differenz in der Spitzenathmung; die Diagnose wäre jetzt schon gesichert, wenn der Husten uns Sputum mit Tuberkelbazillen liefern würde, aber in der grossen Mehrzahl der Fälle können wir in diesem Moment noch nicht darauf rechnen. Früher giebt uns die Perkussion den Anhalt für die Diagnose; mögen also andere Symptome schon früher die Erkrankung signalisiren, gesichert wird die Diagnose erst durch einen positiven perkussorischen Befund; konnten wir bis dahin nur zu prophylaktischen Maassnahmen mahnen, so müssen jetzt die curativen Maassnahmen in ihre Rechte treten!

Mit der Bestimmung des Höhenstandes der Lungenspitze allein wird die Diagnose nicht frühzeitig genug zu stellen sein, und ausserdem ist dieses Vorgehen nicht einwandfrei. Geigel u. A. haben dagegen eingewandt, dass selbst bei normalen, gesunden Menschen die Höhe der Lungenspitzen über der Clavicula variiren kann und deshalb lineare Differenzen nicht durch die Perkussion entdeckt werden können. Die obere Grenze liegt an der Rückseite in gleicher Höhe mit der Spitze des Dornfortsatzes des siebenten Halswirbels (Gerhardt); diese mit den anderen Autoren übereinstimmende Angabe ist ungenau, denn die Spitze des Dornfortsatzes wechselt in ihrer Lage beim Beugen und Strecken des Kopfes um einen Centimeter, ausserdem fehlen die Bestimmungen, über welchem Punkt der Clavicula und in welcher Breite vom siebenten Halswirbel der höchste Punkt der Spitze zu suchen ist. Es sollen minimale Differenzen berücksichtigt werden, also müssen derartige Fehlerquellen ausgeschlossen werden! Wir könnten sonst auf einer falschen Linie zur Spitze hin perkutiren und bei ganz normaler Höhe eine Verkürzung diagnostiziren. Ferner aus der Höhenbestimmung allein haben wir noch kein genügendes Urtheil über das Volumen der Spitze, sie kann trotz normaler Höhe in der Dicke- und Breiten-dimension Einbusse erlitten haben.

Um dies genügend zu berücksichtigen, mussten exakte Umgrenzungen der Lungenspitzen geübt und vor allem durch Untersuchungen bei Gesunden die Normen dafür aufgestellt werden. Diese Aufgabe gelöst zu haben, ist Krönig's grosses Verdienst; von Turban, Weicker, Alfred Wolff u. A. ist dieses bereits anerkannt worden. Während man bis dahin sich begnügte, bei der Spitzenuntersuchung drei durch die Anatomie bekannte Grenzen auf ihren Verlauf zu controlliren, die vordere mediale, den höchsten vorderen und hinteren Spitzenstand, hat Krönig ein davon ganz abweichendes Verfahren eingeschlagen. Ohne Berücksichtigung der von den Anatomen gegebenen Grenzbestimmungen suchte Krönig, lediglich perkussorischen Forschungen folgend bei Gesunden sämtliche Grenzen des hellen Schalls im Bereich der ganzen oberen Thoraxapertur festzustellen. Damit ist die Perkussion der Lungenspitzen derjenigen anderer Organe gleichgestellt; man untersucht auch nicht das Herz auf ideale anatomische Grenzen, sondern begnügt sich, die vorhandene absolute und relative Dämpfung mit der bei Gesunden gefundenen zu vergleichen, aus dem Perkussionsergebniss Rückschlüsse auf die wahre Grösse des Herzens zu machen und nicht nach anatomischen, sondern klinischen Befunden zu urtheilen. Krönig's Schallfelder brauchen durchaus nicht mit der wahren Grösse der Lungenspitze übereinzustimmen, aber nur bei der Feststellung der Spitzengrenzen nach Krönig gewinnt man einen wahren Maassstab für das Volumen der Lungenspitze. Sowohl Krönig's hintere mediale als auch laterale Grenzen gehen auf der Höhe des Cucullarisrandes in die entsprechenden vorderen Grenzen über. Auf dem so begrenzten Stück dieses Muskelrandes muss also heller Schall bei Gesunden zu finden sein und die Breite dieses Stückes ist ein Maassstab für die wirkliche Breite der Spitze. Das Gefühl und der Schall bei der Perkussion geben uns Aufschluss über den wirklichen Höhenstand der Lungenspitze. Um schliesslich ein Urtheil über die Dicke der Lungenspitze zu bekommen, perkutirt man den Cucullarisrand folgendermaassen: Seitwärts von dem Patienten stehend, der die Arme schlaff her-unterhängen lässt, perkutirt man auf den parallel zum Cucullarisrand liegenden Finger über den Muskelrand hinweg von hinten nach vorn oder umgekehrt, einmal schwach, ein zweites Mal stark. Aus der Stärke der Perkussion, welche nöthig ist, um den Lungen-

schall zu bekommen, bildet man sich ein Urtheil über den wirklichen Stand der Lungenspitze. Freilich ist bei der Verwerthung der gefundenen Grenzen zu berücksichtigen, dass, wie Krönig nachgewiesen hat, wenn auch in seltenen Fällen, eine Heterotopie der Spitze lateralwärts vorkommt. Deshalb können wir auch das durch diese Perkussionsmethode gewonnene Resultat nur mit kritischer Berücksichtigung aller anderen Symptome verwerthen. Ausser ihrem Werth für die Diagnose der Spitzenkrankung bewahrt uns die Kenntniss der Krönig'schen Grenzen auch vor diagnostischen Irrthümern. Die mediale hintere Grenze verläuft nach Krönig bei Gesunden vom Cucullarisrand und mit leichter medianwärts gerichteter Convexität nach der hinteren Mittellinie zu, convergirt auf der Höhe der Grenze zwischen zweitem und drittem Brustwirbeldorn auf Centimeterbreite mit der Mittellinie. Damit ist in dieser Gegend ein gedämpfter Bezirk festgestellt, dessen Kenntniss für uns Aerzte sehr werthvoll ist. Wir könnten sonst der Medianlinie zu nahe zur Spitze hin perkutiren und irrthümlich eine Dämpfung diagnostiziren. Man muss sich klar machen, wie die Krönig'sche mediale hintere Grenze und die Dämpfung an dieser Stelle entsteht. Die Erklärung dafür findet man durch das Studium des weiteren Verlaufes dieser Grenze. Sie nähert sich immer mehr der Wirbelsäule, um schon in der Höhe des fünften bis siebenten Brustwirbels mit der Medianlinie nahezu zu verschmelzen: an der Spitze ist das Volumen der Lunge geringer; ausserdem bilden an dieser Stelle die Muskeln ein stärkeres Polster als unten, wenigstens im Vergleich zu dem Volumen der im gleichen Niveau liegenden Lunge, dem zugehörigen Schallkörper. Der Cucullaris giebt dem Nacken die Contour; unter ihm ziehen von den unteren Hals- und oberen Brustwirbeln andere Muskeln zu der oberen Extremität, der Serratus posterior superior zu den Rippen, die Splenii zum Schädel, über den Nacken hinweg zieht noch der Extensor dorsi communis, und zu unterst reichen bis zum Schädel die tiefen kurzen Nacken- und Rückenmuskeln, daraus resultirt eine beträchtliche Dicke der Muskulatur. An den unteren Partien der Wirbelsäule ist nur vom siebenten Brustwirbel an der Latissimus dorsi vom Trapezium bedeckt, und die tiefen, kurzen Rückenmuskeln unter dem Extensor dorsi communis sind höchstens gleich stark entwickelt; dagegen sind die Schallkörper — die Unterlappen — mächtig angelegt und wir dürfen schliesslich, da es sich hier um keine so wichtigen oder wenigstens subtilen Entscheidungen handelt, stark perkutiren. Deshalb können wir nach unten zu längs der Medianlinie keine scharf ausgeprägte Dämpfungszone constatiren. Alfred Wolff schreibt in seiner Arbeit über die Krönig'sche Lungenperkussion in dieser Wochenschrift 1903, No. 6: „Das, was mir an der Krönig'schen Methode das wesentliche zu sein scheint, ist die Beobachtung, dass es eine obere Lungenspitzenengrenze eigentlich nicht giebt, sondern dass der von der Lungenspitze ausgehende Lungenschall als breite Fläche über den Schultergürtel hinwegzieht, eine Erscheinung, die als Projektion des von der Perkussion der Lunge erzeugten Schallfeldes auf die äussere Haut anzusehen ist.“ Dagegen ist einzuwenden, dass unzweifelhaft eine obere Lungengrenze durch die Perkussion festgestellt

werden kann, nur nicht mit der Genauigkeit, wie Ziemssen u. A. es für möglich hielten. Neben der Untersuchung des Krönig'schen Schallfeldes muss die direkte Höhenbestimmung der Lungenspitze geübt werden; aus dem Vergleich der Perkussionsergebnisse gewinnt man erst den richtigen Maassstab; auch um die richtige Stärke der Perkussion für die Supraclaviculargrube herauszufinden, sollte man mit dieser Bestimmung beginnen und dann mit immer stärkeren Perkussionsschlägen über den Cucullarisrand auf die hintere Fläche übergehen. Alfred Wolff schlägt vor, die Breite in Centimetern, welche die Lungenspitze auf die äussere Haut projizirt, etwa 1 cm unterhalb des Muskelrandes des Musculus cucullaris, circa 3 cm oberhalb der Clavicula den „Spitzenisthmus“ zu bestimmen. Ich meine dagegen, dass die vollständige Umgrenzung der Lungenspitze nach Krönig und das Breitenmaass des Lungenschalles auf dem Cucullarisrand neben der direkten Höhenbestimmung nach Ziemssen einen besseren Maassstab für das Volumen der Lungenspitze giebt. Im Lehrbuch der Diagnostik der inneren Krankheiten von G. Edlefsen finden wir folgendes: „Die Höhe wird nach dem höchsten Punkte auf dem Rande des Cucullaris bestimmt. Derselbe überragt den oberen Rand der Clavicula senkrecht, also durch Visiren, gemessen um 1 bis 3, schräg auf der Fläche der Fossa supraclavicularis gemessen, um 3 bis 5 cm. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die aufgezeichnete Grenzlinie um die Dicke der bedeckenden Muskelschicht senkrecht oberhalb der wirklichen oberen Grenze der Lungenspitze liegt.“ Mit diesen Ausführungen könnten wir uns unbedingt einverstanden erklären, nur müssen wir beanstanden, dass für die Lungenspitzenhöhe wieder ein fixer Punkt angenommen ist, denn der höchste Punkt auf dem Cucullarisrand ist bei Gesunden constant an der Peripherie des Halses am Ende der medialen vorderen Grenze, aber durchaus nicht immer senkrecht über dem höchsten Punkt der Lungenspitze und nicht immer in gleicher Distanz von diesem gelegen.

Mit gütiger Erlaubniss des Herrn Prof. Krönig reproduziren wir hier die einschlägigen Abbildungen aus dessen Abhandlung: „Die topographische Lungenspitzenperkussion und ihre Bedeutung für die Diagnose der beginnenden Tuberkulose“.

Der Cucullarisrand steigt schräg vom Halse herab, während die Lunge in einem abgestumpften Kegel endigt und durch eine Horizontale begrenzt werden muss — die Lage dieser Linie zum Muskelrand durch Zahlen auszudrücken, ist zu schwierig und sollte unterlassen werden. Aus dem Ergebniss der palpatorischen Perkussion auf dem Cucullarisrand kann jeder auch ohne Zahlenangabe sich ein Urtheil über das Volumen der Lungenspitze bilden — die direkte Höhenbestimmung dient nur zur Controlle, ob die Perkussionserschütterung mit entsprechender Stärke ausgeführt ist. Sehr nothwendig wäre noch exaktere Bestimmung der Stärke des Perkussionsschlages; zur Bestimmung feiner Differenzen sind Hammer und Plessimeter an dieser Stelle absolut nicht zu gebrauchen. „Wo die Verhältnisse zu sehr leiser Perkussion zwingen, entnimmt man mehr dem Maasse des fühlbaren Widerstandes als dem gehörten Schalle das Urtheil über den Luftgehalt der unterliegenden Theile. Mittelbare Perkussion mit den Fingern

Fig. 1.

Vordere Schallfelder über normalen Lungenspitzen. (Nach Prof. G. Krönig.)

Fig. 2.

Hintere Schallfelder über normalen Lungenspitzen. (Nach Prof. G. Krönig.)

Fig. 3.

Verlagerung des linken Schallfeldes nach aussen in Folge einer physiologischen Heterotopie der linken Lungenspitze. (Nach Prof. G. Krönig.)

Fig. 4.

Verkleinerung des linksseitigen Schallfeldes durch Aneinanderrücken der medialen und lateralen Grenze bei Schrumpfung der linken Lungenspitze. (Nach Prof. G. Krönig.)

Fig. 5.

Unscharfe, verschleierte mediale hintere Grenze bei beginnender Tuberkulose der rechten Lungenspitze. (Nach Prof. G. Krönig.)

Fig. 6.

Unscharfe, verschleierte mediale und laterale vordere Grenze bei beginnender Tuberkulose der rechten Lungenspitze. (Nach Prof. G. Krönig.)

gestattet viel feinere Wahrnehmung dieses Zeichens, als Klopfen mit Hammer und Plessimeter.“ (Gerhardt.) „Von Sahli wurde möglichst gleiche Stärke der einzelnen Schläge auf das Plessimeter zu erzielen gesucht durch die Konstruktion einer perkutierenden Maschine.“ (Gerhardt.) Einer Maschine können wir glücklicherweise entzagen! Ich finde, dass wir das beste Muskelgefühl haben zur Bemessung des Perkussionsschlages und der Resistenz des perkutierten Körpers, wenn wir zur leisen Perkussion auf der Fossa supra clavicularis mit der Kuppe des minimal flektierten Mittelfingers der rechten Hand, während die anderen Finger gestreckt bleiben, durch Bewegungen im Metacarpophalangealgelenk die Schläge auf das Nagelglied des linken Mittelfingers ausführen. Zur starken Perkussion auf anderen Körpertheilen werden bei gleicher Position der Finger oder schliesslich mit dem hakenförmig gekrümmten Mittelfinger, während der vierte und fünfte eingeschlagen werden, die Bewegungen aus dem Handgelenk gemacht. Bei der beginnenden Infiltration der Lungenspitze finden wir zuerst an der hinteren medialen Grenze einen Schallunterschied. Die Verkleinerung des hinteren Schallfeldes zeigt sich dabei nicht im Auftreten einer kompakten Dämpfungszone, sondern dadurch, dass die Grenze — wie Krönig es beschrieben hat — unscharf und verschleiert wird. Gleichzeitig verändern sich der Schall und das Resistenzgefühl auf dem Cucullarisrande. Selbstverständlich begnügen wir uns nicht mit der Grenzbestimmung, sondern prüfen die Schallqualität auf dem ganzen Schallfelde, einschliesslich der Clavicula. „Auch beginnende Infiltration giebt sich zuweilen, ehe noch andere Veränderungen des Perkussionsschalles hervortreten, durch Höherwerden zu erkennen (Skoda), weil dadurch der Luftgehalt und damit das Volumen der schwingenden Masse vermindert wird.“ (Edlefsen.) Einem weiteren Stadium entspricht der verkürzte Schall — dieser kommt durch gleichzeitige Veränderung des Resistenzgefühls bei der palpatorischen Perkussion nach Ebstein zur Wahrnehmung. — Werden alle diese Erfahrungen berücksichtigt, so können uns auch geringfügige anatomische Veränderungen schwer entgehen, wie uns Oestreich, ein Schüler Krönig's, an der Leiche nachgewiesen hat. Es bleiben aber immer noch Fälle, in welchen die Entscheidung Schwierigkeiten macht — bei beiderseitigen minimalen Veränderungen, bei Schallwechsel durch pleuritische Exsudate etc. — So ist ein neues diagnostisches Hilfsmittel — mag es an und für sich auch unbedeutend erscheinen — immerhin beachtenswerth.

Wir können also folgende Thatsache noch für die Diagnose verwerten: Bei mageren, gesunden, erwachsenen Personen giebt die Perkussion auf dem siebenten Hals- und den obersten Brustwirbeldornen hellen Lungenschall mit tracheal-tympanitischem Beiklang. Dieser Beiklang verliert von Wirbel zu Wirbel an Intensität, der fünfte bis siebente Brustwirbel giebt schon vollen Lungenschall. Bei jugendlichen Personen haben nur die obersten zwei oder drei Wirbel, bisweilen nur der siebente Hals- und nur noch ein Brustwirbel, den tympanitischen Beiklang. Diese Thatsache ist bisher nicht genügend gewürdigt, oder verkannt worden: „Vollständig dumpf und dabei klanglos ist bei erwachsenen, etwas wohlbelibten Leuten der Schall der Wirbelsäule.“ (Gerhardt.) Dieser

Ausspruch könnte richtig sein, ohne meine Behauptung zu widerlegen: „Durch dicke Bedeckungen kann die Intensität so vermindert werden, dass der Schall sich immer mehr dem gedämpften nähert und im Vergleich mit anderen Bezirken des Thorax oder mit dem Lungenschall anderer Menschen zuweilen fast als dumpf bezeichnet werden muss, so z. B. bei fetten im Vergleich mit mageren Personen.“ (Edlefsen.)

Edlefsen nähert sich schon meiner Anschauung: „Denselben tympanitischen Schall wie über der Trachea selbst hört man auch, nur etwas weniger hell — eben ausserhalb der seitlichen Begrenzung derselben über den benachbarten Weichtheilen des Halses, wo seine Gegenwart, wie früher bemerkt, die Bestimmung der medialen Grenze des Schallgebietes der Lungenspitze erschweren kann, und — noch etwas mehr abgeschwächt — bei der Perkussion auf den Dornfortsätzen der drei untersten Hals- und der drei obersten Brustwirbel.“ Ich kann nun dieser Darstellung nicht zustimmen. Besonders, wenn man von den unteren Brustwirbeln nach oben zu perkutirt, hört man deutlich, dass auch die höheren Brustwirbel Lungenschall geben, nur dass von der Trachea her der Beiklang nach oben zu immer intensiver wird. Der siebente Halswirbel verhält sich fast genau so, wie die höheren Brustwirbel. Vor allem ist es aber ganz unzweifelhaft, dass der Schall auf den Halswirbeln ein ganz anderes Timbre hat, wie die oberen Brustwirbel. Ersterer ist fast der gleiche, nur natürlich etwas gedämpft, wie auf der Trachea, letzterer ist durchaus verschieden und so eigenartig, dass wir ihn unbedingt unserem Gehör einprägen müssen. Durch drei Faktoren wird hier die Schallqualität bedingt: erstens durch den Knochen-, dann den Lungen- und schliesslich den Trachealschall. Ueber die Eigenart des Knochenschalls schreibt Edlefsen: „Knochen und Knorpel für sich perkutirt, geben wegen ihrer grösseren Festigkeit und besseren Schwingungsfähigkeit, welche sie befähigt, ihre Schwingungen der umgebenden Luft mitzuthellen, einen besonderen Schall, der weit lauter erscheint, als der Schenkel-schall, aber, soweit sie Theile der Wandungen der Körperhöhle bilden, beeinflussen sie den Schall der in diese eingeschlossenen Organe nur sehr wenig.“ Jedenfalls ist bei der Wirbelperkussion dieser Einfluss doch zu erkennen, besonders auf dem siebenten Halswirbel ist das deutlich. Ich habe mir den eigenartigen Knochenschall in folgender Weise zu Gehör gebracht und gleichzeitig die Bedeutung der Knochen als Schalleiter geprüft: Ich perkutire mit dem Knöchel des gekrümmten Zeigefingers direkt meinen eigenen Processus styloideus radii, während ich den Arm frei in der Luft halte und auf einem festen Boden stehe (es kommt nach meiner Erfahrung bei der Perkussion auch auf den Resonanzboden an) — dann indem ich den Ellenbogen auf eine unbelastete und schliesslich auf eine beschwerte Tischplatte stütze. Ich höre zuerst den gewöhnlichen dumpfen Knochenschall, dann einen hellen, schliesslich einen dumpfen Schall, fast wie beim direkten Klopfen auf die Tischplatte. Schon bei Gesunden können wir erkennen, dass die Schallqualität der Wirbelsäule sehr leicht durch die anliegenden Organe beeinflusst wird. Ein Beweis dafür sind Edlefsen's Erfahrungen bei der Nierenperkussion: „Die mediale Grenze der Nierendämpfung lässt sich der anatomischen Lage der

Nieren entsprechend in ihrer grössten Ausdehnung nicht durch die Perkussion nachweisen. Nur am unteren Ende findet man zuweilen zwischen der beiderseitigen Nierendämpfung ein helles Schallgebiet eingeschoben, welches unmittelbar mit dem auf dem Kreuzbein und den unteren Lendenwirbeln gewöhnlich vorhandenen helltympanitischen Schallgebiet zusammenhängt.“ (Edlefsen.) Der Grund für die Aufhellung des Schalles zwischen den Nierendenden ist also nach Edlefsen darin zu suchen, dass sie von der Wirbelsäule um circa 4 cm wegen der schrägen Stellung der Nieren abstehen, während das obere Ende nach den Angaben von Pausch nur 0,5 bis 1,5 cm von der lateralen Seite der Wirbelkörper entfernt ist. Unterhalb der Nierendämpfung giebt die Wirbelsäule bei der Perkussion den Darmschall, aber schon durch Obstructio alvi wird dieser Schall beeinflusst.

Zur Erklärung des hellen Schalles auf den oberen Brustwirbeln ist ein Vergleich mit dem Perkussionsergebniss auf dem Sternum wohl angebracht. „Man erhält auf dem Griffe, an dessen Innenseite theils luftleere Gebilde angelagert sind, theils auch der klanghaltig schallende Hohlraum der Luftröhre angrenzt, dennoch hellen, vollen, klanglosen Schall, allerdings etwas kürzer, als den der seitlich angrenzenden Theile.“ (Gerhardt.) „Daraus lässt sich folgern, dass das Brustbein eine eigenthümliche, an der ganzen Brustwand nur gerade diesem Organe zukommende Leitungsfähigkeit für Perkussionserschütterung besitzt.“ Gerhardt.) Nach meinen Erfahrungen ist die Wirbelsäule kein geringerer Schalleiter, wie das Sternum.

Zur Perkussion der Wirbelsäule muss die betreffende Person mit maximal gebeugtem Kopf (der VII. Halswirbel wird durch Palpation bei aufrechter Haltung bestimmt) und maximal gekreuzten Armen auf einer elastischen Unterlage sitzen. Ich perkutire entweder direkt mit dem Knöchel des gekrümmten Zeigefingers oder der Kuppe des Mittelfingers oder auf den unterliegenden Finger. Es muss vor allem vermieden werden, dass der Muskelrand mitgetroffen wird. Die Stärke der Perkussion ist ganz gleich wie auf der im gleichen Niveau liegenden Lunge. Bei übermässig fetten Leuten ist die Untersuchung ziemlich werthlos, da man zu stark perkutiren muss — bei mageren muss selbstverständlich leise, wie bei Kindern, perkutirt werden.

Ich habe vor circa 2 Jahren gefunden, dass bei der Lungenspitzen tuberkulose der Wirbelschall durch die Infiltration beeinflusst wird und durch weiter fortgesetzte Untersuchungen diesen Befund bestätigen können. Unzweifelhaft giebt die direkte Perkussion auf den Lungen früher die Diagnose der Spitzeninfiltration. Um ein Zeitmaass zu geben, wann eine Schalländerung der Wirbelsäule zu erwarten ist, möchte ich hier erwähnen, dass ich anfangs bei einseitiger Spitzenaffektion immer noch normalen Wirbelschall constatiren zu müssen glaubte; im Verlaufe der weiteren Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass schon bei verkürztem Schall — bevor es also zu einer ausgesprochenen Dämpfung auf einer Lungenspitze gekommen zu sein braucht — eine Dämpfung des Perkussionsschalles auf dem Wirbel, der mit der erkrankten Partie in gleichem Niveau liegt, zur Wahrnehmung kommen kann.

Die Intensität der Schalldämpfung auf dem entsprechenden Wirbel richtet sich nach der Ausdehnung der Infiltration in der Fläche — je weiter die Lungentuberkulose nach unten fortschreitet — eine desto grössere Zahl von Wirbeln wird in den Dämpfungsbezirk hineingezogen. Der VII. Halswirbel wird bei Erwachsenen zuerst gedämpft. Bei weit vorgeschrittener Erkrankung muss vorsichtig von den unteren normalen Wirbeln nach oben perkutirt werden. Bei anliegenden Kavernen ist noch grössere Vorsicht bei der Perkussion geboten — damit man die Erschütterung benachbarter Organe vermeidet und nur den gedämpft tympanitischen Schall der im gleichen Niveau liegenden Lungenpartie zur Wahrnehmung bringt.

Der Perkussionsschall auf dem Ligamentum supraspinale unterscheidet sich nur wenig von dem auf den Dornfortsätzen.

Einen wesentlichen Nutzen für die Praxis würde ich in folgenden Fällen von der Wirbelperkussion erwarten: Ausschlaggebend ist nur ein positiver Befund, d. h. der gedämpfte Schall auf den Wirbeln. Wenn sonst die Diagnose einer Heterotopie der Lungenspitze genügend begründet erscheint — müsste sie bei vorhandener Dämpfung der Wirbel fallen gelassen werden — sind beiderseits so gleichmässig geringfügige Veränderungen des Schalles, dass die Diagnose der Lungentuberkulose nicht genügend gesichert scheint, so wird bei gleichzeitiger

Dämpfung des entsprechenden Wirbels jeder Zweifel behoben. Wenn es sich nicht um Wirbelerkrankungen, Mediastinaltumoren, doppelseitige Spitzenpneumonie, Aneurysma etc. handelt, so ist die Schalldämpfung auf den obersten Wirbeln immer für Lungentuberkulose beweisend. Ein negativer Befund — also normaler Schall auf den Wirbeln — ist nie für die Diagnose ausschlaggebend, kann sie aber erleichtern.

Ich habe diese Untersuchungen in eigener Praxis und auf der inneren Abtheilung des Krankenhauses Friedrichshain in Berlin (dirigirender Arzt Herr Prof. Krönig) angestellt. Ich will auch an dieser Stelle Herrn Prof. Krönig für die lebenswürdige Ueberlassung des Materials und seine werthvollen Rathschläge meinen herzlichsten Dank aussprechen.