Aus der Anatomischen Anstalt zu Tübingen.

Über die Sinnesfelder und die Geschmacksknospen der Papilla foliata des Kaninchens.

Beiträge zur Teilkörpertheorie III.¹⁾

Von

Martin Heidenhain, Tübingen.

Hierzu Tafel XIX—XXV und 16 Textfiguren.

Inhalt:

	Seite
I. Theoretische Einleitung	366
a) Historisches und Stellung des Problems	366
b) Die Teilkörpertheorie auf dem Gebiete der Zellen- und Plasmalehre	372
c) Atomistik und Protomerentheorie	378
d) Aufstellung der allgemeinen Formel der Teilkörpertheorie	380
e) Anwendung der Theorie auf die plasmatischen Derivate der Zellen	382
f) Anwendung der Theorie auf Zellenkomplexe und gewebliche Kombinationen höherer Ordnung	388
II. Technik, Abbildungen und Literatur	392
III. Allgemeiner Teil der Untersuchung	397
1. Morphologie der Papilla foliata und der Geschmacksknospen .	397
2. Allgemeine Form und Konstruktion der Sinnesfelder	401
a) Die äussere Gestalt der Sinnesfelder	401
b) Das indifferente Zwischenepithel und die Art der Einsetzung der Knospen in das Sinnesfeld	402
3. Allgemeine Morphologie der Knospen	405
a) Morphologie der Geschmacksknospen und der Sinneshaare	405
b) Der zelluläre Aufbau der Knospen	408
c) Die Basalzellen	410
d) Die morphologische Individualität der Knospen	413
IV. Spezieller Teil der Untersuchung	414
1. Einführung	414
2. Die Topographie der Knospen im Sinnesfelde	416
a) Allgemeines über die Einteilung der Sinnesfelder in quer- liegende „Stäbe“ und über das Vorkommen mehrporiger Knospen	416

¹⁾ Mit Unterstützung der Königl. Württembergischen Staatsregierung
sowie der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
Archiv f. mikr. Anat. Bd. 85. Abt. I. 25

	Seite
b) Die Gliederung der Stäbe	422
c) Die Fächerstellung der Knospen	425
d) Die gesetzmässigen Variationen der Knospengestalt innerhalb der Stäbe	430
e) Einiges über die unregelmässig gebauten Strecken der Sinnesfelder	435
3. Spezielle Morphologie der mehrporigen Knospen	438
4. Feststellungen, welche sich auf den Teilungsakt beziehen	443
a) Teilungsformen der Knospen	443
b) Die relative Grösse der Knospen im Verhältnis zum Teilungsakte	447
V. Übersicht über die wesentlichen Ergebnisse	454
VI. Theoretische Folgerungen	458
a) Die biogenetische Natur der einfachen Knospen	458
b) Der Teilungsvorgang	460
c) Biogenetische Natur der mehrporigen Knospen	461
d) Systemvergleichung bei Zotten und Geschmacksknospen	463
e) Die homologen Reihen. Fortsetzung der Systemvergleichung	465
VII. Schlusswort	468

I. Theoretische Einleitung.

a) Historisches und Stellung des Problems.

In der nachfolgenden Arbeit habe ich es unternommen, die Geschmacksknospen in der Papilla foliata des Kaninchens unter dem Gesichtspunkte der Teilkörpertheorie von neuem zu untersuchen. Es hat sich dabei gezeigt, dass bisher nur ein kleiner Teil der Daten bekannt war, welche die spezielle Morphologie der Knospen selbst und ihre Anordnung in den Sinnesfeldern betreffen.

Als ich an das Studium des allbekannten Objektes heranging, welches seit annähernd 50 Jahren bis in die neueste Zeit hinein (H. von Wyss, 1869, 1870; Retzius, 1912) immer wieder bearbeitet worden ist, hatte ich keineswegs erwartet, dass eine abermalige Beschäftigung mit dem Gegenstande sofort eine Fülle von neuem Beobachtungsmaterial ergeben würde. Diese Erfolge verdanke ich einerseits einer konsequenten Technik, andererseits den neuen Gesichtspunkten, welche in Anwendung gebracht wurden, und ich glaube, der Leser wird sich an der Hand der vorliegenden Arbeit davon überzeugen, dass die Teilkörpertheorie, besser: synthetische Theorie des tierischen Körpers, bei der Auffindung neuer Daten als „Arbeitshypothese“,

wie man zu sagen pflegt, vorzügliches leistet. Dies hatte sich eigentlich schon bei Gelegenheit meiner Arbeit über die Dünndarmzotten (1911) gezeigt, tritt aber hier noch deutlicher hervor. Wenn später meine seit Jahren in Gang begriffenen Arbeiten über die Darmdrüsen und Zungenpapillen fertig vorliegen werden, wird für jedermann klar erkenntlich sein, dass es mir nach langen zielbewussten Bemühungen gelungen ist, in ein vollkommen neues Arbeitsfeld einzudringen, welches uns gestattet, das Werk Schwanns und Remaks, die theoretische Begründung der Anatomie, in gerader Linie fortzusetzen. Leider ist heutzutage das Interesse für die theoretischen Fragen der Morphologie sehr gering; wer sich damit nicht befassen will, der überschlage die beiden theoretischen Abschnitte meiner Arbeit, die Einleitung und das Schlusskapitel, und begnüge sich mit der Lektüre der histologischen Schilderungen im Hauptteile.

Zweimal an verschiedenen Stellen habe ich eine Übersicht über die Teilkörpertheorie gegeben (Plasma und Zelle I, S. 82 ff., Anat. Anz., Bd. 40, S. 102 ff.) und auch auf dem Anatomenkongresse zu München 1912 in öffentlicher Rede den ganzen Umfang der Theorie entwickelt.¹⁾ Trotz dessen musste ich mich entschliessen, an dieser Stelle meine Anschauungen noch einmal übersichtlich zu entwickeln, da dieselben eine genügende Publizität noch nicht besitzen. Dabei kommt es mir darauf an, die Fragestellung und ihren Gültigkeitsbereich in möglichst deutlicher Weise festzulegen.

Die Teilkörpertheorie und ihr Komplement, die Theorie der morphologischen Reihen, will eine allgemeine Theorie der Organisation sein. Sie beschäftigt sich demgemäss mit dem Bauplan der tierischen Geschöpfe und sucht die Grundgesetze der Organisation festzustellen, welche nach unserer Auffassung in allen Teilen des Körpers, in den gröberen und feineren Gliederungen desselben, immer wieder von neuem zum Ausdruck kommen müssen. Seit dem Zellenwerk Schwanns (1839) und seit Haeckels „Genereller Morphologie“ (1866) ist nur noch einmal etwas Ähnliches unternommen worden, nämlich in dem Buche von Wiesner über „Die Elementarstruktur und das Wachstum der lebenden Substanz“ (1892). Was dieses Werk an bleibenden

¹⁾ Das von mir in München erstattete Referat ist aus äusseren Gründen bisher noch nicht zum Druck gekommen.

Werten enthielt, das habe ich, zunächst ohne Kenntnis der Wiesnerschen Vorarbeiten, in den Jahren 1899—1901 aus der Struktur der Zelle und besonders der Muskelfaser von neuem abgeleitet und späterhin zu einer allgemeinen Theorie der Organisation erweitert, welche in meinem Werke über „Plasma und Zelle“ als Grundlage der Darstellung verwertet wurde.

Das Bemerkenswerte an der wissenschaftlichen Situation auf dem Felde der theoretischen Anatomie ist der vollkommene Mangel an durchgreifenden, allgemein verwertbaren Gesichtspunkten. Denn die Schriften Schwanns, Haeckels, Wiesners, deren wir soeben gedachten, haben nur einige Fragmente einer künftigen allgemeinen Theorie der Organisation geliefert. Schwann übertrug die Zellentheorie der Gewebe von den Pflanzen auf das Tierreich und kam der Theorie vom Zellenstaate nahe, welche wenig mehr als ein blosses Symbol für die Verfassung des tierischen Körpers ist, auch, weil im Grunde genommen auf dem Prinzip der physiologischen Werkthätigkeit basierend, nicht direkt auf morphologische Verhältnisse anwendbar erscheint. Wiesner, auf den wir später noch Bezug nehmen werden, hatte die Organisation der Zelle und der Plasmastruktur zum ersten Male richtig begriffen und hat somit einen sehr wertvollen Beitrag zur Erkenntnis des Bauplanes lebendiger Wesen geliefert; aber der Autor scheiterte meiner Auffassung nach in dem Momente, als er das von ihm besprochene Prinzip der Teilkörpertheorie von der Zelle auf die Gewebemassen der pflanzlichen Organe zu übertragen versuchte. Es gelang diesem Gelehrten also nicht, die Grundbegriffe der Organisation, welche er von dem Zelleninhalte abgeleitet hatte, auf die gröberen Gliederungen des Pflanzenkörpers in Anwendung zu bringen. Eben auf diesem Gebiete, zwischen der Zelle einerseits und dem Körperganzen andererseits, hat Haeckel von vergleichend-anatomischer Grundlage ausgehend ungemein wichtige Vorarbeiten zu einer allgemeinen Theorie der Organisation geliefert, indem er die in dem gedachten Bereiche tatsächlich bestehenden gesetzmässigen Gliederungen durch Unterscheidung einer aufsteigenden Reihe morphologischer Individualitäten zu erfassen suchte. Es ist für mich unbedingt notwendig, bei letzterem Gegenstande zu verweilen, weil ich in der vorliegenden Arbeit abermals den Versuch mache, die in Frage stehenden gröberen Gliederungen des Körpers unter

denjenigen allgemeinen Gesichtspunkten der Organisation, welche sich aus der Zellen- und Plasmalehre ergeben haben, zu betrachten, wobei sich herausstellen muss, ob diese Bestrebungen mit dem andersartigen Vorgange Haeckels in irgendeiner Weise zusammentreffen. Wir unsererseits setzen voraus, dass eine richtig abgeleitete Theorie der Organisation in ihren obersten Gesichtspunkten gleicherweise auf den Zellinhalt wie auf Zellen- bzw. Gewebekomplexe anwendbar sein muss.

Die von Haeckel aufgestellte Reihe der morphologischen Individualitäten, Zellen, Organe, Antimeren, Metameren, Personen und Stöcke, enthält, wie man sieht, gewisse morphologische Formstücke in aufsteigender Grössenordnung und von wachsender Komplikation der Zusammensetzung; ebenso ist erkenntlich, wie der Autor den Bauplan des tierischen Körpers in besonderer Abhängigkeit von der Onto- und Phylogenese dachte und dass seine Reihe einer in idealer Weise vorgestellten Entwicklungsfolge entspricht. Selbstverständlich liegt mir ferne, die Berechtigung der Haeckelschen Aufstellungen nach so langen Jahren im einzelnen zu prüfen, vielmehr kann es nur darauf ankommen, festzustellen, was der Autor theoretisch beabsichtigte.

Offenbar nun gingen die Intentionen Haeckels dahin, in jener Reihe zum Ausdruck zu bringen, dass der fertige Körper ein vielfach in sich zusammengesetztes Gebilde ist und viele bestimmt begrenzbare Formwerte verschiedener Grössenordnung enthält, welche zueinander in besonderen Verhältnissen der Neben-, Über- und Unterordnung stehen, und dass diese alle als morphologische „Individualitäten“ verschiedener Ordnung angesehen werden müssen, welche vermutungsweise, wie die Reihe andeutet, in einer bestimmten Beziehung zur aufsteigenden Linie der Stammesgeschichte stehen. Dabei war Haeckel der Ansicht, dass je die nächst höhere Individualitätsstufe aus der niederen durch einen Akt der Zusammenschaarung oder Gemeindebildung entsteht, welcher in einigen Fällen, z. B. beim Übergang von der Zelle zu den Organen, von den Personen zu den Stöcken, deutlich als Kolonisation, d. i. Fortpflanzung der Individuen der niederen Ordnung durch Teilung oder Knospung nebst systematischer Vereinigung der Nachkommen in einem Verbandsverbande oberer Ordnung, kenntlich wird. Letzteres zu erwähnen, war notwendig, weil die Teilkörper-

theorie von dieser Vorstellung ebenfalls Gebrauch macht und demzufolge mit der Haeckelschen Theorie in einem wichtigen Punkte sich berührt.

Haeckel suchte also den Bauplan aus den Verhältnissen der Entwicklung heraus zu begreifen und dies ist m. E. auch der richtige Weg. Die praktische Zergliederungskunst der systematischen und ebenso der mikroskopischen Anatomie führt uns in einer Richtung abseits von dem Wege der theoretischen Erkenntnis des Wesens der Organisation; denn wir verfahren auf dem Boden dieser Disziplinen lediglich analytisch und zerfallen auf diese Weise den Körper in eine Summe von Organsystemen, Organen, Geweben und von „elementaren“ Formbestandteilen. Die Gesichtspunkte der Untersuchung sind in diesem Falle teils solche der Technik, teils solche der Funktion. So wird das entwicklungsphysiologisch Zusammengehörige auseinander gerissen und es können dabei die wichtigsten zum Bauplan des Körpers gehörigen Gliederungen völlig in den Hintergrund treten. So wird beispielsweise die Metamerenbildung des Rumpfes in den meisten anatomischen Lehrbüchern nur nebenher erwähnt, anstatt ausführlich behandelt zu werden. Demgegenüber ist es notwendig, ausdrücklich hervorzuheben, dass der Prozess der Entwicklung, durch welchen die erblich gegebene Anlage des Bauplanes realisiert wird, in keiner Hinsicht analytisch verläuft wie unser Verfahren der systematischen Zergliederung; vielmehr handelt es sich um einen aufbauenden, schöpferischen, um einen synthetisch wirkenden Akt. Denn während der Entwicklung werden zwar eine Unmasse von einzelnen Formbestandteilen des Körpers fortwährend neu erzeugt, sie werden jedoch gleichzeitig fortwährend zu höheren Verbänden synthetisch assoziiert, welche übrigens, um es gleich zu erwähnen, nicht notwendig mit den Organen der physiologischen Werkstätigkeit identisch zu sein brauchen (z. B. Metameren).

Kehren wir zu der Haeckelschen Reihe zurück, so ist allgemein anerkannt, dass mit der Aufstellung der Antimeren und Metameren als besonderen Formstücken des tierischen Körpers ein wichtiger Fortschritt in der Erkenntnis des Bauplanes tierischer Geschöpfe erreicht wurde; diese Unterscheidungen sind jedenfalls für die vergleichende Anatomie und Embryologie von ausserordentlicher Bedeutung gewesen. Man könnte auch die besondere

Form, welche der Autor seiner Reihe gegeben hat, als ein glückliches Beispiel der theoretischen Spekulation auf diesem Felde im allgemeinen akzeptieren, jedoch befindet sich an einer Stelle derselben — selbst im Sinne Haeckels betrachtet — eine offenbare Lücke, nämlich an der Stelle der Organe. Denn der Organbegriff ist lediglich physiologischer, nicht morphologischer Natur und so gehören die Organe nicht hierher.

An dieser Stelle der Reihe, zwischen den Zellen einerseits und den Antimeren, bezw. Metameren andererseits, befinden wir uns auf dem Felde der Gewebelehre oder der mikroskopischen Anatomie und an dieser Stelle sind durchgreifende Regeln der Organisation, bezw. Gesetze der Formbildung bis jetzt nicht aufgefunden worden. Für dieses Manko scheint niemand die richtige Empfindung gehabt zu haben; nur Kölliker weist in seiner Gewebelehre (letzte Auflage, S. 1—3) ausdrücklich darauf hin, dass die „Histologie“ noch nicht zur Aufstellung auch nur eines einzigen wirklichen Gesetzes gekommen ist. In der Tat hat die mikroskopische Anatomie nur Einzelheiten kennen gelehrt und sie muss daher, wenn sie einen Knochen, einen Muskel, eine Drüse beschreibt, immer wieder von vorne anfangen, weil der Vergleich dieser Organe bis jetzt eigentlich nichts Übereinstimmendes ergeben hat, — natürlich mit Ausnahme der allgemeinen entwicklungsgeschichtlichen Beziehung auf die Zelle.

Fassen wir dem Sinne nach zusammen, was wir über unser Problem bisher gesagt haben, so ist es das folgende.

Die systematische Anatomie und die ihr angeschlossene mikroskopische Anatomie gehen bei ihren Untersuchungen lediglich analytisch, auflösend vor, also etwa wie der Chemiker durch Analyse die Elementarbestandteile irgend eines gegebenen Stoffes bestimmt. Daher auch ist die sogenannte „Histologie“ ihrem Ursprunge nach nichts anderes als die „Lehre von den elementaren Formbestandteilen“ (siehe z. B. die Einleitung in Leydigs Gewebelehre). Jedoch aus blosser Analyse kann eine theoretische Anatomie nicht hervorgehen. Es muss eine synthetische Arbeit nachfolgen, welche untersucht, in welcher Weise die bereits ermittelten Elementarbestandteile sich zu Systemen oberer Ordnung vereinigen; also etwa, um bei dem Vergleich mit der Chemie zu bleiben, wie

der Chemiker, wenn er die Elementarstoffe irgend eines chemischen Körpers ermittelt hat, auch die synthetische Formel desselben, seine bestimmte gesetzmässige Verfassung, zu bestimmen sucht. Von diesen besonderen genetischen Verfassungen, welche in den mannigfachen Gliederungen des Körpers enthalten sind, wusste man bisher so gut wie nichts. Man glaubte mit dem analytischen Teile der Untersuchung das Problem der Struktur, der Organisation, erledigt zu haben. Dies ist jedoch nicht der Fall. Denn die Entwicklungsgeschichte ist ein synthetischer Akt und schafft Gliederungen von aufsteigender Grössenordnung mit besonderer synthetischer Formel, welche nunmehr zu ermitteln ist. Diese in Frage stehende Verfassung der körperlichen Verbände oder morphologischen Formstücke ist meines Erachtens nicht schlechthin physiologischer Natur, wie dies die Theorie vom Zellenstaate annahm, sondern sie liegt auf der Seite der Entwicklungsphysiologie, d. h. alle wahren Formwerte sollten als genetische Systeme begriffen werden.

Im Laufe der Zeit müssen wir dem gegenwärtigen Mangel einer theoretischen Ordnung des anatomischen Materials abzuhelpen suchen. Wir müssen eine einheitliche, eine genetische, eine synthetische Strukturtheorie fordern, welche die Organisation des Plasmas, der Zellen, der Gewebe, Organe und der Körperabschnitte gleicher Weise umfasst. Eine solche theoretische Vorstellung kann sich naturgemäss nur in einem sehr allgemeinen Rahmen halten, weil alle tatsächlichen Verhältnisse der Organisation allüberall spezifischer Natur sind und aus diesem Grunde an allen Orten voneinander differieren. Die wesentliche und nächste Aufgabe muss sein, allgemeine Gesichtspunkte namhaft zu machen, welche uns gestatten, alle Strukturteile und Komplexe, die uns den Eindruck von bestimmten Formwerten niederer oder höherer Ordnung machen, unter gemeinschaftlichem Gesichtswinkel zu betrachten und die Gesetze ihrer Entstehung sowohl wie die ihrer Kombination in Parallele zu bringen. Dies soll uns die Teilkörpertheorie leisten, deren Ergänzung die Theorie der Reihen ist.

b) Die Teilkörpertheorie auf dem Gebiete der
Zellen- und Plasmalehre.

Die Teilkörpertheorie ist in ihrer ersten Begründung bei Wiesner und ebenso bei mir aus der Betrachtung der Ver-

hältnisse der Organisation der plasmatischen Körper entsprungen. Durch den historischen Prozess der Zell- und Plasmaforschung seit den dreissiger Jahren des vorigen Jahrhunderts ist nämlich klargelegt worden, dass die vom Gröberen zum Feineren fortschreitende Analyse des Zellinhaltes doch eigentlich immer wieder zu dem gleichen allgemeinen Resultate gekommen ist; denn es wurden zwar immer wieder neue und immer wieder kleinere Formbestandteile der Zelle entdeckt, diese stellten sich aber in allen Fällen, sobald die Untersuchung auf diesen Punkt hin gerichtet wurde, als Körper heraus, welche durch spontane Selbstteilung fortpflanzbar sind (Kern, Chromosomen, Chromiolen, Centren, Centriolen, Fibrillen und Säulchen der Muskulatur, Neurofibrillen, Plasmafasern der Epidermiszellen, Stärkebildner, Chlorophyllkörper und andere Farbstoffträger, Chondriosomen, Golgischer Apparat und dessen Untersysteme, die sogenannten „Dittosomi“ von Perroncito).¹⁾ Ist also die Zelle selbst als ein

¹⁾ Die genaueren literarischen Nachweisungen über die teilbaren Untersysteme der Zelle gedenke ich an anderem Orte in übersichtlicher Darstellung zu geben, da es an einer solchen Zusammenfassung bisher fehlt. Schon der historische Fortgang der Entdeckungen auf diesem Felde ist von grossem Interesse; so war zum Beispiel die Fortpflanzung der Chlorophyllkörper durch Teilung schon in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bekannt. Über die Fibrillen und Säulchen der Muskulatur siehe meine neueste Arbeit, dieses Archiv, Bd. 83, 1913, S. 427 ff.; über die Neurofibrillen siehe „Plasma und Zelle“, Bd. II, S. 862, 866, 934, über die Plasmafasern der Epidermis ebendasselbst S. 962 ff., über den Golgischen Apparat siehe die Arbeit von Perroncito (1910). Neue Untersuchungen wären nötig über die Elementarkörperchen des Chromatins und des Tigroids (Cytochromatins), welche aller Wahrscheinlichkeit nach mit den Centriolen zusammen in die gleiche Ordnung der Teilkörper gehören. Die Frage der Vermehrung der Drüsengranula ist leider noch nicht definitiv erledigt. Nunmehr leiten sie die meisten Autoren von den Chondriosomen ab. Demgegenüber halte ich noch immer an meiner früheren Ansicht fest, dass die Granula von besonderen kleinsten teilbaren Anlagen abstammen. In dieser Beziehung möchte ich besonders hervorheben, dass Mislowsky auf unserem Institute versucht hat, die Pankreaszelle durch Anwendung des Pilokarpins vollständig zu evakuieren, was ihm indessen in keinem Falle gelungen ist: immer blieben aller kleinste Drüsengranula in der dem Lumen zugewandten Zone zurück (l. c. S. 418), wo sie in sehr dichter Lagerung beisammen lagen. Von diesen könnte die Regeneration der Granula ihren Ausgang nehmen. — Schliesslich möchte ich noch erwähnen, dass man auf botanischem Gebiete eine Zeitlang die Vakuolen bzw. deren Häute als durch Teilung fortpflanzbare Gebilde angesehen hat (Tonoplasten, de Vries).

Teilkörper zu bezeichnen, so besteht sie doch wiederum aus einer Anzahl von Untersystemen, welche zum Teil in verschiedenen Ordnungen sich aufbauen und alle abermals als Teilkörper anzusehen sind — zuzüglich einer plasmatischen Grundmasse, welche optisch nicht mehr analysierbar ist. Soweit das Tatsächliche. Nun sind wir mit der Erforschung der Zell- und Plasmastruktur freilich noch lange nicht am Ende. Jedoch können wir theoretisch folgern, dass durch den, wie angedeutet, im allgemeinsten Endresultat immer wieder übereinstimmenden historischen Progress der Entdeckungen das Prinzip der Organisation der plasmatischen Körper bereits zum Vorschein gebracht worden ist, und dass somit jene empirischen Teilkörper, welche bisher nicht weiter auflösbar waren, ebenso wie die Grundmasse der Zelle selbst, schliesslich ganz und gar aus unsichtbaren metamikroskopischen Teilkörpern kleinster Art, den Protomeren meiner Nomenklatur, bestehen müssen. Dieser Schluss wird zwingend durch die seinerzeit schon von Wiesner beigebrachte Überlegung, dass die praktisch immer wieder und wieder beobachtete spontane Teilbarkeit der geformten Zellbestandteile bei einer weiteren Verfolgung der Strukturen in der Richtung der abfallenden Grössenordnungen schliesslich ein ganz bestimmtes Ende haben muss. Dieses kann nur bei solchen Bauteilchen des Plasmas liegen, welche noch als lebend, als plasmatisch im engeren Sinne bezeichnet werden müssen, und welche demgemäss theoretisch als kleinste, elementare Formwerte zu gelten haben. Eine künstliche chemische oder physikalische Aufspaltung dieser Teilchen würde nur noch Bruchstücke des Plasmas liefern.

Damit kommen wir zu einer wahren Theorie der Elementarorganisation, welche ein dringendes Bedürfnis der allgemeinen Anatomie war, und welche auf diesem Felde dieselbe Rolle zu spielen berufen ist, wie die Molekular- und Atomentheorie auf dem Gebiete der Physik und Chemie.

Ich halte mich also betreffs der Theorie der Zelle und des Plasmas keineswegs an die Einzelheiten der sinnenfälligen Struktur verschiedener Objekte, wie sie in den bekannten Theorien von Flemming, Bütschli und Altmann zur Verwendung kamen, sondern an die entwicklungsphysiologische Tatsache, dass die geformten Organellen der Zelle auf Selbstteilung regulierte

Systeme sind, welche, wenn sie weiterhin auflösbar waren, abermals in teilungsfähige Untersysteme sich zerlegen liessen. Diesen stufenförmigen Aufbau der Zelle und ihrer Derivate in Teilkörpersystemen niederer und höherer Ordnung halte ich für das allein Wesentliche, und demgemäss habe ich schon vor einigen Jahren den Typus dieser Art von Organisation durch eine bildliche Aufrechnung in Form einer schematischen Tafel zum Ausdruck zu bringen versucht (siehe *Anat. Anz.*, Bd. 40, S. 142, 1911).¹⁾

Weiterhin habe ich mich bemüht, zu zeigen, dass diese Auffassung von der Organisation der plasmatischen Körper keineswegs als eine blosse Hypothese aufgefasst werden darf. Zu diesem Behufe habe ich darauf hingewiesen, dass diese im Laufe langer Jahre sich immerfort wiederum erneuernde Entdeckung von der spontanen Fortpflanzbarkeit der plasmatischen Organellen nichts weiter ist als eine durch die Geschichte unserer Wissenschaft sich immerwährend wiederholende Bestätigung eines obersten Erfahrungssatzes der Biologie, nämlich des Satzes, dass Leben nur von Leben stammen kann (*Omne vivum ex vivo*). Da nämlich das Leben keine Kraft ist, welche eingehaucht oder fortgeleitet werden kann, sondern ein auf Selbstunterhaltung gehender Prozess, welcher an die lebendigen Systeme gebunden ist, so müssen, wenn Leben nur durch Erbschaft erworben werden kann, die dem Leben zugrunde liegenden physischen Systeme besonderen Akten der Fortpflanzung unterliegen, durch welche das Leben übertragen und eine Nachkommenschaft gleicher Art erzeugt wird. Wenn also unsere Theorie der Organisation aussagt, dass die plasmatischen Gebilde sich ausschliesslich aus den Teilkörpersystemen verschiedener Ordnungen zusammensetzen, welche allesamt zuletzt aus den unter sich wesensgleichen Protomeren bestehen, so stützt sie sich zugleich auf den erwähnten obersten Grundsatz der Biologie, dass Leben von Leben stammen muss und dass demzufolge auch alle Organisation in der Onto- und Phylogenese nur durch die besonderen Akte der Vervielfältigung der lebendigen Systeme übertragen wird.

¹⁾ Diese Tafel ist gewiss verbesserungsfähig und soll auch nur der vorläufigen Übersicht dienen. Auf der Anatomenversammlung zu München habe ich die Tafel bereits in abgeänderter Form zur Vorführung gebracht.

Ein Wachstum „undifferenzierter“ Plasmamassen bzw. der Grundmasse der Zellen ist daher nur denkbar durch Akte innerer Teilung, nämlich durch spontane Teilung der kleinsten Lebenseinheiten oder Protomeren. Die reale Existenz der letzteren lässt sich jedoch nicht allein im Zusammenhange mit dem Satze von der „Kontinuität des Lebens durch Teilung lebendiger Systeme“ aus dem besprochenen Organisationsprinzip der Zelle allgemein herleiten, sondern es existieren noch eine weitere Reihe von Möglichkeiten, ihr wirkliches Vorkommen aus den speziellen Verhältnissen der Plasmastruktur¹⁾ sowohl wie aus den Tatsachen der primitiven Formbildung und der Bewegung bei den mobilen Plasmen auf direktem Wege darzutun. Hierauf kann ich an dieser Stelle nicht näher eingehen und muss mir eine zusammenfassende Begründung der Lehre von der Elementarorganisation für später vorbehalten. Jedoch weise ich erneut darauf hin, dass mein Werk über „Plasma und Zelle“ in allen Teilen der neuen Lehre entspricht.

Jedoch auch der Beweis aus dem allgemeinen Organisationsprinzip der Zelle lässt sich noch eindringender gestalten, als oben bereits geschehen ist, wenn wir die auffallende Erscheinung, dass wir in der Zelle einen stufenförmigen Aufbau der Teilkörpersysteme in niederen und höheren Ordnungen haben, benutzen, um daraus theoretisch eine Reihenbildung morphologischer Individualitäten zu konstruieren, durch welche die Logik der Tatsachen noch besser zur Darstellung gebracht wird. Hiermit gewinnen wir zugleich eine deutliche Berührung mit der von Haeckel bereits früher aufgestellten Stufenfolge organisierter Individuen.

In der Zelle selbst und in plasmatischen Körpern analoger Art, wie z. B. den Muskelfasern, ordnen sich die Teilkörper der verschiedenen Ordnungen deutlich in Stufen oder „Reihen“ an und zwar in der Weise, dass jedes höhere Glied der Reihe seiner Struktur nach als ein Verband von Teilkörpern niederer Ordnung dargestellt werden kann. Diese Reihenbildung ist komplexer Art und lässt sich am besten durch Aufzählung der teilbaren Individuen in einer entsprechend angelegten Tafel versinnbildlichen,

¹⁾ Vergl. unter anderem meine letzte Arbeit über die Entwicklung der Muskulatur der Forelle, S. 440 ff.

wie wir dies a. a. O. versucht haben (siehe die Arbeit über die Darmzotten, S. 142). Am leichtesten wird sie kenntlich beim Zellkern. Denn dieser ist zunächst selber ein Teilkörper, da er, auch abgesehen von der Mitose, durch direkte Teilung, z. B. während der Embryonalentwicklung der Muskulatur (Plasma und Zelle II, S. 554 f.), bis ins Ungemessene vermehrt werden kann. Weiterhin zerlegt er sich bei Gelegenheit der indirekten Teilung glatt in die abermals teilungsfähigen Chromosomen, welche bekanntlich ihrerseits aus einer formgebenden Liningrundlage, dem Lininfaden oder Linosoma, und den Chromiolen bestehen. Betrachten wir also die Sache recht, so ist es die spontane Spaltungsfähigkeit des Lininfadens, welche die Teilungsfähigkeit des Chromosoms bedingt bzw. in sich einschliesst; andererseits ist es kaum eine Frage, dass die Chromiolen ebenso teilbar sind wie etwa die Centriolen. Zu dieser Folge teilbarer Individualitäten

gehört als nächst übergeordnetes System die Zelle, nur dass diese zugleich noch viele andere, zum Teil deutlich in Reihen geordnete Teilkörper enthält. Aus dieser Form der Anordnung erklärt sich die von mir gewählte Nomenklatur, denn ich bezeichne die teilbaren Individuen als Histomeren bzw. als Histosysteme, zwei Ausdrücke, mit denen das relative Verhältnis der gegenseitigen Unter- oder Überordnung dieser Formwerte gekennzeichnet werden soll. Es ist also der Kern ein Histosystem im Verhältnis zum Chromosom und dieses ein Histomer des Kernes; ein Chromiol hinwiederum ist ein Histomer des Chromosoms, welches im Verhältnis zu ersterem als Histosystem erscheint.

Treten also in der Organisation der plasmatischen Körper derartige Reihen auf, so ist der Schluss nahezu zwingend, dass das Prinzip der Synthese der lebendigen Substanz in der Logik dieser Reihen enthalten ist und dass demgemäss das Ende der Reihe in der Richtung der abfallenden Grössen nicht dort liegt, wo das Mikroskop aufhört, analytische Daten zu liefern, sondern dass die Reihe ungeachtet der bestimmten Begrenzung unserer praktischen Erfahrungen in idealer Weise verlängert werden muss, bis ein *Ultimus terminus* der lebenden Substanz in Gestalt der kleinsten Lebenseinheit oder des Protomers erreicht ist.

Diese Schlussfolge ist dem Sinne nach diejenige Wiesners, und es ist somit in historischer Beziehung bemerkenswert, dass ich seinerzeit unabhängig von diesem Autor durch eine jahrelange sehr genaue Untersuchung der quergestreiften Muskelsubstanz in theoretischer Hinsicht zu dem gleichen Resultate kam.

c) Atomistik und Protomerentheorie.

Die älteren Gelehrten (Kölliker, Brücke etc.) waren mit den allgemeinen Ergebnissen der „Histologie“ nicht zufrieden. Bei der systematischen Zergliederung des Körpers war man zu allerhand „Elementarteilen“ gekommen, welche sich nicht weiter auflösen liessen und welche doch unter sich verschiedenartig waren. Solche „Elementarteile“ waren z. B. die Muskelfibrillen, die Sehnenfibrillen, die elastischen Fasern, ja, vielfach gingen sogar die Zellen unter dem Namen von Elementarteilen, und manche Autoren sprechen sogar noch heutzutage von „zelligen Elementen“, was einem Anachronismus gleichkommt.¹⁾ Als man später den Zellinhalt näher untersuchte, fand man in diesem allerhand Körnchen, Bläschen, Fäserchen, welchen man die Rolle von elementaren Strukturteilen zuzuschreiben sich gezwungen sah. Ein solcher Zustand der Gewebelehre erschien unerträglich, und er ist es auch tatsächlich. Man hoffte denn auch oder stellte sich vor, dass eine spätere Zeit das bis dahin einfach Erscheinende abermals auflösen und auf unter sich gleiche Elementarbestandteile zurückführen werde. Bei den grossen Erfolgen nun, die die Physik und Chemie seit den Anfängen des 19. Jahrhunderts gehabt hatten, bildete man sich ein, und sehr viele Gelehrte halten noch heute daran fest, dass es späterhin möglich sein werde, die Atomistik der exakten Wissenschaften auf die lebendigen Gebilde anzuwenden. Haben wir doch eine Entwicklung der biologischen Wissenschaften selbst miterlebt, welche mit Hilfe der Kolloidchemie das Rätsel des Protoplasmas zu lösen versucht.

Dieser Weg ist meines Erachtens zunächst nicht gangbar und führt bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse einstweilen nur zu Scheinerfolgen, denn die Methoden der Chemie sind auf den lebenden Körper nicht anwendbar, vielmehr könnte

¹⁾ Schleiden bezeichnete die Zelle als „organisches Molekül“.

eine Elementaranalyse des lebenden Stoffes im Sinne der exakten Wissenschaften nur auf dem Wege der ausgedehntesten Stoffwechselversuche am lebenden Objekte selbst zustande gebracht werden, wobei man freilich die Erfahrungen über die Konstitution der Eiweisskörper aushilfsweise mit verwerten müsste, um zu einer theoretischen Vorstellung über den atomistischen Aufbau der kleinsten Plasmamengen vorzudringen.

Diese so beschriebene Aufgabe ist aber eigentlich kaum noch eine Sache der Biologie, noch weniger der morphologischen Disziplinen. In der Biologie haben wir es nicht mit der Molekularstruktur, sondern mit den Verhältnissen der Organisation zu tun, also mit allen Arten der anatomischen Gliederungen bis herab auf die feinste Plasmastruktur. Ich halte es danach für verfehlt, wenn der Biologe sich darauf versteift, dass seine Grundsätze in den Lehrbüchern der Physik und Chemie enthalten sein müssen. Für richtig halte ich es vielmehr, wenn der Biologe immer wieder zum lebenden Körper zurückkehrt und diesen in eindringender Weise untersucht, um erstlich zu erfahren, was dem Leben in bezug auf Struktur und Funktion in besonderem Grade eigentümlich ist, und um dann schliesslich aus diesen Erfahrungen heraus eine Theorie der Elementarorganisation zu begründen; das wäre dann allerdings keine Theorie der atomistischen Konstitution, sondern eine Theorie der kleinsten Formwerte und der Gesetze ihrer Verbindung zu organisierten Systemen höherer Ordnung. Damit retten wir der Biologie ihr eigentümliches Feld und überlassen die definitive Analyse der kleinsten Formwerte einer Zusammenarbeit von Chemie, Physik und Physiologie.

Nach dieser Auseinandersetzung wird der von mir eingeschlagene Modus procedendi ganz und gar klar sein. Zur Begründung der Protomerentheorie habe ich mich an den obersten Erfahrungsgrundsatz der Biologie gehalten, welcher dahin lautet, dass das Leben nie von neuem entsteht, sondern, dass das Lebendige immer vom Lebendigen abstammen muss. Dieser Satz, wenn er auf die Lehre von der Organisation des Körpers übertragen wird, bedeutet, dass auch während der Entwicklung und Massenzunahme des Geschöpfes niemals ein lebendiger Teil, und sei er noch so klein, zwischen oder neben den vorher schon vorhandenen lebendigen Teilen unabhängig von diesen, gewisser-

massen auf dem Wege der *Generatio spontanea*, von neuem entstehen kann; sondern dass jedes überhaupt als lebend zu bezeichnende Teilchen sein Leben nur durch Erbschaft von einem Muttergebilde übernehmen kann.

Wird daher nach einer Theorie der Elementarorganisation gesucht, so muss gefolgert werden, dass die in Frage stehenden aller Organisation zugrunde liegenden Elementarkörperchen, weil sie in letzter Linie die Träger des Lebens sind, die Eigenschaft der Teilungsfähigkeit besitzen und durch dieselbe in allererster Linie charakterisiert sind. Hiermit stimmen dann, wie wir oben schon gezeigt haben, unsere praktischen Erfahrungen über die spontane Spaltungsfähigkeit aller wahren Zellorganellen in vollkommenster Weise überein.

d) Aufstellung der allgemeinen Formel der Teilkörpertheorie.

Fassen wir nunmehr, nachdem wir uns an dem Beispiel der Plasmastruktur näher exemplifiziert haben, den Inhalt unserer Theorie kurz zusammen, indem wir sie zugleich zu einer allgemeinen Theorie der Organisation erweitern.

Die Teilkörpertheorie — synthetische Theorie des tierischen Körpers oder Histomerentheorie — nimmt an, dass der gesamte Körper mit Einschluss des Zellinhaltes und der Interzellularsubstanzen sich in eine Stufenfolge morphologischer Individualitäten oder Systeme niederer und höherer Ordnung zergliedern lässt, welche allesamt nach irgend einem Prinzip der Entwicklung (Teilung, Knospung, Sprossung etc.) fortpflanzbar oder vermehrbar sind. Diese Formen der Vermehrung, welche im wesentlichen die nämlichen sind wie die Formen der Fortpflanzung freilebender Personen, sind zugleich gewöhnlicherweise das Mittel der aufsteigenden Kombination der Formwerte. Die Teilkörper oder Histomeren lassen sich demgemäss in natürliche Reihen von wachsender Grösse ordnen; in diesen sind die Histosysteme der oberen Ordnungen Verbände gleichartiger oder ungleichartiger Histomeren der niederen Ordnungen, welche eventuell abermals in gleicher Weise zerlegbar sind. Die Tatsache, dass alle eigentlichen genetischen Systeme nach besonderen Prinzipien der Entwicklung vermehrbar sind, hängt in letzter Linie mit dem Satz zusammen, dass Leben nur von Leben stammen kann;

denn da das Leben keine übertragbare Kraft ist, ist die Erhaltung desselben sowie auch die unmittelbare Übertragung jeder besonderen physischen Konstitution an die Vervielfältigung oder Fortpflanzung der lebendigen Systeme gebunden.

Zu diesen Sätzen erlaube ich mir noch die folgenden Erläuterungen zu geben.

Die Histosysteme waren bis jetzt am besten charakterisierbar, wenn sie das Vermögen der Teilung besaßen. Der Begriff der „Teilung“ passt aber nicht recht auf alle die verschiedenen Fortpflanzungsakte, welche an dieser Stelle eventuell in Betracht kommen können. Auch habe ich den Namen „Teilkörpertheorie“ ursprünglich nur gewählt nach dem Grundsatz: *a potiori fit denominatio*. Der Begriff der Teilung muss daher meiner Meinung nach möglichst weit genommen werden, nämlich einschliesslich der Vorgänge der Metamerenbildung, Knospung, Sprossung usw., welche eventuell als „Teilung in der Anlage“ gedeutet werden können, also einschliesslich aller Vervielfältigungsprozesse, welche so geartet sind, dass durch sie ein bestimmtes morphologisches Formstück in vielfacher Auflage erzeugt werden kann. Gegenüber dieser einstweilen etwas unsicheren Definition lege ich besonderen Wert darauf, das Folgende hervorzuheben.

Ich halte es für möglich, ja für sehr wahrscheinlich, dass in der Zukunft die gemeinten Histosysteme sich durch ein ganzes Bündel von Merkmalen noch besser werden charakterisieren lassen. Denn das Vermögen irgend eines beliebigen organisierten Systems, auf Grund eines identischen Prozesses der Entwicklung vermehrbar zu sein, beruht sicherlich in jedem einzelnen Falle auf einer bestimmten histodynamischen Verfassung des Systems oder seiner Anlage, von welcher auch andere wichtige Eigenschaften abhängig sein werden, z. B. das Vermögen der systematischen Regeneration. Auch setzt das Vermögen des spezifischen Wachstums und der Teilbarkeit voraus, dass die Histosysteme der verschiedenen Stufen zugleich trophische Systeme sind. Die besondere in Frage stehende Verfassung oder spezifische Regulation erhält jedes System durch entsprechende Akte der Entwicklung, welche schöpferischer Natur sind.

Weiterhin möchte ich von der entwicklungsphysiologischen Bedeutung der Teilkörperreihen reden. Der Übergang von irgend-

einem Gliede einer Reihe zu dem nächst übergeordneten entspricht nach unserer Meinung immer irgendeinem ontogenetischen (bezw. phylogenetischen) Vorgange der Entwicklung oder Differenziation. Im allgemeinen wird dieser Übergang zustande kommen durch Multiplikation der gegebenen Formwerte und Vereinigung oder Kombination derselben in einem Verbands oberer Ordnung. Dies Verhältnis ist am durchsichtigsten, wenn es sich um Kolonisation handelt, also z. B. wenn eine Zelle durch mehrfache Teilung eine Nachkommenschaft liefert, die in einem genetischen Verbande vereinigt bleiben. Aber nicht immer ist das Mittel der Kombination die reguläre äussere Teilung. Beispielsweise führen Knospung und unvollkommene äussere Teilung zur Bildung von Stöcken, während Akte innerer Teilung — also wenn äussere Sonderungen völlig ausbleiben — besonders in Verbindung mit geweblicher Differentiation in bezug auf die Entfaltung geweblicher Systeme von mannigfacher Wirkung sein können.

Die Unterscheidung von äusseren und inneren, vollständigen und unvollständigen Teilungsformen usw. ist gewiss sehr wichtig, jedoch ist es im Augenblick, wo es sich nur darum handeln kann, einen ungefähren Aufriss der Theorie zu erhalten, nicht nötig, allen diesen Einzelheiten nachzugehen. Erinnern möchte ich jedoch daran, dass noch Altmann glaubte, die Zelle sei durch äussere Teilung und Kolonisation kleinster Lebewesen entstanden, während es wohl sicher ist, dass sie durch innere Teilungsakte allmählich aus kleinsten Anfängen heraus sich entwickelt und durch besondere Differenzierung ihre gegenwärtige Komplikation erreicht hat.

e) Anwendung der Theorie auf die plasmatischen
Derivate der Zellen.

Nachdem wir die Histomerentheorie von der Organisation der Zelle abgeleitet und sie weiterhin dem Begriffe nach über das Körperganze ausgedehnt haben, ist es notwendig, in eine Prüfung darüber einzutreten, ob die Theorie für Systeme, welche komplexer sind als die Zelle selbst, tatsächlich noch Geltung hat. Diese Aufgabe gliedert sich in zwei Teile, nämlich 1. die Untersuchung der sogenannten Zellenderivate und 2. die Untersuchung der plurizellularen Komplexe.

Was die Derivate der Zellen anlangt, so gehören dazu auch die geformten Interzellulärsubstanzen, auf welche ich heute nicht näher eingehe; ich erwähne nur, dass ich zuerst die Bindegewebsfibrillen als Teilkörper angesprochen habe und zwar auf Grund ihrer Analogie mit den Muskelfibrillen. Im übrigen beschäftige ich mich in nachfolgendem ausschliesslich mit den metamorphotischen Umwandlungsformen der Zellen. Zu diesen gehören vor allem die quergestreiften Muskelfasern, weiterhin die ein- und vielkernigen Riesenzellen (Megakaryozyten und Ostoklasten) und schliesslich die Neuronen. Die Muskelfasern sind nun gewiss das hervorragendste Beispiel der vielkernigen Zellenabkömmlinge und sie verdienen eine paradigmatische Besprechung, weil sie am besten untersucht sind. Ihnen wären dann die Riesenzellen kurz anzuschliessen, deren Entwicklung, unter dem Gesichtspunkte der Histomerentheorie betrachtet, mit der der Muskelfasern in Übereinstimmung sich befindet. Jedoch die Neuronen verhalten sich abweichend und verdienen abermals eine ausführliche Besprechung.

Für mich ist gar kein Zweifel, dass alle mehrkernigen plasmatischen Formwerte unseres Körpers aus einkernigen Zellen auf dem Wege der inneren Teilung hervorgehen. Ich setze dabei voraus, dass es sich in diesen Fällen nicht nur um eine Kernvermehrung mit beliebiger Zunahme der Plasmamasse handelt, sondern um eine proportionale Vermehrung der Kern- und Zellsubstanz. Es würde hier also die R. Hertwigsche Kernplasmarelation als eine Ableitung aus der Histomerentheorie erscheinen, d. h. die Hertwigsche Regel würde in diesem Falle auf das allgemeine Gesetz des Wachstums und der Organisation vermöge des Mittels bestimmter Teilungsakte zurückgeleitet sein.

Wenn also der anfangs einkernige Myoblast der quergestreiften Muskelfaser wächst und dabei durch Amitose zweikernig wird, so würde das heissen, dass sich die gesamte lebendige Masse inzwischen durch einmalige innere Teilung verdoppelt hat, und eine Folge derartiger innerer Teilungen würde das fort dauernde Längenwachstum der Faser vermitteln (vergl. „Plasma und Zelle“, S. 550 ff.). Meiner Meinung nach ist es zweifellos, dass sich durch eine exakte Auszählung der Kerne und Ausmessung der zugehörigen Plasmavolumina der besprochene Vorgang würde

exakt nachweisen lassen; doch liegen derartige Untersuchungen bisher nicht vor, weil bisher kein Bedarf dafür vorhanden war. Das hier in Frage stehende Verhältnis der Proportionalität zwischen Kern und Plasma wird ja bei den mehrkernigen Symplasmen der Regel nach nicht direkt erkennbar sein, kommt uns aber sofort zum Bewusstsein, wenn die Masse sich abfurcht und in Zellen zerfällt. Da z. B. beim fötalen Herzen im Myokardium die Segmentgrenzen bisher nicht gefunden wurden, so würde eventuell das Auftreten der bekannten Schaltstücke einer sekundären Abfurchung der quergestreiften Masse gleichkommen, welche zuvor durch das Mittel innerer Teilungen sich vergrößert hatte.

Denken wir uns die verschiedenen Stadien der wachsenden Muskelfasern nach der Zahl der Kerne in eine Reihe zusammengestellt, so dass die Stufen mit einem, zwei, drei, vier Kernen usf. einander folgen, so haben wir nach meinem Ausdruck eine homologe oder homöotypische Reihe, d. h. es sind in dieser je die höheren Glieder die nach dem gleichen Typus gebauten höheren Homologen der niederen Glieder, bzw. jener einkernigen Zelle, von welcher die Entwicklung ausging. Derartige Reihen ergeben sich in allen Ordnungen der Histomeren, wenn das Wachstum des Systems lediglich durch einfache innere oder äussere, vollständige oder unvollständige Teilung erfolgt. Die oberen Glieder der Reihen sind in solchen Fällen wohl immer die natürlichen Vielfachen des Anfangsgliedes, ein Verhältnis, welches praktisch noch näher untersucht werden sollte.

Die Glieder der homologen Reihen habe ich bisher ohne weiteres als Teilkörper bezeichnet, obwohl man darüber streiten könnte, wenn sie z. B. nur durch innere Teilung wachsen. Über diesen Punkt will ich zurzeit eine Debatte nicht eröffnen, da es klar ist, dass sich die begrifflichen Fassungen später, wenn mehr Material vorliegt, viel schärfer und bestimmter werden geben lassen. Was die Muskelfasern anlangt, so kommt hinzu, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach als ein Ganzes durch äussere Längsspaltung vermehrbar sind, so dass sie auch auf dieser Basis als Histomeren bezeichnet werden könnten (über diese Frage siehe „Plasma und Zelle“ II, S. 659 ff.). Dieser Vorgang ist jedoch seit langen Jahren nicht mehr genau untersucht worden, so dass sich Zweifel an seinem wirklichen Vorkommen ergeben haben;

demgemäss wäre eine neue Bearbeitung dieser Frage dringendes Erfordernis.¹⁾

Ganz ähnlich wie bei den Muskelfasern liegt die Sache bei den einkernigen Riesenzellen des Knochenmarkes, welche von den Leukozyten her ihren Ursprung nehmen und vermöge interkurrenter multipler Mitosen wachsen. Mit der Mitose ist bekanntlich Wachstum, Massenzunahme der lebendigen Substanz, wenigstens in den gewöhnlichen Fällen, untrennbar verbunden und zwar gleicherweise beim Kern und beim Zelleib; werden doch die Tochterzellen der Regel nach den Mutterzellen völlig gleich. Unterbleibt nun die äussere Teilung, während die Mitose rückläufig wird, wie bei den einkernigen Riesenzellen, so bleibt doch das Wachstum der Kern- und Zellsubstanz bestehen, welches naturgemäss proportional sein wird, da bei der aus der Mitose zurückkehrenden Riesenzelle die Tochterindividuen gleichsam in sich verschmolzen bleiben. Also ergibt sich auch hier wiederum, dass die R. Hertwigsche Kern-Plasmaregel mit dem Prozess der inneren Teilungen im allerengsten Zusammenhang steht. — Weiterhin ist klar, dass man auch für diese Riesenzellen eine homologe Reihe würde aufstellen können, jedoch nur mit vieler Mühe und Arbeit, da die Bestimmung des Plasma- und Kernvolumens sowie die Auszählung der Centren, kurz die sichere Bestimmung bestimmter Entwicklungsstadien, ausserordentliche Schwierigkeiten machen würde. Jedenfalls aber sind diese Zellen im Sinne unserer Theorie die höheren Homologen der Leukozyten. Schliesslich verdient Erwähnung, dass sie nach

¹⁾ Die Angriffspunkte der Untersuchung sind in folgendem gegeben. Es kommen in den Muskeln der Säuger (*M. stylohyoideus*, *M. lumbricales*) schmale und breite Fasern vor, welche, obwohl die Kaliberverhältnisse im einzelnen ausserordentlich wechseln, typisch voneinander verschieden sind. Denn die schmalen Fasern zeigen die Kerne nur unter dem Sarkolemm, die breiten Fasern auch im Innern der Muskelsubstanz. Es liegt also die Vermutung nahe, dass die breiten Fasern ungespaltene Formen sind, da nämlich die embryonalen Fasern anfangs die Kerne im Innern zeigen; bei den schmalen Fasern hingegen könnte das geringere Kaliber und die oberflächliche Lage der Kerne auf die vorausgegangene Längsspaltung zurückgeführt werden. Die Grundfrage der Untersuchung würde mithin lauten: „Wie kommen die Kerne der embryonalen Faser an die Oberfläche, obwohl sie von einem dicken Mantel der kontraktile Substanz umgeben sind, und warum findet man bei einigen besonders breiten Fasern des fertigen Muskels die Kerne noch in zentraler Stellung?“

den Untersuchungen von Van der Stricht und mir der Amitose fähig, also als Ganzes, als System, durch äussere Teilung fortpflanzbar sind. Es entstehen mithin aus den Leukozyten durch innere Teilung deren höhere Homologen, welche sich wiederum als teilbare Histosysteme verhalten, kurz, wir haben eine vollständige Analogie zu den Muskelfasern.

Das Kapitel der Ostoklasten übergehe ich, um Wiederholungen zu vermeiden; auch sind sie zellulärhistologisch kaum untersucht, so dass sie für uns kein gutes Beispiel sein würden. Eine ungefähre Vorstellung über die Entstehung mehrkerniger Riesenzellen und ihr Wachstum durch innere Teilungen verschafft man sich einstweilen am besten durch das Studium der Arbeit Zawarzins über das Descemetsche Epithel, in welchem der Autor Riesenzellen beobachtete. Beim Rinde zeigten diese bemerkenswerterweise eine annähernde Übereinstimmung in den Zahlen der Centren und der Kerne.

Was die Neuronen anlangt, so bilden sie nur eine scheinbare Ausnahme unter den höheren Homologen der Zellen. Ihre biologische Natur habe ich a. a. O.¹⁾ genau besprochen, und klargelegt, dass sie nicht Zellen schlechtweg, sondern besondere Abkömmlinge von solchen sind. Hier kann ich passend hinzufügen, dass es sich in ihnen zweifellos um höhere Homologen der Zellen handelt.

Massgebend für die Beurteilung des Neurons ist, dass dasselbe keine konstante Grösse und kein konstantes Volumen besitzt, sondern dass die Neuronen mit wachsender Grösse der Person ebenfalls wachsen, also anders wie gewöhnliche Zellen und ähnlich wie die quergestreiften Muskelfasern. In „Plasma und Zelle“ (S. 870) habe ich dargelegt, dass bei sehr grossen Neuronen allein das Volumen der Achsenfaser wahrscheinlich das mehr als Hundertfache des Volumens der zugehörigen Nervenzelle, besser: des Neuroblasten,²⁾ ausmacht. Das Neuron reguliert also seine Grösse oder seine Längenausdehnung, bzw. sein Volumen in selbsttätiger Weise. Hierbei muss auffallen, dass die Plasma-

¹⁾ „Plasma und Zelle“ II. S. 868—882.

²⁾ Es ist ein Missbrauch, die kernhaltigen Teile der Neuronen als Nerven- oder Ganglienzellen zu bezeichnen, da die Achsenfaser einen integrierenden Bestandteil des Plasmaleibes des Neurons ausmacht. Nach meinem Vorschlage sollte man wie in der Embryologie so auch in der Histologie die

masse dem Volumen nach enorm zunehmen kann, während das Gebilde im ganzen einkernig bleibt, was scheinbar der R. Hertwigschen Regel von der Kern-Plasmarelation widerspricht. Aber nur scheinbar! Denn die ausschlaggebende Beobachtung liegt darin, dass das Tigroid nach Held ein Nucleoproteid, mithin eine „Kernsubstanz“ ist, welche man unserer Meinung nach am kürzesten und besten als ein „Cytochromatin“ bezeichnen würde. Da wir nun weiterhin durch viele und langjährige Untersuchungen zahlreicher Autoren und besonders Cajals genau wissen, dass eine strenge Relation zwischen der Menge des Tigroids oder Cytochromatins einerseits und der Länge der Achsenfaser, bezw. dem Plasmavolumen andererseits besteht, so sehen wir hier die Hertwigsche Regel unter einem neuen Bilde wiederkehren. Jene periodische Massenzunahme der lebendigen Substanz, welche durch aufeinanderfolgende Zellteilungen oder analoge „innere“ Teilungen bei anderen plasmatischen Systemen bewirkt wird, kann für das Neuron nicht in Betracht kommen. Denn die Neuronen wachsen während der Entwicklung langsam und in ganz kontinuierlicher Weise; dem entspricht dann eine ebenso langsame, kontinuierliche Zunahme des Cytochromatins, welches dort aufgestapelt wird, wo es Platz hat, nämlich im Plasmaleibe des Neuroblasten. Mithin sind wir berechtigt, auf Grund unserer theoretischen Darlegungen anzunehmen, dass das Wachstum der Neuronen ebenso durch innere Teilungsakte statt hat, wie die Massenzunahme anderer Homologen der einfachen Zellen, nur dass hier die Teilungsakte in kontinuierlichem Zuge an den Histomeren der niederen Ordnungen, den Elementarkörperchen des Tigroids einerseits und den Protomeren der plasmatischen Leibessubstanz andererseits zum Ablauf kommen.

In vorstehendem glaube ich gezeigt zu haben, dass die Histomeren-theorie auf die Verwandlungsformen der Zellen anwendbar ist. Letztere lassen sich auf die vorgeschlagene Weise zum ersten Male nach einem Prinzip unter Begriffe der allgemeinen Anatomie unterordnen, während sie aus dem bisherigen deskriptiven System der Histologie herausfielen.

kernhaltigen Abschnitte, von welchen die Achsenfasern ausgehen, als Neuroblasten bezeichnen. Durch eine verfehlte, bezw. überlebte Nomenklatur kann man den einfachsten Tatbestand in Verwirrung bringen, was besonders im Unterricht von ausserordentlichem Nachteil ist.

f) Anwendung der Theorie auf Zellenkomplexe und gewebliche Kombinationen höherer Ordnung.

Wir kommen nunmehr zur Besprechung der Frage, ob unsere Theorie auch auf Zellenkomplexe und gewebliche Systeme höherer Ordnung bezogen werden darf. Hier erst beginnen die eigentlichen Schwierigkeiten, da die spezifischen Vorarbeiten auf diesem Gebiete erst im Werden sind. Allein bei einiger Überlegung ist es möglich, mancherlei Tatsachen, welche bisher für unsere wissenschaftliche Erkenntnis von geringerer Bedeutung waren oder weniger gewürdigt wurden, ohne Zwang auf unsere Theorie zu beziehen.¹⁾

Hier erwähne ich zunächst die grosse Zahl von Verdoppelungen, Spalt- und Zwillingsbildungen, welche bei allen möglichen Organen und Teilen des tierischen Körpers gelegentlich auftreten. Diese Vorkommnisse weisen in jedem einzelnen Falle darauf hin, dass der betreffende Teil in der Anlage früher oder später teilbar war, dass wir also ein in der Anlage auf Teilung reguliertes System vor uns haben. Finger, Hände, Extremitäten treten gelegentlich doppelt auf; das Gleiche gilt von den Zähnen, der Gallenblase, dem Harnleiter usf. Die meisten der genannten Teile kommen naturgemäss auch als Spalt- oder Zwillingsbildungen vor, welche übrigens viel häufiger sind also totale Verdoppelungen. Sehr häufig sind z. B. gespaltene Rippen, Zwillings- und Drillingsbildungen der Nierenpyramiden, Leberläppchen mit doppelter Vena centralis und entsprechend grösserem Volumen, gespaltene Trachealringe und dergleichen mehr. Die meisten dieser Bildungen sind Abnormitäten, einige indessen sind normalerweise immer vorhanden, wie die Zwillings- und Drillingsbildungen der Leberläppchen beim Schwein sowie die der Lobi renales der Niere.

Der Fall der Niere, dessen kurze Besprechung von uns nicht übergangen werden kann, ist für uns von ausschlaggebender Bedeutung. Denn wir wissen genau, dass anfangs nur zwei, bzw. vier Nierenlappen angelegt werden und dass diese durch effektive Teilung auf acht bis zwölf vermehrt werden. Hierbei ist in ungemeinem Grade charakteristisch, dass viele der Lappen offenbare Zwillings- und Drillingsbildungen sind, hervorgegangen aus unvollkommener Teilung der betreffenden Systeme. An den Nieren mancher Tiere, z. B. des ausgetragenen Kalbes, kann man diese

¹⁾ Vergl. auch die Darstellung in „Plasma und Zelle“, I, S. 84 ff.

Verhältnisse in prächtiger Weise übersehen (Textfig. a und b). Gerne hätte ich mich mit der Entwicklung der Niere beschäftigt,

Fig. a.

Fig. b.

Fig. a und b. Rechte Niere eines ausgetragenen Kalbsfötus, a von vorn, b von hinten. Die Lobi renales sind durch tief einschneidende Furchen voneinander getrennt. Unter ihnen befinden sich viele Mehrlingsbildungen, Zwillinge, Drillinge usf., welche durch die Buchstabenbezeichnung kenntlich gemacht worden sind. Die Bezeichnungen sind in beiden Figuren identisch.

wenn ich Hoffnung gehabt hätte, hier in unserer kleinen Stadt das Material zusammenbringen zu können. Jedenfalls darf ich konstatieren, dass der Fall der effektiven Teilung komplexer geweblicher Systeme in der Ontogenese der höheren Geschöpfe vertreten ist.

Weiterhin erlaube ich mir kurz auf einen zweiten Kreis von Erscheinungen hinzuweisen, welcher in einer direkten Beziehung zur synthetischen Theorie der Organisation steht, selbst auf die Gefahr hin, dass die Tatsachen, auf welche ich im folgenden verweise, von seiten des Lesers geringer eingeschätzt werden. Zu den Kernpunkten meiner Theorie der Organisation gehört die Vorstellung, dass während der Entwicklung die Histomeren immer von neuem zu aufsteigenden Ordnungen assoziiert werden. Die Form der Assoziation ist meines Erachtens im Grunde genommen eine histodynamische, findet aber der Regel nach einen morphologischen Ausdruck in bestimmten Ordnungen und körperlichen Zusammenhängen der Teile. Dieser besonderen Form der Assoziation genetischer Systeme entspricht es auf der anderen Seite, dass sie gelegentlich unter bestimmten Bedingungen und zu bestimmten biologischen Zwecken auch wieder dissoziiert werden können, also ihren Zusammenhang verlieren. Wird eine solche Dissoziation tatsächlich beobachtet, so liegt die grösste Wahrscheinlichkeit vor, dass die selbständig gewordenen Teile im Sinne der Theorie als Histosysteme angesehen werden müssen, worüber in jedem fraglichen Einzelfalle noch weitere Untersuchungen anzustellen sein würden.

Wenn z. B. ein Gliederwurm („Plasma und Zelle“ I, S. 87 ff.) sich in seine Metameren zerlegt und diese dann als Keimkörper fungieren, so haben wir einen frappanten Akt der Dissoziation vor uns. Die Metameren, durch ein identisches Prinzip der Fortpflanzung oder Vermehrung erzeugt und durch Synthese zu einem Wurmkörper vereinigt, vermögen also, wenngleich in seltenen Fällen, sich wiederum voneinander zu lösen. Vergleiche auch die Entstehung und Befreiung der Proglottiden bei den Bandwürmern und die ungeschlechtliche Erzeugung der Discomedusen vermöge der Strobilation.

Zur Ergänzung des Gesagten bemerken wir kurz, dass das Phänomen der Dissoziation viel häufiger ist bei zelligen Geweben. Alle Fälle der Entstehung einzelliger Sporen durch nachträglichen Zerfall vegetativer Zellverbände gehören hierher

(Trennung der Zellen im Inneren der Sporangien bei den Farnen etc.). Weiterhin gehören m. E. im Bereich des Zellinneren bzw. der plasmatischen Substanzen die Erscheinungen der Einschmelzung oder Katachonie nach der begrifflichen Fassung, welche ich der Sache gegeben habe, ebenfalls hierher (siehe „Plasma und Zelle“ II, S. 1101). Denn bei der Einschmelzung protoplasmatischer Strukturteile, z. B. der Polstrahlen, oder mannigfacher äusserer Zellorganellen bei den Protisten, als da sind Pseudopodien, Cilien, Tentakel usf., werden nach unserer Auffassung die vorher miteinander in einem bestimmten Verbande assoziierten Protomeren voneinander dissoziiert und für andere Verwendung frei gemacht. Die eingeschmolzene Masse, welche des Plasmatransports fähig ist, nannte ich Hypoblem, den Aufbau innerer und äusserer Zellorganellen durch Synthese der Protomeren Epanorthose.¹⁾

Nach dieser Abschweifung über Dissoziation bei den Histosystemen der niederen Ordnungen kommen wir auf die komplexen geweblichen Systeme zurück. Um zum ersten Male auf diesem Felde eine einschlägige Arbeit zu liefern, habe ich mich vor einigen Jahren an die Untersuchung des Darmkanales herangemacht (s. d. Lit.-Verz.) und zunächst gezeigt, dass die Darmzotten zum mindesten in der Anlage teilbare Systeme sind. Bei einer Betrachtung *ex post* und auf Grund vieler neuer Serien halte ich es jedoch nicht für ausgeschlossen, dass bei dem riesigen Längenwachstum des Darmkanals noch nach der Geburt die Zahl der Zotten durch effektive Spaltung sich vermehrt, bzw. neue Zottenformen, nämlich die sogenannten flachen oder Duodenalzotten, durch Akte innerer Teilung sich erzeugen (vergl. das Weitere in der theoretischen Schlussübersicht).

Weiterhin ist es nach meinen bisherigen Nachforschungen im höchsten Grade wahrscheinlich, dass die Darmdrüsen durch Spaltung vom blinden Ende her der Zahl nach sich vermehren, solange der Darm an Oberfläche zunimmt. Bei dieser Untersuchung bin ich jedoch gelegentlich der definitiven Feststellung des Resultates auf unerwartete, sehr erhebliche Schwierigkeiten gestossen, so dass ich erst später ausführlich über diesen Gegenstand berichten kann.

¹⁾ Eine ausführlichere Darstellung der Erscheinungen der Dissoziation hoffe ich später a. a. O. zu geben.

Aus vorstehenden Betrachtungen und Erfahrungen geht nun zunächst soviel hervor, dass embryologische und anatomische Untersuchungen, welche sich auf die Teilkörpernatur komplexer geweblicher Systeme beziehen, alle Aussicht auf Erfolg haben. Jedoch, es geht aus meinen Erfahrungen ebenso hervor, dass man sich für den Anfang keine allzu schwierigen Objekte auswählen darf. Eben aus diesem Grunde habe ich die seit vielen Jahren im Gang begriffenen Arbeiten über den Darmkanal zurückgestellt und bin auf die Untersuchung der Geschmacksknospen übergegangen, welche als einfache Zellenverbände leichteren Erfolg versprochen. Über dieses Thema habe ich einen vorläufigen Bericht auf der Anatomenversammlung zu München erstattet und lege nunmehr die definitive Arbeit vor, welche die Teilkörpernatur der Knospen zweifellos erweisen wird.¹⁾

II. Technik, Abbildungen und Literatur.

a) Technik.

Zum Zwecke dieser Arbeit habe ich fast ausschliesslich die Papilla foliata der erwachsenen Tiere untersucht. Da es sich bei dem Nachweis der Teilkörpernatur eines beliebigen Gebildes im Grunde genommen immer um die Beziehung des gegebenen Objektes zu gewissen entwicklungsgeschichtlichen Vorgängen handelt, so bestand allerdings anfangs die Absicht, die Entwicklung der Papilla von der Geburt an zu untersuchen. Es zeigte sich jedoch sehr bald, dass die technischen Bedingungen bei den jungen Tieren noch schwieriger sich gestalten als bei den alten, und so habe ich nach Kenntnisnahme einiger Serien von jugendlichen Geschöpfen meine Aufgabe auf die Feststellung des Aufbaues der Sinnesfelder und der Morphologie der Knospen im fertigen Zustande beschränkt. Diese engere Umgrenzung des Themas mag auffallend sein, jedoch ich vermag meinen Entschluss zu rechtfertigen.

Wie schon eingangs angedeutet wurde, ergab sich sehr bald, dass von dem Aufbau der Sinnesfelder des erwachsenen Tieres noch recht wenig bekannt war, und so musste die möglichst genaue Feststellung der in Betracht kommenden Verhältnisse den geplanten entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen vorangehen.

¹⁾ Ein Auszug aus dem sachlichen Teile der vorliegenden Arbeit erschien mit 16 Abbildungen im Anat. Anz., Bd. 45. 1914.

Da nun diese Feststellungen unter der Hand des Beobachters wider Erwarten einen grossen Umfang annahmen, so erschien es rätlich, zu einem Abschluss zu kommen und das Erreichte der Öffentlichkeit vorzulegen.

Weiterhin hat mich der Gang der Untersuchung dahin belehrt, dass in Ansehung meines Zweckes die entwicklungsgeschichtliche Bearbeitung des Objektes wenigstens zunächst nicht unbedingt notwendig ist. Denn wie in vielen anderen Fällen, so zeigt sich auch hier, dass aus der Konstitution des fertigen Objektes das entwicklungsgeschichtliche Verhalten wenigstens teilweise erschlossen werden kann. Hierzu verhilft einerseits die Beurteilung des normalen Zustandes, andererseits die Beobachtung der in ziemlicher Zahl vorkommenden Hemmungsbildungen. Überhaupt bin ich der Meinung, dass in der mikroskopischen Anatomie die Struktur der fertigen Teile mehr als bisher mit dem Auge des Embryologen betrachtet werden sollte, da nach meiner persönlichen Erfahrung viele Verhältnisse der Struktur sozusagen nichts anderes sind als fixierte Entwicklungszustände. So war es also möglich, dass ich die Verfolgung der Entwicklungsgeschichte der *Papilla foliata* auf später vertagen konnte.

Wer unser Objekt kennt, weiss, dass die genügende Konservierung der Knospen schwierig ist. Benutzt wurde Sublimat, „Subtrie“ (konzentrierte Kochsalz-Sublimatlösung 100, Acidum trichloraceticum 2, Eisessig 4), Zenkersche Flüssigkeit und schliesslich ein von mir bereits früher vorgeschlagenes Gemisch aus Sublimat, Osmiumsäure und Eisessig (konzentrierte Sublimat-Kochsalzlösung 80, 2%ige Osmiumsäure 10, Eisessig 5). Die letztere Mischung, welche ich sehr häufig benutze, wenn Epithelien schön in der Form erhalten werden sollen, ergab bei weitem die besten Resultate.

Geschnitten wurde in Paraffin (nach Schwefelkohlenstoff-einbettung) und zwar ausschliesslich in Serien à 6 μ , welche nach den drei Hauptrichtungen des Raumes durch das Organ hindurchgelegt wurden. Zur Unterscheidung der drei Arten von Serien sei folgendes bemerkt. Von den Autoren wird die Schnittrichtung quer zu den Leisten der Papille, senkrecht zur Oberfläche der Zunge bevorzugt (Textfig. c); es ist sogar fast ausschliesslich in dieser Art geschnitten worden, und es ist nicht zu bestreiten, dass man auf diese Weise ausserordentlich typische

Bilder der Geschmacksleisten erhält, welche wie eine Serie regelmässig gestellter Zähne nebeneinander stehen. Allein diese „Querschnittsserien“, wie ich sie kurz nennen will, geben ein ganz einseitiges Bild der Sache. Es ist vor allen Dingen auch nötig, dass man „Flachschnittsserien“ durch das Epithel der Sinnesfelder hindurchlegt, wobei die Hauptachse der Knospen annähernd senkrecht durchquert wird (vergl. Fig. c); hierbei ist jedoch nicht möglich, das Sinnesfeld samt allen seinen Knospen in ganzer Ausdehnung in einen einzigen Schnitt hineinzubringen, denn die Leisten der Papille haben keine gestreckte Form. Viel-

Fig. c. Aus einem Querschnitt durch das Leistensystem der Pap. foliata. Vergrößerung ca. 108. Mi = Mittellamelle; Se = Seitenlamelle; Ha = obere hakenförmige Umbiegung der Seitenlamelle; Wi = Winkel zwischen der untersten Geschmacksknospe und dem angrenzenden Epithel. Die Linien mit den Bezeichnungen „flach“ und „horizontal“ geben die Lage der entsprechenden Schnittserien an.

mehr verlaufen sie mehr oder weniger deutlich in schwachen Kurven (siehe Textfig. d). Aber es gelingt immerhin, bei guter Orientierung des Objektes, relativ grosse Abschnitte des knospentragenden Epithels mit dem Messer auf einmal zu durchqueren, und man erhält dann eine prächtige Ansicht von der Art und

Weise, wie die Knospen in das Epithel eingesetzt sind (Taf. XIII, Fig. 16). Im übrigen zerlegt man bei der gewählten Schnittdicke von $6\ \mu$ die ganze Höhe des Sinnesfeldes in etwa zehn aufeinanderfolgende Flachschnitte, von welchen die oberflächlichsten wegen des Studiums der Geschmacksporen von besonderem Werte sind. Schliesslich haben wir mehrfach auch „Horizontalschnittserien“ benutzt, welche parallel zur Zungenoberfläche durch die Papille hindurchgelegt werden (vergl. Textfig. c). Die Schnittebene steht in diesem Falle wie bei den Querschnittsserien senkrecht auf der Oberfläche des knospentragenden Epithels (Taf. XII, Fig. 11); dabei kommt man oftmals fast durch die ganze Länge der Leisten hindurch, deren Ränder dann Hunderte von Knospen nebeneinander aufweisen. Diese Schnitte sind zur Ergänzung wegen der möglichst genauen Erkenntnis der Form der Knospen wichtig, obwohl sie im übrigen viele neue Einzelheiten nicht zeigen. Bemerkenswert wäre der eine Punkt, dass auf den Horizontalschnittserien die Verzweigungen der Leisten (vergl. Textfig. d, e und f) in die Schnittebene hinein zu liegen kommen.

Was die Färbung der Präparate anlangt, so habe ich das Eisenhämatoxylin nach meinem Verfahren bevorzugt. War das Objekt osmiert, so behandelte ich die Schnitte vorher kurze Zeit mit einer 10prozentigen Lösung von Perhydrol (bezogen von Merck, Darmstadt), um die von dem Osmium ausgehenden Widerstände zu brechen (Verfahren von Prof. Marquette, New York). Auf alle Fälle sollte man bei entsprechender Differenzierung prächtige Tinktionen erhalten, welche gleicherweise bei schwacher und bei starker Vergrösserung brauchbar sein müssen. Die Knospen lassen sich leicht hell auf dunklem Grunde darstellen und die Sinnesporen nehmen fast immer eine intensiv schwarze Färbung an, so dass dadurch die Lage der Porenkanäle vortrefflich markiert wird (siehe die Tafeln). Einen Nachteil hat jedoch das Eisenhämatoxylin: es lässt nämlich die Grenzen der Sinneszellen nicht deutlich hervortreten. Hierauf habe ich jedoch weniger Gewicht gelegt, weil die genaue Form der Zellen doch nur durch Metallimprägnation bzw. durch die Chromsilbermethode darzustellen ist. Von Nachfärbungen habe ich keinen besonderen Vorteil gezogen (Benzollichtbordeaux 6 Bl); die zweite Farbe bringt zwar die Begrenzung der Sinneszellen besser zum Vorschein, deckt aber andererseits wiederum allerhand Einzelheiten zu.

b) Abbildungen.

Den Abbildungen wurde ausschliesslich nur das beste Schnittmaterial zugrunde gelegt. Herr H. Dettelbacher, Universitätszeichner hierselbst, hat die ihm vorgelegten Objekte meiner Meinung nach in vortrefflicher Weise aufgefasst und dargestellt, so dass die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Präparate in den Zeichnungen erhalten geblieben sind.

Im besonderen erwähne ich zunächst, dass die aus den Querschnittsserien entnommenen Einzelabbildungen durchgehends sorgfältig ausgewählte Mittelschnitte der Knospen darstellen. Es scheidet also z. B. die Schnittebene in den Fig. 2—7, Taf. XIX die Knospen in zwei symmetrische Hälften, welche sich spiegelbildlich verhalten. Derartige Schnitte sind zugleich die grössten Durchschnitte der Knospen; würde man bei ihnen den Flächeninhalt mit dem Planimeter bestimmen — was jeden Augenblick möglich ist — so würden wir an den erhaltenen Ziffern einen treffenden Ausdruck für die relative Grösse der Knospen haben, welche in ausserordentlichem Grade variiert.

Weiterhin ist wichtig hervorzuheben, dass die Abbildungen, so weit als irgend möglich, in die Tafeln in gleicher Lage eingesetzt worden sind: der obere Rand der Figuren entspricht der Richtung gegen die Zungenoberfläche, der untere Rand der Richtung gegen die Tiefe der Zungenschleimhaut. Eine Ausnahme machen allein die Figuren auf Taf. XXII und XXV, sowie die Fig. 11 aus einer Horizontalschnittserie, bei welcher eine mit den übrigen Abbildungen übereinstimmende Orientierung naturgemäss nicht möglich ist. Somit konnten sämtliche Einzelabbildungen und auch die grossen Flachschnitte der Fig. 8—10 in die gleiche Stellung gebracht werden, was wegen des unmittelbaren Vergleiches für den Beschauer wichtig ist.

Die Figuren auf den Taf. XXII und XXV, welche von Flachschnittserien entnommen sind, mussten wegen des langen schmalen Formates aufgerichtet werden. Bei diesen Figuren liegt der obere Rand des Sinnesfeldes durchgehends nach rechts; der linke Rand der Figur wendet sich demgemäss gegen die Tiefe der Zungenschleimhaut.

c) Literatur.

Es erübrigt sich für mich eine ausgedehnte Literaturübersicht zu geben, da meine Arbeit über die Geschmacks-

knospen grösstenteils andere Zwecke verfolgt, als diejenigen waren, mit welchen sich die Autoren bisher beschäftigt haben. Auch sind ausgedehnte Literaturbesprechungen schon mehrfach von meinen Vorgängern gegeben worden, z. B. von v. Lenhossék und von Retzius. Dazu kommen dann die ausführlichen Darstellungen der Handbücher (von Ebner, Oppel), so dass ein Bedarf nach einer nochmaligen ausführlichen Darlegung der Literaturentwicklung zurzeit nicht vorliegt. Wenn ich im nachfolgenden nicht sehr eifrig im Zitieren histologischer Beobachtungen bin, so will ich damit den vorangegangenen Autoren keineswegs irgendwie zu nahe treten; ich möchte nur vermeiden, mich bei dem Charakter meiner Arbeit in die Besprechung vieler Einzelheiten zu verlieren, welche für meinen gegenwärtigen Zweck weniger in Betracht kommen.

III. Allgemeiner Teil der Untersuchung.

1. Morphologie der *Papilla foliata* und der Geschmackleisten.

Wir setzen die allgemeine Morphologie der *Papilla foliata* und ihres Leistensystems sowie auch die histologische Zusammen-

Fig. d. Linke *Papilla foliata* eines erwachsenen Kaninchens. V = vorn; H = hinten; O = oben; U = unten. Vergr. ca. 15mal. Man beachte die Gabelungen der Leisten.

setzung der Geschmacksknospen als bekannt voraus. Wir haben auch nicht die Absicht, durch nochmalige ausführliche Diskussion vieler früher schon beschriebenen Dinge den Leser zu ermüden. Jedoch gewinnen mancherlei Verhältnisse, welche bisher wenig beachtet wurden, im Lichte unserer Untersuchung ein neues Interesse und so ist es das zweckmässigste, den Bau der Papille kurz zu rekapitulieren.

Das Feld der Papille erscheint bald mehr birnförmig, bald mehr eirund, wobei der spitzere Teil der Figur nach hinten, der

Fig. e.

Fig. f.

Fig. e und f. e = linke, f = rechte Papilla foliata eines jungen Kaninchens von 220 Gramm Gewicht. Vergr. ca. 15 mal. V = vorn; H = hinten; O = oben; U = unten. Die rechte Papille ist etwas grösser als die linke; die Leistensysteme sind rechts und links keineswegs identisch.

stumpfere nach vorn liegt (Textfig. d, e und f). Oft lässt sich die Papille nicht mit grosser Genauigkeit abgrenzen, weil ihre Leisten ohne strengere Marke in die umgebende Schleimbaut auslaufen, doch ist das Feld niemals rein ellipsoidisch, immer, wie beschrieben, vorn mehr abgerundet, hinten etwas schmaler zulaufend.

Was die Leisten anlangt, so kann man sich vorstellen, dass sie vom unteren Rande der Papille in der Richtung nach aufwärts verlaufen; hierbei divergieren sie etwas, so dass sie schwach fächerförmig angeordnet sind, und ausserdem verlaufen die längeren unter ihnen mehr oder weniger deutlich in Kurven, deren Konkavität nach hinten gewendet ist. Die Abbildungen zeigen, dass die Leisten an der vorderen Rundung des Feldes schnell, in der Richtung nach hinten ganz allmählich kürzer werden; ausserdem sind sie wegen der Fächerform ihrer Anordnung vorn und besonders hinten nicht mehr steil aufgerichtet, sondern in Schräglage befindlich. Es erhellt daraus, dass man auch auf einer gut orientierten Querschnittsserie die Leisten am vorderen und hinteren Pol schräg durchschneiden wird. Ebenso pflegen an beiden Polen die Leisten etwas verkümmert zu sein, so dass man auf die Ausnutzung der Präparate an diesen Stellen getrost verzichten kann.

Für besonders bemerkenswert halte ich die Gabelungen der Leisten (siehe die Textfiguren). Anfangs glaubte ich annehmen zu dürfen, dass diese wegen der Aufstellung der Leisten in Fächerform ausschliesslich in der Richtung nach aufwärts liegen würden. Indessen ist dies nicht richtig. Bei genauerem Zusehen findet man in manchen Papillen Leisten, bei welchen die Teilung in der Richtung nach abwärts liegt (Textfig. e). Hieraus und aus dem Umstande, dass auch dreigeteilte Leisten vorkommen, scheint mir hervorzugehen, dass die Teilungen einen besonderen entwicklungsphysiologischen Akt versinnbildlichen. Denn vererbt wird doch gewiss nur die Anlage zur Leistenbildung überhaupt, nicht aber zur Bildung einfacher, zwei- und dreigespaltener Leisten. Dies ist auch leicht erkenntlich an dem Umstande, dass die beiderseitigen Papillen ein und derselben Zunge nicht völlig gleichgestaltet sind (Textfig. e und f), sondern in bezug auf die in Rede stehenden Verhältnisse sich verschieden gestalten. Wir halten es daher für möglich, dass die Leisten Histosysteme sind, deren Anlagen im Laufe der Entwicklung durch Spaltung

vermehrt werden, so dass gelegentlich — bei unvollkommener Sonderung — Gabelungen entstehen.

Auf dem Querschnitt betrachtet (Textfig. c, S. 394) stehen die Leisten wie Zähnnchen in die Höhe, deren Seitenflächen einander parallel liegen. Sie fassen dabei einen nur geringen Spaltraum zwischen sich, an dessen Boden die serösen Drüsen der Gegend reihenweise ausmünden. Histologisch zeigen die Querschnitte zunächst eine dreigeteilte Bindegewebsleiste und einen oberflächlich abgeglätteten Epithelüberzug. Die drei Blätter des bindegewebigen Grundstockes unterscheidet man am besten als Mittellamelle und Seitenlamellen (Textfig. c, Mi und Se). Die erstere variiert in ausserordentlichem Grade, wie man aus unserer Textfig. g er-

Fig. g. Variationen der Mittellamelle vom erwachsenen Kaninchen.
Vergr. ca. 87 mal.

sehen kann. Allerdings ist sie gewöhnlicherweise einfach, oft aber an ihrem Ende gegabelt oder bis auf eine wechselnde Tiefe hin zweigeteilt, mitunter auch ganz und gar verdoppelt, in welchem Falle die Geschmacksleiste ungewöhnlich breit zu sein pflegt. Ebenso kann die Mittellamelle gelegentlich in drei Spaltlamellen von wechselnder Grösse und Anordnung auslaufen — kurz, da gibt es massenhafte Varietäten, deren genetische Bedeutung einstweilen noch völlig dunkel ist.

Was die Seitenlamellen anlangt, so verhalten sie sich ziemlich konstant, obwohl allerhand Variationen geringeren Grades auch bei ihnen vorkommen. Sie neigen sich im ganzen ein wenig nach aussen und sind am distalen Ende hakenförmig umgebogen (Textfig. c, Ha, siehe auch Fig. g). Auf diese Umbiegung, welche v. Lenhossék zuerst erwähnt, mache ich

ganz besonders aufmerksam, denn sie markiert einen topographisch wichtigen Ort, nämlich den oberen Rand des Sinnesfeldes. Diese Gegend wird in gar nicht seltenen Fällen auch von aussen her kenntlich und zwar durch eine oberhalb der hakenförmigen Umbiegung der Seitenlamelle gelegene Einkerbung (Textfig. h), welche somit einer parallel zum Oberrande des Sinnesfeldes hinziehenden äusseren Rinne entspricht. Diese Formgebung hält v. Lenhossék für ein Fixierungsartefakt. Ich habe sie jedoch auch auf sehr gut konservierten Präparaten angetroffen und glaube, dass wir hier eine durch die Form der normalen Entwicklung bedingte Varietät vor uns haben.

Fig. h.

Querschnitt einer Leiste der *Papilla foliata* eines einjährigen Kaninchens. Vergr. 108 mal. In der Richtung der Pfeile gewahrt man den Querschnitt einer schwachen Furche, welche über der oberen hakenförmigen Umbiegung der Seitenlamelle und parallel derselben an der Leiste sich hinzieht.

2. Allgemeine Form und Konstruktion der Sinnesfelder.

a) Die äussere Gestalt der Sinnesfelder.

Bekanntlich findet man die Geschmacksknospen scharenweise an den einander zugewandten Seiten der Geschmacksleisten. Die von ihnen eingenommene Epithelstrecke kann man demzufolge passend als Sinnesfeld bezeichnen. Die Form des Feldes wird im ganzen betrachtet eine schmale streifenförmige sein, was auf den Flachschnitten gut herauskommt (Taf. XXII und XXV).

Die Knospen drängen sich nun in der Richtung nach aufwärts gegen die obere Umbiegungsstelle der Seitenlamelle heran (Fig. 1 und 5, Taf. XIX etc.) und bilden dort in der Längsrichtung des Feldes eine nahezu ununterbrochene Reihe (Taf. XXII, Fig. 16 und 19, ferner siehe die Projektionen A bis H auf Taf. XXV). Demgemäss ist das Sinnesfeld an seinem oberen Rande scharf begrenzt, während der gegenüberliegende untere Rand sich meist nicht in so bestimmter Weise begrenzen lässt. Es variiert nämlich die Zahl der Knospen in der Querausdehnung des Feldes zwischen 1 und 6, und da, wie besprochen, ihr Aufmarsch in der vertikalen oder Querrichtung immer an der

oberen Umbiegungsstelle der Seitenlamelle beginnt, so muss die untere Begrenzung unregelmässig eingeschnitten sein. Diese Verhältnisse können naturgemäss vortrefflich an Flachschnittserien durch das knospentragende Feld kontrolliert werden; denn der durch die Knospenmitte hindurch gelegte Schnitt (Fig. 16 und 19) pflegt auch die hakenförmige Umbiegung der Seitenlamelle zu treffen (vergl. über die Form der Schnittführung Textfig. c S. 394 die mit dem Worte „flach“ bezeichnete Linie), welche in Form eines schmalen Bindegewebsstreifens sichtbar wird, und man gewahrt dann, wie die Knospen sich gegen den letzteren anlehnen (siehe in Fig. 16 und 19, auch Fig. 22), wodurch sich das Sinnesfeld hier schärfer begrenzt, während der gegenüberliegende Rand unregelmässiger erscheinen wird.

Nach diesem topographischen Befunde nimmt es sich so aus, als ob die Entwicklung der Knospen an einem Punkte, welcher der oberen Umbiegung der Seitenlamelle unmittelbar benachbart ist, beginnt und von da ab in der Richtung nach abwärts fortschreitet. Jedenfalls können bei Vermehrung der Knospenzahl diese sich nicht in der Richtung nach aufwärts über den Haken der Seitenlamelle hinweg ausdehnen, vielmehr steht ihnen nur die nach abwärts gelegene Epithelstrecke frei. Die weitere Darstellung wird zeigen, dass in dieser Betrachtung etwas Richtiges enthalten ist, weil nämlich die Knospen in vertikaler Richtung genetische Verbände bilden, deren Individuenzahl variiert (bitte jetzt schon die Projektionen A bis H, Taf. XVI, flüchtig zu vergleichen).

b) Das indifferente Zwischenepithel und die Art der Einsetzung der Knospen in das Sinnesfeld.

Die Knospen sind in ein geschichtetes Plattenepithel von indifferentem Charakter eingesetzt, welches nicht ganz leicht zu untersuchen ist. Genauere Beobachtung zeigt aber, dass es im Aufbau durchaus dem geschichteten Plattenepithel der Mundhöhle gleicht. Die für den Untersucher sich ergebende eigentümliche Schwierigkeit liegt darin, dass die Knospen meist ungemein dicht stehen (z. B. Fig. 16) und die indifferenten Epithelzellen aus diesem Grunde gleichsam zwischen ihnen eingeklemmt erscheinen. Unter diesen Umständen ist es schwer, sich über ihre Form klar zu werden (siehe Fig. 1), und ich glaubte anfangs, dass die Zwischen-

zellen, weil sie an vielen Stellen nur sehr dünne Septen bilden, sich im Verhältnis zu den Knospen etwa wie platte dünne Hüllblättchen darstellen würden. Dies ist jedoch durchaus nicht der Fall. Vielmehr bleibt die allgemeine Form des geschichteten Plattenepithels erhalten.

Die tieferen, zwischen den Knospen eingeklemmten Zellen (siehe Fig. 2—4) erweisen sich der Regel nach als ungemein schmale, jedenfalls immer in der Höhenrichtung stark verlängerte „zylindrische“ Zellen, welche in der Richtung nach aufwärts sehr schnell in abgeplattete Formen übergehen. Der Plasmaleib der Zylinderzellen ist in der Längenrichtung stark gefasert, was an den Eisenhämatoxylin-Präparaten oft in prachtvoller Weise zum Vorschein kommt. An dieser Faserung ist wiederum gegebenenfalls die Form der Zellen leicht kenntlich.

Was die oberen Lagen abgeplatteter Zellen anlangt, so decken sie in ziemlich unvermittelter Weise die tieferen zwischen den Knospen befindlichen verlängerten Zellen (z. B. Fig. 3, 4, 23, 26 etc.), so dass die beiden extremen Formen hier nicht, wie es sonst bei dieser Art von Epithelien der Fall zu sein pflegt, durch viele vermittelnde Übergangsglieder einander verbunden werden. Ferner sind die zu oberst liegenden Schichten der abgeplatteten Zellen im Bereiche des Sinnesfeldes stark verhornt (v. Lenhossék) und bilden auf diese Weise eine schützende „Hornlamelle“, welche in den Eisenhämatoxylin-Präparaten gerne eine tintenschwarze Farbe annimmt (vergl. die Abbildungen).

In der Richtung nach abwärts drängen alle irgendwie grösseren Knospen mehr oder weniger aus dem indifferenten Epithel des Knospenfeldes hervor, und auf diese Weise müssen sie, wie v. Lenhossék bemerkt, einen seichten Eindruck auf der unterliegenden Bindegewebsplatte erzeugen (siehe Fig. 1—4). Auf dem Querschnitte der Leisten findet man daher an allen Stellen, wo die Knospen dicht gestellt sind, dass die zwischen ihnen befindlichen epithelialen Scheidewände in der Richtung nach aufwärts zurücktreten (Fig. 1 und 2); somit findet man gewöhnlicherweise an der Basis des Sinnesfeldes einspringende Winkel. — Bemerkenswert ist schliesslich, dass in der unteren Begrenzung des Sinnesfeldes zwischen der untersten Knospe und dem anstossenden Epithel der Mundhöhle der Regel nach sich ein spitzer, einspringender Winkel befindet (Textfig. c, S. 394, Wi; Fig. 1). Dieser kommt

dadurch zustande, dass das Mundhöhlenepithel, welches im Grunde der die beiden Nachbarleisten trennenden Furche sehr dick ist, indem es nach aufwärts zieht, sich erheblich verschmälert und sich an die nach abwärts gewandte Seitenfläche der untersten Knospe anzuschmiegen strebt.

Weitere Aufschlüsse über das indifferente Zwischenepithel des Sinnesfeldes und besonders über die Art und Weise, wie es mit seinen obersten Schichten die Knospen überlagert, erhält man auf Flachschnittserien. Der erste Schnitt, welcher die Leiste nur oberflächlich berührt, hebt die Hornlamelle in grösserer oder geringerer Ausdehnung ab (Fig. 14, 17! und 20); fällt bei Eisenhämatoxylin-Färbung die Differenzierung günstig aus, so kommen in dieser Lamelle die Geschmacksporen in prachtvoller Weise zum Vorschein. Diese sind je nach der Grösse der Knospen von verschiedenem Durchmesser, breiter oder schmaler, die kleinsten unter ihnen schwer auffindbar und manchmal verklebt. Der nächste Schnitt pflegt die oberen Enden der Knospen mit den Geschmacksrübchen zu zeigen (Fig. 18!); mitunter erhält man, wenn die Epitheloberfläche von Natur aus nicht ganz eben war (Fig. 14), oder auch, wenn der Schnitt etwas schief liegt (Fig. 9, 10, 20 und 21), teils die Poren der Hornlamelle, teils diverse tiefere Schnitte der Knospen nebeneinander.

Betrachtet man derartige Flachschnitte unter Immersion, so wird leicht kenntlich, dass die abgeplatteten Zellen der oberen Schichten des Deckepithels sich häutchenartig über den Scheitel der Knospen hinweg legen. So sieht man beispielsweise in unserer Fig. 10 unten zunächst die geschwärzte Hornlamelle mit einigen Poren; weiterhin senkt sich in der Richtung nach aufwärts die Schnittebene, und wir stossen auf die weniger verhornten Plattenepithelzellen der zunächst gelegenen Schichten, welche sich über die oberen Enden der Knospen hinweg wölben. Das Messer hat hier im Umfange der Knospen an den sich deckenden, sehr dünnen Epithellamellen konzentrische Schnittländer erzeugt, welche gut sichtbar sind. Die Kerne der zugehörigen Epithelzellen pflegen etwas in der Richtung nach dem Äquator der Knospen verlagert zu sein, wo sie leichter Platz finden als direkt über dem sich emporwölbenden Knospenscheitel. Hierzu vergleiche man die schöne Abbildung Fig. 8. Die Schnittebene liegt hier links relativ hoch, während sie sich in der Richtung nach rechts etwas senkt.

Man erkennt hier gut die dünnen epithelialen Hüllhäutchen, welche sich über den Pol der Knospen hinweg wölben. Die Kerne der zugehörigen Epithelzellen liegen jedoch etwas tiefer, in der Richtung nach abwärts vom Pol der Knospen aus gesehen, und kommen auf diese Weise in der Zeichnung in die dunkleren Strassen zwischen den Knospen zu liegen.

Auf senkrechten Durchschnitten des Sinnesfeldes kommen diese Verhältnisse meist nicht so deutlich zum Ausdruck, jedoch zeigen unsere zahlreichen Abbildungen, dass die dünnen Plättchen über dem Scheitel der Knospen der Regel nach an dieser Stelle kernfrei sind. Die Kerne der betreffenden Zellen findet man seitlich herausgerückt, in der Richtung auf die epithelialen Septen, welche die Nachbarknospen voneinander trennen (vergl. Fig. 12 und 13; ferner Fig. 23—34).

3. Allgemeine Morphologie der Knospen.

a) Morphologie der Geschmacksgrubchen und der Sinneshaare.

Der sogenannte „Geschmacksporus“ der Autoren ist, wie dies von Ebner gut beschrieben und abgebildet hat, eine ziemlich tiefe Einsenkung, welche wir demgemäss als *Fossula gemmalis*, Geschmacksgrubchen, bezeichnen. An diesem unterscheiden wir: a) den Porus, das ist lediglich die äussere Öffnung an der Oberfläche der Hornschichte, b) den Knospenkanal oder Porenkanal, welcher die Hornschichte und die darunter liegenden weichen Lagen von Plattenepithelzellen durchsetzt und c) die Ampulle, eine an den Kanal sich unmittelbar anschliessende, aber schon innerhalb des Knospenscheitels gelegene, meist bauchige Kavität (Fig. 12, 13). Wegen der erheblichen Tiefenausdehnung der Geschmacksgrubchen ist es möglich, auf Flachschnittserien (à 6 μ) zuerst die „Poren“, d. h. die Hornschichte mit Teilen des Knospenkanals abzuheben, während der folgende Schnitt meist schon die Ampullen durchquert (Fig. 17, 18; vergl. ebenso Fig. 8, 9, 10). Unsere Tafeln zeigen naturgemäss ungemein zahlreiche Beispiele der Grubchen, und der Leser wird sich leicht über ihre etwas wechselnde Form und Grösse orientieren, weswegen ich über diesen Punkt nur wenige Worte verlieren will.

Die Variationen der Geschmacksrübchen bestimmen sich im wesentlichen nach der Grösse der Knospen, das ist nach der in der Knospe enthaltenen Zellenzahl. Kleine Knospen besitzen nur kleine äussere Poren, welche in einen schmalen, am Ende wenig oder gar nicht erweiterten Kanal hineinführen (Fig. 2 unten): grosse Knospen besitzen grosse äussere Poren und einen entsprechend weiten Knospenkanal mit anschliessender geräumiger Ampulle (Fig. 12, viele weitere gute Darstellungen in den Fig. 23—29). Der Querschnitt der letzteren wird in den meisten Fällen deutlich breiter sein als der des einleitenden Kanals.

Die Wandfläche der Ampulle ist nun im eigentlichsten Sinne des Wortes die freie Oberfläche der Geschmacksknospe, an welcher die Härchen tragenden Sinneszellen enden. Ist die Zellenzahl der Knospe gering, so genügt demgemäss eine geringe Ausdehnung dieser Oberfläche, und die Ampulle wird klein sein. Ist die Zellenzahl hingegen gross, so muss die freie Härchen tragende Oberfläche an Ausdehnung gewinnen, und wir erhalten weiträumige Ampullen.

Betrachtet man an einem gut ausdifferenzierten Eisenhämatoxylin-Präparat die Wand der Ampulle, so erscheint sie im optischen Querschnitte wie von einer feinen, schwärzlichen Membran bekleidet; oder es findet sich an Stelle der letzteren eine Serie feiner dunkler Knötchen. Gelingt es, was nur sehr selten der Fall ist, von der in Frage stehenden Wandschicht eine günstige Flächenansicht zu erhalten, so gewahrt man, dass sie gefenstert ist. Das Eisenhämatoxylin hat ein enges Netzwerk ausgefärbt, dessen Bälkchen schmale helle Felder zwischen sich lassen. Ganz ohne Frage entspricht dieses Netz den Schlussleisten, die hellen Felder den schmalen oberen Enden der Sinneszellen. Ferner gewahrt man auf jedem Felde in der Mitte ein kleines Knötchen, welches als Basalkörperchen zu dem Sinneshaare gehört.

Der Inhalt der Ampulle besteht zunächst aus einer homogenen glasigen Grundmasse von schleimiger Konsistenz, welche an den mit „Subtrie“ behandelten Präparaten, wenn sie nicht stark genug extrahiert waren, nicht immer, aber häufig eine tintenschwarze Farbe beibehält (Fig. 11 zum Teil). Bei Präparaten solcher Art findet man daher an Stelle der Geschmacksrübchen lediglich tintenschwarze Pfröpfe, ein Bild, das bei hoher

Vergrößerung an stark gefärbte Schleimkelche erinnert, dies um so mehr, weil die schwarze Masse häufig aus dem Porus frei heraushängt und wie hervorquellender Schleim sich ausnimmt.

Wird das Präparat in stärkerem Grade extrahiert, so hellt sich die schleimähnliche Masse successive auf, behält aber oft einen grauen Farbton bei (Fig. 12). Gleichzeitig kommen die Sinneshaare zum Vorschein, welche in dichter Lagerung befindlich sind und in der Richtung nach aufwärts, innerhalb des Knospenkanales, bis an oder sogar in die Hornschichte hereinsreichen.

Soweit ich nun sehen kann, trägt jede Sinneszelle nur je einen „oberen Aufsatz“, und letztere sind sämtlich von einerlei Art, obwohl sich dem ersten Ansehen nach kurze, dicke, steife Zapfen von längeren, feinen, gewellten, cilienähnlichen Fäden unterscheiden lassen (Fig. 12, 13). Eine sehr genaue Untersuchung hat mich indessen dahin belehrt, dass die kürzeren Gebilde der oberen und unteren Begrenzungsebene des Schnittes genähert zu liegen pflegen und demgemäss mit grösster Wahrscheinlichkeit als die basalen Stümpfe abgeschnittener Sinneshaare aufzufassen sind.

Den Umständen gemäss sind diejenigen Sinneshäarchen, welche vom Boden der Ampulle entspringen, die längsten, die am Rande stehenden die kürzesten. Die längsten Häarchen eignen sich nun besonders gut zur näheren Beobachtung, weil sie den Raum der Ampulle in ganzer Ausdehnung frei durchziehen und nicht in der Nähe der stark gefärbten Wandschicht liegen. An diesen langen Häarchen lässt sich feststellen, dass sie keineswegs als steife, hornige oder kutikuläre Stiftchen aufgefasst werden können, wie dies die Meinung der Autoren ist, sondern dass es sich zweifellos um weiche cilienähnliche plasmatische Gebilde handelt. Nur ihr unterer Teil erscheint gewöhnlich in gestreckter, also „steifer“ Form, während der obere fein auslaufende Abschnitt ebenso gewöhnlich mannigfache wellige Biegungen aufweist.

Wie schon erwähnt, sind die Sinneshaare mit einem feinen Basalkörperchen in die Grenzschicht der Sinneszelle eingepflanzt; weiterhin setzen sie sich mit einer fadenartigen Wurzel in den Plasmaleib der Zelle hinein fort. Diese färbt sich gelegentlich in Eisenhämatoxylin ziemlich intensiv und kann dann über weite Strecken hin verfolgt werden, wovon schon Retzius Kenntnis hatte.

In biologischer Beziehung kommt dem Geschmacksgrübchen mit seinem schleimähnlichen Inhalt sicherlich die Bedeutung einer Schutzvorrichtung für die Sinnesbärchen zu. Letztere hat man sich als äusserst verletzlich vorzustellen, aus welchem Grunde sie in ein kleines Räumchen unter die Oberfläche der Schleimhaut versenkt sind. Die weiche, die Härchen umhüllende färbbare Grundmasse findet sich übrigens in ähnlicher Weise auch in den Stäbchensäumen des Darmepithels und der Tubuli contorti der Niere.

b) Der zelluläre Aufbau der Knospen.

Der Bau der Geschmacksknospen ist so gut wie vollständig bekannt. Ich habe besonders über die Morphologie der Sinneszellen nichts Neues hinzuzufügen. Ich teile den Standpunkt von Retzius, welcher nach dem Vorgange von Kolmer eine strengere Unterscheidung von Sinnes- und Deckzellen nicht mehr gelten lässt. Es finden sich, wie die zitierten Autoren mit vollem Rechte bemerken, zwischen den extremen Formen der in den Knospen enthaltenen Zellen alle nur erdenklichen Mittelglieder. Da haben wir einerseits die grossen „hydropischen“, oft vakuolisierten Zellen mit kugeligem, substanzarmem, bläschenartigem Kern — früher „Deckzellen“ (siehe Fig. 4, 6; Fig. 9; Fig. 24, 27 etc.), und auf der anderen Seite ganz schmale, dunkel färbbare Gebilde mit verlängertem, manchmal stäbchenartigem, dunkel tingierbarem Kern, dazwischen aber eine bunte Mannigfaltigkeit anderer Individuen, deren Charaktere sich nicht so scharf begrenzen lassen, und die ihrem Aussehen nach bald mehr dem einen, bald mehr dem anderen Extrem sich nähern. Retzius (1912) hat eine gute Reihe dieser Art abgebildet.

In unseren Figuren hat der Zeichner das Aussehen der Kerne möglichst treu wiederzugeben versucht, und der Beschauer wird daher in den Knospen alle möglichen Formen und Färbungsarten der Kerne wahrnehmen, welche sich in keiner Weise nach bestimmten Klassen gruppieren lassen: demgemäss haben wir offenbar in den zugehörigen Zellen nur die verschieden ausgebildeten Glieder ein und derselben Familie vor uns. Die schmalen Zellen mit den stark färbbaren Kernen scheinen die Ausgangsformen zu sein, während die stark vakuolisierten Gebilde, welche oft einen degenerativen Eindruck machen, an das andere Ende

der Reihe zu verweisen wären. Diese letzteren Zellen waren es, welche von den Autoren als „Deckzellen“ bezeichnet wurden, von denen man anfangs behauptete, dass sie nur in der Peripherie der Knospen vorkommen. Jedoch dies ist tatsächlich nicht richtig, wie die neueren Autoren schon längst festgestellt haben. Auch unsere zahlreichen Mittelschnitte ein- und mehrporiger Geschmacksknospen, wie sie der Leser auf unseren Tafeln findet, zeigen die bläschenförmigen Kerne in ungemein wechselnder Stellung. Betrachtet man aber in dem Flachschnitte der Fig. 9 die am oberen Rande des Sinnesfeldes gelegenen Querschnitte mehrerer grosser Knospen, so gewahrt man, dass doch immerhin verhältnismässig viele der breiten Zellen peripher liegen, dass also in dieser Stellung etwas Typisches liegt. Daher möchte ich es für möglich halten, dass diejenigen Zellen, welche durch Wasseraufnahme und Vakuolisierung erheblich an Breite gewinnen, eine Tendenz haben, sich allmählich gegen die Oberfläche der Knospe hin zu verlagern, weil sie im Innern schwer, in der Richtung auf die Peripherie leichter Platz finden.

Die Anordnung der Sinneszellen innerhalb der Knospen ist oft besprochen und besonders von den Forschern, welche mit der Methode Golgis arbeiteten, gut dargestellt worden. Die Präparate, die mir vorgelegen haben, geben über die besonderen Einzelheiten der Form und Zusammenordnung der Zellen selbstverständlich nicht jenen genauen Aufschluss, den man vermöge der Chromsilbermethode erhalten kann. Trotz dessen erlaube ich mir diese Verhältnisse einer kurzen Besprechung zu unterziehen.

Alle grösseren Knospen enthalten eine enorme Menge von Zellen, wie aus dem Kernreichtum der Gebilde unmittelbar hervorgeht; es finden sich selbst auf $6\ \mu$ dünnen Schnitten meist noch so viele Kerne, dass sie nicht alle in die Zeichnung aufgenommen werden können. Zähle ich die Kerne in meinen Abbildungen ab, so finde ich z. B. in der Knospe der Fig. 5 nicht weniger als 25 Kerne, in Fig. 6 23 Kerne, in Fig. 7 28 Kerne. Und diese Schnitte enthalten doch nur einen geringen Teil der Gesamtzellenzahl. Demgemäss müssen die Leiber der Zellen sich in der Richtung auf die Ampullen in ausserordentlichem Grade verschmälern, wenn sie dort sämtlich bis zur freien Oberfläche des Knospenepithels gelangen sollen, und es können daher auch

die Kerne, weil sie relativ breit sind, zu allermeist nicht in den oberen verschmälerten Teilen der Zellen liegen. Vielmehr müssen die Kerne im allgemeinen in den mittleren oder unteren Teil des Zelleibes hineinrücken, wo sie dann im dichten Neben- und Übereinander Platz finden. Infolge dieser Anordnung gewahrt man im unmittelbaren Anschluss an die Ampulle, seitlich von ihr und besonders in der Richtung nach abwärts, ein kernfreies Feld, in welchem man die Zellenleiber nach allen Richtungen hin fächerartig divergieren sieht. Dies ist z. B. in den Fig. 4—7, auch in Fig. 12, 13 etc. gut kenntlich.

Es ist nun die Frage, ob diese sich so stark auseinander spreitzenden Zellenleiber schliesslich doch alle den Anschluss an die bindegewebige Basalmembran des Sinnesfeldes erreichen. Hierüber lässt sich nach meinen Präparaten im einzelnen nichts aussagen; man müsste schon auf die Metallimprägnationen zurückkommen, wenn man diesen Punkt genau feststellen wollte. Es könnte nämlich wohl sein, dass sehr viele der seitlich gelegenen Zellen, welche scheinbar auf halbem Wege endigen (siehe Fig. 4 und 5), nach abwärts vom Kern einen langen faserartigen Fortsatz entwickeln, welcher bis zur bindegewebigen Unterlage des Sinnesfeldes sich fortsetzt (entsprechende Beobachtungen bei v. Lenhossék). Dies zugegeben, haben wir jedoch eine spezielle Anordnung, bei welcher es ausgeschlossen erscheint, dass wirklich die sämtlichen Zellen das unterliegende Bindegewebe erreichen. Der in Frage stehende Fall wird durch Fig. 6 und 7 versinnbildlicht. Hier wird der grösste Teil der Knospenbasis von einem einschichtigen Zellenmantel bedeckt, welcher in der Richtung nach aufwärts ohne erkennbare Grenze in die nächste epitheliale Zwischenwand übergeht. Dieser auffallende Befund steht in untrennbarem Zusammenhange mit der Frage der sogenannten „Basalzellen“, auf welche ich nunmehr zu sprechen komme.

c) Die Basalzellen.

Hermann hat zuerst eine besondere Zellenart genauer beschrieben, welche in der Tiefe der Knospen in unmittelbarer Nachbarschaft der bindegewebigen Unterlage des Sinnesfeldes befindlich ist. Dort hatten schon mehrere Autoren Kerne gesehen und Hermann suchte nun darzutun, dass sie zu flach geformten Zellen gehören, welche „der Schleimhaut aufliegen und so die

eigentliche Basis für die die Knospe zusammensetzenden Zellen abgeben“, weshalb er sie Basalzellen nennt. „Von feingranuliertem Aussehen und mit einem deutlichen ellipsoiden Kerne versehen, senden diese Zellen massenhafte feine, sich dichotomisch teilende Plasmafortsätze aus und stehen durch dieses Maschenwerk unter sich sowohl wie auch mit dem Schleimhautstroma in Verbindung. Dagegen sieht man nur einige wenige kurze Fäserchen von dem der Knospe zugewendeten Teile der Basalzelle sich erheben, von denen sich leicht nachweisen lässt, dass sie kontinuierlich in die Protoplasmafasern der Stützzellen übergehen. Bei dem kleinen Areal, welches von der Basis einer Knospe eingenommen wird, muss es nun natürlich erscheinen, dass die beschriebenen Basalzellen sich nur in sehr geringer Anzahl in der einzelnen Knospe auffinden lassen; gewöhnlich sind es deren zwei bis vier, und nur in manchen ausnehmend grossen Knospen und namentlich in den ja sehr häufig zur Beobachtung gelangenden Zwillingsknospen kamen sie mir reichlicher zu Gesicht . . .“ (Hermann, S. 296 f.).

v. Lenhossék (1893) hält dafür, dass besondere Basalzellen nicht existieren, glaubt vielmehr, dass von seiten Hermanns Verwechslungen mit den verbreiterten kernhaltigen Teilen fadenförmiger Geschmackszellen vorliegen, welche manchmal weit nach abwärts verlagert sind. In ähnlichem Sinne äussert sich Retzius (1912). Ebenso ist v. Ebner (1899) der Meinung, dass Täuschungen vorliegen und dass die von Hermann beschriebenen Zellen vielleicht subepitheliale Bindegewebszellen sein könnten, welche bis in die Knospenbasis hinein vorgeschoben sind.

Ich bin nun in der Lage, einen wesentlichen Beitrag zur Frage der Basalzellen geben zu können. Sicherlich sind v. Lenhossék und Retzius insofern im Recht, als von den in der Tiefe der Knospen nahe der bindegewebigen Basalmembran¹⁾ sichtbaren Kernen viele denjenigen Sinneszellen zugehören, deren kernhaltige Teile stark nach abwärts verlagert sind. Jedoch es kommen ebendort besondere indifferente Epithelzellen vor, welche von derselben Art sind, wie die Epithelzellen der intergemmalen Scheidewände und welche den Namen Basalzellen verdienen.

¹⁾ Diese lässt sich nach der Methode von Mallory gut anfärben.

Zwei Punkte hebe ich sofort hervor. Erstlich ist es bei Anwendung der Eisenhämatoxylin-Färbung nicht möglich, die Kerne der Basalzellen überall mit Sicherheit von tief gelegenen Kernen der Sinneszellen zu unterscheiden und zweitens pflegen die Basalzellen in einem grösseren Teile der Knospen überhaupt nicht vorzukommen, nämlich in den kleinen Einporigen und besonders in den am Oberrande des Sinnesfeldes gelegenen, wenn auch grösseren Knospen (z. B. Fig. 5). Dagegen sind sie häufig in den mittleren und unteren Knospen (Fig. 6 und 7), wo sie leicht in die Erscheinung treten und ihr Zusammenhang mit den indifferenten Epithelzellen der Zwischenwände klar vor Augen liegt. Wir haben also eine bestimmte topographische Verbreitung dieser Zellen, worauf ich besonders aufmerksam mache.

Unsere Abbildungen geben über die Erscheinungsweise der Basalzellen die genügende Auskunft. Liegt der Fall so, wie in Fig. 24 oder in Fig. 29, so würde ich mir nicht getrauen, die in der Tiefe der Knospen neben der Basalmembran gelegenen Kerne in bestimmter Weise auf Sinneszellen oder Basalzellen zu beziehen. Dagegen haben wir klare, eindeutige Bilder in Fig. 6 und 7, sowie in Fig. 26. Wir finden nämlich ungemein häufig bei mittleren und besonders bei unteren Knospen, dass die indifferenten Epithelzellen von der nächst oberen Zwischenwand her sich wie ein Mantel nach abwärts über die Knospenbasis hinwegschieben. Diese „Epithelmäntel“ sind immer einschichtig; sie sind ferner bald von grösserer, bald von geringerer Ausdehnung und die in ihnen enthaltenen Zellen korrespondieren vollständig mit den Zellen der tiefsten Schichte des einschliessenden indifferenten Epithels. Die bisher zitierten Figuren (6, 7, 26) zeigen die Epithelmäntel auf der höchsten Stufe der Entwicklung; in den gewöhnlichen Fällen sind sie jedoch von geringerer Ausdehnung (Fig. 27 und 28) oder sie sind nur angedeutet (Fig. 1, 3 und 4).

Verfolgt man an irgend einer geeigneten Knospe mit voll entwickeltem Epithelmantel letzteren in der Richtung nach abwärts, also in der Richtung auf seinen freien Rand hin, so kann man gelegentlich wahrnehmen, dass das Plasma der Mantelzellen immer heller und heller wird und schliesslich ganz zu schwinden scheint; dann treten in den tiefsten Teilen der Knospe in der Nähe des

Mantelrandes, bzw. in dessen idealer Verlängerung, allerhand Kerne auf, deren zugehöriger Zelleib — in meinen Präparaten wenigstens — nicht recht kenntlich ist. Diese Erscheinung eines offenbaren Plasmaschwundes erinnert mich an die Beschreibung, die Hermann von den Basalzellen gegeben hat. Denn nach diesem Autor besitzen die Basalzellen zarte, nach allen Richtungen hin ausgefrante oder verästelte Zellenleiber, welche bei der von mir bevorzugten Färbemethode technisch nicht mehr darstellbar sein würden. Im übrigen stehen viele der indifferenten Epithelzellen der Knospenbasis nicht in einem sichtbaren Zusammenhange mit den Zellen der intergemmalen Scheidewände (z. B. Fig. 25, 30, 31 etc.), wobei jedoch hervorgehoben werden muss, dass diese Zusammenhänge schwer kontrollierbar sind, weil sie vor allem auch in seitlicher Richtung, also in den Richtungen lateralwärts von der in den Abbildungen dargestellten Mittelebene liegen könnten (vergl. den Horizontalschnitt Fig. 11).

Weiter unten werde ich zeigen, dass die Basalzellen in einer nächsten Beziehung zu dem Teilungsakte der Knospen stehen.

d) Die morphologische Individualität der Knospen.

Nachdem wir uns im vorstehenden den morphologischen Bau der Knospen in den wesentlichen Zügen wiederum vergegenwärtigt haben, werfen wir schliesslich die Frage auf, welche strukturellen Momente es sind, die bei uns den Eindruck erzeugen, dass es sich in ihnen um morphologische Individuen, Zellenverbände vom Charakter geweblicher Einheiten handelt. Es soll also hier einstweilen nur das Prinzip des Aufbaues in Frage kommen, während wir unsererseits allerdings den Begriff des morphologischen Individuums von der bestimmten Bedingung abhängig machen, dass das betreffende System in irgend einer Weise als solches fortpflanzbar sein muss. Diesem letzteren Problem gilt die weitere Untersuchung. Kommt es jedoch einstweilen nur darauf an, festzustellen, worauf die einheitliche Erscheinungsweise der Knospen beruht, so dürfte klar sein, dass die Gegenwart der Geschmacksrübchen bzw. Ampullen der ausschlaggebende Faktor ist.

Wären die Grübchen nicht vorhanden, so würden wir innerhalb des Sinnesfeldes lediglich Inseln spezifischer Zellen von verschiedenem Umfange haben, doch würden diese kaum das

Bild bestimmter aus Zellen gebildeter Organe ergeben. Es bedürfen jedoch die zarten Sinneshäärchen eines besonderen Schutzes vor äusserer Unbill, und so sind die Grübchen entstanden, gegen welche die Sinneszellen konvergieren. Es können nun die Grübchen nicht beliebig an Umfang zunehmen, und eben deswegen kann auch die Zellenzahl innerhalb ein und derselben Knospe nicht ad libitum zunehmen. Vielmehr ist diese einer bestimmten, ziemlich engen Variationsbreite unterworfen und wird nie ein gewisses Maximum überschreiten können. So bilden sich also Komplexe oder Verbände von Sinneszellen, welche ein begrenztes Grössenwachstum besitzen und demgemäss als morphologische Einheiten einer gewissen Grössenordnung sich darstellen müssen. Sollten jedoch in einem bestimmten Falle die Zellen fortfahren zu proliferieren, obwohl die Knospe den maximalen Umfang bereits besitzt, so muss damit eo ipso die Teilung der Knospe in Gang kommen, welche die Verdoppelung des Geschmacksgrübchens zur Voraussetzung hat. Bleibt die äussere Teilung des Knospenkörpers aus, so muss es zur Bildung einer doppelporigen Knospe oder eines „Zwillings“ (Hermann) kommen. Nun sind aber Zwillings-, Drillings-, Vierlingsbildungen usf. häufige Erscheinungen in unseren Präparaten. Mithin werden wir durch die aufmerksame Verfolgung der morphologischen Daten gleichsam Schritt für Schritt auf die Frage der Teilkörpurnatur der Knospen hingelenkt, deren Auflösung wir nunmehr an der Hand eines reichen Materials versuchen wollen.

IV. Spezieller Teil der Untersuchung.

1. Einführung.

Die Untersuchung beliebiger morphologischer Systeme auf ihre Teilkörpurnatur ist immer schwierig. Das hat die Geschichte unserer Wissenschaft gezeigt. Man braucht nur an das Beispiel der Zelle zu erinnern. Etwa 20 Jahre lang ging man ununterbrochen dem in Rede stehenden Probleme der Zellenteilung nach; zahlreiche Untersuchungen auf den Gebieten der mikroskopischen Anatomie, der Embryologie, der Pathologie, der vergleichenden Anatomie waren notwendig. Schwere Irrtümer in der Fragestellung und im Urteil liefen mit unter und setzten sich durch ganze Literaturen hindurch fort. Eine unendliche Mühe wurde aufgewendet, und viele Streitigkeiten unter den beteiligten Ge-

lehrten entstanden, bis schliesslich Remak auf Grund seiner embryologischen Untersuchungen die richtige Formel fand: Eine Zelle entsteht immer nur aus einer anderen durch Teilung, weil Leben immer vom Leben stammen muss und eine spontane Entstehung von Zellen ebenso unmöglich ist, wie die Generatio spontanea überhaupt. Obwohl nun Remak auf diese Weise den Kernpunkt der Sache richtig getroffen und in völlig entsprechender Weise zum Ausdruck gebracht hatte, wollten die Streitigkeiten doch noch nicht verstummen, und noch viele Jahre mussten dahingehen, bis endlich das neue Prinzip allgemein anerkannt war.

Soll die Teilkörpernatur irgend eines organisierten Systems nachgewiesen werden, so ist der direkte Weg natürlich der, auf den Prozess der Teilung selbst zu gehen und ihn durch entwicklungsgeschichtliche Untersuchung mit aller wünschenswerten Deutlichkeit in allen wesentlichen Stadien zur Darstellung zu bringen. Wie ich jedoch schon weiter oben auseinandergesetzt habe (S. 392 f.), konnte ich bei den Geschmacksknospen auf die entwicklungsgeschichtliche Untersuchung zunächst verzichten. Als Hauptaufgabe lag vor, das fertige Objekt nochmals genau zu studieren und besonders jene morphologischen Erscheinungen zu verfolgen, welche als der unmittelbare Ausdruck vorangegangener Knospenteilungen sich darstellen konnten. Vor allem war es notwendig, das gesamte Sinnesfeld mit Bezug auf das Vorkommen der komplexen Knospenkombinationen höherer Ordnung (Zwillinge, Drillinge etc.) auf das genaueste zu durchforschen, da diese ihrer Entstehung nach auf Teilungsakte der einfachen Knospen sich zurückleiten lassen. Hiermit komme ich dann auf ein Arbeitsgebiet, auf welchem ich ohne Vorgänger bin, dessen Betrieb unter meiner Hand schon früher und auch jetzt wieder zu reichen Resultaten geführt hat, wie sich weiterhin zeigen wird. Es hat sich aber bei dieser Gelegenheit herausgestellt, dass die genauere Topographie der Knospen, welche offenbar mit ihrer natürlichen Entwicklung und mit den an ihnen ablaufenden Teilungsvorgängen in nahem Zusammenhange steht, bisher unbekannt war, und darum müssen wir mit der Besprechung der topographischen Verhältnisse beginnen.

2. Die Topographie der Knospen im Sinnesfelde.

a) Allgemeines über die Einteilung der Sinnesfelder in querliegende „Stäbe“ und über das Vorkommen mehrporiger Knospen.

Über die Art der Verteilung der Knospen im Sinnesfelde, über ihre wechselnde Grösse und ihre Porenzahl kann man sich nur auf Flachschnittserien in genügender Weise orientieren. Die Anfertigung derartiger Serien ist, wie ich früher schon ausgeführt habe, erschwert, weil die Leisten schwach fächerförmig gestellt sind und ausserdem etwas bogenförmig verlaufen (Textfig. d, e und f, S. 397 f.). Man muss daher das einzuschmelzende Stück sehr sorgfältig orientieren, etwa in der Art, dass man die Schnittebene parallel zur Hauptrichtung der Leisten, also entsprechend der Achse des Fächers einstellt. Aber auch dann noch ereignet es sich, dass die ganze Serie für die Zwecke der feineren Topographie verloren geht, wenn es sich nämlich bei der späteren Besichtigung der Schnitte zeigt, dass das Messer nicht genau senkrecht auf der Zungenoberfläche bzw. nicht genau parallel zur Mittelebene der Leisten stand. In diesem Fall erhält man Schiefschnitte durch das Epithel (siehe z. B. Fig. 20 und 21), welche nur dann brauchbar sind, wenn der Winkel zwischen Schnittebene und Epitheloberfläche nicht zu gross ist.

Auf gut gelungenen Flachschnittserien lassen sich jedoch mühelos sogleich mehrere Grundtatsachen feststellen, nämlich,

1. dass die Knospen innerhalb des Sinnesfeldes im allgemeinen zu Querreihen geordnet sind, d. h. zu Reihen, welche auf der Zungenoberfläche senkrecht stehen (Fig. 14—16: Taf. XXV Projektion A—D).
2. dass die Knospen von ausserordentlich verschiedener Grösse sind. Es kommen ganz kleine Individuen vor, welche nur wenige Zellen enthalten, und daneben andere von riesiger Grösse mit enormer Zellenzahl. Man vergleiche etwa in Projektion A Taf. XXV die kleinsten Knospen, deren Poren sich nicht ermitteln liessen, mit der riesigen dreiporigen Knospe in der Gruppe d; oder man vergleiche in Projektion D die ein-, zwei- und dreiporigen Knospen in den Gruppen a—k;
3. dass viele der Knospen von mittlerer und alle Knospen von bedeutenderer Grösse mehrporig sind. Dies lässt

sich unmittelbar erkennen, wenn der Schnitt durch das Niveau der Ampullen ging (Fig. 8 und 9, Fig. 18, 20 und 21; von den Projektionen besonders E—H).

Es musste nun der Versuch gemacht werden, diese soeben kurz skizzierten Tatsachen in exakter Weise zu verfolgen. Es handelte sich mithin darum, eine eingehende Kenntnis von dem Strukturphänomen der Knospenquerreihen, von der relativen Grösse der Knospen und von dem Vorkommen der mehrporigen Individuen zu erwerben. Zur Lösung dieser Aufgabe stand nur ein Weg frei, nämlich die Methode der topographisch-statistischen Aufrechnung. Zu diesem Behufe wählte ich aus den Flachschnittserien einige günstig im Schnitt gelegene Strecken der Sinnesfelder aus, nahm die Konturen der grössten Querschnitte der Knospen mit dem Abbeschen Apparate auf und projizierte dann auf diese in gleicher Weise die sämtlichen Poren. Solche Projektionen sind nicht schwierig herzustellen (Taf. XXV).

Im einzelnen ging ich folgendermassen vor. Form und Lage der Knospen mussten, wie ich mich durch das Studium der Präparate überzeugte, durch Projektion der grössten Querschnitte dargestellt werden. Es genügt nicht, den äquatorialen Durchschnitt zu wählen, denn die Lage desselben lässt sich in den Präparaten nicht so leicht exakt bestimmen, während sich der grösste Durchschnitt immer ermitteln lässt. Man hat auf diese Weise ein bestimmtes Prinzip der Zeichnung. Die grössten Querschnitte pflegen etwas nach abwärts vom Äquator der Knospen zu liegen, weil diese sich der Regel nach gegen ihre Basis hin etwas ausbauchen. Hierzu vergleiche man die Abbildungen auf unserer ersten Tafel. Man hat, wenn man nach meinem Vorschlage die grössten Durchschnitte projiziert, auch den Vorteil, dass diese in der Zeichnung sich enge zusammendrängen, wodurch die Gesetzmässigkeit ihrer Aufstellung besser zum Ausdruck gelangt. Störend ist nur, dass man die grössten Durchschnitte der Knospen, wenn längere Epithelstrecken der Knospen projiziert werden sollen, oft von mehreren benachbarten Schnitten entnehmen muss. Die entsprechende Aufsuchung und Bestimmung der Poren hat, wenn die Schnitte gut ausdifferenziert sind, meist keinerlei Schwierigkeit, und man kann sie dann leicht mittels Pause auf den ersten Aufriss übertragen. Der Leser wird sich aus der Betrachtung der Fig. 14—16 und 17—19,

Taf. XXII, leicht eine zutreffende Vorstellung davon entwickeln können, wie solche Projektionen sich herstellen lassen.

Auf die geschilderte Weise sind die acht Projektionen auf Taf. XXV entstanden, in denen wir ein genaues Abbild der wirklichen Verhältnisse haben, und zwar entsprechen die ersten vier Projektionen, A—D, mehr dem typischen Verhalten, während die letzten vier, E—H, in ihrem Aufbau sich etwas von diesem entfernen. Zur Erklärung füge ich hinzu, dass ich beim Studium der Serien natürlich versucht habe, mir die verschiedensten Varianten der Sinnesfelder zur Anschauung zu bringen, und dass ich deswegen neben einigen typischen Formen auch einige weniger häufige Varianten absichtlich in die Projektionen aufgenommen habe. Es sind daher zwar alle diese Sinnesfelder in der Form, wie sie vorliegen, völlig normale Bildungen, doch sollte der Leser seine Gesamtanschauung über ihre Zusammensetzung mehr aus den ersten vier Projektionen entnehmen. Nunmehr können wir zur Diskussion des vorliegenden Materials übergehen.

Versuchen wir uns zunächst in einer vorläufigen Weise über den Gegenstand zu orientieren, indem wir die vorliegenden acht Projektionen nach dem Gesamteindruck vergleichen, so stellt sich zunächst heraus, dass die verschiedenen Sinnesfelder (bzw. Teile von solchen) einen individuellen Charakter an sich tragen. In einigen finden sich fast nur kleinere und mittlere einporige Knospen (A—C), während in anderen grosse mehrporige Individuen in reichlicher Menge vorkommen (D—H). Weiterhin ergibt sich, dass die kleineren und kleinsten Knospen zum allergrössten Teile am unteren (hier linken) Rande des Sinnesfeldes ihren Platz haben; einige wenige Exemplare der kleineren Formen kommen jedoch auch längs des oberen Randes vor, während im Innern der Sinnesfelder Knospen kleinster Art kaum anzutreffen sind.

Die Knospen sind nun in der Tat gewöhnlicherweise zu transversalen Reihen geordnet (A—D), welche entweder rein quer oder ein wenig schief zur Längsachse des Feldes verlaufen. Daneben finden sich immer auch Stellen, an denen eine unregelmässige Zusammenordnung der Knospen statt hat (besonders in den Projektionen F—H); diese mögen durch eine Verwerfung des Anlagematerials zustande gekommen sein.

Diese Aufstellung der Knospen in Querreihen war bisher unbekannt. v. Lenhossék meinte, dass vier Längsreihen von

Knospen vorhanden sind, welche in den Querschnittsserien gewöhnlich in der Übereinanderstellung von vier Knospen zum Vorschein kommen (Fig. 1). Jedoch sind derartige Längsreihen, wie unsere Projektionen zeigen, überhaupt nicht vorhanden. Dagegen sind die Querreihen an vielen Sinnesfeldern über weite Strecken hin ausserordentlich deutlich (vergl. z. B. die Originalabbildungen Fig. 14—16 und die dazu gehörige Projektion C), und ich möchte meinen, dass sie auf guten Schnitten der Knospen im Präparate selbst noch deutlicher sind als auf meinen Abbildungen.

Nach allen meinen Beobachtungen kann es gar keinem Zweifel unterliegen, dass die innerhalb der einzelnen Reihen befindlichen Knospen in einer näheren genetischen Beziehung zueinander stehen, in der Weise, dass sie von einem gemeinschaftlichen Anlagekomplex abstammen. Dies erkennt man am besten an der auffälligen Tatsache, dass gelegentlich die ganze Querreihe durch eine einzige vielporige Knospe ersetzt wird (Fig. 8 rechts). Meine Auffassung der Sache wird späterhin durch den weiteren Gang der Darstellung in ausserordentlichem Grade an Wahrscheinlichkeit gewinnen; einstweilen kann sie uns dazu verhelfen, das Rohmaterial der Untersuchung in besserer Weise zu ordnen. Demgemäss führe ich für die Querreihen, welche in der Morphologie der Sinnesfelder eine so grosse Rolle spielen, einen besonderen Namen ein und bezeichne sie als „Stäbe“.

Auf den Projektionen A—E habe ich versucht, die Lage der Stäbe durch Konstruktionslinien darzustellen; im übrigen will ich nicht behaupten, dass diese Führungslinien überall die einzig möglichen oder allein die richtigen seien. Meine Absicht war vielmehr, dem Leser einen Anhalt für seine Anschauung zu geben. Nachdem ich mich dann bei der Projektion E überzeugt hatte, dass die Stäbe mitunter weniger gut ausgebildet sind, habe ich bei den weiterhin folgenden, von dem gewöhnlichen Typ abweichenden Projektionen F—H die Konstruktion der Stäbe nicht mehr konsequent durchgeführt. Die dort sichtbaren Linien haben in den meisten Fällen nebst den beigefügten Buchstaben nur noch die Bedeutung, die betreffende Stelle des Objekts zu kennzeichnen.

Es mag nun auf den ersten Blick hin so scheinen, als ob in der Art und Weise, wie ich die quere Gliederung der Sinnes-

felder zum Vorschein gebracht habe, viel Willkürliches liegt; deswegen ist es nötig zu besprechen, welche Handhaben uns das Objekt selbst bei Beurteilung der in Frage stehenden Strukturerscheinung liefert. Der Beschauer sieht leicht, dass an den gut ausgebildeten Stellen nicht bloss die Knospen schlechthin in regelmässigen oder annähernden Querreihen liegen, sondern dass auch die zugehörigen Poren in linearer Folge aufzutreten pflegen, ein Stellungsgesetz, welches bestehen bleibt, auch wenn unter den Knospen des betreffenden Stabes mehrporige Individuen vorhanden sind (Projektion D, Stäbe b, d, f, g; Projektion F, Stäbe f, g, i, k). Diese lineare Aufstellung der Poren kommt übrigens auch auf gut angelegten Querschnittsserien in bester Weise zum Ausdruck, da man immerhin ziemlich häufig die sämtlichen Poren ein und desselben Stabes auf einem einzigen Schnitte von 6 μ Dicke beisammen findet, und zwar habe ich gelegentlich bis zu sechs Poren nebeneinander erhalten. Es hat sich mir daraus die Vorstellung gebildet, dass viele Sinnesfelder vorkommen mögen, welche noch viel regelmässiger gebaut sind als diejenigen, von welchen ich, durch technische Umstände geleitet, die Projektionen angefertigt habe.

Geringfügige Abweichungen von der besprochenen Stellungsregel kommen natürlich vielfach vor und können unsere Gesamtaufassung nicht beeinflussen. Etwas ganz anderes ist es natürlich, wenn ausnahmsweise (Projektion C, Gruppe l) oder in bestimmten Sinnesfeldern, welche auch sonst sich andersartig verhalten, innerhalb der stabartigen Gruppierungen mehrporige Knospen auftreten, welche in reiner oder fast reiner Querlage befindlich sind, wie in Projektion G bei Gruppe f und bei i + k. Hier haben wir eine Erscheinungsweise vor uns, die ganz offenbar von einer besonderen Variation oder Störung des Entwicklungsprozesses abhängig ist. Mit diesen selteneren Vorkommnissen können wir uns einstweilen an dieser Stelle noch nicht näher beschäftigen, vielmehr fahren wir zunächst in der Besprechung der normalen typischen Anordnung der Knospen fort.

Die Tatsache, dass die Poren der Regel nach in linearer Folge auftreten, sind wir berechtigt darauf zu beziehen, dass die Knospen ein und desselben Stabes aus einer gemeinschaftlichen Anlage hervorgehen, deren weitere Entwicklung mit einigen Teilungsakten verbunden war, wobei die spezifische Teilungsrichtung

von einer zur anderen Teilung erhalten blieb, so dass die Nachkommen einzeilig angeordnet sein müssen. Handelt es sich um vollkommene äussere Teilungen, so erhält man eine Serie einporiger Knospen. Treten innere Teilungsakte auf, welche von äusserer Teilung nicht gefolgt sind, so kommt es zur Bildung mehrporiger Knospen, Zwillings-, Drillingsgebilden usf., deren Poren naturgemäss demselben Stellungsgesetze folgen müssen. Daher ist es eine sehr seltene Ausnahme, wenn in den mehrporigen Knospen die Poren nicht linear geordnet sind, und es scheint mir eine besonders bemerkenswerte Tatsache zu sein, dass solche Ausnahmen fast ausschliesslich unter den dreiporigen Knospen vorkommen, bei welchen dann die Poren entsprechend den Ecken eines Dreiecks gestellt sind (z. B. Projektion E bei i, Projektion F bei d, Projektion H bei d). Vier- bis sechsporige Knospen zeigen die Poren immer in rein linearer Anordnung.

Diese hier kurz entwickelte genetische Vorstellung, welche später besser zu begründen sein wird, erleichtert uns einstweilen die Betrachtung der Projektionen in wesentlicher Weise. Wir dürfen nun annehmen, dass überall die lineare Aufeinanderfolge der Poren das Charakteristische ist. Diese weist ganz bestimmt auf den Entwicklungsprozess hin; versuchen wir daher die Stäbe in einem Sinnesfeld konstruktiv festzulegen, so muss unser Bestreben sein, die natürlichen Folgen der Poren zu bestimmen. Betrachten wir daraufhin die Projektion A—D, so sehen wir, dass die Bestimmung der Lage der Stäbe in derartigen typischen Feldern im allgemeinen einfach ist und meist keinem Zweifel unterliegt. Kleinere Unregelmässigkeiten, allerhand fragliche Stellen, welche verschieden beurteilt werden können, muss man mit in den Kauf nehmen. Wir sehen ganz deutlich, dass die Reihen der Poren teils senkrecht, teils etwas schief gegen den oberen Rand des Sinnesfeldes gerichtet sind, dass ferner der Versuch der Konstruktion bald gerade, bald schwach gebogene Führungslinien ergibt.

Da wir von der Untersuchung der typischen Felder ausgehend die Stäbe als genetische Systeme angesprochen haben und da diese an der linienhaften Aufeinanderfolge der Poren kenntlich werden, so folgt, dass wir auch in den atypischen Sinnesfeldern dasselbe Prinzip der Betrachtung anwenden müssen. Demzufolge deuten wir die auffallenden Porenfolgen in dem oberen

Teil der Projektion F ebenfalls als genetische Gruppierungen. An dieser Stelle, welche zugleich das natürliche Ende eines Sinnesfeldes darstellt, sind die Stäbe offenbar schief umgelegt worden und infolge der augenscheinlichen Verwerfung des Anlagematerials haben sich zugleich allerhand Störungen der normalen Anordnung ergeben, welche es unmöglich machen, die Konstruktion der Stäbe im einzelnen durchzuführen.

Schliesslich folgt aus unseren Betrachtungen für die Auffassung der mehrporigen querliegenden Knospen in den Feldern G und H, dass hier eine besondere Form der Entwicklung des Anlagematerials durch innere Teilungen in der Richtung quer zur Lage der Stäbe zur Anschauung gebracht wird, welche bei den besser entwickelten Sinnesfeldern sich in dieser Art nicht auffinden lässt. Hiervon wird noch weiter unten die Rede sein.

Die Eintragung der Führungslinien in die Projektionen ist nach unseren Erfahrungen im allgemeinen nicht schwierig und demzufolge lassen sich leicht einzelne Stellen mit unregelmässiger Gruppierung der Knospen als etwas Besonderes erkennen und in bestimmter Weise umschreiben. Zu dem Behufe muss man sich der betreffenden Strecke des Feldes, welche, wie der Augenschein lehrt, die Knospen in unbestimmter Lagerung enthält, bei Gelegenheit der Eintragung der Führungslinien von beiden Seiten her annähern. Nehmen wir als Beispiel die untere Hälfte der Projektion F, so bemerken wir, dass wir in der Bestimmung der Stäbe f—l keinerlei Schwierigkeit haben; ebenso sind weiter unten die Stäbe n und m vollkommen deutlich und sogar recht typisch. Jedoch zwischen m und l liegt ein indiskutables Feld, auf welchem besondere Verschiebungen des Knospenmaterials offenbar stattgefunden haben. Weitere Beispiele dieser Art sind überflüssig. Jedenfalls ist es für uns belanglos, wenn in den Sinnesfeldern von im übrigen typischer Gliederung hier und da kleinere unregelmässige Strecken vorkommen.

b) Die Gliederung der Stäbe.

Studiert man auf den Projektionen die Gliederung der Stäbe, so gewahrt man, dass sie in gewissen Fällen, welche einem normalen, typischen Verhalten entsprechen, sich in drei bis vier, selten fünf oder sechs einporige Knospen einteilen. Die Knospen solcher Stäbe ergeben nach Umfang und Form auf Querschnittsserien der

Leisten betrachtet das bisher allein beschriebene Bild (Fig. 1); viele hierher gehörige Beispiele findet man in den Projektionen A—C (z. B. Projektion A, Stäbe a und b, Stäbe i—m, Stäbe o—s). Oft jedoch sind die Stäbe anders eingeteilt; zählt man nur drei Knospen oder weniger, so pflegen sich unter ihnen grössere Exemplare zu befinden, welche mehrporig sind (z. B. Projektion C, Stäbe a, f, v; Projektion D, Stäbe b, d, e, f, g, h, i; Projektion F, Stäbe f, g, i, k, l, m etc.). Es hat dann den Anschein, als ob die grössere mehrporige Knospe an der Stelle mehrerer einporiger steht und diese ersetzt. Es finden sich beispielsweise Stäbe mit zwei grösseren Knospen zu je zwei Poren (Projektion F, Stäbe f und g) und ebenso kommen gar nicht selten ganze ungeteilte Stäbe mit vier Poren vor (vergl. hierzu Fig. 8: zur Linken ein Stab mit drei Knospen, unter diesen eine zweiporig, rechts ein ganzer ungeteilter Stab mit vier Poren).

Als ich im Anfang der Untersuchung auf diese Tatsachen aufmerksam geworden war, glaubte ich, es würde sich vielleicht herausstellen, dass das spezifische Zellenmaterial in den Stäben annähernd gleichgross und nur verschieden eingeteilt sei. Dies hat sich jedoch in keiner Weise bestätigt. Es genügt vielmehr eine oberflächliche Durchmusterung der Projektionen, um zu erkennen, dass das Zellenmaterial der Stäbe nach Zahl und Umfang der Knospen beurteilt an Quantität recht verschieden ist. Am deutlichsten tritt dies in der Projektion D hervor bei Vergleich der grossen Stäbe b, d—h mit den kleinen Stäben n—t. Wie dieser Vergleich zeigt, sind offenbar auch die nämlichen Sinnesfelder auf verschiedenen Strecken an spezifischem Materiale sehr verschieden reich und es kann daher in keiner Weise auffallen, dass unsere Projektionen hinsichtlich der Knospen- und Porenzahl in bedeutendem Grade voneinander abweichen. Gehen wir aufs einzelne, so finden wir unter den Stäben neben den typischen Formen zu drei bis vier Knospen bzw. Poren auch solche mit nur zwei Knospen zu je einem Porus oder mit nur einer Knospe zu zwei Poren (vergl. Projektion E die Stäbe c—f).

Die Zellenzahl in den Stäben ist also ganz gewiss verschieden gross. Jedoch lässt sich immerhin nicht verkennen, dass eine gewisse Tendenz der Entwicklung vorliegt, das Sinnesfeld in annähernd gleichartige Quersegmente zu trennen und eine Knospenzahl von etwa drei bis vier in jedem Stabe herzustellen,

wenn auch im einzelnen massenhafte Varianten der Entwicklung vorkommen. Diese Tendenz tritt meines Erachtens nach in den typischen Bildern der ersten vier Projektionen (A—D) deutlich genug zutage.

Da im vorstehenden davon die Rede gewesen ist, dass innerhalb eines bestimmten Stabes eine grössere mehrporige Knospe an die Stelle mehrerer einporiger treten kann, so ist hier der Ort, darauf aufmerksam zu machen, dass in freilich viel selteneren Fällen ganz offenbar irgend eine bestimmte, besonders auffallende, grosse, mehrporige Knospe in ihrem Bestande Materialien aus zwei benachbarten Stäben in sich einschliesst. So haben wir beispielsweise in Projektion A bei Gruppe d eine Riesenknospe zu drei Poren, welche meiner Meinung nach einen solchen Fall darstellt; die in ihr enthaltenen Materialien sind offenbar nicht zur richtigen Verteilung gelangt. Einen ähnlichen Eindruck hat man in der Projektion B von der dreiporigen grossen Knospe bei Gruppe e, und wiederum den gleichen Fall treffen wir in Projektion C bei Gruppe s und noch deutlicher in Projektion D bei Gruppe c. An letzterer Stelle findet man eine vierporige Riesenknospe, welche zweifellos Materialien aus zwei Stäben enthält. Denkt man sich die Masse der grossen Knospe auf zwei Nachbarstäbe verteilt, so würden diese schmal und dürrftig sich ausnehmen, und es scheint demnach, als ob wegen der relativen Geringfügigkeit des Anlagematerials dessen ordnungsmässige Verteilung nicht zustande kam. Nach dieser Annahme sind wir also bereit, gewisse entferntere genetische Beziehungen auch zwischen den Nachbarstäben zuzulassen, in dem Sinne etwa, dass das Zellenmaterial der Nachbarstäbe ursprünglich unter irgend einer Form in einer einheitlichen Anlage gegeben war. Auf diese hypothetischen Beziehungen zwischen benachbarten Stäben werden wir weiter unten bei gegebener Gelegenheit noch einmal zurückkommen.

Unsere Resultate über die Gliederung der Stäbe sind nach dem Vorstehenden etwa die folgenden. Die Zahl und die Grösse der Knospen in den Stäben variiert ganz ausserordentlich. Auch der Gesamtquerschnitt aller zu einem Stabe gehörigen Knospen ist offensichtlich von sehr verschiedenem Umfange, und daher ist es ausgeschlossen, dass die Stäbe auch nur annähernd die gleiche Zahl spezifischer Zellen enthalten. Demgemäss kann als möglich oder wahrscheinlich hingestellt werden, dass das Anlagematerial

der Stäbe von vornherein verschieden gross war. Trotz dessen lässt sich eine gewisse Gesetzmässigkeit im Ausbau der Stäbe nicht verkennen, da von den zahlreichen Varianten ungemein viele einem gewissen mittleren Typ entsprechen. Dieser liegt bei einer Einteilung in drei bis vier Knospen bezw. entsprechend bei einer Porenzahl von drei bis vier, womit der Fall eingeschlossen ist, dass unter den Knospen mehrporige Individuen vorhanden sind. Im übrigen variieren die Porenzahlen der Stäbe zwischen zwei und sechs bei wechselnder Knospenzahl.

Fünfporige Stäbe wurden beispielsweise in der Einteilung zu zwei, drei, vier und fünf Knospen beobachtet. Sechsporige Stäbe sind Raritäten. Der typische vierporige Stab kommt in allen möglichen Varietäten der Einteilung, zu einer, zwei, drei und vier Knospen, vor, wobei die letzteren Zustände die häufigeren sind. Vom dreiporigen Stabe gilt ähnliches.

Unsere Untersuchungen über die Gliederung der Stäbe weisen demnach mit vollster Bestimmtheit darauf hin, dass sie genetische Einheiten sind, von einer gemeinschaftlichen, teilbaren und darum auch in verschiedener Weise sich einteilenden Anlage abstammen.

Nach meiner Anschauung sind die Einzelknospen der Stäbe irgendwie durch Teilung auseinander hervorgegangen, und ich finde eine weitere Bestätigung meiner Auffassung in dem Umstande, dass gelegentlich das Material einer gewöhnlichen einporigen Knospe in zwei entsprechend kleinere zerlegt sein kann. Dieser Fall ist dann leicht erkenntlich, wenn die beiden Tochterknöspchen in der Querrichtung des Stabes liegen, wie dies z. B. in Projektion C bei b, in Projektion D bei v zu sehen ist. Meiner Erinnerung nach kommen derartige kleinere Knospenpaare nur am Oberrande des Sinnesfeldes häufiger vor; am gegenüberliegenden unteren Rande sind sie seltener, in der Mitte der Stäbe kamen sie nie zur Beobachtung.

c) Die Fächerstellung der Knospen.

Es zeigt sich weiterhin, dass im Zusammenhang mit der serialen Aufeinanderfolge der Knospen innerhalb der Stäbe auch die Art ihrer Einsetzung in das Sinnesfeld und sogar ihre Form in bestimmter Weise variiert. Unter den mir vorangegangenen Autoren ist es allein v. Leuhossék, der von diesen Umständen einige Kenntnis hatte. Dieser Autor sagt über die

spezifische Stellung der Knospen des vierteiligen Stabes¹⁾ das Folgende aus (vergl. unsere Fig. 1 sowie das Schema Textfig. i): „Bei der untersten zeigt die Längsachse eine schief aufsteigende Richtung, so dass ihre Basis beträchtlich tiefer zu liegen kommt,

Fig. i.

Schema zur „Fächerstellung“ der Knospen.

als ihre Spitze. Schon bei der zweiten Knospenreihe (Knospe, d. Ref.) sehen wir eine Lageveränderung eintreten, indem sich die Basis der Knospe erhebt, so dass sie beinahe senkrecht auf die Furche in das Epithel eingepflanzt ist; aber erst bei der dritten Reihe (Knospe, d. Ref.) kann die Lage als eine vollkommen senkrechte bezeichnet werden. Bei der kleinen obersten Knospe schlägt die Achse sogar ein bisschen in das Gegenteil um, d. h. die Basis kommt etwas höher zu liegen als der Geschmacksporus.“ Diese

Beschreibung passt, wie der Leser sieht, fast genau auf die Verhältnisse unserer Fig. 1, und es ist keine Frage, dass v. Lenhossék ein ungemein typisches Verhalten zum ersten Male wesentlich richtig beschrieben hat.

Nach meiner Erfahrung kann man der in Rede stehenden Gesetzmässigkeit, welche auf dem Entwicklungsprozesse beruhen muss, einen noch strengeren Ausdruck in folgender Form geben. Konstruieren wir zu den Knospen eines Stabes deren Richtungsachsen, so liegen diese einander nicht parallel, sondern sie schneiden sich unter Winkeln, welche gegen die Basis des Sinnes-

¹⁾ Zum Verständnis des Zitates wolle der Leser sich erneut vergegenwärtigen, dass v. Lenhossék die Stäbe nicht kannte. Wie früher schon berichtet, nahm v. Lenhossék an, dass im Sinnesfelde vier Längsreihen von Knospen vorhanden sind, weil die Querschnitte der Leisten so häufig vier übereinander gestellte Knospen ergeben.

feldes geöffnet sind (siehe Textfig. i). Demgemäss bilden die Achsen der Knospen miteinander eine Art Fächer. Der obere Randstrahl dieser Linienfigur pflegt in den gewöhnlich vorkommenden Fällen auf der Oberfläche des Sinnesfeldes senkrecht zu stehen, bezw. er weicht mit dem basalen Ende ein wenig in der Richtung nach aufwärts ab; ferner bilden der zweite, dritte, vierte Strahl usf. mit dem ersten wachsende Winkel. Daher wird die Achse der untersten Knospe meistens in bedeutendem Grade gegen die Epitheloberfläche geneigt sein.

Auf einen kürzeren Ausdruck lässt sich das vorliegende Stellungsgesetz nicht gut bringen. Man kann nämlich nicht bestimmt behaupten, dass die Richtungsachse der ersten oder der zweiten Knospe von oben her gerechnet senkrecht auf der Epitheloberfläche stehe; man kann vielmehr treffend nur sagen, dass die Achsen der Knospen in erheblichem Grade gegeneinander zu konvergieren pflegen und dass die nach aufwärts gelegenen Strahlen der Stellung senkrecht zur Epitheloberfläche näher kommen als die unteren. Hierbei mag nun eine der oberen Knospen zufälligerweise im Epithel senkrecht stehen oder nicht.

Diese Art der Einpflanzung der Knospen in das Sinnesfeld bezeichnen wir kurz als „Fächerstellung“. Sie illustriert aufs neue, dass die zu demselben Stabe gehörigen Knospen eine besondere, id est genetische Gruppe bilden. Wäre diese Anordnung nicht so konstant und, wie wir weiter unten noch darlegen werden, zugleich mit einem gesetzmässigen Formwechsel der Knospen verbunden, so würden wir nicht so viel Wert auf diese Einzelheiten legen. Die besondere Konstanz der in Frage stehenden Anordnungen ist unter anderem auch aus unseren Projektionen zu ersehen, obwohl diese ursprünglich nur zu dem Zweck angefertigt wurden, um das Vorkommen der Mehrporigen zu kontrollieren, nicht aber, um feinste Details der Stellung der Knospen zum Ausdruck zu bringen.

Wie bei der Fächerstellung der Knospen die Projektionen ausfallen werden, das kann man sich leicht an der Hand der Fig. 1 (oder auch mittelst der Textfig. i) vergegenwärtigen. Projizieren wir bei Fig. 1 Poren und Querschnitte der Knospen in bekannter Art, so werden die ersteren nicht durchgehends in die geometrische Mitte der letzteren hineinfallen. Vielmehr wird der Porus der untersten Knospe in die Nähe der oberen

Begrenzung des zugehörigen Durchschnittes zu liegen kommen und die nämliche Anordnung wird eventuell, wenngleich weniger deutlich ausgeprägt, auch noch bei der darüber liegenden Knospe zu beobachten sein. Umgekehrt wird bei der obersten Knospe der Porus gewöhnlicherweise in den nach abwärts gewandten Teil der Durchschnittsfigur hineinfallen. Kurzum, auch bei den Projektionen wird es sich geltend machen, dass die Poren in der Querrichtung des Feldes näher beieinander liegen als die Knospenkörper. Liegt die Basis der untersten Knospe tiefer wie der zugehörige Porus (vergl. Textfig. i!), so kann sogar der Fall eintreten, dass der letztere sich auf eine Stelle unmittelbar nach aussen von der Umrisslinie der Knospe projiziert.

Haben wir also unter Benutzung einer Flachschnittserie die Poren mit dem Abbeschen Apparat sämtlich auf einer Pause gesammelt und legen diese über den zugehörigen Aufriss der grössten Knospendurchschnitte (vergl. Taf. XXV), so ist die richtige Lage der ersteren schon dadurch fest bestimmt, dass man versuchen muss, die sämtlichen Poren, auch die der randständigen Knospen, in die Durchschnittsfiguren wirklich hineinzubringen. Man wird also die Pause auf der Unterlage so zu verschieben suchen, dass die Poren an den beiden Rändern des Feldes ebenfalls möglichst alle in die entsprechenden Knospen hineinfallen. Diese Manipulation begreift sich leicht, wenn man eine unserer Projektionen, etwa die erste (A), zu Rate zieht. Hier mussten beispielsweise im Stabe a die Poren der beiden endständigen Knospen je in das bezügliche Feld hineingerückt werden und wegen ihres relativ geringen Abstandes konnten sie nur unmittelbar neben die begrenzende Konturlinie zu liegen kommen. Das Gleiche musste der Fall sein bei mehreren anderen Stäben, z. B. bei i, m usf. Auf diese Art ist die richtige Form der Projektion wohl stets gewährleistet und, da wir glatt und gut geschnitten haben, so hat der Aufriss der Poren mit dem der Knospen immer gut zusammengestimmt. Aber es ereignet sich nicht selten, dass einige der Poren, welche zu Knospen des Unterrandes gehören, wenn diese in sehr schiefer Stellung in das Sinnesfeld eingepflanzt sind, auf eine Stelle unmittelbar nach aussen von dem Grenzkontur des zugehörigen Knospendurchschnittes projiziert werden. In diesem Falle habe ich mir erlaubt, um eine möglichst einfache und übersichtliche Form der

Zeichnung zu bewahren, die betreffenden Poren in ihr Feld hinein-zurücken; die willkürliche Verschiebung der Poren war in diesem Felde absolut genommen eine sehr geringfügige, da sie lediglich von einem Punkte auf der konvexen Seite der Einfassungslinie des Knospendurchschnittes über diese hinweg auf eine unmittelbar benachbarte Stelle an der konkaven Seite derselben Kurve verschoben wurden.

In Projektion A ist die exzentrische und gewissermassen einander zugewandte Stellung der Poren der beiden Endknospen der Stäbe in besonders charakteristischer Weise entwickelt. Die gleiche Wahrnehmung machen wir im übrigen auch bei den anderen Projektionen, wobei ich wiederholt hervorhebe, dass die exzentrische Lage der Poren bei den zu unterst gelegenen Knospen bei weitem häufiger, bzw. besser ausgebildet ist als bei den Knospen des Oberrandes. Schliesslich mache ich in diesem Zusammenhange noch auf die Projektion G aufmerksam, welche mir in besonderem Grade vertrauenswert erscheint. Hier zeigen die grossen querliegenden mehrporigen Knospen am Oberrande des Feldes bei k und m die gleiche „exzentrische“ nach abwärts gewandte Lage der Poren. Eben aus diesem Grunde möchte ich meinen, dass diese Knospen nicht etwa aus der Lage gekommene „Stäbe“ sind, sondern dass sie je mehreren in der Querrichtung nebeneinander liegenden einporigen Knospen des Oberrandes entsprechen und somit der Anlage nach, d. h. der ursprünglichen Bestimmung gemäss, zu mehreren nebeneinander liegenden Stäben gehören.

Einen Blick noch wollen wir auf Fig. 11, Taf. XXI, werfen. denn die Fächerstellung der Knospen macht sich auch auf den Horizontalschnittserien bemerklich. Man mag beim Schneiden das Objekt so gut orientieren wie man will, man wird bei der Durchsicht von Horizontalschnitten immer den Eindruck haben, als sei eine ausserordentliche Anzahl der Knospen ganz und gar vom intergemmalen Epithel des Sinnesfeldes umschlossen. Wie diese Erscheinungsweise zustande kommt, wird man sich leicht an der Hand der Fig. 1, 2 und 3 klar machen können, aus welchen ersichtlich ist, dass der Horizontalschnitt bei schief liegenden Knospen leicht einerseits die Ampulle, andererseits das indifferente Zwischenepithel trifft. Dies zeigt unsere Fig. 11; bei diesem Schnitte war es schwer, das Gesichtsfeld der Zeichnung

so auszuwählen, dass wenigstens einige der Knospen an ihrer Basis mit dem Bindegewebe der Seitenlamelle in Verbindung standen.

d) Die gesetzmässige Variation der Knospengestalt innerhalb der Stäbe.

Die Fächerstellung der Knospen tritt fast überall deutlich hervor, unabhängig von der Einteilung des Stabes, der Porenzahl usf. Naturgemäss hat diese Art der Anordnung auch einen bedeutenden Einfluss auf die Gestalt und die innere Konfiguration der einzelnen Knospen. Diejenigen, welche annähernd aufrecht im Sinnesfelde stehen, also die oberen Knospen der Stäbe, können prächtig abgerundet und allseitig symmetrisch ausgebildet sein. Ein besonders schönes Exemplar einer derartigen wohlgeformten Knospe liegt in Fig. 5 vor. Diese fand sich am Oberrande des Sinnesfeldes und steht demzufolge in Anlehnung an das obere umgebogene Ende der Seitenlamelle.

Je stärker nun die Strahlen des Knospenfächers gegen die Oberfläche des Sinnesfeldes geneigt sind, um so mehr erscheinen die Knospen in sich verzogen, so dass mithin die unterste, besonders wenn sie von erheblicher Grösse ist, in bedeutendem Grade von der Form der anderen Endknospe abweicht. Dies lässt sich leicht durch Vergleich der beiden in Fig. 5 und 6 abgebildeten typischen Knospen des Ober- und Unterrandes feststellen, welche gewissermaßen als Beispiel und Gegenbeispiel betrachtet werden können. Sollen diese Formen richtig aufgefasst werden, so ist zunächst nötig, sich dessen zu erinnern, dass nur die oberen Knospen annähernd senkrecht, die in der Richtung nach abwärts folgenden der Regel nach in steigendem Grade schief in das indifferente Epithel des Sinnesfeldes eingesetzt zu sein pflegen, wovon oben ausführlich die Rede war. Dies hat dann zur Folge, dass die tieferen Knospen, besonders die unterste, mit der nach abwärts schauenden Hälfte ihres Umfanges in stärkere Annäherung an die Oberfläche des Sinnesfeldes kommt, als mit der nach aufwärts gewandten Hälfte. Was gemeint ist, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und fällt leicht ins Auge, wenn es sich um eine kleine Knospe handelt, welche zum Unterschiede von den grossen meist symmetrisch gestaltet sind. Eine solche haben wir in dem unteren Individuum der Fig. 3.

Teilt man bei dieser den ganzen Umfang in zwei Abschnitte, einen unteren und einen oberen, so wendet sich der erstere im ganzen betrachtet der Epitheloberfläche zu und liegt ihr näher, während der letztere ebenso im ganzen von der Epitheloberfläche abgewendet ist und ihr ferner liegt.

Dieses primitive Verhältnis ist weniger leicht erkenntlich bei den grossen, zellenreichen Knospen des Unterrandes, welche im Mittelschnitte eine asymmetrische Gestalt angenommen haben, also bei einer Knospe, wie sie in Fig. 6 vorliegt. Bei einem derartigen, schief in sich verzogenen Gebilde wird der Beschauer zunächst nicht auf den Gedanken kommen, dass die gegebene Form abhängig ist von einer primären Schiefelage im Epithel, und doch ist dies der Fall. Denn es wendet sich der nach abwärts gelegene lang ausgezogene Teil ihres Aussenkonturs der Oberfläche des Sinnesfeldes zu und befindet sich in Annäherung an dieselbe, während der genau gegenüberliegende Teil des Konturs in der Richtung nach rechts aufwärts sieht, von der Epitheloberfläche abgewendet ist und ihr verhältnismässig ferner liegt. Die Charakteristika der Schiefelage im Epithel sind demgemäss vorhanden. Diese ist jedoch nicht so leicht kenntlich, weil die Knospe mit breiter Figur innerhalb des Epithels sitzt und in der Gestalt verändert erscheint. Gehen wir, um den Charakter der Formänderung zu ermitteln, wiederum von der unteren der beiden kleinen Knospen in Fig. 3 aus, so besitzt diese, wie wir sehen, trotz ihrer Schiefelage immerhin noch eine annähernd symmetrische Gestalt; dasselbe trifft ebenso für die drei kleinen Knospen der Fig. 2 in gleichem Grade zu. Ferner zeigt sich, dass auch die obere grosse, senkrecht im Epithel sitzende Knospe der Fig. 5 sich im wesentlichen symmetrisch entwickeln konnte, während die in Frage stehende untere Endknospe in Fig. 6 asymmetrisch geworden ist. Eine derartige Asymmetrie ist bei den grösseren Knospen des Unterrandes, welche eine stark vermehrte Zellenzahl aufweisen, bald in stärkerem, bald in schwächerem Grade ausgesprochen und nimmt weiterhin bei den nach aufwärts, in der Richtung des Oberrandes folgenden Individuen mit der allmählichen Abschwächung ihrer Schiefelage entsprechend leichtere Grade an. Man vergleiche hierzu Fig. 7, welche uns die mittlere Knospe eines dreigeteilten Stabes vorführt. Der Charakter der besprochenen Asymmetrie erschliesst sich am leichtesten aus dem Vergleiche der

Fig. 5 und 6. Während in Fig. 5 die Zellen sich symmetrisch um die Ampulle gruppieren, so dass sie gewissermassen einen symmetrischen rundlich begrenzten Fächer bilden, erscheint eben dieser Zellenfächer in Fig. 6 schief verzogen, eine Formengebung, die dadurch zustande kommt, dass die Zellenleiber in der Aufeinanderfolge von oben nach unten fortdauernd an Länge wachsen. Der Eindruck der verschiedenen Länge der Zellen wird hier, wie ich in Parenthese hinzufügen möchte, im wesentlichen durch die besondere Aufstellung der Kerne bedingt, wobei jedoch zu bemerken ist, dass die wahre Zellenlänge auf derartigen Präparaten eigentlich nicht kontrollierbar ist, denn nach Ausweis der Golgischen Methode kann der Zellenleib nach abwärts vom Kern in einen langen, weithin kriechenden Ausläufer übergehen.

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so ist es das Folgende. Mit der Fächerstellung der Knospen variiert ihre Form. Das Prinzip der Variation ist darin gegeben, dass die Knospen innerhalb des Stabes in der Richtung nach abwärts eine sich sukzessive stärker entwickelnde asymmetrische Form gewinnen, indem innerhalb jeder einzelnen Knospe die dem Unterrande des Sinnesfeldes näher liegenden Zellen mehr und mehr sich verlängern. Daher gewinnt man den Eindruck, als wäre die Masse der Knospe bei den von oben nach unten aufeinander folgenden Individuen in immer stärkerem Grade in der Richtung nach abwärts gedrängt worden.

Diese auf den Mittelschnitten der Stäbe beobachteten Formen der einporigen Knospen kehren in genau der gleichen Weise bei den mehrporigen wieder. Letztere verhalten sich nämlich wie eine Kombination einporiger Knospen, zwischen welchen die epithelialen Scheidewände fehlen. Dass dem so ist, davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man die Fig. 26, 27, 28, Taf. XXIII und ebenso die Fig. 31, 32, 33, Taf. XXIV aufmerksam betrachtet. Man braucht nur den Verlauf des oberen und des unteren Konturs des Knospenkörpers sowie die Anordnung der Zellen zu vergleichen, und man wird sich davon überzeugen, dass hier die nämlichen Verhältnisse vorliegen wie bei Fig. 6. Bei einigen der zitierten Figuren, z. B. bei Fig. 26, 28 und Fig. 31, ist sogar die Hervordrängung der Zellenmasse in der Richtung nach abwärts in bedeutendem Grade ausgesprochen.

Wenden wir uns noch einmal der Betrachtung unserer Projektionen zu, so ist klar, dass die besprochenen speziellen Verhältnisse der Morphologie der Knospen auch auf ihnen zum Vorschein kommen müssen. In der Tat bemerken wir, wenn wir einen typischen Aufriss vor uns haben, wie in A, B und C, dass die Knospen am Unterrande sehr häufig nicht mehr rundlich, sondern in der Richtung des Stabes in die Länge gezogen sind, also beispielsweise in B bei den Stäben b, c, h, i, l, in C bei b, c, h, i, m, n, p etc. Unter Berücksichtigung der exzentrischen Lage des Porus gewinnt man also auch hier den Eindruck, als sei die Masse der Knospe gewissermaßen in der Richtung nach abwärts hervorgedrängt oder hervorgequollen.

Weiterhin möchte ich noch hinzufügen, erwecken auch die in der Richtung von oben nach unten an Länge zunehmenden Epithelmäntel (Fig. 1, 4, 6 und 7) den Eindruck, als seien die indifferenten Zellen des Zwischenepithels durch eine spezifische Materialverschiebung in der Richtung von oben nach unten mitgenommen worden.

Werfen wir zum Schlusse noch einen Blick auf Fig. 11, so zeigt sich, dass die sämtlichen Knospen im Horizontalschnitte ziemlich gleichartig geformt und symmetrisch gebildet erscheinen. Wir dürfen uns daher betreffs der Form der Knospen etwa dahin ausdrücken, dass viele unter ihnen, und zwar besonders diejenigen, welche dem Oberrand genähert sind, rundlich gestaltet und dabei annähernd allseitig symmetrisch entwickelt sind, während die dem Unterrand benachbarten oft seitlich abgeplattete, längliche, bilateral symmetrische Gebilde sind, wobei man die Symmetrieebene auf den Querschnittsserien der Leisten im Mittelschnitte des Stabes erhält. Die zentralen Knospen des Feldes werden naturgemäß ihrer Form nach eine vermittelnde Stellung einnehmen.

Nachdem wir im obigen ausführlich dargestellt haben, dass ungeachtet vieler Abweichungen im einzelnen die gesetzmässige Anordnung der Knospen innerhalb der Stäbe mit ebenso gesetzmässigen Variationen ihrer Gestalt einhergeht, dürfte es wohl klar geworden sein, dass wir hier den typischen Effekt eines bestimmt gerichteten Entwicklungsprozesses vor Augen haben. Es ist nicht möglich, diesen Prozess aus den fertigen Formen in seinen Einzelheiten zu erschliessen; doch sind wir wohl berechtigt, uns eine provisorische Vorstellung über die Endstadien der Entwicklung des Sinnesfeldes zu machen, aus welchen

die besprochenen Anordnungen und Formen hervorgehen. Hier ist zunächst in Rechnung zu ziehen, dass das Sinnesfeld oben bestimmt, unten nicht bestimmt begrenzt ist; am Oberrande stemmen sich die zu äusserst befindlichen Knospen gewissermassen gegen die hakenförmige Umbiegung der Seitenlamelle, und es existiert nach dieser Richtung hin somit keine oder nur eine geringe Möglichkeit der Ausdehnung der Knospen für den Fall, dass diese während der Entwicklung erheblich an Grösse zunehmen oder der Zahl nach sich vermehren sollten. Eine Ausdehnungsmöglichkeit ist vielmehr fast ausschliesslich in der Richtung nach abwärts gegeben. Es muss also in dem angenommenen Falle eine ganz allgemeine Tendenz der Abwanderung des gesamten im Sinnesfelde enthaltenen Zellenmaterials in der Richtung auf die Basis der Geschmackseiste bestehen. Nun sind aber die Geschmacksporen in der das Sinnesfeld deckenden Hornlamelle gleichsam festgelegt; die Poren werden daher der intendierten Materialverschiebung nicht mit der gleichen Geschwindigkeit folgen können, und es werden jeweils die tieferen Schichten des Feldes im Verhältnis zu den höheren die beweglicheren, leichter verschieblichen sein. Aus diesen Momenten musste sich dann bei der Vergrösserung des Sinnesfeldes, also bei der Vermehrung der Knospen und ihrer Volumszunahme, die bewusste Fächerstellung sowie die damit verbundene typische Abänderung ihrer Gestalt gleichsam von selbst ergeben. Selbstverständlich wird auch das Porenfeld sich allmählich verbreitern, aber doch nicht in dem gleichen Grade wie die Basis des Sinnesfeldes. Denn die Poren können ihren Abstand nur allmählich ändern, in dem Maße nämlich, wie mit der natürlichen Abschilferung der oberflächlich gelegenen Hornschichten tiefer gelegene Teile der Knospenkanäle an die Oberfläche rücken, deren Querschnitte wegen der Fächerstellung der Knospen in verhältnismässig weiterem Abstände voneinander befindlich sein werden. Auch die starke Vorbuchtung der grossen unteren Endknospen sowie der spitze Winkel zwischen ihnen und dem benachbarten indifferenten Epithel (S. 394, Textfigur c, Wi) sprechen dafür, dass die Materialverlagerung in den Endstadien der Entwicklung in der Richtung von oben nach unten vor sich geht. Schliesslich kann man auch die besondere Lage der Epithelmäntel mit der supponierten Verschiebung des Zellenmaterials in Zusammenhang bringen.

e) Einiges über die unregelmässig gebauten
Strecken der Sinnesfelder.

Nachdem wir im obigen viele Erfahrungen über den typischen Aufbau der Sinnesfelder gesammelt haben, ist es möglich geworden, noch einige Betrachtungen über die von der gewöhnlichen Erscheinungsweise abweichenden Anordnungen, wie sie auf den Projektionen E—H, Taf. XXV, zutage gekommen sind, anzuschliessen. Ich erinnere daran, dass hier natürlich nur gewisse Abschnitte von den Sinnesfeldern vorliegen, welche in der ganzen Länge der Geschmacksknospen an deren Seitenflächen sich hinziehen. Demgemäss könnten die nämlichen Felder an anderen Stellen eventuell ganz das gewöhnliche Aussehen zeigen.

Diese vier Projektionen E—H zeigen, obwohl sie im einzelnen stark voneinander abweichen, meines Erachtens nach doch ein Gemeinschaftliches, nämlich, dass sie nicht völlig ausentwickelt erscheinen. Dies macht sich besonders an dem Auftreten ungemein vieler mehrporiger Knospen bemerklich, also an dem Auftreten zusammenhängender Massen von Sinneszellen, bei denen die der Regel nach eintretende äussere Sonderung in kleinere Komplexe ausgeblieben ist. Wie aus dem obigen hervorgeht, ist ja das Auftreten der mehrporigen Knospen gewiss nichts Abnormes; sie finden sich immer und kommen im normalen Verlauf der Entwicklung zustande. Erst ihr Überhandnehmen zeigt, dass man doch mit einer Art von Entwicklungshemmung rechnen muss.

Betrachten wir nunmehr die in Frage stehenden Projektionen im einzelnen. Zweifelsohne haben wir bei E eine relativ geringe Anzahl von Knospen, also im ganzen genommen nur wenig spezifisches Zellenmaterial. Dagegen sind die Knospen zum Teil recht gross, und viele von ihnen sind mehrporig. Die Aufstellung in Stäben ist an vielen Stellen noch gut kenntlich; letztere erscheinen jedoch verkürzt und enthalten nur ein bis zwei Knospen. Als eine geringfügige Abweichung möchte zu beurteilen sein, dass die Stäbe zum Teil schief liegen (l, m, n, o); dass jedoch an einzelnen Stellen die Poren nicht in linearer Folge liegen (g, i), deutet schon auf eine erheblichere Unregelmässigkeit der Entwicklung. Im ganzen können wir unser Urteil über den hier vorliegenden Aufriss dahin abgeben, dass im Verhältnis zu ihrer Länge die betreffende Strecke des Feldes verhältnismässig wenig spezifisches Material enthält und dass, wahrscheinlich im Zusammenhang

hiermit, die Einteilung und Anordnung der Stäbe nicht so streng ist wie sonst. Mehr lässt sich darüber nicht sagen.

Die Projektion F zeigt in der Richtung nach aufwärts das natürliche Ende eines Sinnesfeldes. Wir finden hier mehrere grosse bis sehr grosse schiefliegende Knospen (bei a—c), welche drei, vier, ja selbst bis sechs Poren aufweisen. Da die lineare Folge der Poren in dem ganzen Gebiete sehr schön ausgebildet ist, so halte ich dafür, dass wir an dieser Stelle schief umgelegte Stäbe vor uns haben, obwohl diese Auffassung ja im einzelnen nicht näher begründet werden kann. Nach abwärts von der besprochenen Stelle folgt (zwischen c und e) ein unregelmässiges Gebiet, welches nicht weiter diskutabel ist, allmählich jedoch erfolgt eine Umordnung der Knospen auf die Form der Stäbe, welche bei e erreicht ist und von da ab im unteren Teile des Feldes ziemlich streng aufrecht erhalten wird, mit Ausnahme einer kleinen Stelle zwischen l und m. Unser Gesamturteil können wir dahin abgeben, dass hier am oberen blinden Ende des Feldes eine Entwicklungsstörung stattgefunden hat, welche sich in der Richtung nach abwärts bis zur Mitte der abgebildeten Strecke geltend macht; der Rest ist regelmässiger gestaltet.

Wir kommen nun zu der Projektion G. Hier sieht man in der unteren Hälfte der Abbildung einer quere Unterbrechung des Sinnesfeldes, welche durch eine tiefe, oberflächlich stark verhornte Einfurchung des Epithels bedingt war. Es war also an dieser Stelle eine Entwicklungsanomalie zu konstatieren und im Zusammenhang damit sehen wir zu beiden Seiten der Einfurchung eine unregelmässige Anordnung der Knospen. Unter diesen finden sich wiederum viele grosse Individuen, welche bis zu sechs Poren aufweisen (bei o und p). Dass die letzteren umgelegten Stäben entsprechen, kann bei der sehr vollständigen Verwerfung des Materials nicht bestimmt behauptet werden. Unbedingt in Abrede stellen möchte ich es für die Knospe m, welche vierporig ist und genau die Form einer mehrporigen Knospe des Oberrandes besitzt, wie wir sie auch bei k und l und in Projektion H bei a, c, g usw. bemerken. Betreffs dieser mehrporigen querliegenden Knospen des Oberrandes habe ich schon oben hergeleitet (S. 429), dass sie zweifellos mehreren einporigen Endknospen entsprechen und demgemäss das Territorium mehrerer benachbarter Stäbe bedecken, wenn dies auch oft im einzelnen nicht nachweisbar ist, da bei

Epithelstrecken dieser Art die Sonderung in der Längenrichtung des Sinnesfeldes überhaupt eine unvollkommene ist. Einen einfachen hierher gehörigen Fall haben wir in Projektion F bei h, denn hier deckt ganz offenbar eine querliegende zweiporige Endknospe das Territorium zweier Stäbe, welche im übrigen voneinander gesondert sind. Etwas Ähnliches hat man auch in Fig. 8, Taf. XX, wo in der Mitte oben eine grosse zweiporige Knospe die Rudimente zweier Stäbe von obenher deckt. In der Projektion G ist dies Verhältnis zum Teil noch mehr verhüllt, weil nämlich im Innern des Sinnesfeldes querliegende zwei- oder dreiporige Knospen auftreten, welche zu mehreren nicht völlig voneinander getrennten Nachbarstäben gehören. Diese querliegenden Knospen in den inneren Teilen des Feldes entsprechen demgemäss nach meiner Meinung den ähnlich gelagerten mehrporigen Knospen des Oberlandes. Ich würde also beispielsweise annehmen, dass die Gruppe $i + k$ im ganzen drei Nachbarstäben entspricht; h und g mögen einfache Stäbe sein, f dagegen möchte ich als das Homologon zweier Stäbe ansehen, da hier mehrere ziemlich genau quer gestellte zweiporige Knospen übereinander liegen. Die Nachbargruppe e wäre sehr schwer zu taxieren; die drei Knospen enthalten hier zusammen acht Poren, mithin so viele, wie niemals in einem einzelnen Stabe vorkommen. Daher müssten wir schliessen, dass diese Gruppe wahrscheinlicher Weise zwei Stäben entspricht, obwohl die Knospen klein, wenig charakteristisch geformt und nicht in typischer Querlagerung befindlich sind. Bei d und c haben wir zwei wohlgeformte, normale Stäbe und schliesslich bei b eine Gruppe, die auf zwei Nachbarstäbe bezogen werden kann. Unser Gesamturteil über die vorliegende Projektion würden wir demgemäss dahin abgeben, dass im unteren Teil derselben auf Grund einer Entwicklungsstörung eine starke Verwerfung stattgefunden hat, während im oberen Teil die Sonderung des Materials in der Längenrichtung des Feldes offenbar eine unvollkommene ist, was an der grossen Zahl mehrporiger querliegender Knospen kenntlich wird. Auf unsere aus dieser Anschauung abgeleiteten Deutungsversuche, wie wir sie vorstehend in Vorschlag gebracht haben, um zu einer ungefähren Übersicht zu gelangen, wollen wir im einzelnen kein besonderes Gewicht legen.

Der unregelmässigste Aufriss ist derjenige der Projektion H. Oben haben wir das natürliche Ende des Feldes, unten war das-

selbe durch eine Einfurchung analog derjenigen in der vorigen Figur unterbrochen. Mit der Gegenwart der letzteren mag es zusammenhängen, dass die Verwerfung des Materials in der unteren Hälfte des Feldes eine sehr vollkommene ist. Nach aufwärts hingegen treten Verhältnisse hervor, die denjenigen der Projektion G zum Teil analog sind. Wir gewahren wiederum die grossen mehrporigen querliegenden Randknospen, welche offenbar doch etwas Charakteristisches sind. Wir können sie aber hier nicht mehr so gut auf eine Mehrheit von unterliegenden Stäben beziehen, da die im Inneren des Feldes auftretenden zwei- und dreiporigen Knospen nicht genau quer, sondern schief gelagert sind, wie denn ein grosser Teil des Feldes, nämlich die Strecke zwischen c und g, schief verzogen erscheint. Wir sehen daher an dieser Stelle von jeder Diskussion der Einzeltatsachen ab. Unser Gesamturteil würde dahin lauten, dass dieser Aufriss verhältnismässig wenige Knospen enthält und an spezifischem Materiale sichtlich arm ist, dass er demzufolge einen unentwickelten Eindruck macht, dass jedenfalls die Gliederung in der Quer- und in der Längsrichtung sehr unvollkommen ausgebildet ist.

3. Spezielle Morphologie der mehrporigen Knospen.

An den Anfang dieses Abschnittes über die spezielle Morphologie der mehrporigen Knospen stellen wir eine tabellarische Übersicht über ihr Vorkommen in der Projektion A—H und bitten den Leser, einen Blick auf diese Aufrechnung zu werfen. Die Projektionen sind nach den Ziffern in der Kolonne X geordnet, also nach den Ziffern, welche angeben, wie hoch der Prozentsatz der Mehrporigen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Knospen war.

In dieser Tabelle haben wir also eine Art statistischer Übersicht über die verschiedenen Varianten der Knospen und ihre Verbreitung in den Sinnesfeldern. Jedoch mache ich ausdrücklich darauf aufmerksam, dass das Material der Aufrechnung, wenn strenge Ansprüche gestellt werden, noch zu klein ist. Denn es hat die *Papilla foliata* über 15 Leisten, mithin über 30 Sinnesfelder; wir besitzen aber nur acht Projektionen und diese betreffen nicht die ganzen Felder, sondern nur Abschnitte von solchen. Da aber nicht nur die Felder selbst, sondern auch die Papillen verschiedener Tiere unter sich verglichen in ihrem Aufbau variieren werden, so ist klar, dass unsere Aufrechnung nur dazu dienen

Übersichtstabelle über das Vorkommen ein- und mehrporiger Knospen in den Projektionen A—H.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Projektion	Einporige Knospen	Zweiporige Knospen	Dreiporige Knospen	Vierporige Knospen	Fünfporige Knospen	Sechsporige Knospen	Gesamtzahl der Knospen	Mehrporige Knospen überhaupt	in Prozenten der Gesamtzahl	Porenzahl der mehrporigen Knospen überhaupt	überhaupt	in Prozenten d. Gesamtzahl
A	66	1	1	—	—	—	68	2	2,9	71	5	7,04
B	60	1	1	—	—	—	62	2	3,2	65	5	7,7
C	72	8	2	—	—	—	82	10	12,2	94	22	22,2
D	56	15	3	1	—	—	75	19	25,3	99	43	43,0
E	23	8	5	2	—	—	38	15	39,4	62	39	62,9
F	33	22	3	2	—	2	62	29	46,7	106	73	68,8
G	41	28	6	2	—	2	79	38	48,1	135	94	69,6
H	17	17	8	—	1	—	43	26	60,4	80	63	78,7
Summe	368	100	29	7	1	4	509	141	29,7	712	344	—

kann, eine allgemeine Vorstellung über die Natur der wirklich gegebenen Verhältnisse zu erwecken. Selbstverständlich habe ich nicht die Absicht, als Autor meine eigene Mühewaltung zu diskreditieren und ich hätte die Tabelle nicht gegeben, bezw. sie in passender Weise vervollständigt, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass die aus der Tabelle ersichtlichen Resultate den objektiven Verhältnissen nahe kommen, wobei ich mich in meinem Urteile auch auf die genaue Durchsicht der Querschnittsserien stütze. Hierzu muss ich noch die folgende Erklärung abgeben.

Die Tabelle soll das zahlenmässige Vorkommen der Ein- und Mehrporigen vor Augen stellen. Ich habe nun früher auseinandergesetzt, dass die Projektionen E—H in ihrer topographischen Konfiguration sich von den typischen Verhältnissen einigermaßen entfernen. Es ist deswegen aber nicht notwendig, dass eben diese Projektionen in bezug auf das zahlreiche Vorkommen mehrporiger Knospen gänzlich aussergewöhnliche Verhältnisse darbieten, d. h. Verhältnisse, welche in Feldern mit typischer Gliederung nicht vorkommen. Denn man findet auf den Querschnittsserien, bei denen man die sämtlichen Sinnesfelder

der Papille in ganzer Ausdehnung nach und nach zu Gesicht bekommt, welche ferner bei guter Orientierung dem Beschauer die Mittelschnitte der Stäbe in sehr reichlicher Zahl vorführen, eben nicht gar wenige, sondern gelegentlich ausserordentlich grosse Mengen mehrporiger Knospen, natürlich vor allen Dingen zweiporige, dann auch viele dreiporige, dazu immer auch vierporige, wenngleich solche in geringer Zahl. Ich habe daher den Eindruck gewonnen, dass auch die Felder von typischer Gliederung, also mit guter Ausbildung der Stäbe, in der Art variieren können, dass ungemein viele mehrporige Knospen in der typischen Stellung auftreten, welche den hohen Ziffern bei E—H recht wohl entsprechen können. Aus diesem Grunde schalten wir die letzteren aus der Betrachtung nicht aus, sondern halten es für richtiger, sie trotz ihrer besonderen Konfiguration als geeignete Repräsentanten der Felder mit einer Vielzahl mehrporiger Knospen anzusehen. Für diese Stellungnahme kommt in Betracht, dass die sämtlichen Felder natürliche Varianten ein und desselben morphologischen Systems sind, und dass in bezug auf das Vorkommen mehrporiger Knospen die Variation A ebensogut ein Extrem ist wie die Variation H.

Im übrigen werde ich aus unserer Aufrechnung nur einige wenige Ziffern herausgreifen. Untersucht wurden 509 Knospen und davon waren $141 = 29,7\%$ mehrporige. Dies ist anscheinend eine gute Ziffer, denn die beiden in unserer Tabelle in der mittleren Stellung befindlichen Varianten D und E ergeben $25,3$ und $39,4\%$, im Durchschnitt $32,3\%$ mehrporige, eine Ziffer, die mit den vorstehend genannten nahezu übereinstimmt. Die Extreme sind jedoch ausserordentlich; einerseits fehlen — wenigstens streckenweise — die Mehrporigen fast vollständig, andererseits machen sie über 60% der Bevölkerung des Feldes aus. In letzterem Falle gehören über dreiviertel aller Poren den Knospen der höheren Ordnungen zu.

Die Zwei- und Dreiporigen sind, wie man sieht, ganz ungemein häufig; auf 100 der ersteren Art kommen noch 29 der letzteren. Zweiporige Individuen sind auch auf den Querschnitten der Leisten in so grosser Zahl vertreten, dass ich der Übung halber die Studierenden in den Kursen danach habe suchen lassen. Die Vierporigen sind jedoch schon sehr viel seltener, während die Fünf- und Sechsporigen als Raritäten gelten können. Jene,

die Vierporigen, kommen noch als normale Bestandteile der Stäbe, eventuell unter der Form der „ganzen“ Stäbe vor (Fig. 8): die Angehörigen der beiden letzten Klassen treten jedoch nur noch bei abnormer Lagerung des Materials auf.

Gehen wir zur Besprechung der Morphologie der höherwertigen Knospen über, so stellen sich einige interessante Einzelheiten heraus, auf welche wegen der Frage der Teilkörpernatur der Knospen geachtet werden muss.

Die kleinsten der zweiporigen Knospen sind kleiner als die grössten der einporigen (Fig. 23 im Verhältnis zu Fig. 6 und 7); ebenso sind die kleinsten der dreiporigen kleiner als die grössten Zweiporigen (Fig. 27 im Vergleich zu Fig. 26) usf. Es sind aber auch die grössten Zweiporigen sehr viel umfangreicher als die grössten Einporigen (Fig. 26 im Vergleich zu Fig. 6), die grössten Dreiporigen ebenso bei weitem umfangreicher als die grössten Zweiporigen (Fig. 28 und Fig. 26) usf., — Verhältnisse, die notwendig festgestellt werden müssen, um klarzulegen, dass die Zellenzahl der Knospen der verschiedenen Ordnungen durchaus nicht etwa nach irgendwie einfachen Proportionen wächst. Im übrigen habe ich durch exakte Messungen das durchschnittliche Volumen der Knospen der verschiedenen Klassen festzustellen versucht, wovon weiter unten noch die Rede sein wird. Einstweilen kann sich der Leser über die relativen Grössenverhältnisse der verschiedenen Knospen an der Hand unserer Abbildungen genügend orientieren, da ihr Volumen den Mittelschnitten direkt proportional anzunehmen ist.

Die zueinander gehörigen Poren der höherwertigen Knospen stehen bald nahe beieinander, bald halten sie grössere Abstände inne. Diese Verhältnisse verdienen eine besondere Besprechung, da wir ja voraussetzen, dass die Knospen sich während der Entwicklung zu teilen pflegen, wobei auch die Poren verdoppelt werden und die Tochterporen sich allmählich voneinander trennen müssen.

Hier sind die Verhältnisse der Zweiporigen, da sie in beliebiger Menge zur Untersuchung herangezogen werden können, am meisten zu beachten. Es zeigt sich, dass bei kleinen und mittleren Knospen die Poren oft sehr nahe beieinander liegen (Fig. 23), während sie bei den Riesenknospen (Fig. 25, 26) weite Abstände innehalten. Bei kleinen Knospen ist es, wie ich aus-

drücklich hervorheben möchte, manchmal kaum noch möglich, festzustellen, dass es sich wirklich um zwei, nicht bloss um einen vergrösserten, eventuell in Teilung befindlichen Porus handelt (Fig. 23). In einigen Fällen konnte erst die Anwendung der apochromatischen Ölimmersion die Entscheidung über die fragliche Duplizität des Porus erbringen. Diese wachsende Skala der Entfernungen der Poren bei wachsender Grösse der zugehörigen Knospen stimmt durchaus mit unserer Vorstellung überein, dass Teilungsakte vorkommen und dass die Geschmacksrübchen der einfachen Knospen bei zunehmender Zellenzahl einer allmählichen Spaltung unterliegen.

Sind Poren, Knospenkanäle und Ampullen in deutlichem Grade voneinander getrennt, so gewahrt man leicht, dass ein Teil der Sinneszellen gegen die eine, ein anderer Teil derselben gegen die andere Ampulle konvergiert. Jedoch sind die Schwesterampullen und die ihnen entsprechenden Knospenanteile oft von ungleicher Grösse. Dies trifft sich in gleicher Weise in allen Klassen der Knospen der höheren Ordnungen. Erklärbar sind diese Verhältnisse nicht; doch mache ich darauf aufmerksam, dass, wenn es sich um eine unterste Knospe handelt, der am meisten nach abwärts gelegene Porus besonders klein zu sein pflegt (z. B. Fig. 34). Dementsprechend finden wir, wie schon früher erwähnt wurde, dass die in den Stäben zu unterst gelegenen einporigen Knospen häufig sehr klein und ihre Poren kaum auffindbar sind. Es sieht also ganz so aus, als ob die kleinsten Knospen des Unterandes lediglich abgesprengte Teilchen der über ihnen stehenden grösseren Knospen sind.

Betrachtet man ferner auf den Mittelschnitten der Stäbe bezw. der Knospen die Gegend zwischen den beiden Zellengruppen, welche auf zwei benachbarte Ampullen konvergieren, so findet man dort unmittelbar unter der Schicht der das Sinnesfeld deckenden Plattenepithelzellen immer einen eigentümlichen dreieckigen Zwickel, welcher auf allen meinen Abbildungen mehrporiger Knospen leicht zu sehen ist. Dieser Zwickel ist nicht ganz leicht zu untersuchen. An klaren Eisenhämatoxylin-Präparaten zeigt er eine Protoplasmamasse, welche äusserst fein gekörnelt ist, und man gewahrt hier und dort, dass in ihr Kerne liegen (Fig. 26 und 29). Die Natur der Kerne selbst und der Plasmamasse lassen darüber keinen Zweifel, dass das Territorium des

Zwickels zu der Knospe selbst gehört; demgemäss muss ich es für ausgemacht halten, dass diese Zwickel von den Leibern einiger Sinneszellen ausgefüllt werden, welche der Form nach sich den gegebenen Raumverhältnissen angepasst haben, also erheblich verdrückt sind. Dass das Plasma solcher Zellen an Stelle einer bestimmten Struktur eine feine Körnelung aufweist, halte ich für leicht erklärlich, weil nur die langgestreckten Sinneszellen die ihrer Form entsprechende feine parallele Faserung aufweisen können. Ob die Zwickelzellen Sinneshaare tragen, wie die normal geformten Zellen, konnte ich nicht feststellen.

Noch möchte ich erwähnen, dass die Zwickelzellen auch sehr schön auf den Horizontalserien zum Vorschein kommen (Fig. 11), bei jenen doppelporigen Knospen, welche der Lage nach zum grössten Teil dem Oberrande des Sinnesfeldes angehören.

4. Feststellungen, welche sich auf den Teilungsakt beziehen.

a) Teilungsformen der Knospen.

Eine besondere Aufmerksamkeit erheischen bei den mehrporigen Knospen die Basalzellen. Wie bei den Einporigen treten sie auch hier bald in vereinzelter Exemplaren (Fig. 29, b), bald in der Form zusammenhängender Epithelmäntel auf (Fig. 26, ep). Dass diese Zellen von dem indifferenten Zwischenepithel abstammen, wird noch erinnerlich sein.

Bei einem kleineren Teile der Mehrporigen gewahrt man nun, dass die Basalzellen sich in sehr deutlicher Weise gegenüber den Zwickeln zu einem Häufchen gruppieren. Diese Zellengruppen sind, wenn klein, äusserst wenig auffallend (Fig. 30, epk, auch schon in Fig. 25, b). Sie erhalten ihre besondere Bedeutung erst dadurch, dass sie in anderen Fällen von der Basis der Knospe emporwachsend sich wie ein Keil zwischen die Masse der Sinneszellen hinein erstrecken (Fig. 31, epk und 32, epk) und im äussersten Falle (Fig. 33, sw und 34, sw) zwischen zwei benachbarten Knospen teilen eine unvollkommene Scheidewand bilden. Diese Keile und Scheidewände sind bei meinem Materiale vom ausgewachsenen Kaninchen selten, aber vorzüglich gut sichtbar. Besonderheiten bieten diese Bildungen nicht dar, nur den einen Umstand möchte ich erwähnen, dass in einigen Fällen der Keil bzw. die Scheidewand am freien Ende eine derbe, in Eisenhämatoxylin stark gefärbte Randfaser zeigte (Fig. 31, 33 und 34), d. h. man findet an

der bezeichneten Stelle auf dem optischen Querschnitt einen derben, intensiv schwarz gefärbten Punkt, welcher beim Heben und Senken des Tubus in erheblichem Umfange konstant bleibt. Der freie Rand der Scheidewand ist also fester ausdifferenziert, möglicherweise an dieser Stelle verhornt.

Ich möchte nun nicht glauben, dass beim ausgewachsenen Kaninchen noch eine erhebliche Anzahl von Knospen durch weitere Teilung sich vermehren. Vielmehr glaube ich, dass die beobachteten Teilungsformen, denn um solche handelt es sich, sozusagen fixierte Bildungen sind, welche sich in dieser Form erhalten haben, als der Prozess des Grössenwachstums der Papille allmählich zum Stillstande kam. Für einen gewissen Teil der Knospen mit Scheidewandbildung liess sich ferner deutlich nachweisen, dass es sich um Hemmungsbildungen handelt, wobei die Ursachen der Entwicklungshemmung völlig klar sind. Betrachtet man nämlich Fig. 30 und 32, so zeigt sich, dass die Stellung des Keiles an der Basis der Knospe nicht genau der Stellung des Zwickels zwischen den beiden Ampullen entspricht. Stellt man sich demgemäss den Keil als wachsend vor, so würde derselbe niemals die Knospe in einer der vorangegangenen Sonderung der Geschmacksgrübchen entsprechenden Weise durchteilt haben. Viel-

Fig. k. Schematische Skizze zur Erläuterung der sogenannten Zellenverschränkung. A und B die beiden Halbtteile der Knospe; zwischen beiden an der Basis der Epithelkeil alternierend mit den Ampullen. C in Verschränkung befindliche Zellengruppe.

mehr sieht man besonders leicht in Fig. 32, aber auch in Fig. 30, dass ein Teil der Sinneszellen, welche von der Basis der einen Halbknospe entspringen, zu dem Porus der anderen Halbknospe hinziehen, um dort zu endigen (vergl. das Schema der Textfigur k). Diese Erscheinungsweise bezeichne ich als Verschränkung der Sinneszellen, und alle Knospen, bei denen dies nachweisbar ist, betrachte ich naturgemäss als Hemmungsbildungen. Je-

doch ist es in praxi bis jetzt noch nicht möglich gewesen, die Zellenverschränkung in allen Fällen, wo sie wirklich vorhanden

sein mag, bestimmt zu erkennen, so dass ich mir auch keine annähernde Vorstellung darüber erwerben konnte, wie weit dieselbe verbreitet sein mag. Was unsere Abbildungen angeht, so mag es wohl sein, dass auch in Fig. 33 und 34 einige wenige Zellen in der beschriebenen falschen Stellung befindlich sind; aber bestimmt behaupten lässt es sich nicht. Jedenfalls liegt nach unseren weitschichtigen Beobachtungen kein Grund vor, die gewöhnlichen polymeren (mehrporigen) Knospen als Hemmungsbildungen anzusehen, welche etwa in ähnlicher Weise durch Verschränkung oder unordentliche Durcheinanderschiebung der Sinneszellen zustande gekommen sein könnten.

Es bleibt mir noch übrig, zwei besondere Formen von gehemmter Knospenteilung zu besprechen, welche ich auf Flachschnittserien aufgefunden habe; hierauf beziehen sich die Fig. 36 und 37.

Bei Fig. 36 sieht man in A und B zwei aufeinanderfolgende und in C einen etwas tiefer gelegenen Schnitt durch dieselbe Knospe. A zeigt eine einfache Ampulle und an der linken Seite des Konturs eine Kerbe. Bei B sieht man die Knospe durch eine Scheidewand geteilt, und zwar liegt der Schnitt entsprechend dem oberen Ende der Scheidewand, wo die offenbar verhornte, hier stark geschwärzte „Randfaser“ (vergl. oben) getroffen wird. Fig. C endlich gibt zur Ergänzung einen tieferen Schnitt etwa durch die Mitte des Knospenkörpers. Danach handelt es sich um eine grössere einporige Knospe, welche von einer in der Richtung nach aufwärts emporragenden Scheidewand fast bis zur Höhe der einfachen Ampulle in zwei gleiche Teile zerlegt ist (Textfig. 1). Der Fall dieser Knospe ist ein *Casus perrarus* und zeigt wiederum, dass die Scheidewandbildung bis zu gewissem Grade von der Teilung des Geschmacksgrübchens unabhängig ist. Während letztere voranzugehen pflegt, ist sie diesmal ausgeblieben und die Scheidewandbildung dennoch eingetreten. Der Fall dieser Knospe ist ferner durch die Konkreszenzhypothese absolut unerklärbar.

Fig. 1. Schematische Skizze zur Erläuterung der Schnittserie Fig. 36, Taf. XXIV.

Noch komplizierter sind die Gliederungsverhältnisse in dem Knospenkonvolut der Fig. 37. Bei A sieht man zunächst den oberen Pol einer einheitlichen Knospe mit zwei Ampullen und bei B den nächstfolgenden Schnitt, welcher den oberen stark verhornten Rand der Scheidewand fast in ganzer Länge getroffen hat. Bei C haben wir ferner einen um ein beträchtliches tiefer liegenden Schnitt, welcher zeigt, dass die Scheidewand den Knospenkörper in einen grossen oberen und einen um vieles kleineren unteren Anteil zerlegt hat; der letztere aber lässt wiederum eine Einschnürung erkennen, welche auf dem nächstfolgenden Schnitte D perfekt ist, so dass der Knospenkörper an seiner Basis aus mindestens drei getrennten Abschnitten besteht. Es zeigte sich jedoch zwischen dem grossen oberen Durchschnitte einerseits und den beiden kleineren andererseits noch ein kleinster abgesprengter Teil (siehe in D), dessen Zusammenhang mit dem gemeinschaftlichen Knospenkonvolut in der Richtung nach aufwärts nicht konstatierbar war. Vernachlässigen wir diese Einzelheit, so verhält sich der eben beschriebene zusammengesetzte Knospenkörper wie folgt. In der Richtung nach aufwärts haben wir zwei Ampullen und zwei Knospenteile, die durch eine unvollkommene Scheidewandbildung voneinander gesondert werden, also etwa wie in Fig. 33. Der untere Knospenanteil zerlegt sich jedoch durch eine abermalige niedrige Scheidewandbildung und verhält sich demgemäss, da ihm

nur eine Ampulle zugehört, wie die vorhin beschriebene Hemmungsbildung der Fig. 36. Bringt man die hier beobachteten Gliederungen durch ein Schema zum Ausdruck, so nimmt dasselbe die Form der Textfig. m an.

Fig. m.

Schematische Skizze zur Erläuterung der Schnittserie Fig. 37, Taf. XXIV.

Die beschriebenen abnorm gebildeten Knospenkörper waren die einzigen von den gewöhnlichen Regeln

der Entwicklung abweichenden Kombinationen, welche ich in einem grossen Schnittmateriale aufgefunden habe.

Fassen wir das Wesentliche aus dem vorstehenden Abschnitt zusammen, so ist es das folgende. Die Basalzellen sind indifferente

Epithelzellen, welche von dem intergemmalen Epithel abstammen, und sie sind bestimmt, bei der Knospenteilung die Trennungswände zwischen den Tochterknospen zu liefern. Dies geht in evidenter Weise aus unseren Beobachtungen hervor. Ich erinnere hier ferner daran, dass die Basalzellen hauptsächlich in den Knospen sich finden, welche dem Unterrande genähert sind, und dass es wiederum nicht die kleinen einporigen, sondern eben gerade die grösseren, besonders die mehrporigen, also eventuell gerade die teilungsfähigen Knospen sind, welche sie beherbergen. Danach muss man schliessen, dass während der Entwicklung die Knospenteilungen besonders in der Region längs dem Unterrande des Sinnesfeldes sich abspielen.

b) Die relative Grösse ein- und mehrporiger Knospen im Verhältnis zum Teilungsakte.

Es musste von erheblichem Interesse sein, etwas Genaueres über die relativen Grössenverhältnisse der Knospen der verschiedenen Ordnungen zu erfahren. Man konnte z. B. die Frage aufwerfen, ob die Einporigen bis zu einer bestimmten Grösse anwachsen und sich dann durchteilen, oder eventualiter, ob sie, wenn die äussere Teilung ausbleibt, von einer bestimmten Grösse an in den zweiporigen Zustand übergehen usf. Da nun Bestimmungen der Zellenzahl oder des Volumens der Knospen nicht möglich sind, so schien es mir erlaubt, an Stelle dessen die grössten Querschnitte der Knospen in Vergleich zu setzen. Letztere wurden auf den Flachschnittserien aufgesucht, mit dem Abbeschen Apparat bei 1000facher Vergrösserung aufgenommen und mit einem Planimeter ausgemessen. NB. Das Instrument, dessen ich mich bediente, war das kleine Kugelrollplanimeter Nr. 29 von G. Coradi in Zürich. Hat man sich auf dieses eingeübt, so arbeitet es sehr exakt, so dass die durch die Messung selbst entstehenden Fehler nicht in Betracht kommen. Die auf diesem Wege erhaltenen Ziffern würden sicherlich ein Vergleichsmaterial von erstem Range abgeben, wenn man nicht eben den Übelstand mit in Kauf nehmen müsste, dass wegen der Fächerstellung der Knospen auf den Flachschnittserien nicht alle Individuen genau senkrecht, sondern vorzüglich die dem Ober- und Unterrand benachbarten etwas schief zur Richtung der Hauptachse durchschnitten werden. Die in Rede stehenden

„grössten“ Durchschnitte parallel zur Oberfläche des Sinnesfeldes haben also in der Tat nicht alle genau die gleiche Lage zum Knospenkörper und sicherlich erhält man besonders für die unteren Endknospen zu grosse Werte. Wie man sich aber durch Vergleichung der Fig. 1—7 überzeugen kann, dürfte der auf diesem Wege entstehende Fehler im Verhältnis zu dem beabsichtigten Zwecke, eine blosse Übersicht über die relative Grösse der Knospen zu erhalten, nicht allzu bedeutend sein. Zweifellos würde man durch eine exakte Ausmessung der Mittelschnitte, wie sie unsere Abbildungen zeigen, bessere Werte erhalten; jedoch wäre die Aufsuchung von ca. 150 guten Mittelschnitten — soviel würden wir etwa brauchen — und ihre Ausmessung eine unverhältnismässig grosse Arbeit gewesen, welcher man andererseits wiederum zum Vorwurf machen könnte, dass dabei nicht jede beliebige im Gesichtsfeld sich bietende Knospe verwertbar ist, sondern dass eine Auswahl stattfinden muss, welche von dem Gutdünken des Untersuchers abhängig ist. Also wird der Leser wohl mit mir darin übereinstimmen, dass es einstweilen bei der Ausmessung der in den Flachschnitten enthaltenen grössten Durchschnitte sein Bewenden haben konnte. Den bei diesem Verfahren entstehenden Fehlern gehen wir dadurch aus dem Wege, dass wir auf die einzelne Zahl sehr wenig Wert legen, vielmehr unsere Resultate auf die Durchschnittsziffern, auf die Vergleichung ganzer Zahlengruppen usf. gründen.

Ich habe also bei einigen Sinnesfeldern innerhalb bestimmter Strecken ihres Verlaufes die grössten Durchschnitte sämtlicher sich darbietenden Knospen bestimmt, um auf diese Weise jede Willkür in der Auswahl der Objekte zu vermeiden. Bei diesem *Modus procedendi* habe ich naturgemäss sehr viele einporige und eine grössere Zahl von zweiporigen, aber nur wenige drei- und vierporige Knospen ausgemessen; fünf- und sechsporige Individuen kamen auf den untersuchten Epithelstrecken nicht vor. Demgemäss hätte ich wohl am besten eine Ergänzungstabelle aufgestellt und in dieser die Ziffern für eine grosse Anzahl beliebig herausgesuchter hochwertiger Knospen vereinigt. Jedoch ich habe auf eine Fortsetzung dieser Untersuchung verzichtet, weil das Resultat bereits sichtbar ist und weil andererseits die Ausführung zahlreicher planimetrischer Messungen auf die Dauer in ungemessenem Grade anstrengend ist. Sollte sich späterhin aus theore-

Tabelle über den Flächeninhalt des grössten Durchschnittes einiger Geschmacksknospen, gemessen parallel zur Oberfläche des Sinnesfeldes und berechnet in μ^2 .

[illegible]

tischen Gründen die Notwendigkeit ergeben, das Zahlenmaterial reicher zu gestalten, so liegen meine Serien für eine Fortsetzung der Untersuchung bereit.

Durchmustern wir die vorstehende Tabelle, so sehen wir, dass die Einporigen mit sehr kleinen Knospen beginnen, wie dies früher schon auseinander gesetzt wurde, denn die kleinsten Knospen bestehen aus nur wenigen Zellen. Weiterhin ergibt die Tabelle, dass die Einporigen zwischen 1000 und 1600 μ^2 Durchschnittsfläche am häufigsten sind und dass von da ab ihre Zahl mit wachsender Grösse sehr rasch abnimmt, um bei etwa 2300 μ^2 zu endigen. Der Durchschnitt der Einporigen liegt bei 1236 μ^2 ; hierbei ist jedoch in Anrechnung zu bringen, dass das gelegentliche Vorkommen einzelner sehr kleiner Knospen, für welche vielleicht ein besonderer Modus der Entstehung gesucht werden muss (siehe S. 442), die algebraisch berechnete Durchschnittsziffer stark herabsetzt. Man erhält daher eine zutreffendere Vorstellung von den Grössenverhältnissen der Einporigen, wenn man eine Häufigkeitskurve der Individuen verschiedener Grösse aufstellt, wie sie die nebenstehende Tafel zeigt.

Die Einrichtung unserer Kurventafel ist leicht zu übersehen. Unser Material bestand aus 96 Knospen, deren grösste Durchschnitte zwischen 200 und 2400 μ^2 liegen. Diese Knospen wurden nun in Klassen von steigender Grösse eingeteilt, wobei jede Klasse um 200 μ^2 wächst. Die Klasse geringster Grösse umfasst die Individuen von 200—400 μ^2 , die nächste diejenige von 400—600 μ^2 usf. Diese Klassen wurden in unserer Tafel entsprechend der Abszisse aufgetragen, wogegen die zu jeder Klasse gehörige Zahl von Einzelindividuen durch eine Ordinate von entsprechender Länge angegeben wird. Der Endpunkt der letzteren wurde in der Mitte des zugehörigen Quadrates markiert und die Marken oder Punkte durch eine Linie verbunden. Es gehörten also zur ersten Klasse von 200—400 μ^2 nur zwei, zur zweiten Klasse von 400—600 μ^2 fünf, zur dritten Klasse von 600—800 μ^2 zehn Knospen usf.

Eine solche Kurve, die, wie der Leser leicht bemerkt, nichts anderes ist als eine typische Variationskurve, lässt ungemein deutlich erkennen, dass die Hälfte der Einporigen auf den engen Spielraum zwischen 1000—1600 μ^2 entfällt, während die andere Hälfte sich auf die Variationsbreite zwischen 200 und 1000 μ^2

Häufigkeitskurve der einporigen Geschmacksknospen vom Kaninchen.

einerseits, 1600 und 2400 μ^2 andererseits verteilt. Hierbei verhalten sich der aufsteigende und der absteigende Schenkel der Kurve ungefähr spiegelbildlich; die Unregelmässigkeiten, die beiderseits noch auffällig sind, sind lediglich dadurch bedingt, dass das empirische Material nicht umfangreich genug war.

Hätten wir statt 96 Knospen deren 1000 ausgemessen, so würden mit höchster Wahrscheinlichkeit die beiden Schenkel der Kurve völlig gleichartig ausgefallen sein.

Weiterhin kann man an unserer Kurve ablesen, dass, wenn eine Durchschnittsfläche von $1600 \mu^2$ erreicht ist, die Knospen in den zweiporigen Zustand überzugehen pflegen, da von da ab die Häufigkeit der Einporigen rapide abnimmt. Vergleicht man hierzu die Kolonne über die Zweiporigen in unserer Tabelle S. 449, so ergibt sich übereinstimmend, dass sie erst bei einer Fläche von über $1000 \mu^2$, also entsprechend dem Gipfel der Kurve der Einporigen, beginnen, dass sie ferner in dem Moment anfangen häufiger zu werden, in welchem die Kurve der Einporigen sinkt und dass ihr Durchschnitt oder ihr Kulminationspunkt mit $2227 \mu^2$ annähernd über dem Punkt liegen würde, wo die Kurve der Einporigen bis auf 0 herabsinkt. Diese Gesetzmässigkeit würde sich wiederum noch viel deutlicher darstellen, wenn das vorliegende Zahlenmaterial grösser wäre. Würde es uns gelingen, eine analoge Kurve über die Zweiporigen aufzustellen, so müsste diese ähnlich ausfallen, wie die der Einporigen und wir könnten sie dann über letztere hinwegzeichnen. Nach den vorliegenden zahlenmässigen Erfahrungen würde sie etwa bei $1000 \mu^2$ nahe der Abszisse beginnen (vergleiche die Kurventafel), dann bis zu einem Gipfel zwischen 2000 und $2400 \mu^2$ (durchschnittliche Grösse $2227 \mu^2$!) ansteigen und schliesslich in spiegelbildlicher Form wieder zur Abszisse herabsinken. Zum Unterschiede von der ersteren Kurve würde jedoch ihr höchster Punkt viel tiefer liegen als bei der Kurve der Einporigen, weil die zweiporigen Knospen im ganzen bei weitem nicht so häufig vorkommen wie jene. — Über die Dreiporigen besitzen wir leider einstweilen noch sehr wenig Ziffern, aber immerhin ist erkenntlich (Tabelle S. 449), dass ihre Frequenz von dem Augenblick an häufiger wird, wo die Zweiporigen beginnen, an Zahl erheblich abzunehmen; ihre mittlere Grösse liegt demgemäss abermals höher, nämlich bei einer Durchschnittsfläche von $2949 \mu^2$.

Unsere Kurve ist mithin nach den obigen Betrachtungen eigentlich mehr als eine einfache Variations- oder Häufigkeitskurve, denn ihr absteigender Schenkel entspricht dem aufsteigenden Schenkel einer zweiten ähnlich gearteten Kurve, welche zu einer

Varietät gehört, deren Auftreten von einem unvollkommenen oder inneren Teilungsakte der ersteren Varietät abhängig ist. Desgleichen würde die zweite Kurve in einem ähnlichen Verhältnisse zu einer dritten Kurve stehen, welches sich auf die Dreiporigen bezieht usf. Oder wir können auch sagen: Es ist ganz klar, dass die durch die Statistik ermittelte gegenseitige Lage der Häufigkeitskurven der Ein-, Zwei-, Dreiporigen usf. in unmittelbarer Weise auf deren genetisches Verhältnis hinweist. Wir brauchen nur unsere Tabelle S. 449 zu betrachten, um durch die Lage der Zahlengruppen darauf verwiesen zu werden, dass die verschiedenen Ordnungen der Mehrporigen durch Teilungsakte auseinander hervorgehen. Wir finden also hier auf einem gänzlich anderen und neuen Wege eine Bestätigung der Resultate unserer mikroskopischen Untersuchungen.

Ein Moment bedarf noch einer besonderen Aufklärung. Bevor ich an die Ausmessung der Knospen heranging, hatte ich die Vorstellung, dass die Durchschnittsziffern für die Ein-, Zwei-, Dreiporigen usf. sich etwa verhalten könnten wie 1:2:3. Allein das ist, wie man sieht, durchaus nicht der Fall; vielmehr bleibt die Ziffer für die mittlere Durchschnittsfläche der Zweiporigen (2227) hinter dem Zweifachen der entsprechenden Zahl für die Einporigen erheblich zurück ($2 \times 1236 = 2472$). Desgleichen ist die Durchschnittsziffer für die Dreiporigen (2949) erheblich kleiner als das Dreifache der Ziffer für die Einporigen (3708), ja sogar noch kleiner als das Dreifache der Hälfte der Ziffer für die Zweiporigen (3342), oder anders ausgedrückt: die Querschnittsgrösse der auf je einen Porus zentrierten Zellenmasse sinkt beim Übergang von den Knospen niederer zu den Knospen höherer Ordnung. Es ist dies auch leicht erklärlich. Denn beispielsweise grenzen in den Zweiporigen deren Halbtelle gewissermassen mit planan Flächen aneinander: demgemäss sind ihre Ampullen in bezug auf die Aufnahme einer möglichst grossen Zellenzahl erheblich ungünstiger gestellt als die Ampullen der Einporigen. Ebenso sind die Ampullen der Dreiporigen abermals in bezug auf die Aufnahme einer maximalen Zellenzahl ungünstiger gestellt als diejenigen der Zweiporigen, weil der zum mittleren Porus gehörige Knospenteil beiderseits von anderen Knospenteilen in weiter Ausdehnung begrenzt wird. Erst beim Aufsteigen zu den Knospen mit vier, fünf und sechs Poren wird allmählich die

Durchschnittsziffer für den grössten Querschnitt der zugehörigen Knospenteile sich allmählich einer konstanten Zahl annähern, da bei der linearen Aufreihung der Ampullen mit Ausnahme der endständigen alle anderen unter den gleichen mechanischen Bedingungen der Entfaltung ihrer zugehörigen Sinneszellen stehen.

Diese Tatsache, dass die in Rede stehenden Durchschnittsziffern für die grössten Querschnitte der Knospen verschiedener Ordnungen relativ abnehmen, lässt eine Verwertung im Sinne der Teilkörpertheorie zu. Wären nämlich die Mehrporigen nur durch zufällige Konkreszenz von zwei oder mehreren Einporigen entstanden, dann würde man ein Wachstum der Durchschnittsziffern im Verhältnis von 1 : 2 : 3 usf. erwarten. Nun trifft dies aber nicht zu; vielmehr ist die Proportion der Ziffern, welche die durchschnittliche Grösse der ein-, zwei- und dreiporigen Knospen angeben, eine besondere, und zwar ist sie abhängig von einer entwicklungsgeschichtlichen Sonderung des Zellenmaterials, bei welcher die Halb- und Drittelteile der betreffenden mehrporigen Knospen durchschnittlich kleiner ausfallen als das Mittel der Einporigen. Dies deutet auf einen typischen Prozess der Spaltung im Sinne der Teilkörpertheorie, wobei beispielsweise die Einporigen, wenn sie einem gewissen Maximum der Grösse sich nähern, immer häufiger durch innere Teilung in den zweiporigen Zustand übergehen, wobei selbstverständlich die daraus hervorgehenden Halbtteile anfänglich verhältnismässig klein sein müssen. Weiterhin folgt aus der Ungunst der mechanischen Bedingungen, dass sie auch durch ihr späteres Wachstum das normale Volumen der Einporigen nicht erreichen können.

V. Übersicht über die wesentlichen Ergebnisse.

Wir wollen im folgenden kurz die wesentlichsten Ergebnisse der morphologischen Untersuchung zusammenstellen und zwar insoweit sie in näherer Beziehung zur Teilkörpernatur der Geschmacksknospen stehen. Wie erinnerlich, haben wir im vorstehenden zunächst die topographischen und histologischen Verhältnisse der Papilla foliata sehr ausgiebig untersucht, um alle Strukturvorkommnisse, welche etwa mittelbar auf die Vorgänge der Knospenteilung hinweisen, ausfindig zu machen. Erst später haben wir die relativ seltenen Teilungsformen beschrieben, von denen einige in sehr deutlicher Weise als Hemmungsbildungen sich

auswiesen. Schliesslich haben wir durch systematische Messungen, zum Teil auch durch Darstellung der Ziffern in Kurvenform, das Gesamtergebnat noch einmal auf einem anderen Wege bestätigen können. Bei der folgenden übersichtlichen Aufrechnung der wichtigsten Ergebnisse ist es nun besser, den umgekehrten Weg einzuschlagen und mit den in direkter Weise auf die Teilkörpernatur der Knospen hinweisenden Daten zu beginnen, um dann weiterhin die Details des Aufbaues der Sinnesfelder sowie der Zusammensetzung der Knospen aus den erwiesenen Teilungsakten abzuleiten.

1. Dass die Geschmacksknospen genetische, auf Teilung regulierte Systeme, also Histosysteme sind, geht aus dem Befunde von Knospen mit Scheidewandbildung direkt hervor, welche den Teilungsakt unmittelbar verdeutlichen und gewissermassen als fixierte Stadien der Entwicklung bzw. als wahre Hemmungsbildungen anzusehen sind.

2. Der bei dieser Gelegenheit beobachtete Zustand der Zellverschränkung schliesst es aus, dass die Deutung der Knospen mit Scheidewand als Teilungsform unrichtig ist; die Form der Verschränkung kann nur dadurch zustande kommen, dass die Korrelation zwischen innerer und äusserer Teilung des Systems, das ist zwischen der Teilung der Ampulle und der Bildung der Scheidewand, nicht vollständig gewahrt bleibt.

3. Diese Resultate werden in objektiver Weise durch die Messungen an dem grössten Durchschnitte der Knospen bestätigt. Konstruiert man die Häufigkeitskurven der Einporigen und vergleicht sie mit dem tabellarisch aufgerechneten Zahlenmaterial über die Zweiporigen, so kann kein Zweifel darüber sein, dass, wenn wir in der Lage wären, für die Zweiporigen eine gleiche Kurve anlegen zu können, deren aufsteigender Schenkel den absteigenden Teil der Kurve der Einporigen kreuzen würde. Es gehen demnach die Einporigen, wenn sie über den Durchschnitt anwachsen, in einen anderen, in den zweiporigen Zustand über, und zwar durch innere Teilung.

4. Weiterhin haben wir bei unseren Messungen gefunden, dass die mittlere Grösse des Querschnittes der Halbteile der doppelporigen Knospen geringer ist als das Mittel des Querschnittes der Einporigen; desgleichen ist die mittlere Grösse des Durchchnittes der Drittelteile der Dreiporigen geringer als der

bezügliche Querschnitt der Halbtteile der Doppelporigen usf. Diese zahlenmässigen Relationen sind ebenfalls auf den Teilungsakt zurückführbar. Geht beispielsweise eine einporige Knospe durch innere Teilung in den zweiporigen Zustand über, so werden die Knospenhalbtteile zunächst recht klein ausfallen und sie werden auch bei weiterem Wachstum wegen der Ungunst ihrer räumlichen Zusammenordnung mit ihrer durchschnittlichen Grösse unter dem mittleren Ausmass der Einporigen zurückbleiben müssen.

5. Innere Teilungen der Knospen sind solche, bei denen die Scheidewandbildung ausbleibt, während die Geschmacksgrübchen bzw. Ampullen sich zerlegen. Die Tatsache, dass bei den Zweiporigen mit wachsender Grösse ihres Umfanges auch die Entfernung ihrer Poren von minimen Abständen anfangend in sehr deutlichem Grade wächst, kann auf den Teilungsvorgang bezogen werden.

Die Teilung der Ampulle selbst wurde nicht beobachtet. Jedoch ist der Schluss unausweichlich, dass, sobald die Zahl der Sinneszellen durch Mitose über ein gewisses Maximum hinaus zunimmt, die Ampulle sich zerlegen muss, weil ihr individuelles Grössenwachstum nach Inhalt und Oberfläche lediglich ein eng begrenztes ist. Im übrigen ist es nicht dringlich notwendig, einen speziellen Nachweis für das Vorkommen der Ampullen-Teilung anzutreten. Denn dass Scheidewandbildung äussere Teilung bedeutet, ist selbstverständlich; andererseits muss aber der Scheidewandbildung die innere Teilung, d. h. die der Ampulle, vorausgegangen sein, weil jene ohne die letztere nicht zum Ziele, das ist zur Zerlegung der Knospe führen könnte, was zufälligerweise in einem Falle von besonderer Hemmungsbildung am Objekte selbst zur Erscheinung kam (Textfig. 1, S. 445).

6. Unsere Beobachtungen haben weiterhin gezeigt, dass bei den vielwertigen Knospen die Poren bzw. die zu diesen gehörigen Knospenteile in linearer Folge sich ordnen. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass bei einer Serie aufeinander folgender innerer Teilungen die Teilungsrichtung erhalten bleibt. Daher bilden die hochwertigen fünf- bis sechstteiligen Knospen langgestreckte, walzenartige, metamer gegliederte Körper. Diese Formen zeigen uns auf das entschiedenste, dass es sich in den polymeren Knospen nicht um Gebilde handeln kann, die durch zufällige Konkreszenz entstanden sind.

Das Gesetz der Konstanz der Teilungsrichtung ist in sehr weitem Umfange gültig, da auch auf den Strecken der Sinnesfelder mit Verwerfung des Anlagematerials die lineare Porenfolge bei den Knospen der höheren Ordnungen sich erhält. Die Tendenz zur Bildung metamerer Knospenkomplexe muss daher auf eine primitive erbliche Anlage zurückgeleitet werden. Dass die Konstanz der Teilungsrichtung nicht in einem absoluten Sinne aufrecht erhalten wird, dass sie vielmehr eventuell nach einem bestimmten Entwicklungsplane wechseln kann, scheinen die Fälle der querliegenden Knospen des Oberrandes in deutlicher Weise darzutun, denn bei diesen liegt die immanente Teilungsrichtung senkrecht über der Achse der Stäbe.

7. Die Sinnesfelder der typischen Form gliedern sich in querliegende Knospenfolgen, die von uns so genannten „Stäbe“. Innerhalb derselben bilden die sämtlichen Poren ein- und mehrwertiger Knospen eine monoserielle Folge. Wir schliessen daraus, dass die Stäbe genetische Einheiten sind und aus einer gemeinschaftlichen teilbaren Anlage abstammen. Mit der Entwicklung der letzteren waren mehrere bald äussere, bald nur innere, oft in beliebiger Folge wechselnde, jedoch in gleicher Richtung liegende Teilungsakte verbunden, so dass mithin die Lage der späteren Stäbe die Linie der fortgesetzten Teilungen markiert.

8. Die Stäbe sind nach unseren Wahrnehmungen in sehr verschiedener Weise eingeteilt und können in ihnen eine bis sechs Knospen bzw. zwei bis sechs Poren vorkommen. Da die Serie der Knospen entlang dem Oberrande des Sinnesfeldes kontinuierlich, ihre Ausdehnung in der Richtung nach abwärts jedoch sehr wechselnd ist, so folgt, dass die Entwicklung vom späteren Oberrande des Sinnesfeldes her ausgegangen sein muss. Hier müssen jene Anlagen sich befunden haben, aus deren Wachstum und Teilung die Stäbe hervorgingen. Da die oberste Knospe sich gegen den umgebogenen hakenförmigen Teil der Seitenlamelle stemmt, konnten bei fortgesetzter Teilung und Vermehrung der Zahl der Knospen diese sich nur in der Richtung nach abwärts ausdehnen und mit dieser spezifischen Art der Materialverschiebung hängt wiederum die Fächerstellung der Knospen sowie ihr gesetzmässiger Formwechsel innerhalb des Stabes zusammen.

9. Die Verteilung der Basalzellen, welche nachweislich zum Teilungsakte in direkter Beziehung stehen, ist bemerkenswerter-

weise eine spezifische, insofern sich ihre Zahl in der Richtung gegen den Unterrand des Feldes ganz erheblich vermehrt. Dort kommen auch die in sich zusammenhängenden Epithelmäntel vor. Es stimmt dies mit der Vorstellung überein, dass die Proliferation der Knospen in der Richtung nach abwärts sich fortsetzt, so dass die Teilungsvorgänge immer jeweilen am Unterrande des Sinnesfeldes am lebhaftesten gewesen sein müssen.

Erwähnt wurde bisher nicht, dass viele der mehrwertigen Knospen äussere Einfurchungen besitzen, welche die Valenz kennzeichnen. Auf diese Erscheinung habe ich keinen Wert gelegt, weil sie auch dann vorhanden sein könnte, wenn es sich in den Knospen der höheren Ordnungen nur um die äussere Aneinanderlagerung einporiger Individuen handeln würde.

Nach dieser langen Aufrechnung halten wir den Nachweis für völlig abgeschlossen, dass die Knospen bzw. ihre Anlagen Teilkörpernatur besitzen, dass sie nach unserer Ausdrucksweise Histomeren sind. Im besonderen bin ich der Meinung, dass die kleinen Knospen der jungen Tiere in der ersten Zeit nach der Geburt noch teilungsfähig sind und dass es sich aus diesem Grunde verlohnen würde, die postfötale Entwicklung der Papilla foliata genau zu untersuchen.

VI. Theoretische Folgerungen.

a) Die biogenetische Natur der einfachen Knospen.

Da die Knospen auf Teilung regulierte Systeme¹⁾ sind, so müssen wir ihnen eine bestimmte gesetzmässige Verfassung zuschreiben, durch welche die Form der Teilung, besonders auch die Teilungsrichtung, garantiert wird. Diese Verfassung kennen wir nicht, es kann nur vermutet werden, dass durch eben dieselbe auch die typische Regeneration bedingt wird. Viele der Sinneszellen gehen bekanntlich während des Lebens zugrunde, und das entstehende Manko wird durch nachfolgende Mitosen ersetzt. Wenn nun ein bestimmt geformtes morphologisches Individuum auf solche Art seinen Bestand in typischer

¹⁾ Der Begriff des „Systems“ in dem von mir gemeinten Sinne versteht sich im Gegensatz zu dem Begriff eines blossen „Aggregates“ einer Vielzahl von Zellen.

Weise ergänzt, so muss es zugleich ein genetisches System mit besonderer Regulation sein, und von dieser Regulation denke ich auch die typische Form der Teilung des ganzen Gebildes abhängig.

Diese in Frage stehende besondere Verfassung des teilungsfähigen Systems ist nach unserer Vermutung histodynamischer Natur, d. h. sie wird nicht in erster Linie bedingt durch das äussere Mittel von allerhand Ernährungs- und Stoffwechselvorgängen, welche dem betreffenden geweblichen Komplex gemeinshaftlich sind, und durch welche sich dessen Einzelbestandteile gelegentlich untereinander beeinflussen, vielmehr sind nach unserer Anschauung dynamische Vorgänge im Spiele, welche an dem Ganzen des betreffenden Komplexes haften und ein Ausdruck der wahren synthetischen Einheit desselben sind (vergl. oben S. 370—372). Um diese Aufstellung recht zu würdigen, möge man sich dessen erinnern, dass der Vorgang der Teilung einer Geschmacksknospe sein nächstes Analogon in der ungeschlechtlichen Fortpflanzung freilebender Personen hat. Wir setzen also die entwicklungsphysiologische Einheit der Knospe analog der Einheit einfach gearteter mehrzelliger Geschöpfe. Nur muss man nicht in den Fehler verfallen, die Theorie vom Zellenstaat und die „Integration“ der zelligen Individuen auf Grund physiologischer Differenzierung auf die entwicklungsgeschichtlichen Einheiten oder Individualitätsstufen zu übertragen. Denn die synthetischen Einheiten der Entwicklungsphysiologie werden angelegt und entwickelt vor der spezifischen physiologischen Differenzierung, und ihre Verfassung bezieht sich nicht auf Funktionen, wie Sekretion, Resorption, Kontraktilität, nicht also auf die spezifische Werkstätigkeit, sondern auf die Physiologie der Formen, als auf die entwicklungsphysiologischen Potenzen, welche bei weiterem Wachstum unter den Bildern der Teilung, der Sprossung, der geweblichen Differenzierung, der Regeneration usf. bemerkbar machen.

Weiterhin kann man die Frage aufwerfen, was es in theoretischer Hinsicht damit auf sich habe, dass die einfachen Knospen der Grösse nach in ausserordentlichem Grade variieren, mehr noch als die zusammengesetzten Knospen der oberen Ordnungen. Es kommen kleine Knospen, bestehend aus nur wenigen Zellen, vor, dann wiederum riesige Knospen von enormer Zellenzahl und zwischen beiden Extremen eine kontinuierliche Serie von

Übergangsformen. Nach meinem Dafürhalten sind nun kleine und grosse Knospen als Systeme einander gleich zu setzen; denn die Maße der Knospen und die Zellenzahlen spielen bei der Beurteilung des Systemcharakters keine Rolle, also etwa in der Weise, wie, um einen Vergleich zu brauchen, kleine und grosse Uhren als Systeme einander völlig gleich sein können. Das System der Knospe hat jedoch die Fähigkeit, durch Teilung der nächst untergeordneten Histomeren, der Zellen, zu wachsen und auf diese Weise seinen Umfang zu vergrössern. Es bilden daher alle einfachen Knospen von der kleinsten bis zur grössten eine aufsteigende Reihe von einheitlichem Charakter, eine sogenannte homologe Reihe. Erst wenn die Knospe durch Ampullenteilung in den zweiporigen Zustand übergeht, wird ihr Charakter als System verändert und dieses auf eine andere Stufe emporgehoben. Von da ab bilden die Knospen mit den verschiedenen Porenzahlen eine neue Reihe oberer Ordnung (siehe weiter unten).

b) Der Teilungsvorgang.

Aus unserer Tabelle S. 449 können einige nützliche Daten, welche den Teilungsvorgang betreffen, entnommen werden. Aus Kolonne I ersehen wir, dass von einer gewissen Querschnittsfläche angefangen, welche etwa bei $1600 \mu^2$ liegt, die Frequenz der Einporigen rapide abnimmt und dass die Ziffer für das grösste Exemplar unter fast hundert Individuen $2309 \mu^2$ beträgt. Man kann daraus schliessen, dass mit der Zunahme der Zellenzahl das System der einporigen Knospe allmählich immer labiler wird und immer leichter in den zweiporigen Zustand übergeht. Auf der anderen Seite zeigt Kolonne II, dass unter $1000 \mu^2$ überhaupt keine Zweiporige gefunden wurde; demnach ist die Teilungspotenz, selbst wenn sie schon unterhalb dieser Grenze vorhanden sein sollte, doch erst von dieser an realisierbar.

Die Bedingungen, von welchen der Eintritt der Teilung abhängt, lassen sich natürlich nicht vollständig angeben; soviel ist sicher, dass die Bedingungen teils in der Knospe selber, teils in der Umgebung gelegen sind. Unter den ersteren spielt gewiss die Zahl der Zellen, welche gegen die Ampulle konvergieren, eine grosse Rolle. Über diesen Gegenstand haben wir schon früher ausführlicher gehandelt (S. 413 f.), und es erübrigt sich aus diesem Grunde, noch einmal darauf zurückzukommen. Die von uns aus-

gemessenen Durchschnittsflächen entsprechen nun einigermaßen der Zellenzahl, jedoch muss ich ausdrücklich hervorheben, dass die Knospen und ihre Zellen bei jungen Tieren, bei welchen die in Frage stehenden Teilungen nach unserer Voraussetzung wirklich vor sich gehen, überhaupt kleiner sind als bei erwachsenen Tieren. Unsere Zahlen sind also relativer Natur und stehen nur in einer gewissen gesetzmässigen Proportion zu den Querschnittsflächen der teilungsfähigen Knospen. Trotz dessen geben unsere Ziffern, wie ich glaube, ein getreues Spiegelbild der wirklichen Vorgänge.

Unter den äusseren Bedingungen, welche auf die Teilung der Knospe wirksam sind, nenne ich die Gunst oder Ungunst der Lage im Sinnesfelde. Ist die einzelne Knospe nicht zu stark zwischen ihren Nachbarn eingeklemmt, kann sie sich mit ihrem Zellenmaterial in günstiger Weise ausbreiten, so wächst sie zu einer erheblichen Grösse heran, ohne den Porus zu verdoppeln; dies lässt sich am Objekt selbst leicht kontrollieren. In solchen Fällen bilden die Sinneszellen, wenn man sie im mittleren Längsschnitte der Knospe betrachtet, von der Ampulle angefangen, einen stark ausgebreiteten Fächer. Liegen dagegen die Knospen innerhalb der Stäbe und überhaupt im Sinnesfelde sehr dicht beisammen, so können die Randstrahlen des Zellenfächers keinen so grossen Winkel miteinander bilden, und die Ampulle kann demgemäss eine besonders grosse Zahl von Zellen nicht mehr fassen.

Sicher festgestellt ist, dass der obere Pol der Knospe mit der Ampulle zuerst der Teilung unterliegt, während die Spaltung der Hauptmasse des Knospenkörpers durch Emporwachsen der Basalzellen in zweiter Linie nachfolgt. Diese beiden Prozesse vereinigen sich normalerweise zu einer einheitlichen Gesamtleistung. Jedoch zeigt die Erscheinung der Zellenverschränkung, dass sie zum Teil von verschiedenen Bedingungen abhängig sind, so dass eine vollständige Gleichsinnigkeit der Arbeitsleistung nicht immer zustande kommt.

c) Biogenetische Natur der mehrporigen Knospen.

Findet eine innere Teilung der Knospe statt, kenntlich an der Verdoppelung der Ampulle und des Knospenkanals, so entsteht eine Knospenkombination oder ein Histosystem oberer Ordnung. Bei weiterem Wachstum ist letzteres abermals befähigt, durch weitere innere Teilungen sich zu komplizieren. Die auf

diese Weise entstehenden mehrporigen Knospen bezeichne ich demnach als mehrwertig oder polymer. Sie sind im Verhältnis zu den einfachen Knospen die Histosysteme oder Homologen der höheren Ordnungen.

Dieser Vorgang der Entstehung der polymeren Knospen ist meines Erachtens äusserst typisch für die Verhältnisse der Entwicklung überhaupt. Denn die Natur bedient sich des Mittels der Teilungen, um von einfachen Formen ausgehend zu komplexen morphologischen Systemen zu gelangen. Das einfachste Beispiel dieser Art sind die Stockbildungen wirbelloser Tiere. Aber auch innerhalb der Gewebe und Organe findet die Entwicklung nach den nämlichen Prinzipien statt. In diesem Sinne sind die zwei-, drei- und vierteiligen Zotten des Dünndarmes der Säuger nichts anderes, als Stockbildungen aus einfachen Zotten (Textfig. p, S. 467). Ebenso ist die Lappenniere der grossen Säuger eine Stockbildung aus mehreren Individuen, deren jedes einer einfachen Niere eines kleinen Säugers entspricht (S. 389). Echte Stockbildung findet nach meinen allerdings bisher noch nicht zum Abschluss gebrachten Untersuchungen auch bei den Dünndarmdrüsen der Säuger, sowie bei den Zungenpapillen des Menschen statt. Stockbildungen sind ferner die zusammengesetzten Säulchensysteme, welche sich bei den Muskelfasern der Forelle in gewissen frühen Zeiten ihrer Entwicklung nachweisen lassen (Textfig. q, S. 467).

In allen den genannten Fällen werden Formenwerte oder Histomeren irgend einer niederen Ordnung zusammengefasst oder kombiniert zu Organen oder Histosystemen höherer Ordnung. Das Mittel der Kombination ist der Akt der Teilung oder Vermehrung eines gegebenen Histomers, wobei jedoch die Nachkommen nicht etwa selbständig werden, sondern in einem engeren genetischen Verbande vereinigt bleiben. Ein derartiger engerer Verband bildet sich am leichtesten, wenn die Teilung unvollständig ist, wenn es sich also nur um eine „innere“ Teilung oder um eine unvollkommene äussere Teilung handelt. Hier bei den Geschmacksknospen entstehen, wie wir gesehen haben, die Stücke durch innere Teilung.

In der Folgezeit, wenn auf diesem von uns zuerst und allein bearbeiteten Gebiete noch mehr Material vorliegen wird, werden wir Gelegenheit haben, die hier in Frage stehenden typischen

Formen einer aufsteigenden Kombination der Systeme bei verschiedenen Organen oder Teilen von solchen unter sich vergleichen zu können. Auf diesem Wege werden wir alsdann zu einem neuen wichtigen Zweige der vergleichenden Morphologie, zu einer vergleichenden Systemlehre kommen. Einstweilen beschränken wir uns darauf, die Geschmacksknospen in einen näheren Vergleich mit den Darmzotten zu setzen, welche ich bereits in einer früheren Arbeit ausführlicher behandelt habe.

d) Systemvergleichung bei Zotten und Geschmacksknospen.

Bei den Darmzotten ergab sich seinerzeit ein reichhaltiges Material. Es wurden neben den einfachen zylindrischen Zotten Zwillings-, Drillings- und Vierlingsbildungen in grosser Zahl beobachtet, und zwar bildeten diese im Jejunum etwa ein Drittel des Bestandes der Zotten überhaupt. Diese Mehrlingsbildungen sind identisch mit den flachen Formen der Zotten, welche man seit mehr als einem halben Jahrhundert kennt. Man darf letztere sich vorstellen als lineare oder metamere Aneinanderreihungen der einfachen oder zylindrischen Zotten. Inzwischen hat sich gezeigt, dass meine damaligen Untersuchungen über die Zotten unvollständig waren, denn im Duodenum der Katze kommen, wie ich neuerdings erfahren habe, längere faltenartige Aneinanderreihungen der Zotten vor, welche dem Formwerte nach über das Vierfache des einfachen Grundwertes bei weitem hinausgehen. Auch wusste ich seinerzeit nicht, dass die Zotten in verschiedenen Gegenden des Darmes und möglicherweise sogar bei verschiedenen Individuen verschiedenes Kaliber besitzen, so dass die von mir damals gegebenen Messungen sich eben nur auf jene bestimmte, von mir ausführlich bearbeitete Schnittserie beziehen, bei welcher die Zotten in äusserst vollkommener Form erhalten waren.

Im übrigen erleidet durch diese neueren Erfahrungen das damals gewonnene Resultat keine Einbusse; denn wenn es sich feststellen lässt, dass in einem bestimmten Darmabschnitte die Grundfläche der einfachen Zotten, der Doppel-, Dreifach- und Vierfachbildungen sich im Mittel zu einander verhalten, wie 1:2:3:4, so liegt darin eine objektive Feststellung von höchstem Werte. Die Glieder dieser Reihe bezeichnete ich als Monomeren, Dimeren, Trimeren usf. Freilich war es keine ganz einfache Auf-

gabe, die verschiedenen Varietäten der Zotten auf diese Klassen zu verteilen. Denn es fanden sich beispielsweise neben massenhaften ganz offenbaren Zwillings- und Drillingsbildungen, bei welchen der flache Schaft der Zotten in zwei bis drei zylindrische Spitzen auslief, auch sehr viele nicht eingespaltete Individuen von gleicher Grösse, bezw. gleichem Volumen, welche nur in der allgemeinen Umrisslinie und dem Querschnitte nach den Zwillingen und Drillingen entsprachen (Textfig. p, S. 467).

Es konnte also fraglich sein, ob es zulässig ist, die ganzen, ungeteilten Formen unter die Mehrfachbildungen einzureihen. Die weiteren Beobachtungen ergaben jedoch, dass viele der ungeteilten flachen Zotten äusserlich ihrem Formwerte entsprechend eingefurcht sind. Es kann also eine ungespaltene Dimere ihrer ganzen Länge nach durch eine einseitige oder auch beiderseitige Furche in zwei Hälften eingeteilt sein. Diese Furchen, ihr Vorkommen, ihre Ausdehnung, ihre Tiefe, variieren naturgemäss ausserordentlich, sind manchmal in ausgezeichneter Weise kenntlich, manchmal nur andeutungsweise vorhanden, so dass Übergänge zu den völlig glatten Formen flacher Zotten sich finden. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, alle ungeteilten Formen, sobald sie nachweislich die typische Grösse der Dimeren, Trimeren etc. besitzen, unter diese einzureihen, auch wenn sie nicht eingefurcht sind.¹⁾

Es ist nun die Frage, ob sich das Material, welches wir von den Geschmacksknospen gewonnen haben, sich in ähnlicher Weise ordnen lässt. Es kann nun unserer Auffassung nach keine Frage sein, dass die Knospen mit 2, 3, 4 Poren usf. als Zwillinge, Drillinge, Vierlinge, bezw. Dimeren, Trimeren, Tetrameren usf. zu bezeichnen sind, und zwar aus dem Grunde, weil mit der Teilung der Ampulle das spezifische System der Geschmacksknospe in sich geteilt erscheint. Die durch unvollständige Scheidewände teilweise zerlegten Knospen, welche freilich nur selten vorkommen, finden ebenso ihr Analogon in den eingespaltenen mehrwertigen Zotten. Es bleibt jedoch die Frage, wie wir uns denjenigen einporigen, zweiporigen etc. Knospen gegenüber ver-

¹⁾ Diese äusserlich vollkommen glatten Zotten von einheitlicher Formerscheinung könnten jedoch eventuell in der inneren Struktur (Anordnung des Chylusraumes, der Muskelbündel, Gefässe etc.) den Mehrlingsbildungen gleichen, ein Punkt, über den ich einstweilen keine Kenntnis besitze.

halten sollen, welche ganz offenbar bereits das Volumen der zweiporigen, dreiporigen etc. Knospen besitzen. Bei den Zotten hatten wir uns gezwungen gesehen, einheitlich erscheinende flache Formen, wenn sie das typische Volumen der Dimeren, Trimeren etc. hatten, unter diese einzureihen; aber die flache Form selbst wies schon darauf hin, dass es sich nicht um die gewöhnlichen zylindrischen Monomeren handeln konnte. Hier nun bei den Geschmacksknospen liegt der morphologische Sachverhalt offenbar anders. Denn wir finden beispielsweise bei denjenigen Einporigen, welche die durchschnittliche Grösse überschreiten und dem Volumen nach den Zweiporigen sich nähern oder mit ihnen übereinkommen, in der Regel der Fälle weder eine Abweichung in der äusseren Form, noch eine solche in der inneren Struktur. Vielmehr gehören einfache Knospen mit einer äusseren Einfurchung, welche eventuell auf eine Bivalenz des Gebildes bezogen werden könnte zu den allergrössten Seltenheiten. (Textfig. S. 445). Daher bin ich der Meinung, dass man die Einporigen sämtlich als Monomeren bezeichnen soll. In analoger Weise sind die Zweiporigen, Dreiporigen usf. zu beurteilen, welche den äusseren Umfang der Knospen der nächst oberen Klassen bereits besitzen.

Diese Verhältnisse des relativen Umfanges der Knospen der verschiedenen Ordnungen sind nun keineswegs undurchsichtig und widerspruchsvoll. Vielmehr ist es notwendig, dass zwischen den verschiedenen Klassen sich die entsprechenden Übergangsformen finden, also z. B. relativ grosse Monomeren, welche die Teilungspotenz besitzen, diese jedoch noch nicht realisiert haben.

e) Die homologen Reihen. Fortsetzung der Systemvergleichung.

Die vergleichende Betrachtung der Teilkörpersysteme lässt sich am leichtesten zustande bringen, wenn es gelingt, homologe Reihen aufzustellen und diese in Parallele zu setzen.

Schon oben haben wir erörtert, dass man die sämtlichen einfachen Geschmacksknospen von der kleinsten anfangend bis zur grössten zu einer aufsteigenden Reihe zusammensetzen kann (Textfig. n), deren Glieder etwa je um eine Zelle wachsen. Diese Reihe wäre dann im Sinne meiner Theorie als eine homologe oder homöotypische Reihe zu bezeichnen, d. h. als eine Reihe, innerhalb deren der Typ der Struktur nicht verändert wird. Die

Glieder der Reihe kann man sich als wachsend vorstellen, und das Wachstum wird durch innere Teilung, durch die Mitose der Geschmackszellen vermittelt. In ähnlicher Weise kann man die

Fig. n. Homologe Reihe der einporigen Knospen. Das Histosystem der Knospe wächst durch Teilung der nächst untergeordneten Histomeren, nämlich der Zellen.

polymeren Knospen zu einer aufsteigenden Reihe zusammensetzen (Textfig. o bis zur Hexamere). Wiederum findet das Wachstum durch innere Teilung statt, nämlich durch Teilung des Systems der Knospe bei mangelnder Scheidewandbildung. Auch hier

Fig. o. Homologe Reihe der polymeren Knospen. Das Histosystem der Knospe unterliegt bei wachsender Zellenzahl der inneren Teilung, woraus der Reihe nach die Knospen der oberen Ordnungen, Dimeren, Trimeren, Tetrameren etc. hervorgehen.

handelt es sich um eine homöotypische Reihe, welche, wie wir im vorigen Abschnitt auseinandersetzen, vollkommen analog ist der Reihe der Darmzotten, die unsere Textfig. p bis zur Tetramere zeigt.¹⁾

Die Reihe der einfachen und diejenige der polymeren Knospen kann man sich ferner aneinander gesetzt denken, weil die zweite Reihe die natürliche Fortsetzung der ersten ist. Nur muss man sich dessen bewusst bleiben, dass beim Übergang von der Mono-

¹⁾ Von den Einzelabbildungen in Textfig. p ist nur F eine schematische Skizze.

mere zur Dimere das System auf eine höhere Stufe gehoben wird. In dem ersten Teile der Gesamtreihe ist die einporige Knospe das natürliche Vielfache der Zelle, während im zweiten Teile die polymere Knospe das Vielfache der einfachen Knospe ist.

Fig. p. Homologe Reihe der Darmzotten. A = Monomere; B = ungeteilte, C = geteilte Dimere; D = ungeteilte, E = geteilte Trimere; F = Tetramere. A = zylindrische, B-F = flache Formen der Dünndarmzotten aus dem Jejunum der Katze.

Es ist selbstverständlich, dass die Theorie der natürlichen Reihen genauer erst entwickelt werden kann, wenn mehr objektives Material vorliegt. Eben aus diesem Grunde ist es aber nützlich, an dieser Stelle ausser den Darmzotten auch das Beispiel der Muskelsäulchen der Forelle wiederum heranzuziehen (Textfig. q),

Fig. q.

Homologe Reihe der Säulchen und Säulchensysteme aus der Muskulatur des Forellenembryos. A und B = Wachstum der Säulchen und fortgesetzte Teilung derselben; C, D und E = Bildung der komplexen Säulchensysteme oberer Ordnung durch fortgesetzte äussere, jedoch unvollständige Teilung. Die Umrisse der Einzelfiguren sind den Präparaten direkt entnommen.

Die Umrisse der Einzelfiguren sind den Präparaten direkt entnommen.

welche ich in einer vorausgegangenen Schrift behandelt habe. Bei diesen liegen die Verhältnisse im einzelnen etwas anders, im ganzen aber ähnlich wie bei den Reihen der Knospen und Zotten.

Die bandförmigen Säulchen des Forellenembryos sind, wie ich a. a. O. auseinandersetzte, synthetische Kombinationen aus teilbaren Metafibrillen und ihr Dickenwachstum geschieht demgemäss durch systematische Spaltung der letzteren. Als System betrachtet sind die Säulchen verschiedenen Querschnittes alle zusammen die natürlichen Vielfachen oder höheren Homologen jener Metafibrillen. Aus diesen Ursachen heraus ist es verständlich, dass die Säulchen bei jeder Grösse des Querschnittes spontan teilungsfähig sind; es ist also nicht nötig, dass sie zum Zweck der Vermehrung erst ein bestimmtes Kaliber gewinnen müssen. Werden die Säulchen nicht vollkommen durchgespalten, bleiben sie einerseits unter sich in Zusammenhang, so entstehen sehr deutliche Stockbildungen. Auf Grund dieser Daten kann man eine Reihe zusammenstellen, wie sie unsere Textfig. q zeigt. Bei A und B sieht man die Säulchen im Querschnitt wachsend, wobei sie vielen interkurrenten Längsspaltungen unterliegen. Weiterhin sieht man bei C, D und E die Stockbildung durch äussere, aber unvollkommene Teilung. Anfangs erscheinen die Stöcke auf dem Querschnittsfelde wie aus einer homogenen, gleichartigen Masse gebildet (bei C), späterhin jedoch (bei D und E) treten in ihnen lichter gefärbte Stellen auf, so dass sie in sich gegliedert erscheinen. Hierbei handelt es sich offenbar um eine Zerlegung der Stöcke in diverse, verschieden geformte, kontraktile Einzelabschnitte, welche jedoch durch eine heller sich färbende Substanz einstweilen noch unter sich verbunden erscheinen. Diese Stöcke bleiben, wie ich zeigte, nicht dauernd bestehen. Vielmehr werden sie späterhin von ihrer Basis her durch Fibrillenabspaltung allmählich aufgelöst. Diese sekundäre Zerlegung ist eine Erscheinung der „Dissoziation“, deren Wesen wir in der theoretischen Einleitung besprochen haben. (S. 390 f).

VII. Schlusswort.

Durch meine Untersuchungen über die genetische Verfassung der Zelle und der Muskelfaser, durch die im Anschluss hieran stehende Begründung einer wahren Theorie der Elementarorganisation, der Protomerentheorie, welche als eine rationelle

Plasmalehre, gelten darf, ferner durch die Einbeziehung der Zellenderivate in diese genetische Theorie der lebendigen Systeme und durch die Ausdehnung derselben auf die komplexen geweblichen Kombinationen habe ich meiner Meinung nach der gesamten theoretischen Anatomie einen wesentlichen Dienst geleistet und sie in ihren Anfängen neu begründet. Was die kommenden Jahre anlangt, so werden sich meine Arbeiten teils mit der weiteren Befestigung der Theorie der Elementarorganisation, teils mit der Fortführung der Systemlehre auf dem Gebiete der Organe befassen. Zu ersterem Zwecke habe ich seit mehr als 10 Jahren eine Publikation über die mobilen Plasmen vorbereitet und zahlreiche Beobachtungen an Pflanzenzellen, Myxomyceten, beschalteten und unbeschalteten Rhizopoden, besonders den Amöben, ferner an Heliozoen und Suctorien gesammelt. Hier hoffe ich zu zeigen, dass die primitiven Vorgänge der Organisation, des Aufbaues und Abbaues der plasmatischen Strukturen, auch die Vorgänge der Plasmabewegung an der Hand der Protomeren-theorie zum ersten Male in ihren Grundzügen wesentlich richtig begriffen und dargestellt werden können.

Was das Gebiet der Organlehre oder der mikroskopischen Anatomie im engeren Sinne anlangt, so zeigen die eben besprochenen drei Reihen, der Zotten, der Geschmacksknospen und der Säulchen aus der Forellenmuskulatur, dass wir tatsächlich in ein neues Feld der theoretischen Anatomie eingedrungen sind. Denn es hat sich ergeben, dass bei infra- und suprazellulären Systemen die gleichen allgemeinen Bildungsgesetze zum Vorschein kommen. Auch die Fortsetzung dieser Serie von Untersuchungen ist schon vorbereitet. Die Säulchen aus der Thoraxmuskulatur der Libelle haben eine neue homologe Reihe ergeben, welche demnächst publiziert werden wird. Auch die Untersuchungen über die Darmdrüsen und ihre Entwicklung zu Stöcken auf dem Wege der spontanen Längsteilung scheint gesichert zu sein, nicht zu reden von anderen Untersuchungen gleicher Art, welche bereits in die Wege geleitet worden sind, so eine Untersuchung über die Zungenpapillen, über die Peyerschen Haufen usw.

Mit diesen Untersuchungen zur Lehre von den genetischen Systemen glauben wir wiederum an dem Kernpunkt der wissenschaftlichen Anatomie angelangt zu sein. Denn die Anatomie ist die Lehre vom Aufbau des menschlichen und tierischen

Körpers, und es war von jeher die vornehmste Aufgabe unserer Wissenschaft nach den in der Organisation des Körpers sich ausprägenden allgemeinen Regeln zu suchen, d. h. den Bauplan zu ergründen und den fertigen Körper als das regelrechte Produkt allgemeiner Entwicklungsgesetze hinzustellen. Von dieser Aufgabe hat man sich in den letzten Jahrzehnten weit entfernt.

Die Gesichtspunkte der Deszendenzlehre und der Vererbung, der Entwicklungsmechanik, der Biologie und der Physiologie beherrschten das anatomische Feld; die Strukturlehre trat zurück. Eben deswegen ist auch das allgemeine Interesse für die mikroskopische Anatomie, Zellen- und Plasmalehre, in Deutschland wenigstens, in ausserordentlichem Grade gesunken, und die Hauptvertreter ganzer Disziplinen, wie z. B. der Neurologie, wurden vom Auslande gestellt. Die wissenschaftliche Morphologie muss nun ihr eigenes Feld wieder zu gewinnen suchen und sie kann dies meines Erachtens nur als Systemlehre.

Die Aufwendung physiologischer Gesichtspunkte, wobei die Beziehung der Struktur zur Werkthätigkeit der Organe in Frage kommt, ist in der Anatomie äusserst nützlich und ich selbst habe in meinen Schriften die physiologischen Erfahrungen in ausgiebigster Weise verwertet. Jedoch wird Einseitigkeit in der Forschung immer zu markanten Ausfällen in den Ergebnissen führen. Es gibt ganze Disziplinen, welche bisher fast ausschliesslich von der Physiologie beherrscht wurden, so die Muskel- und Drüsenlehre. Daher konnte ich die Strukturerscheinungen der kontraktilen Substanz von Grund aus neu bearbeiten, indem ich den Muskel unter die genetischen Gesichtspunkte der Histomeren-theorie brachte. Bei den Drüsen war der Einfluss R. Heidenhains so überwiegend, dass in neuerer Zeit niemand mehr versucht hat, diese Organe ernstlich in ihrer Eigenschaft als Sprossungs- bzw. Spaltungsprodukte zu betrachten, eine Aufgabe, welcher ich erst jetzt näher getreten bin.

Auch die Biologie kann in dem eigentlichen zentralen Bereich der Anatomie nur Hilfswissenschaft sein. Diese Disziplin hat sich in den letzten Jahrzehnten in immer festeren Umrissen herauskristallisiert, indem sie immer mehr darauf ausgegangen ist, alle Beziehungen näher zu untersuchen, welche zwischen den lebenden Wesen und ihren Existenzbedingungen bestehen. Eben deswegen gehören die Verhältnisse der Erblichkeit, der Variabilität,

der Zeugungs- und Fortpflanzungsformen, der Fruchtbarkeit usf. hierher. Da die Systemlehre sich mit den Daseinsformen der Geschöpfe beschäftigt, Zellen, Gewebe, Organe etc. in ihrer Gestaltung nicht nur als morphologische, sondern auch als dynamische Existenzen zu durchdringen sucht, so wird sie der biologischen Gesichtspunkte in gar keiner Weise entraten können. Der Endzweck wird jedoch der sein, den Bauplan des Körpers zu begreifen und nachzuweisen, dass alle Teile desselben Einzelabschnitte eines in sich übereinstimmenden mikrokosmischen Systems sind.

Was die vergleichende Anatomie anlangt, so hat sie leider von jeher ihre Aufgabe zu eng gefasst und sich fast ausschliesslich mit der Identifikation bzw. Ableitung der morphologischen Formen zum Zwecke der Deszendenzlehre beschäftigt. Somit ist auch dieser Teil der Anatomie nicht direkt auf das Ziel, die gesetzmässige Verfassung des Körpers zu ergründen, losgegangen. Freilich hat die vergleichende Anatomie in der letzteren Richtung wenigstens auf einzelnen Gebieten Grossartiges erreicht, so z. B. auf dem Gebiete der Metamerie der Wirbeltiere. Aber es ist sehr charakteristisch, dass von seiten der vergleichenden Anatomie eine zusammenfassende Darstellung über die Prinzipien der Metamerie, über ihren Ursprung, ihre Entwicklung, ihre Verbreitung, ihre Verwandlungsformen niemals gegeben worden ist. Das Wesen der Sache, der Systemcharakter des Metamers und dessen Genese interessierten bei weitem weniger, als das, was man praktisch in der Morphologie der Geschöpfe durch geschickte Identifikation der metameren Formwerte erreichen konnte. Was uns selbst betrifft, so ist uns seit langem geläufig, dass Metamerenbildung in den verschiedensten Ordnungen der Histosysteme vorkommt. Als ich aber vor langen Jahren die Querstreifung des Muskels zum ersten Male unter genetischem Gesichtspunkte als eine protoplasmatische Metamerie bezeichnete und darauf hinwies, dass sie durch einen in unablässiger Folge sich wiederholenden identischen Akt der Entwicklung aus dem ungestreiften Ende der Muskelfaser hervorgeht, so wurde dies teils überhaupt nicht beachtet, teils rief es Widerspruch hervor, weil die so überaus berechnete Verallgemeinerung des Begriffs der Metamerie den betreffenden Gelehrten allzu fremdartig erschien.

Auch die Entwicklungsgeschichte hat die Systemlehre bisher nicht in genügender Weise unterstützt, denn sie war in

den letzten Jahrzehnten zu sehr Dienerin der vergleichenden Anatomie. Was die Entwicklungsmechanik anlangt, so war sie bisher damit beschäftigt, die bekannten Formen und Einrichtungen des Körpers auf die gestaltenden Wirkungsweisen zurückzuführen. Sie war somit im wesentlichen eine physiologische Disziplin und charakterisierte sich als solche durch ausgiebige Verwendung des Experimentes. Dagegen war ihr an der Aufdeckung neuer Verhältnisse der Organisation bisher wenig gelegen. Wir dagegen müssen es als ureigenste Aufgabe der Anatomie bezeichnen, den Aufbau des Körpers von neuem in den gröberen und feineren Teilen zu durchdringen, um die durchgreifenden Regeln der Organisation systematisch und entwicklungsgeschichtlich festzustellen, denn nach unserer Auffassung sind die gestaltenden Wirkungsweisen auf dem Gebiete des Plasmas, der Zelle, der Gewebe, der Organe wiederkehrende, so dass sich die Typen der körperlichen Bildungen in der aufsteigenden Kombination der Teile wiederholen.

Fassen wir dies alles zusammen, so kommen wir zu folgenden Thesen. Es ist löblich und gerechtfertigt, ja unbedingt notwendig, dass die wissenschaftliche Anatomie nach allen Richtungen hin, also sagen wir peripheriewärts, ausgeweitet wird und dass alle möglichen Gesichtspunkte der Betrachtung zu Forschungszwecken verwertet werden. Jedoch es ist ebenso nötig, dass die Anatomie immer wieder zu den klar erkannten zentralen Aufgaben zurückkehrt und, was sie immer sonst nach Durchschweifung des ganzen Feldes kennen gelernt hat, diesen Aufgaben dienstbar macht. Die zentralen Aufgaben sind aber eigentlich nicht solche der Physiologie, Biologie, Deszendenzlehre, Entwicklungsmechanik usw., sie sind auch nicht rein deskriptiver Natur, also in der blossen Formbeschreibung enthalten, sondern sie liegen in der Richtung des Bauplanes. Hiermit kommen wir auf unsere theoretische Einleitung zurück und wiederholen, dass die Zellentheorie der Gewebe einerseits und die Theorie der Antimeren und Metameren andererseits zur Erfassung des Bauplanes nicht genügen. Sie stehen auch unverbunden nebeneinander und können demgemäss nur als Fragmente zu einer künftigen Theorie des Körpers gelten.

Es kann uns nun entgegengehalten werden, dass eine Richtung der Anatomie, welche durch die Idee eines in sich übereinstimmenden Bauplanes aller Teile geleitet wird, keine Aussicht auf Erfolg habe, weil es sich in dieser Idee um eine Utopie, um ein blosses

Hirngespinst handle. Allein, die Antwort auf diese Vorhaltung haben wir in unseren Schriften schon längst gegeben. Die theoretische Forderung eines in sich übereinstimmenden Bauplanes beruht im letzten Grunde auf den reichen Erfahrungen, welche wir seit vielen Jahren über die Fortpflanzung der lebendigen Systeme auf dem Wege der Teilung (im weitesten Sinne) gemacht haben. Es hat sich gezeigt, dass nicht nur die Zelle und die in ihr enthaltenen Organellen, sondern auch allerhand mehrzellige Kombinationen höherer Ordnung aus sich selbst heraus durch Teilung fortpflanzbar, oder wie bei der Knospung, Sprossung, Metamerenbildung aus einer teilbaren Anlage in beliebiger Zahl regenerierbar sind, wobei aus der Synthese der Nachkommenschaft die Systeme oberer Ordnung hervorgehen. Diese Erfahrungen hängen auf das Innigste mit dem Satz von der Übertragbarkeit des Lebens zusammen, und so verwandelt sich das Axiom „*Omne vivum ex vivo*“ unter den Erfahrungen der anatomischen Forschungen in den neuen Ausdruck „*Omne systema ex systemate*“ Um die Feststellung und Begrenzung dieser dynamischen Systeme handelt es sich, durch welche das Leben und alle seine Eigenschaften fort und fort übertragen werden. Histologische und entwicklungsgeschichtliche Forschung werden sich die Hand reichen müssen, um diese Systeme näher zu bestimmen, welche ohne Frage entwicklungsphysiologischer Natur sind, wie auch daraus hervorgeht, dass die Arten ihrer Vermehrung den Arten und Formen der ungeschlechtlichen Fortpflanzung analog sind.

Wie sich die Forschung auf diesem Felde weiterhin gestalten wird, lässt sich nur auf eine kurze Strecke hinaus voraussagen. Das eine glaube ich aber versichern zu können, dass diese Art der Forschung auf vollkommen neue Gebiete hinüberleiten und diese überhaupt erst ermöglichen wird. Zu ihnen rechne ich die Theorie der Flächenstruktur und des Flächenwachstums der Epithelien, der Haut und der Schleimbäute. Dabei wird sich der Systemcharakter der genannten Membranen enthüllen, welcher bisher nur in einer äusserlichen Weise erkennbar war, nämlich an der gesetzmässigen Verteilung der Haare, Schuppen, Federn, Papillen, Zotten usf.

Auch für die Pathologie wird die weitere Entwicklung der Systemlehre von grossem Nutzen sein, da mannigfache Erkrankungen, z. B. ein grosser Teil der Geschwulstbildungen, Systemerkrankungen sind.

Literaturverzeichnis.

- v. Ebner: Über die Spitzen der Geschmacksknospen. Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss., Wien, Math.-naturw. Kl., Bd. 106, Abt. III.
- Derselbe: A. Köllikers Handbuch der Gewebelehre des Menschen, Bd. III. S. 18 ff., 1899.
- Engelmann, Th. W.: Die Geschmacksknospen. Strickers Handbuch der Lehre von den Geweben, Bd. II, 1872.
- Heidenhain, M.: Plasma und Zelle. Jena, Gustav Fischer, Bd. 1, 1907; Bd. 2, 1911.
- Derselbe: Über Zwillings-, Drillings- und Vierlingsbildungen der Dünndarmzotten, ein Beitrag zur Teilkörpertheorie. Mit 20 Abbildungen. Anat. Anz., Bd. 40, 1911.
- Derselbe: Über die Entstehung der quergestreiften Muskelsubstanz bei der Forelle. Beiträge zur Teilkörpertheorie II. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 83, Abt. I, 1913.
- Heiderich, Friedr.: Die Zahl und die Dimension der Geschmacksknospen der Papilla vallata des Menschen in den verschiedenen Lebensaltern. Nachr. d. Ph. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Math.-phys. Kl., 1905.
- Hermann, F.: Studien über die Entwicklungsgeschichte des Geschmackorgans. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 24, 1884.
- Derselbe: Studien über den feineren Bau des Geschmackorgans. Sitzungsber. d. math.-phys. Kl. d. Kgl. Bayer. Akad. d. Wiss. vom 5. Mai 1888.
- Kallius, E.: Geschmackorgan. Handb. d. Anat. d. Menschen, herausgeg. von K. v. Bardeleben, Bd. V, I. Abt., II. Teil, S. 243 ff.
- Kolmer, W.: Über Strukturen im Epithel der Sinnesorgane. Anat. Anz., Bd. 36, 1910.
- v. Lenhossék, M.: Die Geschmacksknospen in den blattförmigen Papillen der Kaninchenzunge. Verh. d. phys.-med. Ges. zu Würzburg, N. F., Bd. XXVII, 1893.
- Mislawsky, N.: Über das Chondriom der Pankreaszellen. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 81, 1913.
- Oppel, A.: Lehrbuch der vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Wirbeltiere. III. Teil: Mundhöhle, Bauchspeicheldrüse und Leber. Jena 1900, S. 346 ff., 453 ff.
- Perroncito, A.: Contributo allo studio della biologica cellulare. Mitochondri, cromidii e apparato reticolare interno nelle cellule spermatiche. Abhandlungen der Accad. dei Lincei. Classe di scienze fisiche etc., Vol. VIII, 1910.
- Retzius, Gust.: Die Nervenendigungen in dem Geschmackorgan der Säugetiere und Amphibien. Biol. Unters., N. F., IV, 1892.
- Derselbe: Zur Kenntnis des Geschmackorgans beim Kaninchen. Ibidem, Bd. XVII, 1912.
- Wiesner: Über die Elementarstruktur und das Wachstum der lebendigen Substanz. Wien, Alfred Hölder, 1892.

- v. Wyss, H.: Über ein neues Geschmacksorgan auf der Zunge des Kaninchens. Zentralbl. f. d. med. Wiss., 1869.
 Derselbe: Die becherförmigen Organe der Zunge. Arch. f. mikr. Anat., Bd. VI, 1870.
 Zawarzin, A.: Beobachtungen an dem Epithel der Descemetschen Membran. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 74, 1909.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel XIX–XXV.

Sämtliche Abbildungen beziehen sich auf die Geschmacksknospen der *Papilla foliata* vom Kaninchen. Alle Präparate waren mit Eisenhämatoxylin gefärbt.

Tafel XIX.

- Fig. 1. Typischer „Stab“ mit vier einporigen Knospen. Vergr. 452. Die vier Pfeile zur Linken geben die Stellung der Knospen in Fächerform an. si = Seitenlamelle des bindegewebigen Grundstockes; hl = Hornlamelle; ha = hakenförmige Umbiegung der Seitenlamelle; ep = Epithelmantel.
 Fig. 2. Drei einporige Knospen kleinster Art, die unterste aus nur wenigen Zellen bestehend und mit ihrer Achse am stärksten gegen die Oberfläche des Sinnesfeldes geneigt. Vergr. 660.
 Fig. 3. Zwei kleine Knospen, eine obere und eine mittlere, in typischer Stellung, die Achsen beider Knospen konvergent. Vergr. 660. ep = Epithelmantel.
 Fig. 4. Zwei mittelgrosse Knospen, eine mittlere und eine untere, in typischer Stellung. An der unteren Knospe das Rudiment eines Epithelmantels. Vergr. 660. ep = Epithelmantel.
 Fig. 5. Eine grosse typische Knospe und zwar die oberste eines Stabes; symmetrische Anordnung der Zellen. Vergr. 660.
 Fig. 6. Sehr grosse unterste Knospe mit entsprechend grosser Ampulle und grossem Epithelmantel (ep). Man beachte, dass diese Knospe, entsprechend der fächerförmigen Aufstellung der Knospen innerhalb des Stabes, in sich schief verzogen ist. Vergr. 660.
 Fig. 7. Sehr grosse Knospe und zwar die mittlere von dreien. Grosse Ampulle, ausgedehnter Epithelmantel. Entsprechend ihrer Lage innerhalb des Stabes ist diese Knospe nicht so stark in sich verzogen wie das Individuum der vorhergehenden Figur. Vergr. 660.

Tafel XX.

- Fig. 8. Aus einer Flachschnittserie. Vergr. 933. Der Schnitt ging durch die Ampullen der Knospen. Der obere Rand des Sinnesfeldes liegt nach aufwärts, wo die homogen gefärbte oberflächliche Hornlamelle in den Schnitt gefallen ist. Letztere ist auch am linken Rande der Figur sichtbar, während nach rechts hin das Niveau des Schnittes sich etwas mehr in die Tiefe senkt. An

einigen Stellen sieht man sehr schön, wie die Lamellen der oberflächlichen Plattenepithelzellen die Knospen in deren Peripherie bedecken; in der Nähe der Ampulle jedoch sind diese Lamellen überall weggeschnitten und man nimmt ihre Schnittränder wahr. In der Richtung der Linien AA und BB sieht man je einen Stab. Der zur Linken besteht aus drei Knospen, von denen die mittlere zweiporig ist. Der zur Rechten bei BB ist ein sogenannter ganzer ungeteilter Stab, welcher durch eine einzige Knospe mit vier Poren repräsentiert wird. Das Feld zwischen diesen beiden Stäben zeigt oben eine zweiporige, unten drei einporige Knospen. Diese Kombination wird erklärlich, wenn man annimmt, dass die obere zweiporige Knospe zwei nebeneinander liegenden unvollständig ausgebildeten Stäben entspricht. Es gehören dann die beiden einporigen Knospen zur Rechten nebst einem halben Teil der oberen Knospe zu dem einen, die dritte einporige Knospe zur Linken samt dem zweiten Teil der oberen Knospe zu dem anderen, übrigens sehr rudimentären Stabe. NB. Die feine Zeichnung in den Plattenepithelzellen (besonders links unten) bedeutet eine teilweise Ausfärbung der Plasmastruktur.

- Fig. 9. Aus einer Flachschnittserie. Vergr. 933. Der hier abgebildete Ausschnitt entspricht in der Projektion G der Strecke von b—e. Der Schnitt liegt unten am oberflächlichsten, wo Teile der sehr dunkel gefärbten Hornlamelle sichtbar sind; in der Richtung nach aufwärts, gegen den oberen Rand des Sinnesfeldes hin, senkt sich die Schnittebene, so dass hier die Knospen breit getroffen sind. Der Schnitt ist darum instruktiv, weil man Poren, Ampullen und Knospendurchschnitte nebeneinander sieht. Im übrigen vergleiche die Erklärung zu Fig. 8. Bei b eine grosse dreiporige Knospe. Unterhalb von c ein Stab mit zwei Knospen, beide zweiporig; von der unteren Knospe sind beide Ampullen getroffen. Unterhalb von d ein Stab mit vier Knospen, zu oberst zwei einporige, darauf folgend eine zweiporige, deren Ampullen beide im Schnitt liegen, darunter nochmals eine einporige, von welcher nur der Porus selbst sichtbar ist. Bei e eine zweiporige Knospe (vergl. auch Projektion G zwischen b und e).

Tafel XXI.

- Fig. 10. Die allgemeine Situation ist dieselbe wie bei Fig. 9. Vergr. 933. Der vorliegende Ausschnitt entspricht in Projektion G der Strecke bei p, wo eine grosse sechsporige Riesenknospe sichtbar ist. Letztere sieht man in der vorliegenden Abbildung im oberen Teile der Figur; der Schnitt liegt jedoch an dieser Stelle bereits so tief, dass nur noch fünf von den sechs Ampullen getroffen sind. Unterhalb der Riesenknospe geht der Schnitt in der Richtung nach abwärts allmählich in ein höheres Niveau über und man sieht der Reihe nach die Ampullen, Porenkanäle (pk) und Poren anderer Knospen auftreten. Um die Ampullen herum sieht man an mehreren Stellen

in schöner Weise die Schnittländer der Epithellamellen, welche den oberen Pol der Knospe decken. Diese zeigen im Umfang der Porenkanäle (pk) eine feine konzentrisch geordnete Plasmastruktur.

Fig. 11. Aus einer horizontalen Schnittserie. Vergr. 452. Die Abbildung zeigt in deutlicher Weise, dass die Knospen im Querschnitt der Stäbe alle gleich und zwar im wesentlichen symmetrisch gestaltet sind. Sublimat-Trichloressigsäure-Eisessig.

Fig. 12 und 13. Poren, Porenkanäle und Ampullen, letztere mit den Sinneshaaren, bei einer Vergrößerung von 1600. In Fig. 13 ist die Ampulle sowohl wie der ausleitende Porenkanal aussergewöhnlich weiträumig. h = Hornschichte; dep = Deckepithel über den Knospen; s = in Fig. 12 schleimartige Substanz, in welche die Sinneshaare eingebettet sind. Man beachte die Schlingelungen der Sinneshaare und ferner die Anwesenheit kurz abgeschnittener Stümpfe von solchen besonders in Fig. 13. Sublimat-Trichloressigsäure-Eisessig.

Tafel XXII.

Die Abbildungen dieser Tafel geben Übersichtsbilder über grössere Strecken der Sinnesfelder, wie sie auf Flachschnittserien gewonnen werden. Die Vergrößerung ist 232 mal. Der obere Rand des Sinnesfeldes liegt bei allen Abbildungen nach rechts. Zugleich geben die Abbildungen eine Vorstellung davon, wie die Schnitte aufeinander projiziert werden können, um die Porenzahl der einzelnen Knospen zu bestimmen.

Fig. 14—16 gehören zusammen und entsprechen der Projektion C. Fig. 14: Dieser Schnitt zeigt einen grossen Teil der Hornlamelle mit vielen Poren, ausserdem die oberen Abschnitte vieler Knospen mit den zugehörigen Ampullen. Der vorhergehende Schnitt zeigte bereits einige Poren, welche auf dem vorliegenden nicht mehr enthalten sind. Fig. 15: Der nächstfolgende Schnitt mit dem Rest der Poren bzw. Ampullen. Fig. 16: Dieser Schnitt ist der übernächste nach dem der Fig. 15. In allen drei Figuren entspricht die Buchstabenbezeichnung genau der Bezeichnung in Projektion C. In Fig. 16 wurden alle Buchstaben eingesetzt, in Fig. 14 und 15 genügten einige wenige Bezeichnungen, um ersichtlich zu machen, wie die drei Schnitte eventuell zur Deckung zu bringen sind. S = in Fig. 16 Längsschnitt des oberen umgebogenen Teils der Seitenlamelle. Die Topographie der Knospen in diesem Sinnesfelde entspricht durchaus dem gewöhnlichen Vorkommen. Die Knospen lassen sich leicht in Querreihen oder „Stäbe“ anordnen, wenn man auch vielleicht über die spezielle Zugehörigkeit einzelner Knospen im Zweifel bleiben mag.

Fig. 17—19 gehören zusammen und entsprechen der Projektion E. Die Buchstabenbezeichnung ist dieselbe wie dort. Dieses Sinnesfeld zeigt das nicht ganz gewöhnliche Vorkommen ungemein vieler mehrporiger Knospen; letztere lassen sich an vielen Stellen nicht genau zu „Stäben“ ordnen. Vergl. den Text S. 435. Fig. 17: Sehr

schönes Bild der oberen verhornten Epithelschicht mit vielen Poren. Fig. 18: Der nächste Schnitt, welcher ebenso in sehr schöner Weise den oberen Pol vieler Knospen mit den Ampullen zeigt. Fig. 19: Schnitt durch den Äquator der Knospen, der dritte nach dem Schnitte der vorhergehenden Figur. S = Längsschnitt durch den hakenförmig umgebogenen Teil der Seitenlamelle.

Tafel XXIII.

- Fig. 20, 21 und 22. Drei zusammengehörige Schnitte aus einer Flachschnittserie. Vergr. 232. Die Abbildungen zeigen das eine Ende eines Sinnesfeldes, welches viele besonders grosse und zum Teil unregelmässig angeordnete Knospen enthält. Bei der Projektion der Poren auf den grössten Umfang der Knospen ergab sich das Bild der Projektion F. Die Buchstabenbezeichnung ist die nämliche wie dort. Demnach haben wir bei a und c sechsporige Knospen, gegenüber bei o eine vierporige, bei b und d je eine dreiporige usf. Am rechten Rande der Figur liegen bei e und f zwei normale Stäbe. Weiterhin vergl. die Projektion F von e—n.
- Fig. 23—26. Serie zweiporiger Knospen. Vergr. 660. Sublimat-Osmium.
- Fig. 23. Zweiporige Knospe mit äusserst nahe beieinander liegenden Ampullen. Oberste Knospe eines Stabes, welcher nach abwärts noch zwei einporige enthielt. Die Einfurchung an der Basis der Knospe ist ein äusserst seltenes Ereignis.
- Fig. 24. Zweiporige Knospe der gewöhnlichen Grösse und Form.
- Fig. 25. Zweiporige sehr grosse Knospe, oberste eines Stabes. Bei b Basalzellen.
- Fig. 26. Zweiporige Riesenknospe, mittlere zwischen zwei kleinen Einporigen. ep = epithelialer Mantel in Zusammenhang mit der nächstoberen Scheidewand; z = Zwickelzellen.
- Fig. 27. Mittलगrosse, dreiporige Knospe; über ihr in demselben Stabe noch eine einporige. ep = epithelialer Mantel. Vergr. 660. Sublimat-Osmium.
- Fig. 28. Sehr grosse dreiporige Knospe; darüber in demselben Stabe nur noch eine einporige. Diese Knospe zeigt sehr gut die besondere asymmetrische Struktur oder innere Verziehung, welche der Fächerstellung der Knospen innerhalb des Stabes entspricht. ep = epithelialer Mantel. Vergr. 660. Sublimat-Osmium.
- Fig. 29. Grosse vierporige Knospe; unter dieser befand sich noch eine einporige. b = Basalzellen; z = Zwickelzellen. Vergr. 660. Sublimat-Osmium.

Tafel XXIV.

Die sämtlichen Abbildungen dieser Tafel mit Ausnahme von Fig. 35 beziehen sich auf die Epithelkeile und unvollständigen Scheidewandbildungen.

- Fig. 30. Zweiporige Riesenknospe. Vergr. 660. Sublimat-Osmium. Die Basalzellen bilden einen Epithelkeil (epk). Die Anordnung der Sinneszellen zeigt sehr deutlich die Form der „Verschränkung“. Die Knospe ist eine oberste; unter ihr befand sich nur noch eine einporige.
- Fig. 31. Grosse dreiporige Knospe. Vergr. 660. Sublimat-Osmium. Diese Knospe ist die unterste in ihrem Stabe und zeigt eine durchaus typische Form. epk = Epithelkeil.
- Fig. 32. Zweiporige Knospe mit Epithelkeil. Vergr. 600. Sublimat-Osmium. Die Zellenverschränkung ist deutlich erkennbar.
- Fig. 33. Zweiporige Knospe. Vergr. 660. Sublimat-Osmium. Der Epithelkeil hat sich zu einer unvollständigen Scheidewand ausgewachsen. Der freie Rand der Scheidewand (sw) ist sehr dunkel gefärbt („Randfaser“).
- Fig. 34. Dreiporige Knospe mit unvollständiger Scheidewand (sw). Diese Knospe war eine unterste; darüber befanden sich noch zwei einporige. Vergr. 660. Sublimat-Osmium.
- Fig. 35. Zweiporige Knospe aus einer Horizontalschnittserie mit Zwickelzellen. Symmetrische Anordnung der Zellen ohne innere Verziehung (vergl. Fig. 11). Vergr. 660. Sublimat-Trichloressigsäure-Eisessig.
- Fig. 36 und 37. Zwei Knospen mit Scheidewandbildung aus Flachschnittserien. Vergr. 452.
- Fig. 36. Bei A der Querschnitt durch den Oberteil einer grossen Knospe mit der Ampulle; auf der linken Seite sieht man schon hier eine Einkerbung des Konturs. Bei B sieht man diese Knospe durch eine Scheidewand in zwei ungleichgrosse Teile zerlegt; der Schnitt ist durch den obersten Rand der Scheidewand gegangen. Bei C ein etwas tieferer Schnitt. Diese Knospe ist also einporig und dabei zweiteilig.
- Fig. 37. Bei A in der Mitte eine grosse Knospe mit zwei Ampullen. Bei B ist diese Knospe durch beiderseitiges Eindringen einer Scheidewand fast vollständig in zwei Teile zerlegt. Bei C sieht man, wie der untere Knospenanteil sich abermals einschnürt, und bei D wie dieser in zwei vollständig gesonderte Teile zerfällt. Die hier abgebildete Knospe ist also zweiporig und dreiteilig.

Tafel XXV.

Diese Tafel zeigt nebeneinander acht Projektionen (A—H), welche im Text genau besprochen sind. Der obere Rand des Sinnesfeldes liegt in allen Figuren nach rechts hin. Vergr. 159.

10

11

12

13

30

epk

31

epk

32

epk

33

epk

34

epk

35

epk

36

A

B

C

C

D

B

A

37