(Aus dem physiologischen Institut der Universität Rostock.
Vorstand: Prof. O. Langendorff.)

Zur Frage über die Kontraktionswelle im Herzen.

Von

Privatdozent Dr. **A. Leontowitsch** (Kiew).

(Mit 17 Textfiguren und Tafel V.)

I.

Bereits vor einigen Jahren wurde die Frage über die Analogie zwischen dem Herzen der Warmblüter und dem der Kaltblüter aktuell, eine Analogie, die viel weiter zu geben scheint, als das bisher angenommen wurde.

In ganz konkreter Weise wurde diese Frage in der Literatur zuerst wohl von Hering¹⁾ aufgestellt. An abgekühlten und darum langsam pulsierenden Herzen bemerkte dieser Autor, dass „ganz unzweifelhaft den Pulsationen der Venen jene der Vorhöfe folgten. Es kann auch vorkommen, dass die Pulsationen an einer Vene arrhythmisch werden, dann folgen gleichfalls arrhythmische Vorhofspulsationen. Weiterhin kann man beobachten, dass erst auf mehrere Pulsationen der Vene eine Vorhofskontraktion folgt, ein Verhältnis, wie man es zwischen Vorhöfen und Ventrikeln längst kennt. Schliesslich pulsieren nur noch die Venen ganz schwach, ohne von Vorhofschlägen gefolgt zu werden. Nach Sistierung der Pulmonalvenenpulsationen können die Hohlvenenpulsationen noch lange bestehen bleiben, niemals habe ich das Umgekehrte beobachtet“.

Durch klinische Beobachtungen an Venenpulsen kam ferner **Wenk ebach**²⁾ zu dem Schluss, dass man zur Erklärung der

1) Zur experimentellen Analyse der Unregelmässigkeiten des Herzschlages. Pflüger's Arch. Bd. 82 S. 32. 1900.

2) Beiträge zur Kenntnis der menschlichen Herztätigkeit. Arch. f. (Anat. und) Physiol. 1906 S. 297. Namentlich gehören hierher die Seiten 318—328.

Phlebogramme das Ausgangsgebiet der Kontraktionen des Herzens in die Stelle der Mündung der *venae cavae* in den rechten Vorhof verlegen muss.

Auf eine experimentelle Basis wurde diese Frage zuerst von Langendorff¹⁾ gestellt, der nachgewiesen hatte, dass der Stannius'sche Versuch bei den Warmblütern eigentlich ebensogut wie bei den Kaltblütern gelingt.

Fast gleichzeitig damit kommt Rehfish²⁾ zu dem Schluss, dass zwischen dem Kaninchen- oder Hundeherzen und dem Kaltblüterherzen insofern eine vollständige Analogie besteht, dass hier wie dort ein selbständig pulsierendes Gebiet des Sinus venosus vorhanden ist, dessen Kontraktionen den Vorhofkontraktionen um $\frac{1}{25}$ Sek. vorangehen, wobei die Geschwindigkeit der Erregungsfortpflanzung von diesem Gebiete zum Vorhofe durch Reizung des Vagus verringert werden kann.

Rehfish stützt sich bei seinen Schlüssen darauf, dass die Vorhofkontraktionskurve bei Reizung des Vagus neue Erhebungen erhält. Es könnten daher Zweifel entstehen, ob hier nicht mechanische Einflüsse anderer Herzteile im Spiele wären. Die genaue Feststellung des Ortes, von dem aus die Kurve in dem erwähnten Sinne beeinflusst wird, lag übrigens ausserhalb der Aufgabe, die sich Rehfish gestellt hatte.

Etwas eigenartig ist die Stellung, die in dieser Frage von Frédéricq³⁾ und seinen Schülern eingenommen wird. Nach Frédéricq handelt es sich hierbei nicht um die oben erwähnte Analogie, sondern darum, dass sich zunächst der rechte Vorhof, dann infolge der sich wellenartig fortpflanzenden Erregung der linke zusammenzieht, und dass sich die Erregung erst dann durch das His'sche Bündel auf die beiden Ventrikel fortpflanzt. „La pulsation cardiaque

1) Langendorff und Lehmann, Der Versuch von Stannius an Warmblüterherzen. Pflüger's Arch. Bd. 112 S. 352.

2) Rehfish, Über die Reizung des Herzvagus bei Warmblütern mit Einzelinduktionsschlägen. Arch. f. (Anat. und) Physiol. 1906 S. 152.

3) L. Frédéricq, La pulsation du cœur du chien est une onde de contraction qui débute dans l'oreillette droite, s'étend rapidement aux parois des deux oreillettes, puis franchit lentement le faisceau de His pour s'irradier rapidement dans la substance des ventricules. Archives internat. de physiol. t. 4 p. 57. — Schmidt-Nielsen, Le prétendu synchronisme de la systole des deux oreillettes. Ibidem p. 417.

du chien — sagt dieser Autor — doit être assimilée à une onde de contraction, qui, née dans l'oreillette droite, entre le point d'aboutement des deux veines caves, se propage avec une très grande rapidité par continuité de substance à l'ensemble des deux oreillettes, de sorte que leur systole paraît simultané. L'onde de contraction se propage ensuite avec lenteur le long du faisceau de His, pour atteindre les ventricules, sur lesquels elle s'irradie avec très grande rapidité; la systole des ventricules paraît également simultanée (p. 69 et 70).

Mit der weiteren Erforschung dieser Verhältnisse befassten sich zwei Schüler L. Frédéricq's: Schmidt Nielsen¹⁾ und Stassen²⁾. Durch die Marey'sche Trommel erhielten sie Kontraktionskurven verschiedener Teile des Hundeherzens (bei geöffnetem Thorax und künstlicher Atmung). Nielsen schreibt simultane Kurven vom linken und rechten Vorhof und vom rechten Ventrikel. Die Zeit wurde durch Sekunden bezeichnet, die Geschwindigkeit der Trommel betrug ca. 50 mm pro Sekunde. Nielsen fand nun dabei, dass das rechte Atrium sich meist um 0,02—0,03 Sek. früher als das linke zusammenzieht. Nur die geringere Zahl der Kontraktionen ergab Kurven, nach denen es schwer war zu entscheiden, welche von den beiden Vorhöfen sich früher zusammenzieht.

Stassen, der die Nielsen'schen Versuche nachgeprüft hat, gibt die Reihenfolge der Kontraktionen der verschiedenen Gebiete des Herzens an:

1. Das System des rechten Vorhofes,
2. das System des linken Vorhofes (um 0,02—0,03 Sek. später),
3. eine 0,08—0,10 Sek. andauernde Pause, während der die Kontraktionswelle das His'sche Bündel durchläuft,
4. das System des linken Ventrikels,
5. das System des rechten Ventrikels.

Auf den Vorschlag des Herrn Professors O. Langendorff unternahm ich es, experimentell zu untersuchen, ob nicht all diese in den Kontraktionen verschiedener Vorhofsteile beobachteten Differenzen darauf zurückzuführen sind, dass auch im Herzen der Warmblüter ein „Sinus“ oder ein analoges Gebiet vorhanden ist.

1) Schmidt-Nielsen, Le prétendu synchronisme de la systole des deux oreillettes. Archives internat. de physiol. t. 4 fasc. 4.

2) Stassen, De l'ordre de succession des différents phase de la pulsation cardiaque chez le chien. Archives internat. de physiol. t. 5 fasc. 1 p. 60.

II.

Nach dem ursprünglichen Plan sollten die Beobachtungen zunächst an ausgeschnittenen suspendierten Herzen von Warmblütern, und zwar an Herzen von Kaninchen und Katzen vorgenommen werden. Da aber der Anfangsteil der Aorta bei Katzen einen stark gekrümmten Verlauf nimmt, so sind Seitenvibrationen des Herzens während dessen Zusammenziehung bei diesen Tieren gar nicht zu vermeiden. Dieser Umstand ist für die Versuche verhängnisvoll, da die Kurven dadurch derart kompliziert werden, dass man unmöglich mit Sicherheit den Beginn der Kontraktion des Vorhofes oder des Ventrikels ablesen kann. Die Katzen eignen sich daher nicht für derartige Zwecke, und wir geben hier nur zwei an diesen Tieren vorgenommene Versuche wieder.

Die Kaninchen wurden stets durch Äther narkotisiert. Das Herz wurde vorher in situ sorgfältig mit der Ringer'schen Lösung durch die V. jugularis durchgespült, damit man auch sicher sein konnte, dass alle Teile des Herzens von Gerinnseln frei waren.

Zur Zuleitung der Ringer'schen Lösung bediente ich mich eines im physiologischen Laboratorium der Rostocker Universität befindlichen, von Langendorff konstruierten Apparates, der dort gewöhnlich zu Demonstrationszwecken bei den Vorlesungen verwendet wird.

Der Bau dieses Apparates wird durch das beiliegende Schema (Fig. 1) erläutert. Ein würfelförmiger, von oben offener Kasten *A*, dessen Seitenlänge 25 cm beträgt, wird mit Wasser gefüllt, das durch den darunter stehenden, mit einem Regulator versehenen Gasbrenner erwärmt wird. Im Wasser steht eine 2,5 Liter fassende dreihalsige Wulff'sche Flasche, die mit der zur Ernährung des Herzens dienenden Flüssigkeit (der Ringer'schen Lösung) gefüllt ist. Der mittlere Hals der Wulff'schen Flasche ist für das Thermometer *T* bestimmt, das bis zur tiefsten Schicht der Nährflüssigkeit reicht. Der Hals *L* lässt das Röhrchen eines zylinderförmigen Glastrichters durch. Oben ist dies Röhrchen mit einem T-förmigen Hahn versehen, unten reicht es bis zum Boden der Wulff'schen Flasche. Durch eine Drehung des Hahnes kann je nach Wunsch eine Kommunikation des Fortsatzes *Z* des Trichters mit dem Inneren der Flasche (wenn der unpaarige Schenkel des T-förmigen Hahnes nach unten gerichtet ist) oder eine Verbindung des Trichters mit diesem Raume (wenn der unpaarige Schenkel nach rechts) hergestellt werden.

Der Trichterfortsatz *Z* ist mit einer Sauerstoffflasche verbunden. Durch die Drehungen des Hahnes *H* wird daher entweder ein Druck des Sauerstoffs auf die Ringer'sche Lösung ermöglicht, oder es wird ein Zuströmen einer neuen Portion Flüssigkeit zur Flasche erreicht. Im Pfropfen des Halses *R* befinden sich zwei Öffnungen: durch die eine Öffnung geht ein Glasröhrchen *O*, das bis zum Boden der Wulff'schen Flasche reicht und dazu dient, die Ringer'sche

Fig. 1.

Lösung zum Herzen zu leiten, in der anderen Öffnung ist das Röhrchen O_2 eingeklemmt, das im oberen, Sauerstoff enthaltenden Teil der Flasche endet und an seinem oberen Ende ein Manometer *M* und einen Hahn H_2 besitzt. Sieht der unpaarige. Schenkel des Hahnes H_2 nach rechts, so ist das Innere der Wulff'schen Flasche mit dem Manometer *M* verbunden (die während des Ganges des Versuches erforderliche Stellung des Hahnes), sieht aber dieser Schenkel nach links, so ist das Gas oberhalb der Ringer'schen Flüssigkeit mit der Aussenluft verbunden (diese Stellung des Hahnes H_2 ist dann erforderlich, wenn wir durch H_1 frische Ringer'sche Lösung zugießen wollen).

Durch kombinierte Drehungen beider Hähne erhalten wir demnach entweder eine Arbeitsstellung verschiedener Teile des Apparates oder die Stellung, die zum Zuströmen der Ringer'schen Lösung erforderlich ist. Steht schliesslich der Hahn H_1 in Arbeitsstellung, während Hahn H_2 nach aussen offen ist, so ist diese Kombination zur Sättigung der Ringer'schen Lösung mit Sauerstoff geeignet.

Alle hier beschriebenen Teile sind in der Wulff'schen Flasche mittelst Gummipfropfen befestigt. Die Unbequemlichkeit, die dieser Einrichtung anhaftet, und die darin besteht, dass nach teilweiser Entleerung die Wulff'sche Flasche dazu neigt, aufzusteigen, lässt sich durch zwei Eisenstangen F beseitigen, die mittelst der Federn F_r mit den am Kasten A befestigten Stiften verbunden sind. Die Stangen F drücken auf die Ränder der Gummistöpsel und befestigen auf diese Weise sowohl die Pfropfen als die Flasche in ihrer Lage.

Die Sättigung mit Sauerstoff und die Herstellung eines Druckes dieses Gases auf die Ringer'sche Lösung geschieht von einer Sauerstoffflasche aus, deren Gummischlauch nicht unmittelbar, sondern vermittelt eines Sicherheitsventils mit dem Fortsatz Z verbunden ist. Dieses Ventil besteht nach dem Vorgang von Gottlieb und Magnus aus einem T-förmigen Glasrohr, dessen freier Schenkel in einen schmalen, gegen 20 cm hohen, mit Quecksilber gefüllten Glaszylinder hineintaucht. Dank dieser Vorrichtung wird der Sauerstoffdruck über der Ringer'schen Lösung durch die Quecksilbersäule reguliert, denn sollte der Druck in der Flasche die Höhe der Quecksilbersäule übersteigen, so müsste das überflüssige Gas durch das Quecksilber hindurch nach aussen entweichen. Dieses Ventil ist auch für den Fall von Nutzen, wenn die Ringer'sche Lösung durch ein Versehen nach Z und in den Gummischlauch der Sauerstoffflasche geraten sollte. Dann sammelt sich nämlich die Ringer'sche Lösung im unteren Teile der T-förmigen Röhre an und wird durch den Druck des Sauerstoffs durch die Quecksilberschicht hindurch nach aussen entfernt.

An der anderen Seite des Apparates ist die Kanüle O durch Gummischlauch mit einem Stativ verbunden, an dem die Herzkannüle K und in der Nähe des Herzens ein Thermometer W befestigt sind. Dieses letztere zeigt die Temperatur der in das Herz eindringenden Ringer'schen Lösung an.

Den Hauptbestandteil bildet hier (Fig. 2) eine T-förmige Glas-kanüle N , deren freies Ende h , wie bereits erwähnt, mittelst Gummi-

schlauches mit der Kanüle O_1 des oben beschriebenen Apparates (Fig. 1) verbunden ist. Das obere sowie das untere Ende sind von kupfernen Ansatzröhren P und P_1 eingefasst. Der Ansatz P ist für das Thermometer W bestimmt, welches zu diesem Zwecke in einen kupfernen kegelförmigen Pfropfen Z derart eingefasst wird, dass dieser Pfropfen in den Ansatz hineinpasst. Durch einfaches Einschieben wird das Thermometer fest genug in der auf der Fig. 2 dargestellten Lage fixiert.

Der untere Ansatz dient zur Fixierung der Glaskanüle K , was durch einfaches Einschieben ins untere Ende der Röhre N erreicht wird. Dieser Ansatz ist nämlich aussen von einer passenden Schraubenmutter P_2 umgeben, die unten eine dem Durchmesser der Kanüle K gerade entsprechende Öffnung besitzt. Beim Aufschrauben der Schraubenmutter P_2 auf den von aussen mit Schraubenwindungen versehenen Ansatz P_1 wird vermittelst der Kupferscheibe B ein Druck auf den kegelförmigen Gummipfropfen C ausgeübt. Dank dieser Vor-

Fig. 2.

richtung wird die Verbindung des Herzens mit der Nährflüssigkeit in einfacher Weise hergestellt. Die Kanüle K wird ins Herz eingeführt und am Eingang angebunden; mittelst einer mit einem feinen Gummischlauch am Ende versehenen Spritze wird sie sorgfältig mit Ringer'scher Lösung gefüllt, dann wird das obere Ende der Kanüle K in die Öffnung der Schraubenmutter P_2 gesteckt und durch Anschrauben in seiner Lage befestigt. Sollte im Innern des Systems der T-förmigen Röhre N überflüssige Luft vorhanden sein, so kann sie dadurch verdrängt werden, dass man für kurze Zeit das Thermometer W (abgebildet ist nur sein unterer Teil) entfernt.

Die Kanüle K hat die beschriebene Form erhalten, damit die Fassung des unteren Endes (P_1 und P_2) der durch Fäden hergestellten Verbindung der Engelmann'schen Serrefines mit den Schreibhebeln nicht hinderlich wäre.

Die Kurven der Herzkontraktionen erhielten wir durch direkte Registrierung mittelst Schreibhebelchen, die den Engelmann'schen ähnlich waren. Das Verhältnis der Hebelarme betrug bei der Registrierung auf berusstem Papier 1 cm : 20 cm, so dass die Herzbewegung zwanzigfach vergrößert dargestellt wurde. Die Höhe der Vorhofskurven betrug ca. 7 cm. Bei der photographischen Registrierung musste die Länge der „schreibenden“ Hebelarme wegen Platzmangels in der Spalte auf die Hälfte reduziert werden, so dass sich hier das Verhältnis 1 : 10 ergab.

Die eigentlichen schreibenden Endstücke waren bei Registrierung auf berusster Oberfläche aus dünnen, unbiegsam gemachten Zelluloidblättchen angefertigt, bei photographischer Registrierung bestanden sie aus kurzen, dünnen, schwarzen Borsten.

Es stellte sich während unserer Arbeit heraus, dass man hier ziemlich häufig mit sehr kleinen Zeitabschnitten (unter 0,01 Sek.) zu rechnen hatte. Die Trommel musste daher eine bedeutende Geschwindigkeit erhalten. Diese Geschwindigkeit war stets höher als 100 mm pro Sekunde, erreichte aber in manchen Versuchen sogar 500 mm. Im ganzen erwies sich jedoch eine Geschwindigkeit von 200 mm als ausreichend, und sie wurde auch hauptsächlich — namentlich bei den photographischen Versuchen, die auf den folgenden Seiten beschrieben werden — angewandt.

Die von mir gemachten Aufzeichnungen zerfallen in zwei Kategorien: die auf berusstem Papier und die auf photographischem Wege registrierten.

In der ersten Kategorie sowie bei den Anfangsversuchen der zweiten wurde die Registrierung mittelst drei Hebelchen, bei den meisten Versuchen der zweiten Kategorie mittelst vier Hebelchen ausgeführt. Von diesen Hebelchen waren zuerst zwei an verschiedenen Abschnitten der Vorhöfe und einer an der Spitze der Ventrikel angebracht. Als sich aber später die Wichtigkeit der gleichzeitigen Registrierung einer möglichst grossen Zahl der Vorhofspunkte herausgestellt hatte, wurden gleichzeitig drei und beim Photographieren vier Vorhofspunkte registriert.

Die photographische Registrierung wurde deshalb angewandt, weil die bei den Versuchen enthaltenen Resultate mit den Vorstellungen, die nach den herrschenden Anschauungen über die Bedingungen der Pulsationen verschiedener Herzteile als die wahrscheinlicheren gelten mussten, nur schwer in Einklang zu bringen waren. Es entstand daher die Befürchtung, dass die nun zutage getretenen „Unregelmässigkeiten“ von irgendwelchen Besonderheiten oder Fehlern des Registriermechanismus abhängen konnten, so z. B. von der Schwere einzelner Teile, der Reibung der Schreibhebel an der Trommel, der grösseren oder geringeren Biegung der End-

Fig. 3.

stücke usw. Es konnten auch die bei der Berechnung der Kontraktionsfolge einzelner Hebelchen unvermeidlichen Fehler in Betracht kommen.

Bei der photographischen Registrierung wurden die möglichen Fehlerquellen in jeder Weise zu eliminieren gesucht. Unsere Hebelchen waren so leicht, dass sie von einer an den Serrefines angebrachten Belastung von 0,3 g umgestürzt wurden. Um einen steileren Aufstieg der Kurve zu erzielen, war die Rotation der Trommel gegen die Spitze¹⁾ der Hebelchen gerichtet. In diesem

1) Über die Deformation der Kurve durch die Rotation der Trommel, vgl. Langendorff, Physiologische Graphik S. 111.

Falle ruft nämlich die Rotation der Trommel keine Verflachung der Kurve hervor, die Wirkung ist vielmehr eine entgegengesetzte.

Die Anordnung des Versuches ist aus der Fig. 3 ersichtlich.

Als Lichtquelle diente die Laterne *A* mit Kalklichtbrenner und Kondensator (Oef. 150 mm). Unmittelbar vor den durch diese Laterne beleuchteten Hebelchen *F* liegt die Spalte *C*, die die Seitenstrahlen zurückhält. Das photographische Objektiv *G* lieferte ein fast naturgrosses Bild der Hebelchen auf einem 160 cm langen, zwischen zwei Trommeln gespannten Streifen photographischen Papiere.

Die mit dem photographischen Papier versehenen Trommeln befanden sich in einer Dunkelkammer, deren Wand mit *V* bezeichnet ist, alle anderen Vorrichtungen waren ausserhalb dieser Kammer in einem hellen Zimmer untergebracht, das aber während der lichtempfindlichen Manipulationen verdunkelt werden konnte.

Wesentliche Hilfe leistete uns die automatische Aufzeichnung — auf photographischem Wege — zweier Ordinatensysteme: Die Abszissen entstanden dadurch, dass in dem mit der Spalte *Sp* versehenen Kasten *D*, vor der Trommel mit dem photographischen Papier eine Garten'sche Zylinderlinse *L* mit aufgetragener Millimeterteilung aufgestellt wurde¹⁾. Die Ordinaten wurden mit Hilfe eines mit zehn Speichen versehenen Garten'schen Episkotiste reproduziert, das durch ein Kymographion in Bewegung gesetzt wurde. Bei unserer Versuchsanordnung betrug die Entfernung zwischen den Ordinaten 0,035 Sek. Zur Kontrolle wurde in der Ebene der Hebel eine Stimmgabel mit 100 Schwingungen pro 1 Sek. aufgestellt. *NN* ist die optische Achse.

III.

Einige Bemerkungen zur Erläuterung der folgenden Tabellen.

Bei der Anordnung der Versuche, die hier geschildert werden, ging der Verfasser von der Voraussetzung aus, dass die oben zitierten Arbeiten von Schmidt-Nielsen, Stassen und L. Frédéricq die tatsächlichen Verhältnisse ganz richtig darstellen. Im ursprüng-

1) Garten, Über rhythmische elektrische Vorgänge im quergestreiften Skelettmuskel. Abhandl. d. kgl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Mathem.-physiol. Klasse Bd. 26 S. 331.

lichen Plan der Versuche lag es daher, die Bewegungen zweier Teile des Vorhofes und eines Teiles des Ventrikels zu registrieren, um auf diese Weise Kombinationen der Kontraktion verschiedener Teile der Vorhöfe mit der Kontraktion einer und derselben Stelle der Ventrikel zu erhalten.

In den Vorhöfen wurden die Herzohren und die hinteren Wände rechts und links vom Septum gewählt. Es erwies sich, dass die Teile des Herzohres und der Vorhofswand unschwer so gewählt werden können, dass die Kontraktion jeder solchen Stelle einzeln

Fig. 4. Schema des von hinten gesehenen Herzens.

A = das Viereck, an dem die Serrefine des rechten Vorhofs befestigt war.

B = das Gebiet der Befestigung der Serrefine des linken Vorhofs.

× und × = ungefähre Bezeichnung der Herzohrenteile, an denen die Serrefines befestigt waren.

registriert wird, ohne dass die Kurve von den umliegenden Teilen beeinflusst wird. Das hier angeführte kleine Schema zeigt ungefähr, wo die Serrefines an den Vorhöfen und den Herzohren befestigt waren.

Um die Aufeinanderfolge der Kontraktionen zu bestimmen, wurden die berechneten Differenzen der Kontraktionszeiten (in Tausendsteln einer Sekunde) der Anschaulichkeit halber so dargestellt, dass der Beginn der Kontraktion des rechten Vorhofs gewöhnlich als *O* bezeichnet wurde; der Beginn der Kontraktion der

übrigen Teile wird sodann in einer positiven Anzahl der Tausendstel einer Sekunde ausgedrückt, falls diese Kontraktion der obenerwähnten Kontraktion folgt und in einer negativen, falls sie ihr vorangeht. Die Zahlen in der Rubrik „Atrium dextrum“, und in den folgenden bedeuten demnach Tausendstel einer Sekunde.

Ausser dieser zahlenmässigen Darstellung der Kontraktionsfolge einzelner Vorhofteile ist überall auch graphisch die angenommene Richtung der Kontraktionswelle angegeben.

P bedeutet hier — wie auch überall weiter — die Dauer einer vollständigen Herzperiode, d. h. die Zeit (ebenfalls in Tausendsteln einer Sekunde) vom Beginn einer Kontraktion irgendeines Vorhofsteils bis zum Beginn der nächsten Kontraktion desselben Teils. Die erhalten Zahlen bilden im allgemeinen den Durchschnitt aus fünf Messungen. Abweichungen davon sind als solche stets hervorgehoben.

In den Versuchen, die hier beschrieben werden sollen, ist es von Wichtigkeit, über die Änderungen der Reihenfolge, in der die verschiedenen Herzteile zur Kontraktion gelangen, orientiert zu sein. In einem Teil der Tabellen, in denen diese Versuche dargestellt wurden, bezeichneten wir die Punkte, in denen die Serrefines am Herzen befestigt waren, mit den Zahlen 1, 2, 3, 4, und gaben in jeder Rubrik die betreffende Zahl und deren Bedeutung an (so z. B. Atrium dextrum = 1, Atrium sinistrum = 2 usw. Die verschiedenen Reihenfolgen werden dann in Form von 1, 2, 3, 4 oder 4, 1, 2, 3 usw. bezeichnet, wobei die Zahlen in der Reihenfolge angeführt werden, in der die entsprechenden Herzteile zur Kontraktion gelangen. Ziehen sich zwei Teile gleichzeitig zusammen, so werden die entsprechenden Zahlen eingeklammert. So bedeutet (4, 1), 2, 3, dass sich 4, 1 gleichzeitig, aber vor 2 und 3 zusammenziehen. Zur leichteren Orientierung in den Änderungen der Reihenfolgen wird jede bestimmte Reihenfolge mit einem Buchstaben bezeichnet, der hinter die Zahlengruppe gesetzt wird, wie z. B. (4, 1). 2, 3 = *A*; 1, 2, 3, 4 = *B* usw. je nach den Besonderheiten der betreffenden Tabelle. Bleibt ein Buchstabe unverändert, so bedeutet das, dass auch die Reihenfolge der Kontraktionen unverändert bleibt und umgekehrt. — Durch solche Bezeichnungen wird hauptsächlich eine grössere Anschaulichkeit bei der Reproduktion erreicht. Grösstenteils benutzten wir jedoch eine andere anschaulichere Bezeichnungsmethode: Jeder Herzabschnitt wurde durch ein Viereck bezeichnet, das die Anfangs-

buchstaben der Benennung dieses Abschnittes enthielt. Die Lage dieser Vierecke entsprach ungefähr der gegenseitigen Lage der betreffenden Herzabschnitte. Ein gebogener Pfeil gab dann die Richtung und die Reihenfolge der Kontraktion an. So besagt das hier beigegebene Schema, dass sich zunächst das Atrium dextrum, dann das Auriculum sinistrum, danach das Auriculum dextrum und zuletzt Atrium dextrum zusammenzieht.

Darstellung der Resultate.

Tabelle I.

Versuch vom 1. Juni 1907. Herz einer Katze. Temp. 22° C. (Speisung mit durch Ringer'sche Flüssigkeit verdünntem Blut.) Erste beim Versuch erhaltene Kurve. Dem Aussehen nach pulsierte das Herz während des Versuches sehr gut.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = 1	Auriculum dextrum = 2	Ventriculum dextrum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	42	112	1, 2, 3 = A	1480	80
2	0	30	150	1, 2, 3 = A	1340	100
3	0	10	150	1, 2, 3 = A	1360	100
4	0	11	176	1, 2, 3 = A	?	

Tabelle II.

Versuch vom 1. Juni 1907. Kaninchen. Temp. 30° C. (Ringer'sche Lösung.) Dem Aussehen nach pulsierte das Herz vortrefflich.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = 1	Auriculum dextrum = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	4	174	1, 2, 3 = A	1800	110
2	0	8	200	1, 2, 3 = A	1680	125
3	0	0	180	(1 u. 2 zus.) 3 = B	1520	125
4	0	4	200	1, 2, 3 = A	?	125
5	0	15	61	1, 2, 3 = A	1980	33
6	0	8	216	1, 2, 3 = A	1500	60
7	0	6	215	2, 1, 3 = C	2140	80

Versuch vom 3. Juni 1907. Kaninchen. Der eigentliche Versuch von 11 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags. Dem Aussehen nach pulsierte das Herz noch um 5 Uhr nachmittags ganz regelmässig.

Tabelle III.

Versuch vom 3. Juni 1907. Kurve Nr. 1. Temp. 28° C. 11 Uhr 20 Min. vorm.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = 1	Auriculum dextrum = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Rotation der Trommel in mm pro Sek.
1	0	26	?	1, 2, ? = A ?	?	100
2	0	23	153	1, 2, 3 = A	?	100
3	0	25	109	1, 2, 3 = A	2060	100
4	0	33	166	1, 2, 3 = A	?	100
5	0	47	200	1, 2, 3 = A	?	100
6	0	43	175	1, 2, 3 = A	?	100

Tabelle IV.

Versuch vom 3. Juni 1907. Kurve Nr. 2. Temp. 28° C. 12 Uhr mittags.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = 1	Auriculum sinistr. = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Rotation der Trommel in mm pro Sek.
1	0	16	161	1, 2, 3 = A ₁ (?)	1920	100
2	0	13	136	1, 2, 3 = A ₁ (?)	?	100

Tabelle V.

Versuch vom 3. Juni 1907. Kurve Nr. 3. Temp. 28° C. 12 Uhr 40 Min. mittags.

Nummer der Kontraktion	Auriculum dextrum = 1	Auriculum sinistr. = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimeter pro Sekunde
1	0	30	200	1, 2, 3 = A ₂ (?)	950	100
2	0	29	153	1, 2, 3 = A ₂ (?)	1060	100

Tabelle VI.

Versuch vom 3. Juni 1907. Kurve Nr. 4. Temp. 28° C. 1 Uhr 20 Min. nachm.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = 1	Auriculum dextrum = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	47	200	1, 2, 3 = A (s. Tab. III)	1250	100
2	0	43	175	1, 2, 3 = A (s. Tab. III)	?	100

Die Betrachtung dieser Tabellen ergibt folgendes:

1. Nach der Dauer von P nähert sich Tabelle III der Tabelle IV, ebenso wie sich Tabelle V der Tabelle VI nähert.

2. Der Kontraktion der Auricul. dextr., geht die Kontraktion des Atrium dextr. voran. Wie man sieht, weisen die Tabellen III und IV Kontraktionen auf, bei denen die Welle wie folgt verläuft: Atrium dextrum, Auriculum sinistr., Auriculum dextrum.

3. Die Tabellen V und VI könnte man so vereinigen, dass der Lauf der Kontraktionswelle vom Atrium dextr. über das Auriculum dextr. nach dem Auriculum sinistr., das Atrium dextr. um ein Bedeutendes — um 0,05 Sek. — früher kontrahiert.

Versuch vom 4. Juni 1907. Kaninchen. Die Kurven wurden in der Zeit von 12 Uhr 30 Min. bis 2 Uhr nachmittags gewonnen. Das Herz pulsierte bis 5 Uhr nachmittags, obgleich sich schon während des Versuchs zeitweise eine Dyskoordination der Kontraktionen bemerkbar machte. Der Druck der Ringerschen Lösung betrug 60 mm Hg.

Tabelle VII.

Kurve Nr. 1. Temp. 25° C. 12 Uhr 30 Min. mittags. Temp. 24° C.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = 1	Auriculum dextrum = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	56	119	1, 2, 3 = A	1850	120
2	0	18	26	1, 2, 3 = A	1730	80

Tabelle VIII.

Kurve Nr. 2. Temp. 22° C. 1 Uhr nachmittags.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = 1	Atrium sinistr. = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	44	6	3, 1, 2 = A ₃ (?) anorm. Kontrakt.	?	110

Tabelle IX.

Kurve Nr. 3. Temp. 25° C. 1 Uhr 20 Min. nachmittags.

Numer der Kontraktion	Atrium dextr. = 1	Auric. sinistr. = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	124	fast gleichz. mit 0	(1, 3 zus.), 2 = A ₄ (?) anorm. Kontrakt. fast dieselbe	2850	104
2	0	107	ebenfalls fast 0 aber früher als das Auricul. sinistr.		?	90

Tabelle X.

Kurve Nr. 4. Temp. 25° C. 1 Uhr 40 Min. nachmittags.

Numer der Kontraktion	Auric. dextr. = 1	Auric. sinistr. = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	52	250	1, 2, 3 = A ₂ (?)		130
2	0	99	Beginn nicht erhalten	?		100
3	0	54	271	wie Kontrakt. 1		90

Tabelle XI.

Kurve Nr. 5. Temp. 25° C. 2 Uhr nachmittags.

Numer der Kontraktion	Atrium dextr. = 1	Atrium sinistr. = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	57	Beginn nicht erhalten	1, 2, = A ₅ (?)	1860	170
2	0	54	" " "	1, 2, = A ₅ (?)	1640	100
3	0	61	" " "	1, 2, = A ₅ (?)	?	90

Die Betrachtung der Resultate dieses Versuchs zeigt uns, dass 1. die Temperatur der Ringer'schen Lösung sich der Temperatur nähert, bei der schon ernste Dyskoordinationen des Herzens eintreten (Tab. VIII und IX), und 2. dass sich das Atrium dextr. nichtsdestoweniger früher als die anderen Abschnitte kontrahiert. Ein vollständiges Bild der Kontraktionen lässt sich allerdings nach den hier gewonnenen Resultaten nicht machen, denn die Zahlen, die sich auf die einander folgenden Kontraktionen beziehen, sind sogar bei einer und derselben Kurve verschieden.

Versuch vom 5. Juni 1907. Kaninchen. Der Versuch dauerte von 12 bis 2 Uhr mittags, das Herz pulsierte jedoch um 5 Uhr noch fast gut. Druck der Ringer'schen Lösung 80 mm Hg.

Tabelle XII.

Kurve Nr. 1. Temp. 26° C. 12 Uhr mittags.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextr. = 1	Auric. dextr. = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	19	Beginn nicht erhalten	1, 2 = A (?)	1670	87
2	0	41	" " "	1, 2 = A (?)	1660	100
3	0	35	" " "	1, 2 = A (?)	?	132

Tabelle XIII.

Kurve Nr. 2. Temp. 26° C. 12 Uhr 25 Min. mittags.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextr. = 1	Atrium sinistr. = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	59	Beginn nicht erhalten	1, 2 = A _s (?)	1640	135
2	0	62	" " "	1, 2 = A _s (?)	1640	105
3	0	72	" 172 "	Wahrsch. dieselbe	?	85

Tabelle XIV.

Kurve Nr. 3. Temp. 26° C. 1 Uhr nachmittags.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = 1	Atrium sinistrum = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	86	162	1, 2, 3 = A _s (?)	2360	190
2	0	48	168	1, 2, 3 = A _s (?)	2410	160
3	0	73	152	1, 2, 3 = A _s (?)	?	145

Tabelle XV.

Kurve Nr. 4. Temp. 26° C. 1 Uhr 25 Min. nachmittags.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = 1	Auriculum sinistrum = 2	Ventriculum = 3	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	94	194	1, 2, 3 = A ₁ (?)	2380	180
2	0	48	96	1, 2, 3 = A ₁ (?)	?	100

Tabelle XVI.

Kurve Nr. 5. Temp. 26° C. 2 Uhr nachmittags.

Nummer der Kon- traktion	Atrium dextrum = 1	Auriculum dextrum = 2	Ventri- culum = 3	Reihenfolge der Kon- traktionen	P.	Geschwindig- keit der Trommel in Millimetern pro Sekunde
1	0	19	8	1, 3, 2 (anorm. Kontraktion.)	2710	80
2	0	55	2 Anstiege 10 u. 120	?	?	100

Auch in diesem Versuch erhielten wir noch zwei anormale Kontraktionen (Tab. XVI), bei denen die Ventrikel sich früher kontrahieren, als das sein sollte. Die Temperatur von 26° C. ist demnach noch eine zu niedrige. Wir werden daher später die Ringer'sche Lösung auf eine höhere Temperatur bringen.

Betrachten wir aufmerksam die Reihenfolge der Kontraktionen verschiedener Vorhofsteile, so finden wir, dass sie sich im allgemeinen der von Frédéricq angegebenen nähert. Das tritt besonders hervor, wenn wir die mittleren Zahlen für die betreffenden Perioden berechnen.

In der Tat erhalten wir aus dem letzten Versuch folgende Zahlen für die Kontraktion der Vorhöfe:

Beginn der Kontraktion des Atrium dextr. = 0 "
 " " " " Auricul. dextr. = 0,036 "
 " " " " Auricul. sinistr. = 0,071 "
 " " " " Atrium sinistr. = 0,068 ".

Allgemeine Schlussfolgerungen des Kapitels.

Wie man aus dem Vergleich der für verschiedene aufeinanderfolgende Kontraktionen angeführten Angaben mit Leichtigkeit sehen kann, unterliegen doch die Zahlen, die die Aufeinanderfolge der Kontraktionen derselben beliebigen Teile des Vorhofs ausdrücken, bedeutenden Schwankungen.

Es ist daher immerhin zweifelhaft, ob es statthaft ist, den Gang der Kontraktionswelle durch Berechnung resp. durch Summierung mehrerer Kontraktionen festzustellen. Wir waren deshalb im weiteren bestrebt, eine möglichst grosse Anzahl sich kontrahierender Herzteile gleichzeitig zu registrieren. Bei direkter Registrierung (am berussten

Papier) bieten aber schon drei Hebelchen sehr grosse Schwierigkeiten. Wir berücksichtigten daher nur drei Punkte des Vorhofs und unterliessen es, die Kontraktionen der Ventrikel zu registrieren.

IV.

Für die Aufstellung und das Lesen der Tabellen gilt dasselbe, was im Beginn und zum Schluss des vorigen Kapitels gesagt worden ist. Die Vergrösserung der Bewegung war in den Versuchen vom 12., 15. und 17. Juni eine zehnfache.

Tabelle XVII.

Versuch vom 12. Juni 1907. Kaninchen. Temp. 36° C. Das Herz pulsierte dem Aussehen nach regelmässig. Es wurde nur eine Kurve gewonnen.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Atrium sinistrum	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	1 mm der Trommel entspricht Tausendstel 1 Sekunde
1	0	5	— 14		1380	9
2	0	0	0	gleichzeitig.	1420	10
3	0	0	10		1420	10
4	0	— 10	0		1400	10
5	0	— 20	— 35		1420	10
6	0	— 11	— 11		1440	11
7	0	0	0	gleichzeitig.	1420	11
8	0	0	5		1440	11
9	0	20	?		?	10

Tabelle XVIII.

Versuch vom 15. Juni 1907. Katze. Temp. 27° C. Druck der Ringer'schen Lösung — mit Blut vermischt 80 mm Hg.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Atrium sinistrum	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	1 mm der Trommel entspricht Tausendsteil 1 Sekunde
1	0	16	8		730	16
2	0	0	— 39		1200	13
3	0	18	65		1100	12
4	0	7	— 7		930	13
5	0	7	— 35	dieselbe.	900	14
6	0	0	— 35		750	14
7	0	— 20	— 52		780	13
8	0	— 2	— 35	dieselbe.	750	11
9	0	11	— 44		800	11
10	0	0	— 35	dieselbe.	1180	10
11	0	0	— 35	dieselbe.	1180	10
12	0	5	55		1100	10
13	0	0	66		870	10
14	0	— 9	— 27		830	9

Tabelle XIX.

Versuch vom 17. Juni 1907. Kaninchen. Das Herz schlug gut. Temp 35° C. 40 mm Hg.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Atrium sinistrum	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	1 mm der Trommel entspricht Tausendsteln 1 Sekunde
1	0	6	17		2000	11
2	0	30	20		1950	10
3	0	— 30	— 100		1700	10
4	0	— 10	— 100	dieselbe.	1100	10
5	0	20	10		1000	10
6	0	40	0		1000	10
7	0	30	20		1000	10
8	0	?	10	?	?	10

Die Messung der Kurve des Versuchs vom 12. Juni 1907 ergibt folgendes:

1. In einer Reihe von Fällen (zweite und dritte Kontraktion) kontrahieren sich alle beobachteten Vorhofsteile gleichzeitig. In anderen Fällen (dritte, vierte, sechste und achte Kontraktion) bezieht sich diese Gleichzeitigkeit auf die Kontraktion zweier Vorhofsteile.

2. Die Reihenfolge, in der sich die einzelnen Teile kontrahieren, ist in den anderen Kontraktionen ebenfalls sehr verschieden. Die Differenzen der Kontraktionszeiten entsprechen hierbei solchen Entfernungen auf der Oberfläche der Trommel, welche unschwer abgezählt werden können, auch wenn man ohne die genaueren Methoden auskommen will, mit denen wir gearbeitet haben. So kon-

trahiert sich z. B. in der fünften Kontraktion das Atrium sinistrum um 3,5 mm früher als das Atrium dextrum.

3. In der Aufeinanderfolge der Kontraktion verschiedener Vorhofsteile treten immerfort vollständig unerwartete Veränderungen ein.

Da wir es aber trotz der obigen Bemerkungen nicht für unmöglich hielten, dass die erwähnten unerwarteten Resultate durch die Einwirkung sei es zufälliger, sei es konstanter Fehler zustande gekommen waren, so stellten wir noch drei Versuche mit Registrierung auf berusstem Papier und Vergrößerung des Verhältnisses der Hebelarme bis zu 20:1 (anstatt wie früher 10:1) an. Wir erhielten auf diese Weise Kurven, deren Höhe 5–8 cm betrug.

Des weiteren versuchten wir, den Einfluss, den eventuell die Eigenschaften des einen oder anderen Hebelchens auf die Resultate ausüben könnten, dadurch zu eliminieren, dass wir jedesmal (im Versuch vom 21. Juni 1907) die Hebelchen, die mit bestimmten Vorhofsteilen verbunden werden sollten, wechselten.

Schliesslich versuchten wir noch ein drittes Mittel, indem wir gleichzeitig die Geschwindigkeit der Trommel steigerten, um auch auf diesem Wege die Fehler, die möglicherweise bei der Abzählung entstehen könnten, zu beseitigen.

Tabelle XX.

Versuch vom 18. Juni 1907. Kaninchen. Das Herz pulsiert sehr gut. Temperatur der Ringer'schen Lösung 35° C.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Auricul. sinistrum	P.	Reihenfolge der Kontraktionen	1 mm der Trommel entspricht Tausendsteln 1 Sekunde
1	0	18	9	1100		9
2	0	35	30	1020	dieselbe.	9
3	0	32	22	1050	dieselbe.	9
4	0	31	28	1050	dieselbe.	9

Nummer der Kon- traktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Auricul. sinistrum	P.	Reihenfolge der Kontraktionen	1 mm der Trommel entspricht Tausendstel 1 Sekunde
5	0	19	9	1050	dieselbe.	9
6	0	37	19	1050	dieselbe.	9
7	0	33	19	?	dieselbe.	9
8	0	17	9	1050	dieselbe.	17
9	0	20	13	1050	dieselbe.	13
10	0	28	17	1050	dieselbe.	11
11	0	15	15	1050		10
12	0	23	18	1040	Wie bei d. Kontraktionen .1-10.	9

Tabelle XXI.

Versuch vom 21. Juni 1907. Kaninchen. Das Herz pulsierte von 11 Uhr morgens bis 6 Uhr abends ausgezeichnet. Um 6 Uhr wurde noch eine Kurve der Kontraktion verschiedener Teile des rechten Ventrikels gewonnen. Der linke Ventrikel pulsierte zu dieser Zeit schon schwach, aber doch regelmässig.

11 Uhr 45 Min. morgens. Kurve Nr. 1. Druck der Ringer'schen Lösung 40 mm Hg. Von oben gerechnet war die Reihenfolge der Hebelchen: Auriculum sinistrum, Atrium sinistrum, Atrium dextrum.

Nummer der Kon- traktion	Atrium dextrum	Auriculum sinistrum	Atrium sinistrum	P.	Reihenfolge der Kontraktionen	Geschwindig- keit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
1	0	2	4	800		1
2	0	0	2	800		1

Nummer der Kon- traktion	Atrium dextrum	Auriculum sinistrum	Atrium sinistrum	P.	Reihenfolge der Kontraktionen	Geschwindig- keit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
3	0	10	13	820		1
4	0	5	10	810	dieselbe.	1
5	0	0	2	880		1
6	0	10	19	830		1
7	0	10	13	820	dieselbe.	1
8	0	— 1	0	800		1
9	0	8	8	830		1
10	0	0	9	870		0,9
11	0	— 5	— 5	850		1
12	0	3	7	850		1
13	0	— 3	3	?		1

Tabelle XXII.

12 Uhr 10 Min. mittags. Kurve Nr. 2. Temperatur der Ringer'schen Lösung 35° C. Aus Versehen wurde die Kurve registriert, während eine neue Portion dieser Lösung in die Woulf'sche Flasche eingegossen wurde. Von einem Drucke dieser Flüssigkeit kann daher nicht die Rede sein.

Nummer der Kon- traktion	Atrium dextrum	Atrium sinistrum	Auriculum sinistrum	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindig- keit der Trommel in Mitlimelern pro 0,01 Sek.
1	0	5	12		310	0,5
2	0	— 16	7		320	0,5
3	0	— 1	4		330	0,6
4	0	— 3	8	dieselbe.	350	0,8
5	0	— 10	3	dieselbe.	480	0,8
6	0	— 6	1	dieselbe.	430	0,8
7	0	6	— 6		470	0,9
8	0	0	0	gleichzeitig.	470	1
9	0	— 2	4		500	1
10	0	3	0		500	1
11	0	— 4	— 3		500	1
12	0	— 1	— 5		500	0,7

Tabelle XXIII.

In der dritten Kurve waren stark wellenförmige Teile vorhanden, die den Intervallen zwischen den Kontraktionen entsprachen. Diese Kurve wurde daher nicht gemessen.

Kurve Nr. 4. 1 Uhr 5 Min. mittags. Temperatur der Ringer'schen Lösung 35° C., Druck 40 mm Hg. Alle Hebelchen stehen nun in anderer Verbindung mit dem Herzen. Die Reihenfolge ist, von oben nach unten gerechnet, folgende: Atrium dextrum, Auriculum dextrum, Atrium sinistrum.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Atrium sinistrum	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
1	0	10	20		520	0,7
2	0	20	39	dieselbe.	550	0,8
3	0	7	13	dieselbe.	600	0,85
4	0	6	28	dieselbe.	600	0,9
5	0	2	12	dieselbe.	600	1
6	0	3	23	dieselbe.	690	1,1
7	0	— 5	23		700	1,1
8	0	— 2	26	dieselbe.	700	1,1
9	0	— 7	23	dieselbe.	710	1,1
10	0	— 3	27	dieselbe.	710	1,1
11	0	9	32		700	1,1
12	0	5	30	dieselbe.	650	1
13	0	10	30	dieselbe.	?	1

Tabelle XXIV.

Kurve Nr. 5. 1 Uhr 25 Min. nachmittags. Temperatur der Ringer'schen Lösung 30° C., Druck 40 mm Hg. Von oben nach unten gerechnet, ist die Reihenfolge der Hebelchen: Auriculum dextrum, Auriculum sinistrum und Atrium dextrum.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Auricul. sinistrum	Sek.	Reihenfolge der Kontraktionen	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
1	0	7	18	0,890		1,1
2	0	25	30	0,880	dieselbe	1
3	0	39	47	1,070	"	1
4	0	35	38	1,050	"	1,05
5	0	31	41	1,110	"	1
6	0	21	31	1,150	"	0,9
7	0	19	24	1,180	"	0,9
8	0	23	31	1,230	"	0,9
9	0	22	33	1,120	"	0,9
10	0	25	36	1,180	"	0,9
11	0	22	31	1,180	"	0,9
12	0	17	28	—	"	0,9

Tabelle XXV.

Kurve Nr. 6. 1 Uhr 50 Min. Temperatur der Ringer'schen Lösung 35° C., Druck 40 mm Hg. Von oben nach unten gezählt, sind die Hebel mit dem Auriculum dextrum, Atrium sinistrum und dem Atrium dextrum verbunden.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Atrium sinistrum	P.	Reihenfolge der Kontraktionen	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
1	0	10	20	430		0,6
2	0	6	10	500	dieselbe	0,8
3	0	4	7	500	dieselbe	1,1
4	0	11	22	530	dieselbe	1,1
5	0	7	20	560	dieselbe	1,0
6	0	13	21	550	dieselbe	1,0
7 und 8 verdorben				7 u. 8 580		

Nummer der Kon- traktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Atrium sinistrum	P.	Reihenfolge der Kontraktionen	Geschwindig- keit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
9	0	— 13	5	580		1,0
10	0	4	25	580		0,9
11	0	1	14	600	dieselbe.	0,9
12	0	— 20	2	580		0,9
13	0	2	14	580		0,9
14	0	+ 17	25	580	dieselbe.	0,9
15	0	— 6	17	600		0,9
16	0	6	23	580		0,9
17	0	8	27	550	dieselbe.	1,0
18	0	1	22	600	dieselbe.	1,0
19	0	10	14	600	dieselbe.	0,9
20	0	— 14	8	?		0,8

Die Betrachtung der in diesem Versuch gewonnenen Kurven führt uns zu denselben Schlüssen, zu denen wir bei den früheren Versuchen gekommen sind. Von den einzelnen Kurven zeigt jede etwas charakteristisches, wir haben aber kein Recht, diese Eigentümlichkeiten auf den Einfluss der Hebel zurückzuführen, da in jeder Kurve verschiedene Kombinationen der Hebel vertreten sind. Ebensovienig

ist ein Zusammenhang zwischen der Veränderung der Kontraktionsfolge und der Dauer der einzelnen Herzperioden zu konstatieren. Nur die Temperatur der Ringer'schen Lösung übt einen merklichen Einfluss im Sinne einer Verlängerung der Intervalle zwischen den Kontraktionen verschiedener Herzteile aus.

Speziell über die Kurven Nr. 1 und 2 lässt sich sagen, dass, trotzdem die Herzperiode in der zweiten Kurve halb so kurz wie in der ersten und im Herzen kein Druck vorhanden ist, man doch die Tendenz zur gleichzeitigen Kontraktion verschiedener Herzteile merkt.

Die Kurven Nr. 4 und 5 zeigen grössere Intervalle zwischen den Kontraktionen verschiedener Herzteile als die Kurven 1 und 2. Die Kurve Nr. 5 zeigt hierbei grosse Gleichmässigkeit in bezug auf die Reihenfolge der Kontraktionen und die Dauer der Intervalle bei gleichzeitig vorhandenen bedeutenden Schwankungen der Dauer der Herzperioden.

Versuch vom 29. Juni 1907. Dieser Versuch war besonders lehrreich in der Beziehung, dass uns seine Resultate über die Ursachen der schädlichsten Fehler aufklärten. Mit Bezug darauf wandten wir im weiteren Verlauf der Arbeit auch das photographische Verfahren an. Am 29. Juni erhielten wir in der Zeit von 11 Uhr bis 2 Uhr 20 Min. neun Kurven. Aus den weiter unten angegebenen Gründen unterziehen wir aber nur die dritte, vierte und fünfte Kurve einer Analyse, während die übrigen Kurven bei der Zusammenstellung der Resultate der vorliegenden Arbeit ausser Betracht bleiben.

Im Gegensatz zu den früheren Versuchen blieben hier die Verbindungsstellen der Hebelchen mit den Herzteilen nach Möglichkeit dieselben. Der ganze Versuch besteht aus zwei Serien: Die Kurven 1—5 bieten die Kombination: Atrium dextrum, Auriculum dextrum, Atrium sinistrum, während die Kurven 6—9 die Kombination: Atrium dextrum, Auriculum dextrum, Auriculum sinistrum bieten, so dass also nur die Verbindung mit dem Atrium sinistrum durch die mit dem Auriculum sinistrum ersetzt wurde. Zur Angabe der Reihenfolge der Kontraktionen sind in den Tabellen XXVI—XXXI folgende Bezeichnungen gewählt: für das Atrium dextrum = *S*, für das Atrium sinistrum = *V*, für das rechte Herzohr = *R* und für das linke *L*. Danach wird z. B. *VRL* die Reihenfolge Atrium sinistrum — rechtes Herzohr — linkes Herzohr, *L R V* die umgekehrte Reihenfolge bedeuten usw.

Tabelle XXVI.

Kurve Nr. 1. 11 Uhr 25 Min. vormittags. Temperatur der Ringer'schen Lösung 31° C. Nur drei Kontraktionen sind registriert worden: die übrigen Registrierungen kamen wegen zu schwacher Reibung der Schreibhebel gegen die

Trommel nicht zustande. Ein horizontaler Zwischenraum, der den Kontraktionspausen entsprechen hätte, fehlt in den Kurven. Die Kontraktionen der Vorhofsteile geben die erste grössere und die zweite kleinere Welle.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = <i>S</i>	Auriculum dextrum = <i>R</i>	Atrium sinistrum = <i>V</i>	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
1.	0	—25	—35	<i>VRS</i>	540	2
2	0	—28	—20	<i>RVS</i>	600	2,5
3	0	—36	—18	dieselbe	640	3

Kurve Nr. 2. 11 Uhr 50 Min. Temperatur der Ringer'schen Lösung 31° C. Die Hebel drücken fester auf die Trommel. Die Form der Kurve bleibt unverändert.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = <i>S</i>	Auriculum dextrum = <i>R</i>	Atrium sinistrum = <i>V</i>	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
1	0	—25	20	<i>RSV</i>	600	2
2	0	—44	28	dieselbe	570	2,5
3	0	—34	30	"	600	3,3
4	0	—48	28	"	580	4,5
5	0	—64	20	"	580	5
6	0	—61	29	"	?	6

Tabelle XXVII.

Kurve Nr. 3. 12 Uhr 10 Min. Temperatur der Ringer'schen Lösung 31° C. Die Hebelchen sind ebenso fest wie bei der zweiten Kurve angepresst. Die horizontalen Teile (die Pausen) sind gut ausgeprägt.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = <i>S</i>	Auriculum dextrum = <i>R</i>	Atrium sinistrum = <i>V</i>	P.	Reihenfolge der Kontraktionen	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
1	0	12	3	630	<i>SVR</i>	2,1
2	0	12	7	630	dieselbe	2,3
3	0	12	12	640	<i>S(VRzusamm.)</i>	2,7
4	0	6	1	650	<i>SVR</i>	3,7
5	0	5	6	680	<i>SRV</i>	4,8
6	0	8	misslungen	670	<i>SR</i>	1,3
7	0	14	7	680	<i>SVR</i>	1,5
8	0	7	5	680	dieselbe	4,4
9	0	12	10	?	"	2

Tabelle XXVIII.

Kurve Nr. 4. 12 Uhr 22 Min. Temp. 31° C. Die Hebelchen sind fester angespresst. Die horizontalen Teile der Kurven (die Pausen) sind gut ausgeprägt.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = S	Auriculum dextrum = R	Atrium sinistrum = V	P.	Reihenfolge der Kontraktionen	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
1	0	24	34	660	S R V	1,8
2	0	26	36	650	dieselbe	2,7
3	0	13	17	650	"	3,3
4	0	22	31	650	"	4,6
5	0	17	30	650	"	5,3

Tabelle XXIX.

Kurve Nr. 5. 12 Uhr 35 Min. Temp. 28° C. Die Hebelchen sind noch stärker angespresst. Die horizontalen Pausen sind gut ausgeprägt.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = S	Auriculum dextrum = R	Atrium sinistrum = V	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
1	0	19	34	S R V	750	1,6
2	0	33	49	dieselbe	750	2,0
3	0	28	52	"	750	3,3
4	0	12	35	"	750	4,3
5	0	19	25	"	750	2,5
6	0	31	62	"	?	3,0

Tabelle XXX.

Kurve Nr. 6. 1 Uhr 20 Min. Temp. 31° C. Das Hebelchen des Atrium sinistrum ist mit dem Auriculum sinistrum verbunden. Die Hebelchen sind ebenso angespresst wie früher. Die Pausen haben nicht die Gestalt gerader horizontaler Linien, ihre Reproduktion ist demnach misslungen.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum = S	Auriculum dextrum = R	Auricul. sinistrum = L	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
1	0	14	23	S R L	580	1,1
2	0	4	10	dieselbe	590	1,2
3	0	0	8	(S R zus.) L	590	1,8
4	0	3	11	S R L	590	2,2
5	0	— 5	0	R (S L zus.)	590	2
6	0	— 8	0	dieselbe	590	2,3
7	0	— 7	0	"	590	2,3
8	0	— 9	— 2	R L S	590	2,8
9	0	— 11	— 7	dieselbe	600	3,7
10	0	— 8	— 4	"	?	7

Tabelle XXXI.

Kurve Nr. 7. 1 Uhr 50 Min. Temperatur der Ringer'schen Lösung 31° C. Die Hebel sind schwächer als in der Kurve 6 angepresst. Die horizontalen Teile (die Pausen) sind schlecht gelungen.

Nummer der Kon- traktion	Atrium dextrum = <i>S</i>	Auriculum dextrum = <i>R</i>	Auricul. sinistrum = <i>L</i>	Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindig- keit der Trommel in Millimetern pro 0,01 Sek.
1	0	14	70	<i>SRL</i>	650	1,3
2	0	— 6	38	<i>RS L</i>	640	1,2
3	0	— 3	32	dieselbe	650	2,1
4	0	1	45	<i>SRL</i>	650	2
5	0	— 14	?	?	660	2
6	0	— 3	44	<i>RS L</i>	650	2,4
7	0	— 1	42	dieselbe	650	3,8
8	0	— 12	?	?	670	3,8
9	0	— 2	37	dieselbe	?	4,3

Bis zum Schluss des Versuches ist es in dieser Serie nicht gelungen, Kurven mit guten Pausen zu erhalten, die Resultate der Kurven 8 und 9 sind hier daher nicht angegeben. (Ob der Schreibhebel mit grösserem oder geringerem Druck an die Trommel gepresst war, darüber konnte man dadurch Aufschluss erhalten, dass die untere Feder etwas schief zeichnete; je nach dem Druck erhielt man daher bald einen grösseren, bald einen kleineren Teil der Kurvenspitze.)

Die Betrachtung des Versuchs vom 29. Juni 1907 ergibt, dass der grössere oder geringere Druck des Schreibhebels — wie das auch übrigens zu erwarten war — keinen Einfluss auf das Resultat der Versuche ausübt. In der Tat waren in dem dritten, vierten und fünften Versuch die Hebel verschieden stark angepresst, und doch war das Resultat dasselbe.

Was das Fehlen einer guten horizontalen Pause in der Kurve vor ihrem Anstieg bedeutet, ist eigentlich klar. Wir haben es dann nicht mit einem durch die Kontraktion eines bestimmten Vorhofsteils hervorgerufenen Anstieg, sondern mit einer Kombinationskurve zu thun, die aus der Summierung zweier Kurven, der gesuchten und einer aus zufälligen Bewegungen des Schreibhebels entstandenen, hervorgegangen war. Studiert man die Bewegungen der Hebel und die Registrierungen unter verschiedenen Bedingungen, so kann man sich unschwer überzeugen, dass das Fehlen einer der Pause entsprechenden Horizontale durch seitliche rotierende Bewegungen des

Herzens hervorgerufen worden ist. Das einzige Mittel zur Beseitigung dieser Störung ist die Fixierung des Herzens.

Die hier angegebenen Kurven des letzten Versuchs zeigen, dass die durch den erwähnten Umstand hervorgerufene Abweichung vom richtigen Resultat zuweilen doppelt so gross ist als das Resultat selbst. So beträgt die Maximaldifferenz in der „guten“ Kurve (Nr. 5) 0,065 Sek. nach der Plusseite, während die betreffende Grösse in der „schlechten“ Kurve 0,062 Sek. nach der Minusseite beträgt. Da die Fehler demnach grösser sind als die gesuchte Grösse, so ist diese Fehlerquelle sehr ernst zu nehmen. Da ausserdem diese Quelle sehr variabel ist, so könnten die Fehler auch durch eine grosse Anzahl von Beobachtungen nur mit grösster Mühe beseitigt werden, namentlich wenn man bei der Berechnung der mittleren Zahlen die tatsächlich verschiedene Reihenfolge der Kontraktionen berücksichtigen sollte. Trotz aller Mühe wird aber ein Teil der Kurven doch von den unerwünschten Vibrationen beeinflusst. Es bleibt daher nur übrig, die untauglichen Kurven ausser acht zu lassen und nur die besseren (die man als solche vor der Messung nach dem erwähnten Merkmal erkennen kann) zu berücksichtigen.

In jeder Kurve ist die Rotationsgeschwindigkeit der Trommel verschieden. Dieser Umstand scheint aber keinen Einfluss auf die Resultate der Abzählung auszuüben. Schon eine Geschwindigkeit von 1—2 mm pro 0,01 Sek. scheint für unsere Zwecke auszureichen.

V.

Zur Nachprüfung der erhaltenen Resultate haben wir noch einige Versuche mit photographischer Registrierung der Kontraktionen angestellt. Im Vergleich zu der Registrierung auf berusstem Papier weist die Photographie bedeutende Vorzüge auf:

1. die Hebel sind sehr leicht;
2. es ist leichter, ihre gegenseitige Lage unverändert zu erhalten, da alle Manipulationen, die die Reibung der Hebel gegen die Trommel betreffen, wegfallen;
3. dank dem Zweiordinatensystem der Registrierung ist auch das spätere Anbringen der Nullpunkte an allen Hebeln auf dem Niveau der Spalte überflüssig;
4. die spätere Berechnung der Kurven ist leichter;
5. leichter ist es auch, auch mit einer grösseren Zahl von Hebeln umzugehen;

6. die Bewegung der Trommel mit dem Papier in der Richtung gegen die Hebel ist leicht ausführbar.

Bei diesen Kurven nahmen wir die Vergrößerung der Hebel 10:1. Die Fixierung des Herzens wurde dadurch erreicht, dass an die Atrioventrikulargrenze ein in Gummi gewickelter Glasstab angebracht wurde und die Ventrikel durch ein an ihrer Spitze mittels eines Hakens angehängtes 25 g schweres Gewicht belastet wurden. Der Faden, an dem das Gewicht hing, stützte sich gleitend ebenfalls an einen Glasstab. Eine merkliche Beeinflussung der Kontraktionen wurde dadurch nicht hervorgerufen. Immerhin gelang es gewöhnlich erst nach einigen Probeaufnahmen, befriedigende Fixierung zu erzielen und befriedigende Aufnahmen — d. h. ohne durch die Herzrotation hervorgerufene Vibrationen — zu erhalten. Neben der Bestimmung der Reihenfolge der Kontraktion der Herzteile machten wir einige Probeversuche, um die Geschwindigkeit der Kontraktionswelle des Herzens zu bestimmen. Freilich ist es schwer, an einem pulsierenden Herzen die Entfernung zwischen zwei Punkten irgendwie genau zu bestimmen. Immerhin bleibt doch diese Entfernung stets dieselbe, so dass also auch der Fehler bei allen Bestimmungen der Geschwindigkeit der Welle im gegebenen Zwischenraum konstant bleiben muss. Die Zahlen für verschiedene Versuche müssen daher verschieden, für denselben Versuch aber gleich sein.

Diese Messungen ergaben jedoch noch auffallendere Resultate, als das übrige von uns gewonnene tatsächliche Material, denn die Geschwindigkeit der Kontraktionswelle erweist sich sehr oft als eine ganz und gar nicht konstante Grösse.

Es folgen die Resultate dieser Versuche.

Tabelle XXXII.

Versuch vom 19. Juli 1907. Das Herz schien regelmässig zu pulsieren. Es wurden zwei Kurven erhalten. Kurve Nr. 1. 1 Uhr mittags. Temperatur der Ringer'schen Lösung 32° C.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Auriculum sinistrum	Reihenfolge der Kontraktionen	P.
1	0	0 (? +)	40		1030
2	0	10	40	dieselbe	?
3	0	0 (? +)	40	dieselbe	?

Tabelle XXXIII.

Kurve Nr. 2. 1 Uhr 25 Min. Temperatur der Ringer'schen Lösung betrug 32° C. Aus Versehen strömte in die Gefäße des Herzens 2 Min. vor der Aufnahme Sauerstoff, da die Ringer'sche Lösung ausgegangen war.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Auriculum sinistrum	Reihenfolge der Kontraktionen	P.
1	0	20	60	ebenso wie in der ersten Kurve	?
2	0	25	60	dieselbe	?

Tabelle XXXIV.

Versuch vom 23. Juli 1907. Temp. 25° C. Regelmässige langsame Herzschläge.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Auriculum sinistrum	Auriculum sinistrum weiter von der Medianlinie	Reihenfolge der Kontraktionen	P.
1	0	60	80	180		?

Tabelle XXXV.

Versuch vom 27. Juli 1907. Temperatur der Ringer'schen Lösung 33° C. Druck der Lösung 60 mm Hg. Zur Zeit der Aufnahme pulsierten nur die Vorhöfe. Nach der Aufnahme pulsierten sie noch 2 Stunden hindurch. Die Kurve des Auriculum dextrum ist etwas wellenartig, die übrigen sind gut gelungen.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum	Auriculum dextrum	Auriculum sinistrum	Atrium sinistrum	P.
1	0	15	113	83	950
2	0	15	42	21	950
3	0	9	36	21	950
4	0	10	20	0	nicht zustande gekommen
5	0	15	40	5	950
6	0	10	40	30	950
7	0	15	45	30	nicht zustande gekommen

Nummer der Kon- traktion	Dauer der Fortpflanzung der Erregung zwischen				Kontraktions- folge
	Atrium et Auriculum dextrum	Auriculum dextrum et sinistrum	Auriculum dextrum et Atrium sinistrum	Atrium et Auriculum sinistrum	
1	15	98	68	30	
2	15	27	6	21	dieselbe.
3	9	27	12	15	dieselbe.
4	10	10	10	20	
5	15	25	10	35	
6	10	30	20	10	dieselbe.
7	15	30	15	15	dieselbe.

Versuch vom 29. Juli 1907. Während des ganzen Versuches pulsierte das Herz sehr gut.

Es sind zwei Kurven gewonnen, die nicht durch seitliche Schwankungen deformiert sind. Die Stellen, an denen die Serrefines befestigt waren, wurden während der ganzen Zeit nicht geändert. Es handelt sich hierbei um das Atrium dextrum, Auriculum dextrum und um zwei Stellen des Auriculum sinistrum: das eine in der Nähe der Medianlinie des Herzens, das andere 5 mm nach links von dieser Stelle entfernt.

Die direkte Entfernung der Befestigungsstelle der Serrefine im Atrium dextrum von der entsprechenden Stelle am Auriculum dextrum betrug 9 mm, vom Auriculum dextrum bis zur inneren Serrefine des Auriculum sinistrum 25 mm.

Die einzelnen Abzählungen der Differenzen zwischen den Anfangsmomenten der Kontraktionen verschiedener Vorhofsteile variieren um eine bestimmte Grösse. Es wurde daher die arithmetische Mittelzahl aus zehn Bestimmungen genommen, die nach der Gauss'schen Methode der kleinsten Quadrate bearbeitet worden waren. Als wahrscheinliche Schwankung der abgezählten Grösse wurde der wahrscheinliche Fehler der arithmetischen Mittel angenommen.

Es folgen die auf diese Weise erhaltenen Differenzen:

Tabelle XXXVI.

Kurve von 1 Uhr 25 Min. mittags. Temperatur der Ringer'schen Lösung 32° C., Druck 60 mm Hg. 1 Trommel-Millimeter = 8,35 Tausendstel einer Sekunde.)

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum		Auriculum dextrum		Auriculum sinistrum näher zur Medianlinie	
	in Millimetern	in 0,001-Sekunden	in Millimetern	in 0,001-Sekunden	in Millimetern	in 0,001-Sekunden
1	0	0	$3,0 \pm 0$	25 ± 0	$3,5 \pm 0,1$	$29 \pm 0,8$
2	0	0	$3,0 \pm 0,04$	$25 \pm 3,3$	$3,1 \pm 0,08$	$26 \pm 6,7$
3	0	0	$2,9 \pm 0$	33 ± 0	$3,3 \pm 0,08$	$28 \pm 6,7$

Nummer der Kontraktion	Auricul. sinistr. weiter von der Medianlinie		Reihenfolge der Kontraktionen	P.	Geschwindigkeit d. Welle zwischen zwei Punkten des Auriculum sinistrum	Geschwindigkeit d. Welle zwischen Atrium dextrum u. Auriculum dextrum	Geschwindigkeit d. Welle zwischen Auriculum dextrum und sinistrum median
	in Millimetern	in 0,001-Sekunden					
1	$4,1 \pm 0,18$	$34 \pm 0,15$		?	1000 mm pro Sek.	359 mm pro Sek.	6000 mm pro Sek.
2	$4,4 \pm 0,09$	$37 \pm 7,5$	dieselbe.	?	460 mm pro Sek.	359 mm pro Sek.	29760 mm pro Sek.
3	$3,9 \pm 0$	33 ± 0	dieselbe.	?	1000 mm pro Sek.	370 mm pro Sek.	7485 mm pro Sek.

Es ist wohl möglich, dass sich in der zweiten Kontraktion das Auriculum sinistrum mediale und das Auriculum dextrum gleichzeitig kontrahieren, da die festgestellte Differenz die wahrscheinliche Schwankung nicht übersteigt.

Tabelle XXXVII.

Kurve Nr. 2. 1 Uhr 45 Min. Temperatur der Ringer'schen Lösung 32° C., Druck 60 mm Hg. Die Zahlen sind die mittleren aus elf Bestimmungen. Die Entfernung zwischen beiden Stellen des Auriculum sinistrum beträgt 5 mm, zwischen dem Atrium dextrum und dem Auriculum dextrum 9 mm, zwischen dem Auriculum dextrum medianum und dem Auriculum dextrum 25 mm. Die Zahlen sind etwas abgerundet.

Nummer der Kontraktion	Atrium dextrum		Auriculum dextrum		Auriculum sinistrum in der Nahe der Medianlinie	
	in Millimetern	in Tausendsteln einer Sekunde	in Millimetern	in Tausendsteln einer Sekunde	in Millimetern	in Tausendsteln einer Sekunde
1	$0 \pm 0,06$	$0 \pm 0,7$	$-2,2 \pm 0,16$	$-28,0 \pm 0,8$	$-2,1 \pm 0$	-26 ± 0
2	$0 \pm 0,06$	$0 \pm 0,4$	$-3,2 \pm 0,09$	$-14,0 \pm 1,3$	$0,28 \pm 0,2$	$1,2 \pm 0,9$
3	$0 \pm 0,2$	$0 \pm 0,8$	$-2,5 \pm 0,12$	$-10,0 \pm 0,48$	$-1,0 \pm 0,28$	$-4,0 \pm 1,1$
4	$0 \pm 0,4$	$0 \pm 0,5$	$-4,0 \pm 0,08$	$-19,0 \pm 0,3$	$-0,1 \pm 0,2$	$-0,4 \pm 0,8$
5	$0 \pm 0,28$	$0 \pm 1,0$	$-5,5 \pm 0,2$	$-2,2 \pm 0,8$	$-0,1 \pm 0,2$	$-0,4 \pm 0,8$
6	$0 \pm 0,19$	$0 \pm 0,7$	$-3,9 \pm 0,13$	$-16,0 \pm 0,5$	$0,08 \pm 0,19$	$-0,3 \pm 0,8$
7	$0 \pm 0,3$	$0 \pm 1,0$	$-2,4 \pm 0,14$	$-10,0 \pm 0,6$	$1,0 \pm 0,5$	$4,0 \pm 2,0$

Nr. d. Kontrakt.	Auricul. sin. 5 mm weiter von der Medianlinie		Kontraktionsfolge	P.	Geschwindigkeit der Kontraktionswelle zwischen 2 Punkten des Auricul. sinistrum in mm	Geschwindigkeit der Welle zwischen Atrium dextrum und Auriculum sinistrum dextrum in mm	Geschwindigkeit d. Welle zwischen Auriculum dextrum u. Auriculum sinistrum mediale in mm	Wie vielen Tausendsteln einer Sekunde entspricht ein Millimeter der Trommel
	in Millimetern	in Tausendsteln einer Sekunde						
1	$-2,2 \pm 0,06$	$-28 \pm 0,8$		1035	4000	327	952	12,5
2	$0,65 \pm 0,16$	$2,8 \pm 2,2$		1020	3105	647	1665	4,4
3	$-0,74 \pm 0,26$	$-3 \pm 1,0$		1000	5000	900	4155	4,0
4	$-0,6 \pm 0,24$	$-2,5 \pm 0,1$		960	2381	481	1367	4,2
5	$-0,2 \pm 0,3$	$-0,8 \pm 1,2$	dieselbe. ?	990	12500	228	1116	4,0
6	$-0,09 \pm 0,3$	$-0,4 \pm 0,1$	dieselbe. ?	840	7353	573	1561	4,0
7	$0,7 \pm 0,14$	$3 \pm 0,6$		?	3289	875	1694	4,4

In den letzten vier Kontraktionen kontrahieren sich beide Teile des Auriculum sinistrum so schnell hintereinander, dass man an eine gleichzeitige Kontraktion denken kann. Im Allgemeinen

aber sind die Kontraktionszeiten so verschieden, dass man das Resultat unmöglich durch irgendwelche zufällige Momente erklären kann.

Später wurde noch eine Kurve erhalten. Da aber das Herz hierbei schlecht fixiert und der Anfang des Anstiegs der Kurve schwer zu bestimmen war, so musste die Kurve unberücksichtigt bleiben. Danach pulsiert das Herz noch ganz regelmässig.

Versuch vom 30. Juli 1907. Es wurden drei Kurven erhalten. Davon hatte nur die dritte gute horizontale Pausen und wurde daher allein berücksichtigt.

Die erste Kurve wurde um 12 Uhr 20 Min., die zweite um 12 Uhr 40 Min., die dritte um 1 Uhr mittags aufgenommen. Danach pulsierte das Herz — dem Aussehen nach wenigstens — ebenso gut wie während der Aufnahme.

Temperatur der Ringer'schen Lösung 31° C., Druck 60 mm Hg.

Die Serrefines waren folgendermaassen befestigt: die erste am Atrium dextrum, die zweite am Auriculum dextrum, 10 mm weit von der ersten, die dritte am Auriculum sinistrum 27 mm medialwärts von der zweiten, die vierfe ebenfalls am Auriculum sinistrum, 5 mm von der dritten entfernt.

In der folgenden Tabelle der Differenzen der Kontraktionszeiten verschiedener Vorhofsteile sind die mittleren Zahlen aus 20 Messungen angegeben.

Tabelle XXXVIII.

Nr. d. Kontrakt.	Atrium dextrum		Auriculum sinistrum		Auricul. sin. med.		Auricul. sinistr. later.	
	in Millimetern	in Tausendsteln 1 Sek.	in Millimetern	in Tausendsteln 1 Sek.	in Millimetern	in Tausendsteln 1 Sek.	in Millimetern	in Tausendsteln 1 Sek.
1	$0 \pm 0,17$	$0 \pm 0,3$	$0,05 \pm 0,09$	$0,2 \pm 0,4$	$8,5 \pm 0,09$	$34 \pm 0,4$	$9,9 \pm 0,1$	$40 \pm 0,4$
2	$0 \pm 0,12$	$0 \pm 0,48$	$-0,7 \pm 0,13$	$-2,8 \pm 0,52$	$7,9 \pm 0,1$	$32 \pm 0,4$	$10,6 \pm 0,1$	$42 \pm 0,4$
3	$0 \pm 0,14$	$0 \pm 0,62$	$-1,2 \pm 0,14$	$-5,2 \pm 0,62$	$6,1 \pm 0,13$	$27 \pm 0,58$	$7,5 \pm 0,16$	$33 \pm 0,71$
4	0 ± 0	0 ± 0	$-0,4 \pm 0,09$	$-1,5 \pm 0,4$	$6,7 \pm 0,13$	$29 \pm 0,57$	$7,7 \pm 0,12$	$33 \pm 0,5$
5	$0 \pm 0,05$	$0 \pm 0,2$	$-1,3 \pm 0,07$	$-5,7 \pm 0,3$	$5,4 \pm 0,07$	$24 \pm 0,3$	$6,4 \pm 0,10$	$28 \pm 0,4$
6	$0 \pm 0,1$	$0 \pm 0,4$	$-0,5 \pm 0,13$	$-2,0 \pm 0,5$	$7,5 \pm 0,06$	$29 \pm 0,2$	$9,4 \pm 0,14$	$34 \pm 0,6$
7	$0 \pm 0,06$	$0 \pm 0,2$	$-0,2 \pm 0,04$	$-0,9 \pm 0,2$	$6,8 \pm 0,06$	$29 \pm 0,3$	$7,8 \pm 0,1$	$34 \pm 0,4$

Nr. d. Kontrakt.	Kontraktions- folge	P.	Geschwindig- keit d. Welle zwischen Atrium sin. med. und later. mm	Geschwindig- keit d. Welle zwischen Atr. dextr. u. Auric. dextr. mm	Geschwindig- keit d. Welle zwischen Auric. dextr. u. Auric. sin. med. mm	Wie vielen Tausendsteln einer Sekunde entspricht 1 Millimeter der Trommel
1		920	667	50 000 (mögl. Minimum 11 000)	794	4
2		?	349	3 424	757	4,2
3	dieselbe	855	642	1 919	834	4,5
4	"	870	935	6 578	878	4,5
5	"	865	957	1 766	949	4,4
6	"	865	524	5 076	803	4,2
7	"	865	915	110 000	892	4,4

Anmerkung: In der ersten Kontraktion ist die Differenz zwischen den Kontraktionszeiten des Atrium dextrum und des Auriculum dextrum so gering, dass man Gleichzeitigkeit annehmen kann.

Versuch vom 2. August 1907. Das Herz pulsierte gut. Es wurden drei Kurven aufgenommen, von denen nur die dritte gelungen ist. Zur Registrierung wurden ein Abschnitt des rechten Vorhofs (wie stets, hinten) und drei Punkte des rechten Herzhohrs gewählt. Da aber die Registrierung des Atrium dextrum misslungen ist, so kommen nur die Punkte des Herzhohrs in Betracht, die als Auriculum 2, Auriculum 3 und Auriculum 4 bezeichnet sind (s. Fig. 15). Die Temperatur der Ringer'schen Lösung betrug 33° C., der Druck 60 mm Hg. Die direkte Entfernung zwischen Auriculum 2 und Auriculum 3 = 7 mm, zwischen Auriculum 3 und Auriculum 4 = 15 mm, zwischen Auriculum 2 und Auriculum 4 = 11 mm. (Zahlen-Mittel aus 20 Messungen.)

Tabelle XXXIX.

Nummer der Kontraktion	Auriculum 3		Auriculum 2		Auriculum 4	
	In Milli- metern	In Tausend- steln 1 Sek.	In Millimetern	In Tausendsteln 1 Sekunde	In Millimetern	In Tausendsteln 1 Sekunde
1	0 ± 0,14	0 ± 0,6	3,1 ± 0,17	13 ± 0,7	0,7 ± 0,12	3,1 ± 0,5
2	0 ± 0,18	0 ± 0,8	1,7 ± 0,13	7,4 ± 0,6	1,7 ± 0,12	7,4 ± 0,5
3	0 ± 0,10	0 ± 0,4	1,0 ± 0,14	4,2 ± 0,6	2 ± 0,16	8,4 ± 0,7
4	0 ± 0,10	0 ± 0,4	1,5 ± 0,13	6,5 ± 0,6	0,7 ± 0,19	3,1 ± 0,8
5	0 ± 0,12	0 ± 0,5	2,5 ± 0,27	11,0 ± 1,2	0,3 ± 0,17	1,3 ± 0,7
6	0 ± 0,13	0 ± 0,5	1,1 ± 0	4,8 ± 0	0,5 ± 0,12	2,2 ± 0,5
7	0 ± 0,13	0 ± 0,5	1,5 ± 0,15	6,5 ± 0,7	0,5 ± 0,12	2,2 ± 0,5

Nr. d. Kontrakt.	Kontraktions- folge	P.	Geschwindig- keit d. Welle zwischen Auricul. 2 u. Auricul. 3 in mm	Geschwindig- keit d. Welle zwischen Auricul. 2 und 4 in mm	Geschwindig- keit d. Welle zwischen Auricul. 3 und 4 in mm	Wie vielen Tausendsteln einer Sekunde entspricht 1 Millimeter der Trommel
1	3, 4, 2	1020	519	1054	4922	4,4
2	3 (2, 4)	1020	946	∞	2027	4,4
3	3, 2, 4	1020	1678	2638	1796	4,2
4	3, 4, 2	1020	1072	3161	4918	4,4
5	3, 4, 2	1020	643	1149	11451	4,4
6	dieselbe	?	1461	4214	6881	4,4
7	3, 2, 4	?	1072	2523	6912	4,4

In der zweiten Kontraktion ziehen sich Auriculum 2 und 4 gleichzeitig zusammen.

Die Betrachtung der Resultate des photographischen Verfahrens ergibt, dass wir auch hier trotz einer Reihe Verbesserungen in der Methodik, trotz der Präzision in der Berechnung der Kurven, dieselben Resultate wie bei der Registrierung auf berusster Oberfläche erhalten. Man muss daher annehmen, dass alle unsere Resultate eigentlich ein gleichartiges Material bilden, und dass sie nicht durch irgendwelche Zufälligkeiten der Versuche hervorgerufen, sondern durch die Eigentümlichkeiten der Herzkontraktion selbst bedingt sind.

VI.

An unsere Resultate lassen sich folgende Bemerkungen knüpfen:

I. L. Fredericq und seine Schüler hatten wohl Grund, das Vorhandensein einer Kontraktionswelle im Herzen mit der Richtung vom rechten Vorhof zum linken anzunehmen.

Betrachten wir zunächst unsere Versuche, in denen verschiedene Teile des Vorhofs registriert wurden, so haben wir 158 mal das Atrium dextrum nebst dem Auriculum dextrum registriert. Darunter waren 124 Fälle, in denen sich das Atrium zuerst kontrahierte, in zwei Fällen konnte man eine gleichzeitige Kontraktion annehmen, und nur in 22 Fällen erfolgte zuerst die Kontraktion des Auriculum dextrum.

35 mal wurden das Auriculum dextrum und sinistrum gleichzeitig registriert. Darunter waren 27 Fälle, in denen sich das Auriculum dextrum zuerst, ein Fall, in

dem es sich gleichzeitig mit dem Auriculum sinistrum, und sieben Fälle, in denen es sich später als das Auriculum sinistrum kontrahierte.

Das Atrium sinistrum nebst dem Auriculum sinistrum wurden 32 mal registriert. In zehn Fällen kontrahierte sich das Auriculum sinistrum zuerst, in drei Fällen kontrahierten sich beide Teile gleichzeitig und in 20 Fällen erfolgte die Kontraktion des Auriculum zuletzt.

108 mal wurden das Atrium dextrum und das Atrium sinistrum zusammen registriert. Darunter erfolgte zuerst in 80 Fällen die Kontraktion des Atrium dextrum, in 24 Fällen die Kontraktion des Atrium sinistrum, in vier Fällen kontrahierten sich beide Teile gleichzeitig.

Die hinteren Teile des Atrium dextrum kontrahieren sich demnach früher als das Auriculum dextrum.

Der Zeitabschnitt zwischen den Kontraktionen einzelner Vorhofsteile ist keineswegs konstant. Er kann von 0,05—0,04 Sek. (vgl. die Versuche vom 23. Juli 1907 und vom 19. Juli 1907) bis auf wenige Tausendstel einer Sekunde oder sogar auf Null sinken. Die betreffende Zeitdifferenz kann auch einen negativen Charakter annehmen, d. h. die Richtung der hypothetischen Welle kann sich ändern. Solche Fälle kann man in vielen der hier geschilderten Versuche beobachten. Sonderbarerweise erhält man die beste „Welle“ (der Richtung: Atrium dextrum, Auriculum dextrum, Auriculum sinistrum, Atrium sinistrum oder Atrium sinistrum, Auriculum sinistrum) bei Vorhöfen, die sich eigentlich unter pathologischen Bedingungen kontrahieren, so z. B. wenn die Ventrikel nicht pulsieren oder wenn die Temperatur so niedrig ist, dass bald eine vollständige Dissoziation der Herzstätigkeit eintreten muss (z. B. die zweite Kurve des Versuches vom 19. Juli 1907, der Versuch vom 23. Juli 1907 und der Versuch vom 27. Juli 1907).

Am wenigsten geeignet, die Frédéricq'schen oder analoge Anschauungen zu stützen, sind jedoch oft gerade solche Fälle, in denen sich das Herz unter Bedingungen befindet, die denen der normalen Pulsation sehr nahe sind (Versuch vom 21. Juni, vom 17. Juni, vom 12. Juni usw.). Gerade hier zeigen auch die am weitesten voneinander entfernten Teile oft die Neigung, gleichzeitig zu pulsieren. Unsere Versuche geben uns dennoch einen Anhalt

dafür, dass — wie das auch von Engelmann¹⁾ angenommen wird — sich alle Vorhofsteile unter normalen Bedingungen gleichzeitig kontrahieren.

Wir haben aber keinen Grund, diese mit den Frédéricq'schen Anschauungen nicht im Einklang stehenden Fälle unberücksichtigt zu lassen, denn diese Fälle hätten nicht vorkommen können, wäre die Frédéricq'sche Theorie richtig. In der Tat müsste man dann von seinem Standpunkte aus annehmen, dass der leitende Apparat imstande ist, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Welle innerhalb einiger Sekunden äusserst schnell und unerwartet zu ändern. In dieser Beziehung ist die Rubrik „Geschwindigkeit der Welle“ (zwischen dem Atrium dextrum und dem Auriculum dextrum) des Versuchs vom 30. Juli besonders lehrreich, da hier diese Ungleichmässigkeit während der 7 Sekunden des Versuchs durch Zahlen illustriert wird.

Wir werden daher zu der Schlussfolgerung gedrängt, dass die Verschiedenheit im Beginn der Kontraktion nicht der Ausdruck einer Kontraktionswelle ist, sondern nur mit der Reihenfolge der Kontraktionen verschiedener Vorhofsteile zusammenhängt.

Die Frédéricq'schen Anschauungen können demnach bei genauerer Betrachtung nicht als begründet angesehen werden.

II. Die tatsächlichen Angaben von Rehfisch²⁾ entsprechen der Wirklichkeit, doch können wir seine Annahme, dass sich am suspendierten Herzen ein dem Sinus venosus entsprechender Teil feststellen lässt, nicht bestätigen. Wohl ist der Beginn der Kontraktion in verschiedenen Vorhofsteilen verschieden, die Erklärung dafür muss aber anderswo gesucht werden.

Bei der Erklärung dieser Differenz könnten wir mit drei Möglichkeiten rechnen:

a) Jeder Teil des Herzmuskels besitzt infolge seiner physiologischen Eigentümlichkeiten die Fähigkeit, in einem bestimmten Rhythmus zu pulsieren, so dass die Koordination verschiedener Vor-

1) Engelmann, Über den Ursprung der Herzbewegungen und die physiologischen Eigenschaften der grossen Herzvenen des Frosches. Pflüger's Arch. Bd. 65 S. 109.

2) l. c. Engelmann's Arch. 1906 S. 152.

hofsteile eben durch diese physiologischen (vielleicht chemischen) Eigentümlichkeiten des Muskels bedingt sind.

Durch Engelmänn's Forschungen und besonders scharf durch die Arbeiten von Langendorff¹⁾ und C. Lehmann ist jedoch einerseits das Vorhandensein eines eigenartigen zentralen Punktes der Herztätigkeit an der Mündungsstelle der grossen Venen bewiesen, andererseits aber festgestellt, dass nicht alle Teile des Herzmuskels die Fähigkeit der Automatie in gleicher Weise besitzen. Die Möglichkeit a) fällt daher fort²⁾.

b) Man könnte sich zweitens vorstellen, dass neben dem kontraktilen Muskelsystem ein besonderes leitendes System besteht. Man kann diese Möglichkeit schematisch folgendermaassen darstellen:

Schema b. Fig. 5. C = hypothetischer Ausgangspunkt der Herztätigkeit, m, n usw. = Nerven, die von diesem Punkt zu verschiedenen Vorhofsteilen gehen und die sich bei A, B usw. verästeln.

Schema c. Fig. 6. C = Ausgangspunkt der Herztätigkeit, A, B, D, E, F = lokale Ganglienzentren in verschiedenen Teilen des Herzmuskels.

Dieses Schema (b) gibt uns schon eher die Möglichkeit, die Resultate unserer Versuche befriedigend zu erklären. Jedoch lässt das

1) Der Versuch von Stannius an Warmblüterherzen. Pflüger's Arch. Bd. 112 S. 352. — Derselbe, Über einige an den Herzhöhlen angestellte Beobachtungen. Pflüger's Arch. Bd. 112 S. 522.

2) In persönlichen Unterhaltungen mit Langendorff brachte ich diese theoretischen Anschauungen zur Sprache und fand in vielen Beziehungen seine Zustimmung. Möglicherweise sind sie durch die Unterhaltungen in seinem Institut angeregt. Als das Tatsachenmaterial dieser Arbeit besprochen wurde, wurden auch diese theoretischen Ausführungen berührt; jedoch beabsichtigte Langendorff nicht, sie hier einzufügen. Vielleicht wollte er sie bei späterer Gelegenheit (Budapest 1909?) zur Sprache bringen? Sein vorzeitiger Tod veranlasst mich, diesen Teil der Arbeit in der ursprünglichen Gestalt wiederzugeben.

Vorhandensein der Automatie in so vielen Herzteilen darauf schliessen, dass dieses hypothetische Zentrum kein so abgesondertes, sondern ein mehr diffuses sein muss. Wir kommen damit zur dritten Möglichkeit:

c) Wollen wir die Resultate, die wir bei der Messung der Geschwindigkeit der „Kontraktionswelle“ unter diesen Bedingungen gewonnen haben, bewerten, so müssen wir den Einfluss der verschiedenen Lage berücksichtigen, die die Schreibhebel resp. die Serrefines gegenüber dem Innervationszentrum, den Erregungsfortpflanzungsbahnen und den Fasern des myogenen kontraktile Apparat selbst einnehmen.

Nehmen wir in der Tat an, C sei das supponierte Zentrum der Herztätigkeit, von dem die Nerven AC und BC abgehen (Fig. 7). Nehmen wir ferner an, dass unsere Serrefines in A und in B befestigt und dass die Geschwindigkeit der „Erregungswelle“ zwischen A und B zu messen ist. In diesem Falle sind folgende Kombinationen möglich:

Fig. 7.

1. Die Punkte sind so gewählt, dass die Richtung des leitenden und des kontraktile Substrats zusammenfallen, so dass AB dasselbe was AC oder BC bedeutet. In diesem Falle bestimmen wir eigentlich die wirkliche Geschwindigkeit der Kontraktionswelle resp. der Erregungsfortpflanzung. Beträgt z. B. die Entfernung $AB (= AC)$ 30 mm und die Zeit, während der diese Entfernung von der Welle zurückgelegt wird, 30 Tausendstel einer Sekunde, so wird die Geschwindigkeit der Leitungswelle $30 \text{ mm} : 0,030 \text{ Sek.} = 1000 \text{ mm pro Sekunde}$ betragen.

2. Nehmen wir jetzt einen weiteren Fall an: AB fällt nicht mit AC oder BC zusammen, und wir haben also die scheinbare Kontraktionswelle, tatsächlich aber die Kontraktionsfolge zu bestimmen. Das Resultat der Messung wird natürlich verschieden sein, je nach dem Verhältnisse der Bahnen AC und BC . Ist $AC = BC$, so kontrahieren sich A und B gleichzeitig und die Geschwindigkeit der (natürlich scheinbaren) „Welle“ zwischen A und B ist unendlich gross.

3. AC ist grösser als BC . Der Punkt B zieht sich dann früher als der Punkt A zusammen, die Welle ist eine scheinbare, ihre Geschwindigkeit aber ist kleiner als unendlich gross.

4. Ist BC grösser als AC , so ist die Geschwindigkeit ebenso gross wie im vorigen Falle, nur ist das Zeichen ein umgekehrtes.

5. Je weiter der Punkt C von den Punkten A und B entfernt ist, desto wahrscheinlicher ist die relative Beständigkeit der Resultate, die man bei der Messung der Geschwindigkeit von AB nach Bewegungen der Punkte A und B erhalten wird.

6. Aus den verschiedenen Einstellungen ergibt diejenige die minimale Geschwindigkeit, bei der die Richtung des innervierenden Mechanismus mit der des kontrahierenden zusammenfallen. Diese Geschwindigkeit wird daher der gesuchten am nächsten kommen.

Betrachten wir die Resultate der Versuche, in denen die Geschwindigkeit der supponierten Kontraktionswelle bestimmt wurde, nach diesem Gesichtspunkte, so finden wir, dass die eben angeführten Erwägungen keinen Schluss über die Lage des supponierten allgemeinen Zentrums zulassen, falls wir von einer Konstruktion des motorischen Apparats des Herzens nach dem Schema b ausgehen. Das Schema c muss daher als das wahrscheinlichere gelten. Für dieses Schema spricht auch der Umstand, dass die Geschwindigkeiten der Welle nicht nur an den einzelnen Punktpaaren, an denen sie gemessen wurden, sondern auch für dieselbe Kurve (während der Sieben- bis Zehnsekundendauer der Aufnahme) in weiten Grenzen geschwankt haben. Besonderes Interesse bieten in dieser Beziehung die Versuche vom 29. Juli, 30. Juli, 2. August und 27. Juli. (In letzterem Versuch wurden nicht die Geschwindigkeiten, sondern nur die Zeitabstände zwischen den Kontraktionen verschiedener Herzteile gemessen.)

Ein solches Resultat wäre schwer verständlich, wenn wir nicht annehmen wollten, dass an den von uns erörterten Vorgängen Apparate mitwirken, welche den gewöhnlichen Vorstellungen über die Tätigkeit der Ganglienzellen entsprechen. Denn können auch die Messungen der Entfernungen an den Vorhöfen keinen Anspruch auf Genauigkeit machen, so müsste doch der Fehler konstant sein und nicht Schwankungen der Geschwindigkeit von einer Kontraktion zur anderen hervorrufen. Eigenartig ist auch die von uns erhaltene Geschwindigkeit der Fortpflanzung der Erregungswelle. Nehmen wir nach den obigen Auseinandersetzungen die kleinsten der erhaltenen Zahlen, so beträgt diese Geschwindigkeit gegen 300 mm pro Sekunde;

sie wäre demnach geringer als die Geschwindigkeit der Nerven- und Muskelleitung.

III. Über das System, dessen physiologische Wirkungen man am besten — unseren gewöhnlichen Vorstellungen gemäss — als gangliennervös bezeichnen kann, sind zwei Ansichten möglich: man kann es 1. aus Nerven und Ganglienzellen oder 2. aus Muskeln bestehend betrachten.

Nehmen wir die zweite (die Engelm ann'sche) Hypothese an, so vereinfachen wir eigentlich nicht die Frage, sondern komplizieren sie im Gegenteil übermässig, da wir damit dem Muskel eine ungewöhnlich komplizierte physiologische Funktion zuschreiben. Und doch ist der morphologische Nerven- und Ganglienapparat im Herzen vorhanden, und nur die Theorie will uns veranlassen, ihn zu ignorieren¹⁾. Ziehen wir die angeführten Versuche in Betracht, so finden wir auch kaum einen Grund für die Annahme der Engelm ann'schen Hypothese.

IV. Der Versuch, die Regulierung der Herztätigkeit auf den Ganglienapparat zurückzuführen, fand bekanntlich in der letzten Zeit einen Verteidiger in der Person H. E. Hering's. Er rechnet mit der Möglichkeit der Desorganisierung der Pulsation einzelner Herzteile und mit der eventuellen Änderung der normalen Pulsationsfolge und unterscheidet „nomotrope“ und „heterotrope“ Kontraktionen. Unter ersteren versteht er solche Pulsationen, deren Ausgangspunkt im Gebiete des Sinus oder in dessen Nachbarschaft liegt, unter letzteren versteht er Pulsationen mit dem Ausgangspunkt in irgendeinem beliebigen Teil des Herzmuskels, in dem Ganglienzellen vorhanden sind²⁾.

In unserem Falle hatten wir es kaum mit solchen nomotropen und heterotropen Wirkungen zu tun, denn sollen auch die Ganglien-

1) In dieser Beziehung bietet die von Waledinsky unter der Leitung von Prof. Smirnow ausgeführte Arbeit „Über das Vorhandensein und die Lokalisation von Nervenganglien in den Ventrikeln der Säugetierherzen“ (Tomsk 1908) grosses Interesse (russisch). Zur Darstellung der Ganglienzellen bediente er sich eines einfachen und bequemen Verfahrens, der Bearbeitung des Herzens mittels einer 7%igen Karbolsäure. Er fand an der ganzen Oberfläche des Herzens eine so bedeutende Menge von Ganglienzellen, dass er von einem diffusen „plexus gangliosis ventriculorum cordis superficialis“ spricht. Ich habe auch in den kleinen Gefässen des Frosches sehr eigentümliche echte Ganglienzellen gefunden. (Intern. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol. Bd. 23 S. 1.)

2) Hering, Über Automatie der Säugetierherzen. Pflüger's Arch. Bd. 116 S. 143.

zellen wirklich am Prozess beteiligt sein, so gibt uns doch die frühere Kontraktion des von einer solchen Zelle innervierten Gebietes kaum das Recht, dieses Gebiet als Ausgangspunkt der Kontraktionen zu betrachten. Besteht doch das Charakteristische der Ausgangs- und Nichtausgangspunkte in ihrem Verhalten zur Extrasystole. Dieses Verhalten ist aber in diesem Zusammenhang noch nicht erforscht, und was man bis jetzt darüber weiss, spricht sogar entschieden gegen diesbezügliche Anschauungen von H. E. Hering.

V. Ähnliche Resultate wie wir erzielte Schlüter¹⁾ in demselben Laboratorium von Prof. Langendorff am Ventrikel. Er legte die N. ischiadici zweier neuromuskulärer Präparate eines Frosches auf verschiedene Abschnitte eines Katzenherzens, das ebenso wie in unseren Versuchen pulsierte, und bestimmte an den Myogrammen des Musc. gastrocnemius, welcher Muskel — und demnach auch welcher Teil des Herzens — sich früher kontrahierte. Die Resultate waren ungleich, d. h. bald pulsierte der eine, bald der andere Teil zuerst. Es wurde dasselbe gefunden, was wir für den Vorhof festgestellt haben. Bei Schlüter ist auch die hierher gehörende Literatur angegeben.

Ähnliche Beobachtungen machte Saltzmann im Jahre 1907 (Skand. Arch. f. Physiologie S. 233). Er suchte festzustellen, ob sich die Musc. papillares früher als das übrige Myocardium zusammenziehen, und fand eigentlich, dass bald diese Muskeln, bald das Myocardium früher zur Kontraktion gelangen.

Unseren Feststellungen sind auch die Resultate analog, die W. Lombard²⁾ bei Registrierung der Kontraktionsfolge verschiedener Froschmuskeln bei komplizierten reflektorischen Bewegungen erhielt (zum Teil nach Vergiftung des Tieres mit Strychnin und Atmung).

In diesem Falle, in dem am Prozess zweifellos Ganglienzellen oder ähnliche Apparate beteiligt waren, stellte es sich heraus, dass man von keiner bestimmten Kontraktionsfolge sprechen kann, und dass hierbei alle möglichen Kombinationen vorkommen.

VII. Schlussfolgerungen.

1. Die Kontraktionen der verschiedenen Abteilungen des suspendierten Herzens treten am häufigsten in

1) Schlüter, Die Reizleitung im Säugetierherzen, Pflüger's Arch. Bd. 89 S. 87. Vgl. auch Nagel, Handb. d. Physiol. d. Menschen Bd. I, 1. Hälfte.

2) Du Bois-Raymond's Arch. 1885 S. 405. Die Aufeinanderfolge reflektorisch kontrahierter Muskeln.

dieser Reihenfolge ein: rechter Vorhof (hinterer Teil), rechtes Herzohr und ferner linkes Herzohr, linker Vorhof (hinterer Teil) oder linker Vorhof — linkes Herzohr.

2. Immerhin kann von einer streng bestimmten Folge der Kontraktionen keine Rede sein. Verschiedene Vorhofsteile können sich gleichzeitig oder in beliebiger Reihenfolge hintereinander zusammenziehen.

3. Bei der Bestimmung der supponierten Geschwindigkeit der Kontraktionswelle erhält man in ein und demselben Versuch verschiedene Resultate, die zwischen ca. 350 mm und ∞ schwanken (vgl. Tab. XXXVII, XXXVIII, XXXIX).

4. Wir können demnach in den Erscheinungen, mit denen sich L. Frédéricq beschäftigt hat, keine Kontraktionswelle sehen. Es handelt sich hier vielmehr um die eine oder andere Reihenfolge der Kontraktionen verschiedener Vorhofsteile.

5. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich — wie das Engelmann annimmt — unter normalen Herzkontraktionen alle Vorhofsteile gleichzeitig kontrahieren.

6. Alle beschriebenen Eigentümlichkeiten der Vorhofspulsationen sind am einfachsten zu erklären, wenn wir annehmen, dass in den verschiedenen Teilen der Vorhöfe Ganglienzellen vorhanden sind, die durch ihre Tätigkeit die Pulsation der ihnen untergeordneten Herzmuskelabschnitte unmittelbar bestimmen.

Zum Schluss muss ich in Dankbarkeit des so vorzeitig verstorbenen Professors O. Langendorff gedenken, der mir dieses Thema vorgeschlagen hat und mir seine freundliche und wertvolle Unterstützung während meiner Arbeit zuteil werden liess. Seinen Assistenten, Herrn Privatdozenten Dr. J. Müller und Herrn Privatdozenten Dr. H. Winterstein, danke ich herzlich für die freundliche Mitwirkung bei der Ausführung meiner Versuche.

Beschreibung der abgebildeten Kurven.

Diese Kurven sollen nur die Verschiedenheit der Kontraktionsfolgen illustrieren. Feinere Beziehungen sind nur bei genaueren Messungen zu sehen! Die Zeit ist überall durch Schwingungen einer Stimmgabel mit 100 Schwingungen

in der Sekunde bezeichnet. Die Figuren 1 und 2 sind auf berusstem Papier, die übrigen durch Photographie gewonnen. Alle sind ca. um $\frac{2}{3}$ verkleinert.

Fig. 8. Versuch vom 18. Juni 1907. Zweite Kontraktion (s. Tabelle XX). Von oben nach unten gezählt, sind die Hebel befestigt: am rechten Vorhof (hinteren Teil), am rechten Herzohr und am linken Herzohr. Die gegenseitige Stellung der Hebel in einer vertikalen Linie ist an der ruhenden Trommel durch Kontraktionen des Vorhofs ausgedrückt. Die Temperatur der Ringer'schen Lösung betrug 35° C. Kontraktionsfolge:

Fig. 9. Versuch vom 21. Juni 1907. Tabelle XXIV. Dritte Kontraktion. Temp. 30° C. Kontraktionsfolge:

Das Niveau der Hebel ist in derselben Weise wie in der Fig. 1 zu erkennen. Aus den Kurven kann man auch ohne Messungen ersehen, dass der Zeitabstand zwischen den Kontraktionen des *l. O.* und des *r. O.* kleiner ist als der zwischen *r. V.* und *r. O.*, obschon die Entfernung *l. O.* bis *r. O.* grösser ist als *r. V.* bis *r. O.* Der rechte Vorhof ist mit „S“ bezeichnet.

Fig. 10. Versuch vom 27. Juli 1907. Tabelle XXXV. Sechste Kontraktion. Temp. 35° C. Kontraktionsfolge:

Fig. 11. Versuch vom 29. Juli 1907. Tabelle XXXVI. Erste Kontraktion. Temp. 32° C. Druck 60 mm Hg. Kontraktionsfolge:

Fig. 12, 13 und 14 stellen die zweite, dritte und vierte Kontraktion der XXXVII. Tabelle dar. (Versuch vom 29. Juli 1907.) Sie sollen zeigen, dass die

Kontraktionsfolge auch innerhalb einiger Sekunden desselben Versuchs wechselt. Die Resultate genauer Messungen sind in der Tabelle XXXVII angegeben. Nach diesen ist die Kontraktionsfolge der zweiten Kontraktion (Fig. 12):

Die Kontraktionsfolge der Fig. 13 ist:

Die Kontraktionsfolge der Fig. 14 ist:

Fig. 15. Erste Kontraktion der Tabelle XXXIX. (Versuch vom 2. August 1907.) Die Seereffines waren am rechten Herzhorn befestigt, wie das auch an der Fig. 17 zu sehen ist. Die Figur stellt ein Schema des Herzens (von hinten) dar, an dem die Punkte mit den daneben stehenden Zahlen die Befestigungsstellen der Seereffines zeigen.

Die Kontraktionsfolge ist hier: 3, 4, 2.

Fig. 16. Die zweite Kontraktion desselben Versuchs. Kontraktionsfolge: 3 (2, 4), d. h. zuerst tritt die Kontraktion im Punkt 3 und dann gleichzeitig in den Punkten 2 und 4 ein.

Fig. 17.

Fig. 9.

Fig. 13. Versuch v. 29. Juli 1907.
Dritte Zuckung.

Fig. 14. Versuch v. 29. Juli 1907.
Vierte Zuckung.

August 1907.
1. Zuckung.

Fig. 16. Versuch v. 2. August 1907.
Zweite Zuckung.