A tale scopo contribuiscono la semplicità della descrizione e i numerosi esempi illustrati che formano del libro un'edizione elegante

RIVISTA

Comptes Rendus. T. CXXXV, Dicembre 1902.

BARILLET L. e BROCHET A. *Sugli elettrodi bipolari ad anodo solubile* (pp. 1049-1051). — Dopo avere esaminato in una Nota precedente il comportamento di un elettrodo bipolare ad anodo insolubile piazzato in un elettrolizzatore a solfato di rame, gli A. studiano in questa Nota l'azione di un elettrodo bipolare in rame piazzato nello stesso apparecchio.

Le conclusioni generali a cui giungono dalle loro ricerche sugli elettrodi bipolari sono le seguenti:

1° Gli elettrodi bipolari ad anodo solubile, all'infuori della questione d'intensità, deformano il flusso di corrente nella stessa guisa di quelli ad anodo insolubile, in virtù di fenomeni importanti di polarizzazione.

2° La buona utilizzazione degli elettrodi bipolari esige che gli spazi riservati alla circolazione del liquido siano per quanto è possibile stretti per evitare le perdite per derivazione, considerevoli anche cogli anodi solubili.

3° Se l'apparecchio necessita un'agitazione energica che non si può ottenere se non facendo circolare l'elettrolito trasversalmente in tutti i compartimenti insieme, gli elettrodi devono essere incassati in cornici di grandi dimensioni.

4° In un elettrolizzatore si potranno impiegare pezzi metallici non comunicanti cogli elettrodi, non soltanto se il metallo funziona come anodo insolubile, ma anche se funziona come anodo solubile.

NEGREANO D. *Processo di separazione elettrica della parte metallica di un minerale dalla sua ganga* (p. 1103). — Il processo indicato dall'A. si basa sul ben noto fenomeno per cui proiettando un miscuglio di zolfo e minio su due corpi elettrizzati di nome contrario, si ha la separazione dei due componenti il miscuglio.

Con un metodo perfettamente analogo l'A., riducendo in fine polvere un minerale silicico con impregnazioni di malachite e di

ossidi di ferro e di rame, ha ottenuto la separazione della parte metallica dalla ganga silicica.

Simili risultati ha ottenuti operando su una roccia quarzosa contenente della limonite e su un minerale di lignite con ricche impregnazioni di pirite.

L'A. pensa che forse questo processo potrebbe essere applicato alla estrazione dell'oro dalla sua ganga.

BLONDLOT R. *Sulla velocità colla quale le diverse varietà di raggi X si propagano nell'aria e nei diversi mezzi* (pp. 1293-1295). — Si sa che i raggi X sono più o meno penetranti, a seconda del grado del vuoto del tubo da cui sono emessi. L'A. ha ricercato se queste diverse varietà dei raggi X si propagarono nell'aria colla stessa velocità, e se questa velocità è indipendente dal mezzo in cui si propagano.

La conclusione definitiva a cui l'A. è portato dalle sue esperienze si è che la velocità di propagazione delle diverse varietà di raggi X, nei diversi mezzi, è uguale a quella della luce nell'aria.

PELLAT H. *Studio della magnetofrizione del fascio anodico* (pp. 1321-1324). — In precedenti Note l'A. ha segnalato una serie di fenomeni che si producono quando si fa agire un campo magnetico intenso sul flusso catodico o anodico dei tubi a gas rarefatti e che non possono spiegarsi colle leggi dell'elettromagnetismo. Essi si spiegano invece perfettamente con un fregamento anisotropo che subirebbero le particelle in movimento, grandissimo nel senso perpendicolare alle linee di forza del campo magnetico e molto più debole o nullo nel senso delle linee stesse. L'A. per ricordare questa proprietà, propone di dare a questi fenomeni il nome generale di *magnetofrizione* del fascio catodico o anodico.

In questa Nota, l'A. riassume lo studio da lui fatto del modo secondo cui varia la magnetofrizione di un fascio anodico secondo la pressione e la natura del gas.

I gas studiati erano contenuti in un tubo cilindrico lungo circa un metro e di 17 mm. di diametro la cui parte centrale era piazzata tra le espansioni polari piane di una forte elettrocalamita Weiss distanti di m. 0,02, e che dava un campo press'a poco uniforme su una lunghezza di m. 0,07; i fori praticati nell'asse delle espansioni polari permettevano di esaminare il tubo di lato. In questa guisa il fascio anodico tagliava ad angolo retto le linee di forza del campo magnetico. I gas studiati dall'A. sono stati l'idrogeno, l'ossigeno, un miscuglio di ossigeno e idrogeno e infine l'aria secca.

I fenomeni osservati dall'A. con qualunque gas sono i seguenti:

Quando l'intensità del campo aumenta progressivamente a partire da zero, il fascio anodico si restringe sempre più lungo la parete del vetro, e forma avanti o dietro, a seconda del senso del campo o della scarica, un filetto tanto più minuto quanto più il campo è intenso. A partire da una certa intensità del campo, il fascio anodico si diffonde attorno al filetto, fino a che la diffusione aumentando sempre più, nei campi molto intensi, il filetto stesso sparisce e l'effetto delle forze elettromagnetiche non si manifesta più che per una intensità luminosa un po' più grande sul bordo dove era il filetto, quando si riguarda il tubo di lato. La parte diffusa non presenta mai stratificazioni, e il filetto non può presentarsene se non quando è larghissimo, in campi quindi pochissimo intensi.

I valori del campo che danno luogo a uno degli aspetti descritti sono diversissimi a seconda della pressione e del gas. A misura che la pressione diminuisce, diminuisce pure l'intensità del campo a partire dalla quale comincia ad apparire la diffusione, ma vi è sempre una grandissima differenza tra i valori corrispondenti a una stessa pressione per l'idrogeno e per l'ossigeno, il quale subisce molto più difficilmente dell'idrogeno gli effetti della magnetofrizione.

L'A. ha ricercato pure se nel caso di un miscuglio, gli effetti sui due gas si manifestavano separatamente, e, operando su un miscuglio di idrogeno e ossigeno, ha trovato che dal punto di vista della magnetofrizione il miscuglio si comportava come un gas unico, che godesse delle proprietà intermedie tra quelle godute dai componenti.

L'A. si riserva di pubblicare in una Nota successiva le conclusioni che crede potere trarre da queste esperienze.

BLOCH E. *Sulla emanazione del fosforo* (pp. 1324-1326). — È noto che l'aria che si trova in vicinanza di un bastone di fosforo diventa conduttrice della elettricità. Barus stabilisce che l'*emanazione* del fosforo non solo è conduttrice, ma possiede la proprietà di condensare il vapore d'acqua anche non saturo: le sue esperienze d'altra parte sembrano provare l'indipendenza dei due fenomeni; di più esse non rispondono a tutte le quistioni relative alla natura della conduttibilità. C. Schmidt nega che si sia in presenza di una propria ionizzazione e attribuisce la conduttibilità alla convezione dell'elettricità per mezzo dei prodotti di ossidazione del fosforo che formerebbero le nubi osservate. Harms

combatte questa opinione con alcune esperienze quasi puramente qualitative.

Di fronte a queste contraddizioni sui panti più essenziali, l'A. ha compiuto una serie di ricerche su questo argomento, i primi risultati delle quali lo portano a concludere che la conduttibilità dell'aria secca che è passata sul fosforo è dovuta a ioni di piccolissima mobilità che servono da nuclei di condensazione al vapore d'acqua anche non saturo. L'A. lascia da parte per ora la quistione circa il meccanismo chimico per il quale questi ioni sono prodotti, e se la loro formazione è legata a quella di un composto definito come l'ozono o un ossido di fosforo, o se pure si tratta di una semplice modificazione dell'ossigeno. Questa quistione è collegata allo studio chimico preciso dell'ossidazione del fosforo, sulla quale, non si hanno attualmente dati sufficienti.

MOREAU G. *Sull'effetto Hall e le mobilità degli ioni di un vapore salato* (pp. 1326-1328). — Studiando la mobilità degli ioni l'A. ha trovato, con un metodo indicato in un'altra sua Nota ¹⁾, per gli ioni negativi una mobilità che diminuisce al crescere della concentrazione, e che è unicamente funzione della natura del metallo. Per i sali di potassio e di sodio, la cui concentrazione era compresa tra 1 mol. e $\frac{1}{256}$ di molecola per litro di soluzione vaporizzata, essa variava da 660 cm/sec a 1320 cm/cc per una caduta di 1 volt per centimetro.

Lo stesso metodo, applicato agli ioni positivi, gli hanno dato 80 cm/cc qualunque sia la natura del sale o della concentrazione.

Passando quindi all'effetto Hall, l'A. ha verificato che la formula

$$R = K_2 - K_1,$$

dove R è il coefficiente di rotazione, K_2 e K_1 la mobilità degli ioni positivi e negativi, fornisce una interpretazione cinematica dell'effetto Hall, che l'esperienza verifica. La formula poi

$$R \sqrt{M} = \text{cost.}$$

dove M è il peso molecolare del metallo non fa che confermare quanto le osservazioni dell'A. hanno stabilito, che cioè l'iono negativo non dipende che dal metallo del vapore. Esso sembra all'A. costituito di un nucleo proveniente dalla dislocazione dell'atomo metallico, che raggruppa attorno a esso altri atomi non ionizzati, in numero crescente colla concentrazione. L'iono posi-

1) C. R. 30 Giugno 1902.

tivo sarebbe il resto dell'atomo con molecole del mezzo infiammato.

Così si spiegherebbe, secondo l'A., l'influenza preponderante del metallo che Arrhenius ha osservato nella conduttibilità dei vapori salini.

TOMMASI D. *Su un nuovo accumulatore elettrico* (pp. 1328-1329). — In questa Nota è descritto un nuovo accumulatore le cui costanti possono riassumersi così:

Numero di lastre	5
» positive	2
Lunghezza delle lastre in millimetri	140
Larghezza	140
Spessore	130
Peso totale in grammi	2000
» di due positive e due negative	1600
Durata della scarica in ore	5
Differenza di potenziale medio utile in volts	1,9
Sviluppo in ampères	6
» per chilogrammo di lastre utili	3,8
Capacità in ampères-ore	2,8
» per chilogram. di lastre	17,75
Potenza in watts	11,4
» per chilogrammo di lastre	7,1
Energia in watts-ore	54,15
» per chilogrammo di lastre	33,7

L'A. in fine fa rilevare che al regime di un ampère per chilogrammo di lastre, si arriva speditamente a una capacità da 34 a 38 ampères-ora, cioè 22 a 24 ampères ora utilizzabili, sempre per chilogrammo di lastra.

WATTEUILLE (DE) C. *Sugli spettri di fiamme* (pp. 1329-1332). Si possono distribuire in due categorie principali gli spettri che sappiamo produrre: quelli d'origine puramente calorifica (fiamme etc.), e quelli d'origine elettrica e calorifica al tempo stesso (arco scintilla). L'A. ha studiato gli spettri appartenenti alla prima categoria, e senza entrare nei dettagli particolari a ciascuno dei 19 spettri dei metalli studiati, in questa Nota si limita alle conclusioni seguenti:

1° Nelle condizioni delle sue esperienze lo spettro di fiamma può estendersi assai lontano nell'ultravioletto. Così la riga 2269 dello stagno vi è ancora visibile;

2° Tutte le righe osservate nella fiamma sono comuni agli spettri della scintilla e dell'arco; le righe caratteristiche della scintilla non si trovano nello spettro della fiamma;

3° Sono le righe più forti dell'arco quelle che esistono nella fiamma e non vi è caugiamiento relativo d'intensità tra le righe facenti parte dei due spettri d'arco e della fiamma, quando si passa da uno di questi spettri all'altro;

4° Tutte le righe, senza eccezione, della fiamma sono quelle che sussistono nella scintilla resa oscillante e studiata da Hemsalech. Ma la reciproca non è esatta, per quanto quelle delle righe della scintilla oscillante che mancano nella fiamma abbiano nella prima una intensità debolissima e che non sia impossibile che un prolungamento del tempo di posa potrebbe farle apparire nella fotografia dello spettro della fiamma;

5° Infine, lo spettro del nucleo della fiamma dei metalli del gruppo del ferro (Fe, Ni, Co, Mn) è identico a quello della scintilla oscillante, tanto dal punto di vista della presenza delle righe quanto da quello delle loro intensità relative.

Circa poi la questione molto discussa, se sia cioè la temperatura il solo fattore che influisce sulla costituzione degli spettri, o se, come è più generalmente ammesso, il loro carattere può essere modificato da cause particolari, di natura elettrica, l'A. è indotto dalle sue esperienze a pensare che soltanto la temperatura abbia una influenza attiva.

P. BACCER.

Journal de Physique. Marzo, Aprile e Maggio 1903.

BLONDIOT R. *Sopra la polarizzazione dei raggi X* (pp. 169-172). — I tentativi fatti fin qui per polarizzare i raggi X sono stati infruttuosi. L'A. si domanda se i raggi X emessi da un tubo focus non sieno già polarizzati durante la loro emissione. Per riconoscere se tale polarizzazione esiste ha disposto l'apparecchio seguente:

Un tubo focus è congiunto con due fili BH e B'H ricoperti di gutta-percha a un rocchetto d'induzione: due altri fili, pure ricoperti, terminati in due anelli che circondano rispettivamente BH e B'H senza toccarli, sono avvoltolati insieme e le loro estremità, CC' terminate in punta, sono mantenute ad una piccola distanza regolabile, in modo da formare un piccolo eccitatore a scintille. In virtù di questa disposizione, l'influenza elettrostatica, esercitata dai fili BH e B'H sopra gli anelli, produce ad ogni corrente di apertura del rocchetto, una piccola scintilla all'intervallo CC', mentre dei raggi X sono emessi dal tubo. La

retta CC' secondo cui scocca la scintilla si può orientare in qualunque modo. Una lastra di alluminio di cm. 40 di lato è interposta fra il tubo e la scintilla in modo da impedire ogni influenza diretta degli elettrodi del tubo sopra CC' .

Per definire le posizioni relative del tubo e della scintilla CC' , consideriamo tre assi ad angolo retto di cui uno, OZ , sia verticale. Disponiamo il tubo in modo che la sua lunghezza coincida con OY , essendo volto l'anticatodo verso l'origine, e l'intervallo CC' in un punto della porzione positiva dell'asse OX , in modo che la sua direzione sia parallela ad OY . I raggi X agiscono aumentando lo splendore della scintilla. Ora facendo ruotare l'interruzione CC' fino a renderla parallela a OZ , ossia normale ai raggi catodici non si osserva più alcuna influenza dei raggi X .

Essi dunque hanno un piano di azione che è quello che passa per ciascun raggio X e per il raggio catodico generatore.

Facendo ruotare la scintilla attorno OX come asse, parallelamente al piano YOZ , si vede passare da un massimo di splendore, quando è orizzontale, a un minimo quando è verticale.

Perchè il fenomeno sia facilmente osservabile bisogna che la scintilla sia molto debole e corta. Se si fa ruotare il tubo focus attorno al suo asse, che è parallelo ai raggi catodici, i fenomeni osservati non cambiano.

L'A. ha trovato anche che il quarzo e lo zucchero in pezzi fanno ruotare il piano di polarizzazione dei raggi X , nello stesso senso di quello della luce; ed ha ottenuto rotazioni di 40° . I raggi secondari, detti raggi S , sono ugualmente polarizzati: le sostanze attive fanno ruotare il loro piano in senso contrario a quello della luce. L'A. ha osservato rotazioni di 18° .

MATHIAS E. *Sopra le teorie liquidogeniche dello stato fluido* (pp. 172-185).

BERTHELOT D. *Sopra la nozione degli stati corrispondenti e sopra diversi punti corrispondenti rimarchevoli* (pp. 176-202).

BRUNHES B. e DAVID P. *Studio delle anomalie del campo magnetico terrestre sopra il Puy de Dôme* (pp. 202-205). — Le misure fatte da Moureaux nel Massif Central hanno mostrato che esistevano nel centro della Francia alcune anomalie che richiedevano uno studio minuzioso. Gli A. si sono proposti di cominciare lo studio dalla catena dei Puys e la presente memoria contiene il risultato delle loro misure intorno al punto culminante del Puy de Dôme.

PELLAT H. *Della magnetofrizione nei tubi a gaz rarefatti* (pp. 241-249). — Studiando l'azione di un campo magnetico in-

tenso sulla scarica elettrica nell'interno di tubi a gaz rarefatti, l'A. ha trovato un certo numero di fenomeni che gli son parsi del tutto inesplicabili colle leggi conosciute. Il fascio anodico, come il fascio catodico, ha la più grande difficoltà a tagliare le linee di forza e tende a canalizzarsi nei tubi di forza del campo magnetico.

In un campo magnetico intenso, il fascio catodico che sfugge da un catodo in forma di disco disegna esattamente il tubo di forza magnetica che ha per base la superficie del catodo, i raggi catodici partendo uniformemente da tutta la superficie del disco, da una parte e dall'altra di questo.

L'A. propone di dare a questi nuovi fenomeni il nome di fenomeni di magnetofrizione, senza pregiudicare del resto la loro intima natura, e fa notare che niente prova fin qui che l'elettrizzazione delle particelle in movimento sia necessaria perchè si produca il fenomeno di magnetofrizione.

LÉBÉDINSKY W. *Sopra l'azione delle diverse radiazioni sulla scintilla elettrica* (pp. 249-253). — L'A. ha trovato due anni or sono dei processi semplici e sicuri per mettere in evidenza l'azione dei raggi ultravioletti sopra la scintilla elettrica. Nel 1902 ebbe l'occasione di fare alcune esperienze con la radiazione del bromuro di radio, le quali mostrarono la più completa somiglianza tra gli effetti di queste radiazioni e quelli della luce ultravioletta. Con dei raggi X emanati da un tubo focus, l'A. ha osservato il fenomeno analogo al fenomeno di Hertz ed ha creduto interessante studiare la loro azione sopra un conduttore elettrizzato dinamicamente. Le esperienze hanno mostrato che i raggi X ne abbassano in valore assoluto il potenziale V fino ad un potenziale V_x e che la loro azione è differente secondo il segno di elettrizzazione del conduttore.

RAVEAU C. *Sopra la teoria di uno dei metodi di misura dell'equivalente meccanico del calore* (pp. 253-255).

GUILLOZ TH. *Processo di radioscopia stereoscopica* (pp. 255-258). — È la descrizione di un semplice dispositivo, che si può adattare agli apparecchi ordinari di radiografia e che permette di praticare in visione stereoscopica gli esami radioscopici suscettibili di essere effettuati in buone condizioni di luminosità e di contrasto (ossa, torace, cuore). Perchè il rilievo apparisca nettamente bisogna che il tubo abbia un buon rendimento di raggi X.

ARNOUX R. *Elasticità e magnetismo* (pp. 258-260). — Una striscia di caoutchouc vulcanizzato, sottoposto a forze di trazione F crescenti, aumenta nella lunghezza L seguendo una legge di cui l'andamento è analogo a quello della variazione della ma-

gnettizzazione del ferro dolce sottoposto a campi magnetici crescenti.

La curva che rappresenta L in funzione di F presenta prima una parte sensibilmente rettilinea per la quale il modulo d'elasticità d'Young $\frac{dF}{dL}$ è costante: in seguito l'allungamento cresce più rapidamente della forza di trazione F e la curva s'innalza: essa presenta un punto di flesso, poi il modulo d'Young aumenta e la curva tende sempre più all'asse orizzontale (della forza di trazione). Con un filo di ferro sottoposto a trazioni crescenti, si ottiene una curva analoga, limitata però alla regione che precede il punto di flesso.

Il caoutchouc vulcanizzato presenta la viscosità, ma non sensibilmente l'isteresi elastica: il ferro presenta grandi deformazioni permanenti quando è stato sottoposto a trazioni sufficientemente grandi. Si può paragonare l'isteresi elastica del ferro all'isteresi magnetica.

Si possono spiegare le analogie tra i fenomeni elastici e magnetici ammettendo con Ampère che la magnetizzazione resulti da un orientamento più o meno completo dei magneti molecolari sotto l'azione della forza magnetizzante.

BLONDIOT R. *Azione di un fascio polarizzato di radiazioni molto refrangibili sopra scintille elettriche molto piccole* (pp. 337-339). — L'A. ha studiato se delle radiazioni spettrali polarizzate esercitassero sopra una piccola scintilla un'azione che presentasse lo stesso genere di dissimetria di quella dei raggi X ¹⁾.

Essendo dapprima la piccola scintilla disposta orizzontalmente, è notevolmente più brillante e più bianca quando riceve il fascio polarizzato; se invece si dispone verticalmente la scintilla, divenuta più debole e più rossa, non è più modificata in modo apprezzabile dall'azione della luce.

Facendo ruotare la scintilla intorno all'asse del fascio polarizzato e in un piano perpendicolare a questo, asse si ottengono le stesse apparenze che coi raggi X e coi raggi S. Le esperienze eseguite provano che esiste un piano d'azione della luce polarizzata e questo piano è normale al piano di polarizzazione.

Ricordiamo che nel caso dei raggi X, il piano d'azione è quello che passa pel raggio X e pel raggio catodico generatore. Raccostando questi due fatti, si può, secondo l'A., dedurne una conseguenza importante.

Adottiamo prima, tanto per la luce quanto per i raggi X, la

1) Journ. de Phys. 4. serie, T. 2, p. 169, 1903.

teoria elettromagnetica. Nei raggi X, la vibrazione elettrica, generata dai raggi catodici, deve essere nel loro piano d'azione; l'analogia indica che deve esser lo stesso nel caso delle radiazioni luminose e, per conseguenza, in queste, la vibrazione elettrica è normale al piano di polarizzazione; il che concorda colle vedute di Wiener. Se invece si adotta la teoria dell'etere elastico, la vibrazione eterea, che è prodotta dalla materia in movimento nell'emissione catodica, è ancora nel piano di azione. Se ne conclude per analogia, che in un raggio di luce polarizzata, le vibrazioni son normali al piano di polarizzazione: che è l'ipotesi di Fresnel.

BLONDLOT R. *Sopra una nuova specie di luce* (pp. 339-342).

— Le radiazioni emesse da un tubo focus sono filtrate attraverso una foglia di alluminio o uno schermo di carta nera, per eliminare i raggi luminosi che potrebbero accompagnarle. Studiando tali radiazioni per mezzo della loro azione sopra una piccola scintilla, l'A. ha riconosciuto che esse presentano, dopo la loro emissione, la polarizzazione rettilinea, e che quando traversano una lamina di quarzo normale all'asse, o un pezzo di zucchero, il loro piano d'azione subisce una rotazione: in seguito, che si rifrangono e si riflettono.

Ciò prova che non si tratta dei raggi di Röntgen, ma di radiazioni che traversano l'alluminio, la carta nera, il legno, son polarizzate rettilineamente dopo la loro emissione, sono suscettibili di polarizzazione rotatoria ed ellittica, si rifrangono, si riflettono, si diffondono, ma non producono né fluorescenza, né azione fotografica.

TISSOT C. *Sopra il detector magnetico* (pp. 342-348). — Lo scopo delle ricerche dell'A. non era di realizzare un apparecchio da potersi sostituire al cohèrer nelle applicazioni alla telegrafia senza fili; ma era di seguitare lo studio dei fenomeni che avvengono nell'antenna ricevitrice.

L'apparecchio adoperato fu analogo a quello di Rutherford e permetteva di svelare l'effetto delle onde elettriche a una distanza di 4 chilometri: alla medesima distanza fu anche disposto un bolometro, analogo a quello di Rubens, che permetteva anche di misurare l'energia ricevuta dall'antenna. Le esperienze intraprese portano a credere che nel fenomeno del *detector* intervenga l'isteresi propriamente detta e che non vi intervenga direttamente il valore del periodo.

DESCUDÉ M. *Tensione superficiale delle mescolanze di alcool etilico ed acqua* (pp. 348-351). — Le esperienze furono eseguite su mescolanze che segnavano 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°,

90°, 100° agli alcoolometri: il metodo impiegato fu quello dei tubi capillari, di modo che la tensione superficiale si deduce, dalla relazione:

$$\frac{2F}{d} = r h + \frac{1}{3} r^2$$

nella quale F rappresenta la tensione superficiale, h l'altezza di ascensione, d la densità del liquido, r il raggio del tubo al punto d'affioramento del liquido.

I risultati delle esperienze, eseguite a 15°, sono i seguenti:

l'influenza della temperatura è meno sensibile che con l'acqua pura e va diminuendo a misura che aumenta la proporzione di alcool;

se si prendono per ascisse i gradi centesimali e per ordinate o h o F , si ottiene una curva che discende prima assai rapidamente, voltando la sua convessità verso l'asse delle ascisse, poi più lentamente. Fra 60° e 90° la curva si confonde quasi con una retta e da 90° a 100° discende di nuovo assai bruscamente, volgendo la convessità dalla parte opposta: di modo che ha un punto di flesso, di cui è assai difficile determinare l'esatta posizione.

DAVID P. *Effetti della folgore sopra una linea telefonica interna, all'osservatorio del Puy de Dôme* (pp. 352-354).

GERRIT BAKKER. *Teoria della capillarità* (IV Memoria) pp. 354-366).
M. ALLEGRETTI.

Drude's Annalen. N. 1 (seguito), 1902.

WÜNSCHE H. *Ricerche intorno al magnetismo dell'amalgama di nickel* (pp. 116-142). — L'amalgama di nickel è un composto chimico di aspetto variabile, che si scompone sotto l'influenza dell'ossigeno atmosferico in un tempo relativamente breve; si ottiene con preferenza per mezzo d'elettrolisi. Alla temperatura ordinaria codesta amalgama è lievemente ferromagnetica, essendo il suo magnetismo dipendente dalla struttura molecolare, variabile sotto certe circostanze. L'A. non poté constatare alterazioni delle proprietà magnetiche alle basse temperature (sino a — 78°). Mentre i metodi usuali sia magnetometrici che balistici non si adattano alle misure del magnetismo, la ricerca della forza portatile dell'amalgama nel campo magnetico fornisce risultati soddisfacenti.

SCHMIDT W. *Rifrazione doppia nei liquidi buoni e cattivi isolanti* (pp. 142-176). — La determinazione delle costanti elettro-

ottiche può farsi col metodo di compensazione per le sostanze isolanti e quelle conduttrici, variando la accuratezza fra 2 e 20 p. c., a seconda della conduttività.

Il fenomeno di dispersione accompagnante la doppia rifrazione mostra differenze relative per le varie sostanze. La costante elettro-ottica è alterata dalla temperatura in modo assai sensibile; per i miscugli non si può dedurre da alcuna legge semplice e chiara, per quanto lo dimostrano gli esperimenti dell'A.

La doppia rifrazione dell'acqua è, cosa assai singolare, di valor medio, allorchè tante altre sue proprietà sia fisiche che chimiche sono estreme. D'altro canto, la costante elettro-ottica del nitrobenzolo supera quella del solfuro di carbonio, che si considerava come la sostanza più fortemente birefrangente, di circa 60 volte.

EMDEN R. *Contributi alla teoria del sole* (pp. 176-198). — L'A. applica alla teoria del sole certe ipotesi usate dall'Helmholtz nelle di lui ricerche sulla fisica dell'atmosfera. Così facendo, gli è possibile di spiegare alcuni fenomeni osservati sul sole.

TAMMANN G. *Velocità di efflusso delle sostanze cristallizzate* (pp. 198-225). — Il risultato principale di questo studio è piuttosto negativo, mostrando l'A. che le curve di fusione predette dal Poynting e dall'Ostwald non esistono. Il ghiaccio specialmente, pure essendo compresso in modo che l'acqua possibilmente formata possa scolarsi, non si fonde prima che la pressione non superi la pressione di fusione del ghiaccio. La plasticità, l'attrito interno reciproco, aumentano, sia per il ghiaccio che per il fosforo giallo, rapidamente colla forza deformante, nonchè colla temperatura, mentre nei casi della naftalina e del piperino cristallini, siccome in quello del piperino amorfo, si osserva un massimo ben marcato.

SCHMIDT K. E. F. *Determinazione della frequenza delle oscillazioni elettriche lente* (pp. 225-231). — L'A. dà un metodo per determinare frequenze di oscillazioni concordanti colla frequenza di suoni estremamente alti.

Quel metodo è caratterizzato dall'uso del telefono per produrre onde acustiche stazionarie in tubi di vetro. Il telefono viene eccitato dalla oscillazione da esaminarsi e, dal canto suo, produce l'onda acustica. Determinando la lunghezza di quell'onda, si può calcolare col mezzo della nota velocità di propagazione del suono il periodo del suono e, conseguentemente, la frequenza delle oscillazioni elettriche.

LINKE F. *Sull'importanza delle correnti d'aria ascendenti e discendenti per l'elettricità atmosferica* (pp. 231-236). — L'A.

spiega le cadute di potenziale negative che si osservano durante le piogge, col mezzo dell'aggregazione di goccioline prodotta dalle nuvole ascendenti, cariche di elettricità negativa libera, aggiungendovi le cariche delle singole gocce, allorchè la capacità non si accresce che come le radici quadrate dei volumi. La differenza di potenziale, negativa relativamente all'ambiente, si accresce perciò in misura diretta delle terze potenze, potendo assumere valori negativi persino relativamente alla terra, ciò che produce cadute negative alla superficie della terra.

GRUNMACH L. *Intorno al lavoro dell'A. « Determinazione sperimentale della tensione superficiale dell'aria liquida »* (p. 236).

A. GRADENWITZ.

Philosophical Magazine. S. 6, Vol. V, 1903.

MC LENNAN J. C. *Radioattività indotta nell'aria ai piedi delle cascate d'acqua* (pp. 419-428). — Esperienze comparative fatte dall'A. a Toronto e ai piedi delle cascate del Niagara mostrano che la radioattività indotta in un filo metallico tenuto elettrizzato negativamente è assai minore alle cascate che a Toronto. Ai piedi delle cascate il filo metallico si caricava spontaneamente di elettricità negativa, al potenziale di circa 7500 volta.

Secondo l'A. la causa cui si deve la radioattività indotta nel filo metallico è un'emanazione della superficie terrestre, e la sua minore intensità ai piedi delle cascate si spiegherebbe con l'azione della elettrizzazione dell'acqua; perchè anche in una stanza chiusa la radioattività dell'aria è maggiore a grande distanza che in prossimità di una macchina elettrostatica in azione.

Quando il suolo è coperto di neve la radioattività dell'aria diminuisce, e il residuo che si ottiene dall'evaporazione della neve è notevolmente radioattivo.

WILSON H. A. *Determinazione della carica degli ioni prodotti nell'aria dai raggi Röntgen* (pp. 429-441). — Il metodo usato è analogo a quello del Thomson (*Phil. Mag.* Dicembre 1898), fondato sul fatto che gli ioni agiscono da nuclei di condensazione pel vapor acqueo; modificato però in modo da far a meno della valutazione del numero delle goccioline di nebbia. Per determinare la carica e di un ione basta infatti misurare la velocità v_1 e v_2 con le quali la nebbia cade in un campo nullo e in un campo X verticale; perchè se m è la massa di una gocciolina, e g l'accelerazione della gravità, si ha

$$\frac{mg}{mg + X} = \frac{v_1}{v_2}$$

E poichè secondo il Thomson (l. c.) si ha

$$m = 3.1 \times 10^{-8} v_1^{1/2}$$

ne risulta

$$e = 3.1 \times 10^{-9} \frac{g}{X} (v_2 - v_1) v_1^{1/2}.$$

Dalle misure fatte dall'A. risulta in media $e = 3,1 \times 10^{-10}$ unità elettrostatiche, valore prossimo a quello trovato dal Townsend (*Phil. Mag.* Febbraio 1898). Ammettendo che questa sia anche la carica di un atomo d'idrogeno nell'elettrolisi, cioè 10^{-20} unità elettromagnetiche, poichè un'unità elettromagnetica di elettricità fa depositare $\frac{0,01118}{107,11} = 1,043 \times 10^{-4}$ grammi di idrogeno, ne segue che la massa di un atomo d'idrogeno sarebbe $10^{-4} \times 10^{-20} = 10^{-24}$ di un grammo. La massa di 1 cm³ di idrogeno essendo a 0° e a 760 mm/hg di 9×10^{-5} grammi, ne risulterebbe che in un centimetro cubo d'idrogeno sarebbero nelle condizioni normali contenute $\frac{9 \times 10^{-5}}{2 \times 10^{-24}}$, ossia, approssimativamente, 4×10^{19} molecole.

RUTHERFORD E. e SODDY F. *La radioattività dell' uranio* (pp. 441-445). *Studio comparativo della radioattività del radio e del torio* (pp. 445-457). — Nella prima di queste Note gli A., dopo aver rammentato gli studi precedenti di Crookes e di Becquerel, secondo i quali l'attività fotografica dell'uranio è dovuta alla presenza di una sostanza diversa, uranio X, che può esser chimicamente separata dall'uranio, il quale riacquista col tempo la radioattività, dimostrano che tanto la perdita quanto il ricupero della radioattività seguono una legge esponenziale. Essi fanno poi osservare che si posson distinguere due specie di emanazioni dell'uranio: i raggi α facilmente assorbiti, dotati di azione elettrica, propri dell'uranio e da cui non posson separarsi, e i raggi β penetranti, deviabili magneticamente, cui è dovuta l'azione fotografica, e che son propri dell'uranio X.

Nella seconda Nota, gli A. studiano comparativamente il radio e il torio, elementi che hanno proprietà radioattive analoghe e differenti solo per la rapidità della loro emanazione. Mentre infatti l'intensità di tale emanazione si riduce a metà in un minuto pel torio, si riduce a metà dopo 4 giorni pel radio; ma d'altra parte l'attività eccitata nei corpi circostanti dal radio sparisce più rapidamente di quella eccitata dal torio. È anche da notare che mentre si conosce uno stato intermedio del torio, chiamato

torio X, da cui ha origine l'emanazione attiva, nel caso del radio non è stato finora possibile separare un sistema intermedio fra il radio e l'emanazione del radio. Ma ciò forse è dovuto alla estrema piccolezza della quantità di radio di cui si è potuto disporre; e per analogia dovrebbe esistere anche il radio X.

Anche il radio, come il torio e l'uranio, emette due specie di raggi, quelli α facilmente assorbiti e che non deviano altro che in campi magnetici fortissimi, e i raggi β , molto penetranti, facilmente deviabili. Emette anche altri raggi molto penetranti, non interamente noti finora.

CHAPMAN H. W. *Il problema di Colombo* (pp. 458-476). — L'A. studia il moto di rotazione di un uovo appoggiato su un piano orizzontale. Egli trova che l'asse di un ovoide, posato orizzontalmente, non si dispone verticale, se insieme a un impulso attorno alla verticale non riceve un moto rotatorio attorno al suo asse; e che anche in questo caso è poco probabile che l'asse si disponga verticalmente. Invece ciò accade sempre nel caso dell'uovo cotto, e quindi l'A. ritiene che allora si abbia a che fare anche con un attrito interno.

RUNGE C. e PRECHT J. *La posizione del radio nel sistema periodico dedotta dal suo spettro* (pp. 476-481). — Gli A. hanno esaminato lo spettro del radio, facendo scoccare la scintilla elettrica sopra pochi milligrammi di bromuro di radio loro fornito dal Giesel. Dalle linee osservate, e dal loro comportamento nel campo magnetico, essi deducono che il radio appartiene al gruppo del magnesio, del calcio, dello stronzio e del bario.

Questa posizione è anche confermata dalla legge logaritmica che collega la distanza fra le righe spettrali e i pesi atomici degli elementi. Da tal legge resulterebbe pel radio il peso atomico 257,8. Il valore 225 trovato dalla Sig.a Curie si spiegherebbe colla difficoltà di separare il bromuro di radio da quello di bario, i quali secondo F. Rinne sarebbero isomorfi. D'altra parte il valore più alto del peso atomico sarebbe d'accordo con le osservazioni del Rutherford, che gli elementi a peso atomico elevato son quelli che più facilmente mettono in libertà gli elettroni.

RUTHERFORD E. *Alcune osservazioni sulla radioattività* (pp. 481-485). — L'A. risponde ad alcune osservazioni fatte ai suoi lavori da H. Becquerel e da P. Curie, circa la natura materiale delle emanazioni dei corpi radioattivi. Dalle esperienze fatte, e di cui è dato conto in una apposita Nota (*Phil. Mag.* Maggio 1903, p. 561), tale natura materiale risulta chiaramente.

MAIORANA Q. *Nuovi fenomeni magnetotattici presentati da soluzioni magnetiche* (pp. 486-488). — V. N. Cim. (5), 4, p. 44.

WILBERFORCE L. R. *Trattazione elementare di un reticolato di conduttori* (pp. 489-490). — È una deduzione elementare delle note leggi sulla ripartizione del potenziale e delle correnti in un reticolato di conduttori.

FLEMING J. H. e CLINTON W. C. *Sulla misura di piccole capacità e di piccole induttanze* (pp. 493-511). — Il metodo più semplice per la misura delle piccole capacità è quello della scarica del condensatore attraverso un galvanometro; ma per praticarli occorre caricare e scaricare molte volte al secondo il condensatore, ciò che ordinariamente si fa coi diapason elettromagnetici. Ma in tal modo non si ha mai l'uniformità nella durata dei contatti, ed è perciò che gli A. hanno costruito uno speciale commutatore rotante, che può dare fino a 100 cariche e scariche regolarissime al secondo. Con tale apparecchio è possibile misurare con molta precisione anche capacità di pochi milionesimi di microfarads, quali son quelle di pochi metri di filo di rame teso verticalmente.

Gli A. hanno fatte molte misure per verificare le formole proposte per la capacità di fili isolati o di sistemi di fili paralleli, ed hanno sempre trovato sperimentalmente valori di circa il 10 % maggiori di quelli calcolati con le formole, che sono le seguenti:

Per un filo verticale isolato di lunghezza l e di raggio r (in cm):

$$c = \frac{l}{2 \log_e \frac{l}{r}} \text{ unità elettrostatiche ;}$$

per due fili orizzontali paralleli, di raggio r e posti alla distanza D fra di loro:

$$c = \frac{l}{4 \log_e \frac{D}{r}} ;$$

per un solo filo orizzontale posto alla distanza h dal suolo:

$$c = \frac{l}{2 \log_e \frac{2h}{r}} .$$

Per più nastri metallici disposti parallelamente, la capacità totale è sempre assai minore della somma delle singole capacità. La seguente tabella, nella quale è presa per unità di capacità quella di un solo nastro sospeso in una grande sala, mostra come

variano i risultati col numero e con la distanza reciproca fra i nastri:

Numero dei nastri disposti parallelamente	Capacità totale per le seguenti distanze fra i nastri:				Somma delle capacità singole
	12 pollici	6 pollici	3 pollici	addossati	
1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	1,74	1,45	1,34	1,19	2,00
3	2,31	1,80	1,61	1,97	3,00
4	2,79	2,10	1,85	1,44	4,00
5	3,28	2,42	2,03	1,46	5,00
6	3,75	2,70	2,21	1,54	6,00
7	4,18	2,98	2,36	1,59	7,00
8	4,61	3,25	2,52	1,72	8,00
9	5,03	3,51	2,68	1,81	9,00
10	5,46	3,76	2,82	1,96	10,00
11	5,90	4,00	2,97	1,99	11,00

Anche per un disco circolare, sospeso in mezzo ad una sala, la capacità misurata è di circa il 10 % superiore a quella teorica. Tali differenze sono certamente dovute all'influenza dei corpi circostanti; perchè nel calcolo si suppone che il conduttore sia sospeso in uno spazio infinito, affatto sottratto all'influenza di altri conduttori.

Gli A. hanno anche trovato che la capacità di un filo di rame diminuisce notevolmente (fino a ridursi a 0,32 del suo valore) se esso viene avvolto a spirale a spire serrate e di piccolo diametro.

Il commutatore rotante, leggermente modificato nei contatti, può servire anche per la misura di piccole induttanze col metodo di Anderson (*Phil. Mag.* 31, p. 329, 1891). Una resistenza variabile r è posta in serie col galvanometro nel ponte Wheatstone, e un condensatore di capacità C tra le sue armature in comunicazione col vertice Q , S del ponte e con il punto in cui la resistenza r si unisce al galvanometro. Ottenuto il valore $R = \frac{PS}{Q}$ della resistenza del circuito per correnti continue, si fa funzionare l'interruttore e si varia r fino a riottenere l'equilibrio al galvanometro. Allora si ha

$$L = C \{r(R + S) + RQ\}.$$

Come si vede, questo metodo richiede la conoscenza di una capacità e di una resistenza soltanto.

PECK J. W. *Sulle epoche speciali nei sistemi vibranti* (pp. 511-516). — L'A. stabilisce quali condizioni occorrono perchè un sistema vibrante possa avere in riposo tutte le sue parti in un medesimo istante, e perchè possa trovarsi in un medesimo istante nella configurazione non disturbata per tutte le sue parti - stati che, se esistono una volta, si ripresentano periodicamente.

PARKS G. J. *Sullo spessore della pellicola liquida formata per condensazione alla superficie di un solido* (pp. 517-523). — In un tubo di vetro fu posta della lana di vetro, la cui superficie era di circa 29 m^2 ; e dall'aumento di peso che esso tubo subisce quando è tenuto in un ambiente saturo di vapore, l'A. deduce lo spessore della pellicola che si condensa sul vetro stesso. Tale spessore cresce rapidamente nei primi quattro o cinque giorni, e raggiunge il valore limite di circa $13,4 \times 10^{-6} \text{ cm.}$ dopo 20 giorni.

Dai lavori di Martini, di Bellati e Finazzi, e di Barus sulla condensazione alla superficie della silice in polvere, l'A. deduce poi che anche su tale sostanza lo spessore della pellicola di vapore è dello stesso ordine di grandezza, e che si può ritenere che vari da 10×10^{-6} a $80 \times 10^{-6} \text{ cm.}$ a seconda della sostanza.

TROWBRIDGE J. *Sulla costituzione gasosa delle righe H e K dello spettro solare, e discussione sulle righe gaseose invertite* (pp. 524-529). — Già nel 1902 l'A. riferì la scoperta da lui fatta delle linee invertite negli spettri dei gas, che sono attraversati da potenti scariche elettriche. In seguito ad alcune obiezioni fatte alla spiegazione che egli ne dava, ha eseguito nuove esperienze, dalle quali risulta che tali linee invertite non sono dovute al calcio, ma bensì son linee del gas, e che lo spettro continuo che si ottiene in quelle esperienze allorquando i tubi di scarica son di vetro non è dovuto all'incandescenza delle pareti. Ne segue che il gruppo delle righe H e K dello spettro solare, quantunque sia senza dubbio uno spettro composto, ha una forte base di linee gasose, e probabilmente dell'ossigeno.

Secondo l'A. lo spettro continuo è dovuto alla subitanea compressione del mezzo, prodotta dalla scarica, e le linee invertite son dovute a una polarizzazione e non ad uno strato invertente.

BLYTH V. J. *Sull'influenza del campo magnetico sulla conduttività termica* (pp. 529-537). — Dalle esperienze eseguite con il metodo del ponte, risulta all'A. che per campi trasversali di 3550 unità la variazione della conduttività termica del bismuto è appena sensibile. Per l'acciaio dolce la variazione della conduttività è dal 3,3 al 2,1 % quando la variazione del campo è 7500 o 6700 unità rispettivamente. Un campo longitudinale di 51 unità produce una diminuzione del 4 % nella conduttività dell'acciaio

dolce. Anche nel ferro dolce l'azione di un campo longitudinale è assai più intensa di quella del campo trasversale.

GLAZEBROOK R. T. *L'ottica teorica dal 1840* (pp. 537-543). — Passando in rassegna i lavori di Stokes nel campo dell'ottica, l'A. mostra quale sviluppo abbia avuto nell'ultima metà del secolo scorso tale parte della Fisica, specialmente pel potente contributo che vi apportò quello scienziato.

MILLS E. J. *Sui pesi atomici* (pp. 543-549). — È la terza parte dello studio sui pesi atomici, nel quale l'A. mostra che essi son rappresentabili con la formola

$$y = p n - n \left(\frac{n}{n+1} \right)^x,$$

ove p rappresenta il numero d'ordine del gruppo cui appartiene l'elemento nel sistema periodico, $n + 1$ il numero dei periodi del sistema, ed x il numero d'ordine nel gruppo.

DURACK J. J. E. *Sulla ionizzazione specifica prodotta dai corpuscoli emessi dal radio* (pp. 550-561). — Facendo seguito ad un suo precedente studio sui raggi Lenard (*N. Cim.* (5), 4, p. 434) l'A. ha misurato la corrente degli ioni emessi dal radio in varie condizioni di pressione e di gradiente del potenziale. Egli trova che il numero degli ioni prodotti da ciascuno dei corpuscoli emessi dal radio mentre attraversa 1 cm. di aria alla pressione di 1 mm. di Hg è in media 0,17, e quindi molto minore dei valori 20 e 13, che secondo Townsend dovrebbero aversi pei raggi Röntgen e pei corpuscoli del radio.

Dal valore sopra trovato l'A. deduce che la traiettoria libera media dei corpuscoli del radio nell'aria alla pressione di 1 mm. è circa 6 cm., e questo valore spiega il piccolissimo assorbimento che subiscono i raggi deviabili di Becquerel.

RUTHERFORD E. e SODDY F. *Condensazione delle emanazioni radioattive* (pp. 561-576). — *Cambiamenti radioattivi* (pp. 576-591). — Non era riuscito agli A. condensare la emanazione radioattiva del torio operandone il raffreddamento fino alla temperatura di solidificazione della CO_2 ; ma adoperando l'aria liquida essi hanno potuto dimostrare che l'emanazione del torio e del radio hanno un punto definito di volatilizzazione e di condensazione. L'emanazione del torio si condensa a -120° , quella del radio a -150° .

Nella seconda Nota gli A. rammentano che essi avevano già esposto in precedenti pubblicazioni che la radioattività del radio, del torio e dell'uranio è mantenuta da una produzione continua di nuove specie di materia, che possiedono attività temporaria. In

alcuni casi il nuovo prodotto può separarsi con processi chimici, come ad es. il torio X e l'uranio X, che si ottengono rispettivamente dal torio e dall'uranio; in altri i nuovi prodotti son gassosi e si separano per diffusione. Questi ultimi possono esser condensati col raffreddamento e di nuovo volatilizzati; sono occlusi dalle sostanze solide che li emettono, e se ne liberano per soluzione; si diffondono rapidamente per l'atmosfera e per i setti porosi, ed in generale si comportano come gas inerti di peso molecolare elevato. Altra volta la nuova materia non è volatile, ma è prodotta da un ulteriore cangiamento della emanazione gassosa.

Questi nuovi corpi differiscono dalla materia ordinaria soltanto in ciò, che la quantità che se ne è finora ottenuta è così piccola, da sfuggire agli ordinari metodi di analisi chimica e spettrale. Ma lo stesso vale pel radio quale si trova in natura, che non è rivelato nella pechblenda nemmeno dallo spettro.

Quanto poi alla natura della emanazione, gli A. osservano che i raggi emessi sono sincroni col cangiamento che interviene nel sistema radiante, e quindi la radioattività non è una conseguenza dei cangiamenti stessi. Un corpo che è radioattivo deve essere necessariamente soggetto a cangiamenti e non è possibile che qualcuno dei nuovi tipi di materia radioattiva sia identico con uno degli elementi noti; perchè tale materia esiste soltanto per poco tempo e la diminuzione della sua radioattività dipende dalla sua continua sparizione. Questo modo di vedere è confermato dalla deviabilità elettrica e magnetica dei raggi α , che, essendo opposte a quelle dei raggi β o catodici, mostra che quei raggi consistono di corpuscoli carichi positivamente che si muovono con grande velocità. I raggi α poi sono la parte più importante della radioattività, di cui rappresentano circa i $\frac{99}{100}$, e quelli β , quantunque più studiati pel loro maggior potere penetrante e per la loro azione fotografica, sono assai meno importanti.

Da quello che è ora conosciuto si può inferire adunque che la radioattività deve ritenersi come risultato di un processo che sfugge alla sfera delle forze misurabili, e non può esser nè creata, nè alterata, nè distrutta. Come la gravitazione, essa è proporzionale solo alla quantità di materia interessata, e in questo senso si può anche parlare di conservazione della radioattività. Le differenti emanazioni si cangiano una nell'altra e in materia inattiva; e mentre, come è già stato detto sopra, la diminuzione della radioattività è dovuta alla sparizione, il ricupero della radioattività è dovuto alla produzione di sostanza attiva. Se i due processi si equilibrano — come avviene per gli elementi radioattivi in uno spazio chiuso — l'attività resta costante. Ma l'apparente costanza è meramente l'espressione della lenta velocità del can-

giamento che subisce l'elemento radioattivo. In questo concetto nell'universo la radioattività tende a sparire, e l'energia liberata nei processi radioattivi non disobbedisce quindi alla legge della conservazione. A questo proposito è anche da osservare che l'attività eccitata dal torio su un filo di platino non si distrugge, come sembra, arroventando il filo; ma invece si volatilizza e si rideposita sui corpi circostanti. Secondo gli A. quella che chiamasi radioattività indotta nei corpi stati in contatto o vicini a corpi radioattivi, è una emanazione di sostanze attive mescolate col corpo inattivo, o con i prodotti di disintegrazione di radio-elementi.

Dal fatto che l'attività del polonio non è permanente gli A. inferiscono poi che tale sostanza non può essere un nuovo elemento; ma che anche essa deve essere il prodotto di disintegrazione di uno degli altri tre radio-elementi conosciuti. Non è però esclusa la possibilità della esistenza di altri elementi radio-attivi; anzi si può dire che saranno radioattivi gli elementi di peso atomico superiore a quello dell'uranio.

Poichè la velocità del cambiamento è proporzionale alla quantità della sostanza attiva, e non dipende da altri fattori, gli A. ne deducono che il sistema che cangia non è la molecola, ma l'atomo, dal quale vengono espulse particelle dell'ordine di grandezza dell'atomo d'idrogeno. Il processo di disintegrazione, una volta cominciato, procede di stadio in stadio, con l'emissione di raggi α , fino a che non si giunga ai raggi β o elettroni. Gli A. danno il nome di *metabolon* a questi elementi continuamente soggetti a cambiamento.

Calcolando finalmente l'energia nei radio-elementi gli A. trovano come limite inferiore dell'energia irradiata dall'emanazione di 1 gr. di radio puro il valore di 8200 ergs al sec., e poichè nei composti solidi del radio quella energia è circa 0,4 dell'energia totale della radiazione, ne deriva che un grammo di radio emette circa 2.10^4 ergs al sec. ossia 15000 calorie-grammo per anno. La radiazione di un grammo di radio durerebbe quindi poche migliaia di anni, ammettendo che ogni particella produca un raggio solo ad ogni cambiamento. Anche ammettendo che ogni particella produca 50 raggi, la vita del radio è sempre limitata a circa 1 milione di anni; e ciò fa supporre che il radio presente in un minerale non sia sempre esistito in esso come tale, ma che sia continuamente prodotto dagli scambi radioattivi.

Sembra poi probabile che l'elio non sia altro che un ultimo prodotto del radio; ma per stabilir questo fatto occorrono altre ricerche.

BROWN J. *Annullamento della differenza di potenziale voltaica col riscaldamento* (pp. 591-594). — L'A. ha osservato che non

esiste più differenza di potenziale fra un disco di rame e uno di zinco a contatto, allorchè essi son tenuti nell'olio da macchine scaldato a 145° c.; differenza che ricompariva quando i dischi eran tolti dall'olio e raffreddati nell'aria. L'effetto Volta sarebbe quindi dovuto agli strati d'aria aderenti ai metalli.

JEANS J. H. *La teoria cinetica dei gas esposta da un nuovo punto di vista* (pp. 597-620). — Dopo aver rammentato che la ordinaria teoria cinetica presenta difficoltà insormontabili — come l'ipotesi di uno strato molecolare disordinato, la restrizione a molecole infinitesime, quelle sulle loro azioni scambievoli ecc. — l'A. espone la sua nuova teoria, che è puramente matematica, ma che non può riassumersi brevemente.

MORTON W. B. *Sulla relazione fra la velocità di propagazione e l'attenuazione delle onde elettriche lungo fili paralleli* (pp. 643-648). — È una Nota che non si presta ad essere riassunta brevemente.

DERRIMAN W. H. *Su una tavola oscillante per la determinazione dei momenti d'inerzia* (pp. 648-650). — È un quadro a base circolare, sospeso a un filo di torsione, entro il quale può situarsi il corpo di cui si vuol determinare il momento d'inerzia. L'asse di rotazione può coincidere o no con quello geometrico; e il momento d'inerzia I è dato dalla formola

$$t = 2\pi \sqrt{\frac{I}{c}}$$

essendo t la durata d'oscillazione del sistema e c una costante dipendente dal filo.

HONDA K. e SHIMIZU S. *L'effetto Wiedemann nelle sostanze ferromagnetiche* (pp. 650-657). — Gli A. hanno studiato l'influenza della tensione sull'effetto Wiedemann negli acciai al nichel e nelle sbarre ferromagnetiche.

PEARSON K. *Su una teoria generale del metodo di falsa posizione* (pp. 658-668). — L'A. espone un metodo che si presta per il tracciamento di curve rappresentanti funzioni, le cui costanti sono implicite nelle funzioni stesse in modo così complicato, da non poter esser determinate col metodo dei minimi quadrati.

LEHFELDT R. A. *Potenzimetro per misure con coppie termoelettriche* (pp. 668-671). — È un potenziometro che, eliminando l'introduzione di grande resistenza nel circuito del galvanometro e della coppia termoelettrica, permette la misura di piccole forze elettromotrici.

LEHFELDT R. A. *Comparatore di resistenza* (pp. 672-674). — Sono diversi rocchetti disposti in modo da poter servire da ponte Wheatstone, con un inseritore circolare.

LANGLEY S. P. *Visione netta* (pp. 674-677). — Per eliminare la indecisione delle immagini delle stelle che si osservano coi

telescopi, l'A. ha trovato molto vantaggioso di agitare fortemente l'aria contenuta nel tubo del telescopio.

LORD RAYLEIGH. *Sulla proporzione di argo nel vapore dell'aria liquida* (pp. 677-680). — L'A. trova che per ottenere l'argo è molto conveniente ricorrere al vapore che si svolge dall'aria liquida e nel quale la proporzione fra l'argo e l'azoto è circa 5 volte maggiore che nell'aria ordinaria.

STRUTT R. J. *Radioattività dei materiali ordinari* (pp. 680-685). — Misurando la velocità con la quale si scarica un filo metallico sospeso entro recipienti foderati di metalli diversi, l'A. trova che i raggi Becquerel sono emessi da tutti i corpi da lui studiati, e in molto maggior copia dal platino. La radioattività di questo, a pari superficie, è circa 3000 volte minore di quella del nitrato d'uranio; e poichè il radio è almeno 100000 volte più attivo dell'uranio, potrebbe darsi che la radioattività dei metalli ordinari fosse dovuta a tracce di radio in essi contenute.

BARKLA C. G. *Radiazione secondaria dei gas soggetti ai raggi X* (pp. 685-698). — L'A. trova che tutti i gas soggetti ai raggi X divengono sorgenti di radiazione secondaria. La radiazione secondaria è assorbita allo stesso modo di quella primaria. Per una data radiazione primaria l'intensità di quella secondaria — a parità di pressione e temperatura — è proporzionale alla densità del gas dal quale procede. La radiazione secondaria non è dovuta alla ricombinazione degli ioni.

TOWNSEND J. S. *Ionizzazione specifica prodotta dai corpuscoli del radio* (pp. 698-699). — Riferendosi alla Nota del Durack (v. sopra) l'A. ritiene che la differenza fra i valori da lui trovati e quelli del Durack, se è dovuta alla differenza di velocità dei corpuscoli, si debba ascrivere al maggiore spessore di alluminio che l'emanazione del radio attraversava nelle sue esperienze in confronto di quelle del Durack.

MC. LENNAN J. C. e BORTON E. F. *Alcune esperienze sulla conduttività elettrica dell'aria atmosferica* (pp. 699-708). — Anche dalle esperienze che riferiscono gli A. risulta che la conduttività dell'aria — analogamente a ciò che ha trovato R. J. Strutt (v. sopra) — dipende da un'emanazione del materiale che forma le pareti del recipiente in cui l'aria è rinchiusa.

A. STEFANINI.

FINE DEL VOLUME V SERIE V.

PIETRO SALVIONI, *gerente responsabile*.