zu sehen, die eine ähnliche Beschaffenheit besitzen wie die beiden, die 1882 beobachtet wurden; vor Allem dürfte ihnen der Natrium enthaltende Kern nicht fehlen. Von kern-

losen Cometen (wie z. B. 1887 I) könnte man indessen auch kaum wesentliche Resultate in Bezug auf die oben ange-deuteten Fragen erwarten.

Berlin 1887 Oct. 24.

A. Berberich.

Cometenbeobachtungen

angestellt mit dem Kopenhagener $10\frac{1}{2}$ zöll. Refractor von C. F. Pechüle.

Datum	M. Z. Kop.	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Vgl.	α app.	$\log p.\Delta$	δ app.	$\log p.\Delta$	Red. ad l. app.	*
1886-87 Comet 1886 VII (Finlay).										
Dec. 19	7 ^h 26 ^m 47 ^s	+4 ^m 29 ^s 74	+ 6' 21".4	26.5	22 ^h 46 ^m 56 ^s 93	9.328	— 8° 36' 12".3	0.891	+2 ^s 00 +15".3	1
20	7 36 1	—1 40.20	— 0 0.2	24.6	22 52 7.63	9.337	— 7 59 58.0	0.888	+2.05 +15.3	2
21	7 11 8	—1 20.36	— 6 26.3	20.6	22 57 9.65	9.270	— 7 24 19.8	0.890	+2.07 +15.3	3
Jan. 17	8 30 33	—0 12.58	+ 0 33.2	12.5	1 7 34.37	9.400	+ 8 22 59.5	0.827	—0.46 — 5.3	4
18	6 35 1	—2 50.35	— 5 16.8	12.4	1 11 37.16	9.034	+ 8 50 31.5	0.810	—0.43 — 5.4	5
Febr. 14	8 43 24	+2 27.83	—	14	2 57 14.49	9.438	—	—	—0.22 —	6
14	9 11 28	—	+ 0 27.1	5	—	—	+18 57 39.2	0.780	— — 6.0	6
16	8 40 15	+0 47.10	— 6 15.0	24.6	3 4 7	9.312	+19 27 53.7	0.740	—0.21 — 6.0	7
17	9 41 58	+2 10.36	— 3 43.3	31.5	3 7 38.61	9.464	+19 43 14.0	0.789	—0.25 — 6.1	8
März 16	8 52 50	—3 52.94	— 4 49.5	5.4	4 29 48.12	9.500	+24 8 14.3	0.749	—0.26 — 6.6	9
1887 Comet 1886 VIII.										
Febr. 13	7 43 35	—1 5.90	—	18	20 6 52.24	9.455	—	—	—1.41 —	10
13	8 3 34	—	— 1 30.7	4	—	—	+37 59 24.7	0.903	— — 3.2	10
14	7 36 3	—1 52.10	+ 2 31.3	20.4	20 10 3.59	9.472	+38 35 35.8	0.899	—1.40 — 3.4	11
16	7 21 3	—1 37.16	— 5 20.0	24.5	20 16 31.76	9.505	+39 48 19.8	0.889	—1.37 — 4.0	12
1887 Comet 1887 II.										
Febr. 13	9 51 42	+1 56.99	— 2 57.0	20.3	1 38 27.48	0.087	+74 12 28.2	0.235	—0.78 +10.7	13
März 16	12 4 29	—0 47.80	— 4 18.5	15.6	4 4 1.09	9.610	+41 45 11.9	0.830	—0.41 — 0.7	14
1887 Comet 1887 III.										
März 16	10 2 16	+3 29.15	+ 3 53.3	10.6	3 29 35.12	9.599	+33 2 20.4	0.793	—0.32 — 3.7	15

Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1887.0.

*	α 1886-87.0	δ 1886-87.0	Autorität	*	α 1887.0	δ 1887.0	Autorität
1	22 ^h 42 ^m 25 ^s 19	— 8° 42' 49".0	1/2 (W ₁ 855 + Lam ₃ 4656)	9	4 ^h 33 ^m 41 ^s 32	+24° 13' 10".4	BB.VI +24° 6' 76
2	22 53 45.78	— 8 0 13.1	Lam ₃ 4690	10	20 7 59.55	+38 0 58.6	W ₂ 20 ^h 258
3	22 58 27.94	— 7 18 8.8	1/2 (Y. 10151 + Sj. 9475)	11	20 11 57.09	+38 33 7.9	1/2 (Rad. 4684 + Y. 8792)
4	1 7 47.41	+ 8 22 31.6	1/2 (Sj. 392 + Gl. 293)	12	20 18 10.29	+39 53 43.8	Conn. d. Temps 37
5	1 14 27.94	+ 8 55 53.7	W ₁ 1 ^h 193	13	1 36 31.27	+74 15 14.5	AOe. 1866
6	2 54 46.88	+18 57 18.1	W ₂ 2 ^h 1273	14	4 4 49.30	+41 49 31.1	W ₂ 4 ^h 8
7	3 3 20	+19 34 14.7	Brüss. Z. 1872-73	15	3 26 6.29	+32 58 30.8	W ₂ 3 ^h 497-99
8	3 5 28.50	+19 47 3.4	W ₂ 3 ^h 60				

Bemerkungen.

Für den mittleren Fehler der Einheit der Rubrik Vgl. ergibt sich ungefähr: Für Comet 1886 VII (Finlay) in AR. cos δ : ± 0.15 für Jan. 17 und März 16, ± 0.25 für Dec. 19, 20, 21, Jan. 18, Febr. 16, ± 0.45 für Febr. 14 und Febr. 17; in Decl.: unter ± 1.5 für Dec. 20, 21, Jan. 17, 18, ± 2.0 für Febr. 14 und März 16, ± 3.0 für Febr. 14, 16,

± 4.5 für Dec. 19. Für Comet 1886 VIII ± 0.20 und $\pm 1"$ bis $\pm 2"$. Für Comet 1887 II ± 0.17 und ± 2.5 . Für Comet 1887 III ± 0.25 und ± 3.3 .

Sämmtliche Beobachtungen sind mit Fadenmikrometer angestellt.

Kopenhagen 1887 Sept. 19.