Hautkrankheiten.

Akute und chronische Infektionskrankheiten.

Freneh, Herbat. An adress on opsonius and their utility in practical medicine. The British Med. Journal 1907, Feb. 2, p. 256.

French, der Gelegenheit hatte die Staphylokokkenvaccinebehandlung bei Acne vulgaris unter Kontrolle des opsonischen Index auszuführen, bespricht in dieser Arbeit den Begriff der Opsonine, des opsonischen Index und die Technik der Feststellung derselben.

Er weist auf die auf diesem Gebiet grundlegenden Arbeiten von Wright, in denen die Behandlungs- und Untersuchungsprinzipien genauer geschildert wurden, hin. Fritz Juliusberg (Berlin).

Danlos et Dehérain. Érosions péri-anales à spirilles. Ann. de dermat. et de syph. 1906, p. 271.

Bei einer Frau finden sich in der Umgebung der Anal- und Vaginalöffnung teils seichte, scharf umgrenzte, einen serpiginösen Kontur zeigende Erosionen, teils längliche Ulzerationen zwischen den Analfalten. In dem rahmigen Eiter finden sich Spirillen und ein nicht grambeständiges Stäbchen, welches nicht mit dem Vincentschen Bac. fusiformis identisch ist; der Befund entspricht dem bei Balanoposthitis erosiva erhobenen. Heilung durch Methylenblau. Walther Pick (Wien).

Nicolas et Lacomme. Dermatomycoze des régions glabres causée chez l'homme par le microsporon canis. Ann. de dermat. et de syph. 1906, p. 321.

Bei einem 37jährigen Patienten finden sich über der Clavicula und an der Innenseite des l. Oberarmes je ein Trichophytieherd bei gleichzeitig bestehendem allgemeinen Pruritus; durch die mikroskopische Untersuchung, Kultur und Impfversuche charakterisiert sich der Pilz als ein auf allen Nährböden leicht wachsendes Mikrosporon, das identisch ist mit einem Pilz, der sich bei einem dem Patienten gehörigen Pudel innerhalb kahler Hautpartien vorfindet, und sich durch die leichte Überimpfbarkeit vom Mikrosporon Audouini, durch das Fehlen von Endokonidien sowie von Acladium- und Orsporaformen vom M. equinum unterscheidet, hingegen alle Eigenschaften des Mikrosporon canis (Sa-

bouraud-Bodin) aufweist. Auf lokale Applikation von Jodtinktur, einige Schwefelbäder mit Schmierseifenwaschung trat rasch Heilung ein.

Walther Pick (Wien).

De Beurmann et Gougerot. Les sporotrichoses hypodermiques. Ann. de derm. et de syph. 1906, p. 837.

Die Autoren unterscheiden 3 Formen von Sporotrichien: 1. Eine gummöse Sporotrichie mit multiplen Herden, 2. eine Sp. mit multiplen großen subkutanen Abszessen, 3. eine Sp. in Form der Lymphangitis gummosa. Dem bereits publizierten Fall der ersten Form fügen die Autoren zwei neue Fälle hinzu. In allen 3 Fällen war das Allgemeinbefinden nicht gestört, doch fand sich stets irgend eine die Infektion möglicherweise begünstigende Ursache: Tuberkulose, Senilität oder Gicht. Die Symptome sind: In einem Zeitraum von 3—4 Wochen treten ohne irgendwelche Prädisposition, multiple (6—35) subkutane Knoten auf, welche 2 Stadien durchlaufen. Im ersten Stadium, das ungefähr 4 Wochen dauert, findet sich, zunächst nur durch Palpation kenntliche, 5—6 mm große, derbe elastische, bewegliche, nicht schmerzhaft Knoten, über welchen die Haut vollkommen normal bleibt. Die Knoten wachsen dann, erreichen die Größe von 20—30 mm, wölben die Haut, an welcher sie adhäreren, halbkugelförmig vor, bleiben [aber scharf abgegrenzt, beweglich, nicht schmerzhaft.] Die Haut über den Knoten ist violett oder bräunlich verfärbt. Nach 4—6 Wochen treten die Knoten in das 2. Stadium, sie fluktuieren, zeigen aber keine Tendenz aufzubrechen, die Verfärbung der Haut bleibt die gleiche. Der Inhalt dieser fluktuierenden Knoten ist eine viscöse, gummöse, ursprünglich klare, später eitrig getrühte Flüssigkeit in welcher mikroskopisch die Parasiten nur unsicher nachzuweisen sind, kulturell ergibt sie Reinkulturen von *Sporotrichum Beurmanni*. Werden diese Knoten inzidiert, so entstehen hieraus oft runde syphiloide Ulzera mit dicken aber nicht infiltrierte und nicht unterminierte Rändern. Diese verschiedenen Stadien finden sich meist gleichzeitig in allen möglichen Übergängen bei einem Patienten vertreten. Jodkali 2—4 g pro die führt in kurzer Zeit zur Heilung. Differentialdiagnostisch kommt hauptsächlich Lues in Betracht, doch sitzen die syphilitischen Gummen hauptsächlich an den Extremitäten, sind nicht so zahlreich, ihre Entwicklung ist eine langsamere, sie erreichen nicht derartige Größen, ulzerieren häufiger und bilden dann Geschwüre mit polyzyklischem, infiltrierte Rande. Tuberkulose Gummen entwickeln sich langsamer und bilden häufiger Geschwüre mit unterminierten Rändern, welche die Tendenz haben weiterzuschreiten, während die sporotrichotischen Abszesse spontan nie ulzerieren, die eventuellen Ulzera aber rasche Heilungstendenz zeigen. Die Sarkoide (Tuberkulide) bleiben durch viele Monate stationär, abszedieren nicht.

Die Kultur gelingt leicht auf den gebräuchlichen Nährböden (Zuckeragar, Glycerinagar, Ascitesagar, Gelatina, Bouillon etc.). Die Inkulation gelang bei neugeborenen Meerschweinchen, welche hierauf, neben lokaler Knotenbildung Metastasen am Rücken oder an einer Extremität

zeigten. Die Impfung in die Pfote der Maus gab immer ein positives Resultat.

Histologisch fand sich in einem erweichenden Knoten im Bindegewebe intensiv entzündliche Reaktion, an welcher sich die fixen Bindegewebszellen, die Endothelien und Lymphocyten, letztere unter Bildung perivaskulärer Knoten, beteiligen; keine polynukleäre Leukocyten, kein Ödem, kein Fibrin. Die äußere Wand des Knotens wird von einer dicken Schicht fibrocellulären Bindegewebes gebildet; gegen die Kavität zu werden die Fasern immer feiner und spärlicher, hören plötzlich ganz auf, während die Zellen immer mehr zunehmen. In der mittleren Schicht finden sich wesentlich Bindegewebszellen in entzündlichem Zustand, nach außen hin mit Lymphocyten gegen das Zentrum zu mit polynukleären Leukocyten untermischt. Auch Knoten mit epitheloiden Zellen und Riesenzellen finden sich. Die innerste, erweichte Partie des Knötchens ist charakterisiert durch die Nekrose aller Elemente; die Bindegewebszellen werden acidophil nur einige Makriphagen und zahlreiche polynukleäre neutrophile Leukocyten bleiben sichtbar. Die Gefäße zeigen Wandverdickung ohne Thrombose oder Dilatation.

Die oben erwähnten Metastasen nach Impfung beim Meerschweinchen, zeigten das gleiche histologische Bild. Die Autoren differenzieren den Prozeß auch histologisch von Lues, Tuberkulose und Blastomykose und besprechen zum Schlusse ausführlich die bisher in der Literatur niedergelegten Fälle von Sporotrychie.

Walther Pick (Wien).

Sabouraud. *Nouvelles recherches sur les microsporums.* Premier mémoire. *Microsporums anciens et microsporums nouveaux.* Ann. de derm. et de syph. 1907, p. 161.

Sabouraud tritt zunächst neuerlich dafür ein, daß, um Vergleiche zu erleichtern, ein einheitlicher Nährboden zur Kultivierung der pathogenen Pilze allgemein angenommen werde, und empfiehlt einen solchen von der Zusammensetzung: Maltose 10, Pepton 40, Agar 18, Wasser 1000. Die Konstanz der Bilder, welche die Kultur gleicher Pilzarten auf diesem Nährboden bietet, ist aus den der Arbeit beigefügten Abbildungen sehr schön ersichtlich. Seit Einführung der Röntgenbehandlung nimmt, die Zahl der Trichophytiefälle, die in Paris zur Beobachtung kommen ab, u. zw. ist diese Abnahme bei der Mikrosporie deutlicher als bei der Makrosporie. Zu den bisher bekannten 5 Arten von Mikrosporen konnte Sabouraud, nach Untersuchung sämtlicher ihm untergekommenen Mikrosporiefälle durch einen Zeitraum von einem halben Jahre, drei neue Arten hinzufügen, welche er nach dem Aussehen der Kultur als *Misrosporum lanosum*, *M. umbonatum* und *M. velveticum* bezeichnet. Während die beiden letzteren sich nur kulturell charakterisieren lassen, ist das *M. lanosum* von größerem Interesse, weil es sich klinisch und histologisch differenzieren läßt und ein Drittel sämtlicher in Paris beobachteter Mikrosporien hervorruft.

Das *M. lanosum* bildet auf genanntem Nährboden am 25. Tage über 4 cm im Durchmesser haltende Kulturen, deren gedelltes Zentrum

von einem 4 mm hohen, dichten, wolligen, weißem Saum umgeben ist; durch das lebhaftes Wachstum in der Kultur steht es dem Mikrosporon des Hundes und der Katze nahe; es ist leicht aus der Kultur auf Meerschweinchen inokulabel und erzeugt bei diesen am 8--10. Tage nach der Impfung einen sich allmählich ausbreitenden schuppenden Fleck, der später ein mit einer Kruste bedecktes Geschwür bildet; nach Abfallen der Kruste, ungefähr am 20. Tage, bleibt eine kahle unregelmäßige Stelle mit leicht erhabenem Rande zurück. Die Überimpfung des *M. Audouini* auf das Meerschweinchen gelang aus der Kultur gar nicht und nur einmal durch direkte Anwendung erkrankter Haare.

Die durch das *M. lanosum* erzeugte Erkrankung ist sehr kontagiös und S. konnte familiäre Epidemien beobachten; auf der Kopfhaut erzeugt es kleine, von grauen Schuppen bedeckte meist multiple Herde mit gesunden und kranken, abgebrochenen Haaren; ältere Herde erschienen entzündlich gerötet, doch konnte nie die Bildung eines echten Kerion (im Sinne einer *Trichophytia profunda*) beobachtet werden. Im Gegensatz zum *M. Audouini* erzeugt das *M. lanosum* äußerst häufig auch Herde auf der unbehaarten Haut; daselbst fanden sich in einem Falle 100--150 Kreise, von $1\frac{1}{2}$ —3 cm Durchmesser, ähnlich den Effloreszenzen bei Herpes iris, am Rande nicht vesikulös, rosa oder bräunlich gefärbt, im Zentrum leicht schuppig; in den Schuppen reichlich Pilze nachweisbar.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Boudet. Sur un cas de trichophytie disséminée du tronc. Ann. de dermat. et de syph. 1906, p. 1062.

Demonstration eines Falles von Trichophytie, ausgezeichnet durch die große Zahl der Herde, die zum Teile konfluierend polyzyklische Konturen aufweisen und alle am Stamme lokalisiert sind.

Walther Pick (Wien).

Ceresole. Sur une trichophytie du daim transmissible à l'homme. Ann. de dermat. et de syph. 1906, p. 743.

Bei den Damhirschen im Schlosse von Papadopoli bei St. Polo di Piave war eine Trichophytie ausgebrochen; es fanden sich bei diesen Tieren zahlreiche isolierte oder konfluierende herpetische Herde, insbesondere an der Schnauze und der Innenfläche der Ohrmuschel, ferner an Hals, Rücken, Bauch und der Innenseite der Oberschenkel, im ganzen nur wenig intakte Haut übrig lassend. Die Herde hatten bis zu 10 cm Durchmesser; die frischen Herde bildeten elevierte Scheiben mit starker Abschuppung, die Haare innerhalb derselben erschienen weiß bestäubt. Ältere Herde zeigten im Zentrum eine leicht zu entfernende Borke, nach deren Loslösung eine kahle, rötliche, leicht nässende Fläche zurückblieb; am Rande ein scharfer Kreis von eitrigen Folliculitiden und adhärenenten Eiterborken gebildet. Heftiges Jucken, starke Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens, von 13 Hirschen starben 10 in kurzen Zwischenräumen. Der Wärter und 12 mit den Tieren in Berührung gekommene Personen zeigten gleichfalls herpetische Herde an den Wangen, Händen, am Hals und an den Beinen; die befallenen Partien waren rot und geschwollen,

die Herde selbst von einer impetiginösen Kruste und reichlich Eiter haltenden Pusteln begrenzt. Subjektiv heftiges Jucken, allgemeine Schwäche und Abgeschlagenheit, zuweilen Fieber. Heilungsdauer 3—4 Monate. Der Ausgangspunkt der Infektion war nicht festzustellen. In den Borken und Haaren waren Pilzfäden und -sporen nachweisbar; der Pilz war leicht auf künstlichen Nährböden rein zu züchten und wurde aus der Reinkultur mit positivem Resultat auf Meerschweinchen, Kaninchen und auch auf den Menschen überimpft.

Walther Pick (Wien).

De Beurmann et Gougerot. Onychomycosis. Ann. de dermat. et de syph. 1906, p. 277.

Die Erkrankung beginnt mit isolierten weißen Flecken am freien Nagelrand, die sich exzentrisch ausbreiten; innerhalb der unteren Partien des Nagels geht die Hornschicht verloren und läßt die unvollständig verhornten Partien sichtbar werden, welche oft eine Dicke von 8 mm erreichen; die Lunula bleibt intakt, die Oberfläche des Nagels erscheint längsgestreift, endlich fällt der ganze Nagel ab, um sich durch einen gesunden Nagel zu ersetzen, der aber neuerlich infiziert werden kann. Die Affektion dauert bei dem Patienten bereits 4 Jahre. Im Detritus konnten Pilze nachgewiesen werden, da aber die Kultur trotz sechsmaligen Versuches mißlang, ist eine Identifizierung mit der Trichophytie nicht möglich. Sabouraud glaubt, da Patient längere Zeit in Tonking gelebt hat, eine exotische Mykose annehmen zu können. Mehrere derartige aus Tonkin, Siam und Cambodge stammende Fälle, bei welchen gleichfalls im Gegensatz zur Trichophytie eine Kultivierung des Pilzes nicht möglich war, heilten unter Chrysarobin. Sonstige Hauterscheinungen fehlen stets.

Walther Pick (Wien).

Schabrowski. Wesen, Verhütung und Bekämpfung des Rhinoskleroms vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin. Bd. XXXI. pag. 196.

Schabrowski gibt ein eingehendes klinisches Bild des Rhinoskleroms unter Berücksichtigung der neueren Literatur. Auch die Ätiologie und die pathologische Anatomie werden besprochen. Den Schluß bilden Vorschläge zur Bekämpfung und Verhütung der Krankheit speziell für die Provinzen Ostpreußen und Schlesien. Verf. schlägt folgende Maßnahmen vor:

Ärztliche Anzeigepflicht und Aufklärung der Ärzte über das Wesen und die Symptome der Krankheit. Alljährliche Untersuchung der Familienangehörigen der Skleromkranken sowie derjenigen, welche an Heiserkeit, Atemnot, Borkenbildung in Nase und Hals leiden. Auch die Skleromkranken sollen jährlich mindestens einmal kontrolliert und aufgeklärt werden über die hygienischen Maßnahmen zwecks Verhütung des Weiterverbreitung. In Breslau und Königsberg sind Skleromstationen für unentgeltliche Behandlung der Kranken einzurichten.

M. Winkler (Luzern).

Zeisler, Joseph (Chicago). Notes of a case of Actinomy-cosis. The Journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. 11. 1906.

Der von Zeisler mitgeteilte Fall betrifft eine junge Dame, die beim Golfspiel die Gewohnheit hatte, frisch gepflücktes Gras zu kauen. Offenbar ist es hierbei zu einer Verletzung der Zunge durch eine Ähre gekommen und entwickelte sich eine typische Aktinomykose der Unterkiefergegend, die außer durch den klinischen Befund noch durch den Nachweis des Strahlenpilzes verifiziert werden konnte. Neben Jodkali, das die Patientin nicht gut vertrug, und mäßiger Bestrahlung hat sich die innerliche Verabreichung von kleinen Dosen von Kupfersulfat (in Kapseln) nützlich erwiesen.

Rudolf Winternitz (Prag).

Külbs, Wien (Institut Weichselbaum). Ein Fall von Aktinomykose der großen Zehe. Wiener klinische Wochenschrift 1907, Nr. 2.

Külbs beschreibt einen Fall, bei dem nach einer Latenzdauer von 2 Jahren nach einer Nagelbettentzündung an der großen Zehe in der amputierten Zehe Aktinomyces-Mycelien in subkutanen Eiterherden derselben nachgewiesen wurden.

Viktor Bandler (Prag).

Küttner, H. Über teleangiektatische Granulome. Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Botryomykose. Bruns Beitr. zur klin. Chir. 1905, XLVII. Bd., 1. Heft.

Nach einer historischen Einleitung, in der Küttner die Entwicklung der Lehre von der Botryomykose in der Veterinärpathologie und das namentlich von französischen Autoren behauptete Vorkommen der Botryomykose beim Menschen bespricht, teilt er drei von ihm in Tübingen und Marburg beobachtete Fälle nebst einem vierten aus dem Marburger pathologischen Institut stammenden Fall mit, in denen an Hand, Fuß und Kinn Tumoren von pilzförmiger Gestalt und Stielung mit Neigung zu Blutungen beobachtet wurden. Die Tumoren zeigten gewisse klinische Besonderheiten und waren identisch mit den Gebilden, die in der neueren Literatur als Botryomykose des Menschen beschrieben worden sind. Histologisch konnte ein Zusammenhang der Geschwülste mit den Schweißdrüsen, wie er von französischen Autoren, besonders Poucet und Dor, behauptet wurde, nicht gefunden werden. Es zeigten sich aber, ebenso wie klinisch, so auch histologisch typische Besonderheiten. Die Tumoren sind nach Ansicht Küttners als entzündliche aufzufassen; ihre Besonderheit liegt in dem Verhalten der Gefäße. Der ganze Tumor besteht von der Wurzel im Corium bis zu dem pilzförmigen Gewächs über der Haut aus Kapillaren, die nicht nur selbst an Menge und Ausdehnung enorm zugenommen haben, sondern auch durch Wucherung ihrer Endothelien die Zellmassen der Geschwulst bilden. Küttner bezeichnet daher die Geschwülste der angiomartig gewucherten Kapillaren halber als teleangiektatische Granulome.

Zum Schluß wirft Küttner die besonders interessierende Frage nach der Ätiologie dieser Granulome auf und besonders auch die Frage, ob der „Botryomyces“, d. h. mit einer Hülle umgebene Kokkenhaufen, die sich durch Aneinanderlagerung zu einem sogenannten Botryomyces-

rasen zusammenschließen können, den spezifischen Erreger darstellt. Aus einer Reihe von Tatsachen und Erwägungen glaubt Küttner, dem „Botryomyces“ und damit der Botryomykose die Daseinsberechtigung absprechen zu müssen. Wohl steht aber fest, daß die bisher als „Botryomykosis hominis“ bezeichnete Erkrankung klinisch und histologisch wohl charakterisiert ist und als typisches Krankheitsbild festgehalten werden muß. Die Ätiologie ist zur Zeit nicht ganz klar. Traumatische Einwirkungen spielen sicher eine Rolle, dafür spricht schon der konstante Sitz der Tumoren an den exponiertesten Körperstellen. Küttner hat den Eindruck, daß es sich um schleichende Infektionen mit Staphylokokken handelt, die nicht zur Eiterung, sondern infolge des chronischen Berührungszusammenstoßes zur Bildung von Granulationsgewebe führen. Die Syphilis als ätiologischer Faktor kam bei der Affektion nie in Betracht. Die Diagnose der Geschwülste ist leicht, eine Verwechslung mit Melanosarkom und syphilitischen Produkten makroskopisch jedoch möglich. Die Therapie besteht in der elliptischen Exzision des Tumors mitsamt der im Corium wurzelnden Basis.

Voß (Halle a. S.).

Balzer et Poisot. Vaccine du sein chez une nourrice. Ann. de dermat. et de syph. 1906, p. 967.

Eine Patientin zeigt an beiden Warzenhöfen in dichtester Anordnung zahlreiche Bläschen und Pusteln von Stecknadelkopf- bis Erbsengröße; die Umgebung erythematös gerötet. Die Autoren heben die Schwierigkeit der Diagnose hervor; dieselbe konnte erst gestellt werden, als die Patientin ihr 13 Monate altes Kind, das sie selbst stillt, vorwies, welches am Arm Pusteln nach einer 12 Tage vor Erkrankung der Mutter durchgeführten Impfung zeigte.

Walther Pick (Wien).

Siegel. Was wissen wir über den Vaccineerreger. (Kurze Bemerkungen zu dem Aufsatz Paschens in Nr. 49 dieser Wochenschrift.) (Münchener medicin. Wochenschr. 1906, Nr. 52.)

Enthält eine Entgegnung Siegels und eine Berichtigung einiger Punkte des in Nr. 49 d. Wochenschrift veröffentlichten Aufsatz Paschens.

Oskar Müller (Dortmund).

Menzies, Acworth und Jamieson, W. E. Vaccination of the cornea. The British Med. Journal 1907, Jan. 26. p. 198.

Menzies und Jamieson beschreiben folgenden Fall: Dem 2. Autor flog beim Aufbrechen einer Lymphtube ein Splitter ins rechte Auge. Trotz sorgsamer Auswaschung traten am 5. Tage Sehstörungen auf. Einen Tag später wurde ein stecknadelkopfgroßer Epitheldefekt im unteren äußeren Quadranten der Cornea konstatiert. Die Stelle vergrößerte sich und nahm 3 Tage später ein Viertel der Cornea ein. Die Erscheinungen an der Cornea waren von Conjunctivitis und Ödem der Lider begleitet. Die Behandlung bestand in Borwaschungen, Atropin und Duboisin. Nach anscheinender Besserung trat eine Ulzeration der affizierten Cornea auf, die sehr langsam heilte.

Fritz Juliusberg (Berlin).

Mühlens und Hartmann. Zur Kenntnis des Vaccine-erregers. Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. XLI, p. 203, 338, 435.

Mühlens und Hartmann geben in der vorliegenden ausführlichen Arbeit zuerst eine Übersicht über die neueren, den Gegenstand betreffenden Arbeiten, unterziehen die Arbeiten Siegels ebenso wie die, ähnliche oder gleiche Befunde enthaltenden Mitteilungen, einer scharfen aber gerechten Kritik. Darauf folgt eine eingehende Darlegung der eigenen Methoden, Untersuchungen und Resultate, die z. T. durch experimentelle, z. T. durch histologische Untersuchungen gewonnen wurden. Ihre Ergebnisse fassen die Autoren dahin zusammen, daß ein Kreisen des Vaccinevirus im Kaninchenkörper selbst bei verschiedenen Arten der Infektion mit großen Lymphdosen nicht nachgewiesen werden konnte, daß für die von Siegel beschriebenen Erreger der Vaccine weder der Nachweis der Protozoen-Natur nur ihre Spezifität für Vaccine nachgewiesen ist; sie kommen auch im Blute von normalen Kaninchen vor. Die Siegelschen Körper sind nicht identisch mit den Guarnierischen Körperchen. Die Spirochaeten Bonhoffs sind als Kunstprodukte anzusehen, die Guarnierischen Körperchen als Zerfallsprodukte der Kernsubstanz. Die Initialkörper Prowazeks sind nicht mit dem Siegelschen Cytorhythkes identisch und stellen vielleicht den Träger des Virus dar.

Wolters (Rostock).

Süpfle. Über spirochaetenähnliche Gebilde in Vaccine-lymphe. Zentralblatt f. Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. XL. p. 495.

Süpfle hat die Resultate Bonhoffs einer Nachuntersuchung unterzogen, indem er sowohl animale Glyzerinlymphe, als auch den Pustelinhalt von Erstimpfungen wie revaccinierten Kindern untersuchte und dann noch Blut- und Pustelinhalt eines Versuchstieres an verschiedenen Tagen durchmusterte. In der Glyzerinkälberlymphe fanden sich Bildungen, die den Abbildungen Bonhoffs entsprachen, die aber wegen der Unregelmäßigkeit ihrer Bildung, ausgefaserten Enden etc. als Spirochaeten nicht angesprochen werden dürfen. In den übrigen Untersuchungen wurde mit einer Ausnahme nichts gefunden. Der Autor kommt zu dem Schluß, daß die Spirochaeten in diesem Falle Artefakte seien, wenn er auch die Möglichkeit nicht bestreiten wolle, daß Spirochaeten eine Rolle in der Ätiologie der Vaccine spielen könnten.

Wolters (Rostock).

Reischauer. Über die Pocken der Vögel, ihre Beziehungen zu den echten Pocken und ihren Erregern. Zentralblatt f. Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. XL. p. 356, 474 u. 653.

Reischauer berücksichtigt in seiner vorliegenden Arbeit die bisherigen Untersuchungsergebnisse nach jeder Richtung und kommt auf Grund seiner eigenen Untersuchungen zu dem Resultate, daß die Pocken der Vögel durch ein Virus hervorgerufen werde, das filtrierbar und das äußerst widerstandsfähig gegen Kälte, Hitze und chemische Mittel sei. Auf Grund eingehender histologischer Untersuchungen glaubt er die in den Epithelzellen vorkommenden Zelleinschlüsse als die Parasiten ansprechen

zu sollen. Die Identität der Verhältnisse mit denen der Pocken läßt eine nahe Beziehung zwischen den Erkrankungen annehmen, wenn auch über Infektion der Tiere noch nichts bekannt ist, wie auch umgekehrt der Vogel mit Pockenvirus. Genauer muß bei der Fülle des Stoffes im Original eingesehen werden.

Wolters (Rostock).

Pröschner. Über die künstliche Züchtung eines unsichtbaren Mikroorganismus aus der Vaccine. Zentralblatt f. Bakteriologie und Parasitenkunde, Bd. XL. p. 337.

Pröschner geht in seiner Arbeit zuerst auf die bisherigen Untersuchungen über den Erreger der Vaccine ein, die er einer eingehenden Kritik unterzieht. Er folgert aus den vorliegenden Untersuchungen, besonders auch von Prowazek, der nachwies, daß die Guarnierischen Körperchen die Erreger nicht sein können, daß das Pockenvirus ein unsichtbarer Mikroorganismus sein müsse, der mit unseren jetzigen mikroskopischen Hilfsmitteln nicht sichtbar zu machen ist. Dabei ist das Pockenvirus nicht filtrierbar und mit unseren heutigen Färbeverfahren unfärbbar, aber es ist kultivierbar. Auf den gewöhnlichen Nährböden gelingt das nicht, weshalb der Verfasser einen solchen (die Art der Bereitung soll später angegeben werden) zusammengesetzte, welcher durch spezifische in ihm vorgehende Veränderungen das Wachstum erkennen ließ (homogene Trübungen in flüssigen, grau-weiße, schmierige Belege auf festen Nährböden). Überträgt man diese unsichtbaren Kulturen auf das Kalb, so gibt es eine gut ausgebildete, aber schwache Pustel, auf der Cornea erhält man die typische Vaccinekeratitis. Bei weiterer Kultur büßt das Virus seine Virulenz ein, nicht aber seine Vermehrungsfähigkeit. Die Virulenz stellt sich auch nach Verimpfung auf das Kalb nicht wieder her.

Wolters (Rostock).

Knoepfmacher, W., Wien (Karolinen-Kinderspital). Subkutane Vaccineinjektionen am Menschen. Wiener medizinische Wochenschrift 1906, Nr. 45.

Die ausführlich mitgeteilten Versuche ergaben folgende Resultate: Bei vaccineimmunem Menschen macht die Injektion höchstens ganz geringe, in den ersten Tagen vorübergehende lokale Reizerscheinungen. Bei voll empfänglichen Kindern, welche durch die Injektion keinen Vaccineschutz erfahren haben, geht die Injektion spurlos und ohne Hinterlassung von lokalen Erscheinungen vorüber. Von 7 Kindern haben 3 bei der Hautimpfung, welche am 13. Tage nach der subkut. Vaccineinjektion vorgenommen wurde, prompt reagiert und am 8. Tage zur vollen Höhe entwickelte Impfpusteln gezeigt und an der subkutanen Injektionsstelle war niemals eine Reaktion sichtbar. Kinder, welche noch nicht vacciniert waren und durch die subkut. Injektion vollständig immun wurden, haben in den ersten Tagen nach der Injektion gar keine Erscheinungen an der Injektionsstelle gezeigt, aber zumeist in der zweiten Woche entstehen plötzlich an der Injektionsstelle eine diffuse oder kleinfleckige Rötung und ein kleines Infiltrat. Drei Kinder haben bei der Revaccination, am 13. Tage nach der Subkutaninjektion vorgenommen, mit Pustelbildung,

eines mit Entstehung von Knötchen, reagiert. Diese 3 Kinder bekamen auch ein Infiltrat an der Injektionsstelle, aber verspätet. Von Interesse war es, das Verhalten der Leukocyten bei den Versuchen zu verfolgen. An zwei Kindern zeigte sich bei täglicher Zählung, das infolge der Lymphinjektion keine Leukocytose auftritt. Es zeigte sich ferner, daß der vaccineimmune Mensch (5 Beobachtungen) auf die Injektion von verdünnter Lymphe mit einer frühzeitigen, in den ersten 24 Stunden sich entwickelnden lokalen Reaktion antwortet, der noch nicht Vaccinierte dagegen in den ersten Tagen gar keine Veränderung zeigt, sondern erst in der zweiten Woche reagiert.

Viktor Bandler (Prag).

Hochsinger, Wien. Ein Fall von lokalisierter Generalvaccine. Wiener medizinische Wochenschrift 1906, Nr. 46.

Der Fall, über welchen Hochsinger hier berichtet, unterscheidet sich von den gewöhnlichen Fällen der Generalvaccine dadurch, daß die zweite Eruption der Vaccinepusteln nicht ein über den ganzen Körper ausgebreitetes Exanthem bildete, sondern sich lediglich in der Umgebung der primären Impfstellen lokalisierte. Am 15. Tage nach der erfolgreichen Impfung des 3 Monate alten Brustkindes entwickelten sich unter Fieber auf der geröteten Umgebung der Krusten der Impfstellen Bläschen von Linsengröße, welche die primäre Impfstelle kreisförmig umgaben und die Eigenschaften der Vaccinepocken aufwiesen. Hochsinger glaubt, daß in diesem Falle die Neueruption von Impfpocken auf hämatogenem Wege entstanden ist und zwar ist die starke Hautkongestion und Hyperämie, welche in dem beobachteten Falle am Ende der zweiten Woche in der Umgebung der Impfstellen vorherrschte, für die Proluption des zweiten Pockenexanthems verantwortlich zu machen. Viktor Bandler (Prag).

Jansen. Über die Resistenz des Tuberkulins dem Licht gegenüber. Zentralblatt für Bakteriologie u. Parasitenkunde. Bd. XLI. p. 677 und 775.

Jansen ging bei seinen Experimenten in der Weise vor, daß er gekochte Tuberkelbazillen in dünner Schicht einer intensiven Beleuchtung aussetzte, und dann die Menge verimpfte. Auf der andern Seite wurden mit stark belichtetem Alt- und Neutuberkulin gesunde und tuberkulöse Versuchstiere eingespritzt. Die Belichtung hatte absolut keinen Einfluß, im ersten Falle entwickelten sich miliare Tuberkel, teilweise sogar mit miliarem Bau, Riesenzellen, Epitheloidzellen. Bazillen und Bazillenbrocken lagen hie und da zwischen den epitheloiden Zellen. Nekrotische Partien waren in der Regel nicht vorhanden. Die mit lebendem Materiale geimpften Tiere gingen rascher zu Grunde und boten das Bild einer akuten Miliartuberkulose dar. Die Versuche mit stark belichtetem Tuberkulin ergaben bezüglich einer Abschwächung keinerlei Resultate. Das spezifische Toxin ist außerordentlich resistent gegen die Belichtung. Die mit dem belichteten Tuberkulin injizierten Tiere gingen sehr rasch zu Grunde und zeigten in allen tuberkulösen Organen sehr starke Hyperämie um die kranken Stellen.

Wolters (Rostock).

Fermi, Claudio. Die saccharifizierende Wirkung des *Bac. tuberculosis*. Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. XL. p. 187.

Fermi teilt in der vorliegenden kurzen Arbeit seine Resultate mit, welche ergeben haben, daß der *Bac. tuberculosis* ebenso wie die früher von dem Autor untersuchten *Streptothrix*-Arten aus den kartoffelhaltigen Nährböden Zucker zu erzeugen vermögen. Diese neue und bis jetzt unbekannte Eigenschaft bringt den Tuberkelbazillus den *Streptothrix*-Arten immer näher.

Wolters (Rostock).

Anzilotti. Über ein besonderes Kulturverfahren für den Tuberkelbazillus auf Kartoffeln. Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. XL. p. 765.

Anzilotti schildert sein seit 10 Jahren bereits benutztes Verfahren, den Tuberkelbazillus auf Kartoffeln zu züchten, und betont dessen Bedeutung, da die Kulturen viel rascher und üppiger gedeihen und wie es scheint, virulenter werden als auf anderen Nährböden. Aus geschälten, weißfleischigen Kartoffeln werden mit dem Korkbohrer 4 cm lange Stücke ausgestochen, die Stücke durch schrägen Schnitt halbiert, wodurch längere Kulturflächen entstehen. Abwaschen in Aqua dest., Kochen in 6% Glycerinlösung, die mit gesättigter Lösung von kohlensaurem Natron alkalisch gemacht wurde, bis sie ganz weich und stark aufgequollen sind, zirka 20 Minuten, während dessen muß auf die Reaktion geachtet werden und Natronlösung zugesetzt werden, sobald sie sauer wird. Die präparierten Stücke kommen in Reagenzgläser mit unterer Verengung, in den unteren Raum kommt von der erwähnten Glycerinlösung, bis sie die Kartoffel erreicht und durchtränkt. Drei Tage Sterilisation im Kochschen Topf 20 Minuten, einmal 20 Minuten im Autoklav bei 120 Grad. Verhindert man die Verdunstung durch Gummikappe oder Siegellack, so können die Kulturen monatelang aufgehoben werden, ohne daß ihre Virulenz nachläßt.

Wolters (Rostock).

Audry. Leucoplasie et épithéliomatose surtuberculeuses. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1078.

Audry teilt 3 Fälle von Leukoplakie mit, welche nicht auf luetischer Basis entstanden waren, sondern bei welchen die histologische Untersuchung unter der Leukoplakie ein tuberkulöses Infiltrat ergab; im ersten Falle handelte es sich um eine Leukoplakie der Zunge bei einem Patienten, der an einem Tumor tuberkulöser Natur in der Rinde des Kleinhirns und Meningitis starb; im zweiten Falle um eine Leukoplakie der Vulva bei einer 60jährigen Frau, im dritten um eine Leukoplakie der Oberlippe bei einem Phthisiker. Audry glaubt, daß sich auch Epitheliome aus solchen Leukoplakien häufiger entwickeln als im allgemeinen angenommen wird.

Walther Pick (Wien).

Darier et Brissay. Tuberculides papulo-nécrotiques transformées in situ en lichen scrofulosorum, chez une fillette de 13 ans atteinte de tuberculose osseuse et ganglionnaire. Ann. de dermat. et de syph. 1906 p. 1075.

Ein 13jähriges Mädchen zeigt am Stamm, an den Armen und Schenkeln stecknadelkopfgröße Knötchen, die im Zentrum gelblich verfärbt erscheinen. Histologisch zentrale Nekrose in einem Infiltrationsherd. Vierzehn Tage später hat sich das Aussehen der Affektion gänzlich geändert. Die Knötchen sind hirsekorn groß, kupferfarben, an Stelle der zentralen Nekrose findet sich eine kleine Kruste. Histologisch ein Tuberkel mit einer Riesenzelle und umgebenden epitheloiden und lymphoiden Zellen.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Macé de Lépinay. Sur l'atténuation de la virulence du bacille de Koch chez les lupiques. *Ann. de dermat. et de syph.* 1906. p. 693.

Hallopeau versucht den Beweis für die schwächere Virulenz der Tuberkelbazillen beim Lupus dadurch zu erbringen, daß er nachweist, daß die Lungenaffektionen Lupöser sich durch ihre Gutartigkeit auszeichnen; dies ist der Fall bei 16 Lupösen seiner Abteilung, von welchen 8 ganz leichte und nur 1 schwerere Lungenerscheinungen aufweisen.

Walther Pick (Wien).

Evans, W. Der gegenwärtige Stand der Behandlung des Lupus vulgaris. *The Brit. Journ. of Dermat.* Februar 1907.

An bedeckt getragenen Körperstellen: Excision; im Gesichte: Röntgenstrahlen, in zweiter Reihe Finsenlicht. In Fällen, in denen „die Neigung zum Rückfall groß und das Gebiet ausgedehnt ist“, Tuberkulinbehandlung unter Beachtung des opsonischen Index.

Paul Sobotka (Prag).

Morestin. Tuberculose cutanée. Extirpation, greffe italienne. *Ann. de dermat. et de syph.* 1906. p. 684.

Demonstration eines 7jährigen Kindes, bei welchem ein tuberkulöses Ulcus am Vorderarm excidiert und dann mittelst italienischer Plastik von der Haut der Vorderseite des Stammes zweizeitig gedeckt wurde.

Walther Pick (Wien).

Balzer et Poisot. Lupus avec lymphangiectasies et lymphorragies. *Ann. de dermat. et de syph.* 1906. p. 679.

Bei einem 64jährigen Patienten findet sich der linke Fuß und das untere Drittel des Unterschenkels ödematös, gerötet, die Haut und das Subkutangewebe induriert; auf dem roten Grunde zahlreiche violette Knötchen, insbesondere am Fußrücken und an den Zehen. An der Basis der Zehen ein Geschwür mit lividen Rändern; an der Innenseite des Fußes ist ein größerer Knoten aufgebrochen und läßt serösen Eiter zu Tage treten. An der Achillessehne eine nußgroße Erhabenheit; an der Innenseite des Unterschenkels bis über das Knie hinauf reihen sich derartige Knoten aneinander. Die kruralen Lymphdrüsen vergrößert. Über dem rechten Malleolus Pigmentflecke; am linken Handrücken finden sich in fünf kleinen Herden gruppiert rotviolette, wenig infiltrierte Knoten. Ähnliche an den Armen. Nach jedem Versuch, die Geschwüre und Knoten am Bein mit dem Galvanokauter zu zerstören, stellt sich eine 3—4 Tage anhaltende reichliche Lymphorrhoe an der betreffenden Stelle ein; an der

oberen Extremität fehlt dieses Symptom. Die Autoren verweisen auf ähnliche Fälle von tuberkulöser, angiektatischer Lymphangitis. — Die später vorgenommene Untersuchung des Falles ergibt, daß es sich um ein *Sarcoma idiopathicum cutis* handelt (cf. Bulletin de la soc. franç. de dermat. et de syph. 1907. p. 12).

Walther Pick (Wien).

v. Baumgarten. Zur Kritik der ascendierenden Tuberkulose im weiblichen Genitaltrakt. Berl. Klin. Wochenschrift Nr. 3. 1907.

Die Ergebnisse neuerer experimenteller Untersuchungen von Jung und Benecke über das Ascendieren tuberkulöser Prozesse im weiblichen Genitaltrakt stehen nur scheinbar im Widerspruch zu den Resultaten der Arbeiten v. Baumgartens und seiner Mitarbeiter über diesen Gegenstand, welche in der Regel eine Ausbreitung der Tuberkulose in der Richtung des Sekretstromes, also deszendierend, annehmen. Denn einerseits fanden Jung und Benecke stets starke tuberkulöse Erkrankung der abwärts von der Infektionsstelle gelegenen Genitalteile, also auch Deszension, andererseits trat Aszension wohl nur dann ein, wenn durch die Art der infizierenden Operation eine Urinstauung oberhalb der künstlich krank gemachten Stelle hervorgerufen worden war.

H. Hübner (Frankfurt a. M.).

Audry et Combéleran. Ulceration tuberculeuse de la vulve, chez une fillette de 11 mois. Ann. de dermat. et de syphil. 1906. p. 167.

Bei einem einjährigen Mädchen findet sich an der rechten Seite der Vulva ein Geschwür, das klinisch und histologisch die Charakteristica des tuberkulösen Geschwüres zeigt; es sitzt wesentlich an der Innenfläche des Labium minus, die Umgebung ist hochgradig geschwollen und gerötet. In der rechten Inguinalfalte gleichfalls ein Geschwür als Residuum verweiterter Lymphdrüsen, in der linken Inguinalfalte zwei vergrößerte, nicht erweichte Drüsen. Heilung der Geschwüre nach Exkochleation und Kauterisation. Die Infektion dürfte durch die Mutter erfolgt sein, in deren Sputum zahlreiche Bazillen nachweisbar waren. Walther Pick (Wien).

Danlos et Pathaut. Tuberculose vulvaire et leucoplasie. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 675.

Bei einer 44jährigen Patientin findet sich ein Geschwür, welches das linke große Labium und die Umgebung der Clitoris einnimmt. Excision, Heilung. Überimpfung eines Teiles des excidierten Stückes auf ein Meerschweinchen gibt ein negatives Resultat. 5 Jahre später findet sich folgender Befund: Die Haut an der gleichen Stelle leukoplakisch verändert, stellenweise erodiert. In der Umgebung der Clitoris finden sich mehrere papilliforme, weiche, von einem weißlichen Epithel bedeckte Tumoren. Die Autoren denken an Tuberkulose. Die von Gastou vorgenommene histologische Untersuchung zeigt Ansammlung von lymphoiden Zellen teils diffus, teils in perivaskulären Haufen; auf Grund dieser Ähnlichkeit mit dem Boeckschen Sarcoid glaubt Gastou die Affektion den Tuberkuliden nähern zu können.

Walther Pick (Wien).

Morestin. Deux cas de lupus de la face traités opératoirement. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 583.

Demonstration zweier Fälle von Lupus der Wange, die nach Exstirpation durch Lappenbildung aus der Haut des Halses gedeckt wurden. (Abbildungen beigelegt.) Walther Pick (Wien).

Hallopeau. Sur deux cas de gommes lymphangitiques ascendantes chez les lupiques. Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 574.

Hallopeau berichtet über einen Patienten mit Lupus faciei, welcher von einem tuberkulösen Abszeß an der großen Zehe aus, zwei skrofulöse Gummern am Fuße bekommen hatte. Ein zweiter Fall, der außer im Gesicht auch an der Hand einen Lupus aufwies, bekam, von diesem letzteren ausgehend, den ganzen Vorderarm entlang bis zum Ellbogengelenk kleine skrofulöse Gummern. Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Roy. Sur un cas de suppurations tuberculeuses multiples avec grains riziformes. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 305.

Bei einem 34jährigen Patienten finden sich im Gesicht, an den Extremitäten und am Penis violett gefärbte, abszeßähnliche Knoten, zum Teil in der Tiefe gelegen und nur durch die Haut durchtastbar. Daneben an den Extremitäten wuchernde Formen, an den Fingern spinae ventosae. Die Abszesse enthalten krümmelige Massen, wie sie sich sonst nur bei der tuberkulösen Synovitis tendinosa finden. Da keine Bazillen nachweisbar sind, halten die Autoren auch diese Affektion für tuberkulotoxischen Ursprungs. Walther Pick (Wien).

Danlos et Dehéraïn. Tuberculose serpiginieuse des membres inférieures. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 270.

Ein 55jähriger Patient zeigt seit 47 Jahren eine ursprünglich serpiginöse, gegenwärtig mehr herdförmige, über Glutaealregion und Beine ausgedehnte Hauttuberkulose, welche trotz des langen Bestandes auf sein Allgemeinbefinden ohne Einfluß geblieben ist. Fournier macht darauf aufmerksam, daß derartige Erscheinungen auch durch phagedaenische Geschwüre und durch Syphilis hervorgerufen werden können.

Walther Pick (Wien).

Civatte. Note pour servir à l'étude des tuberculides papulo-squameuses. Trois cas de tuberculides a forme de parapsoriasis. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 209.

Civatte bringt die Krankengeschichte dreier Fälle von Parapsoriasis, die große Ähnlichkeit mit einander zeigen. Die Eruption findet sich am Stamm und den Extremitäten disseminiert; Kopf, Gesicht, Hals, Hände und Füße sind frei. Die primäre Effloreszenz ist eine halbkugelige, linsengroße, blaßrosa gefärbte Papel mit normaler Epidermis; auf Kratzen tritt eine geringe Haemorrhagie ein. Wenn das Infiltrat verschwindet, bildet sich eine trockene, dünne, wenig adhärente Schuppe, die sich ohne Häorrhagie entfernen läßt. Nach Abfallen der Schuppe bleibt zuweilen eine Narbe zurück, die aber bald schwindet. Subjektive Symptome

fehlen. Die Dauer der einzelnen Effloreszenz beträgt 4 Wochen im Mittel; die Krankheit selbst erneuert sich immer wieder in Schüben und ist sehr resistent gegen jegliche Therapie; sie befällt nur jugendliche Individuen zwischen 20 und 30 Jahren, in zwei von den drei Fällen wurde der Beginn von einer Pharyngo-Laryngitis begleitet. Zwei Fälle waren tuberkuloseverdächtig, im dritten Falle war die Mutter an Tuberkulose gestorben. Histologisch fanden sich in zwei Fällen in dem Infiltrat des Initialstadium neben Lymphocyten auch epitheloide und Riesenzellen; im dritten Falle fanden sich histologisch gar keine Anhaltspunkte für Tuberkulose, dafür zeigte der Fall klinisch große Ähnlichkeit mit dem Bilde des Lichen serofulosorum. Tuberkelbazillen wurden in keinem Falle gefunden. Der Autor identifiziert diese Fälle von Parapsoriasis mit der Dermatitis psoriasiformis nodularis (Jadassohn), und glaubt dieselben in die Gruppe der Tuberkulide einreihen zu können. Walthers Pick (Wien).

Brault, Tuberculides papulo-nécrotiques étendues, avec déformations digitales très accentuées. Ann. de dermat. et de syph. 1906, p. 73.

In narbig veränderter Haut beider Vorderarme und Hände finden sich zahlreiche Knötchen eingesprengt, daneben an den Phalangen Geschwüre, die nur langsam heilen, und Knochendefekte.

Walthers Pick (Wien).

Mibelli, V. Disseminierte Miliartuberkulose des Haarbodens. Vortrag gehalten in der italienischen Gesellschaft für Dermatologie und Syphiligraphie in Mailand am 18. September 1906. Monatshefte für prakt. Dermatologie, Bd. XLIV.

Der Vortrag ist im Giornale Italiano delle Malattie veneree e della pelle. Bd. VI. 1906 erschienen.

Ludwig Waelsch (Prag).

Batut. Traitement de la tuberculose du testicule. Annales des Maladies des organes génito-urinaires, Bd. II. 24. Jahrgang 1906 Nr. 16.

Batut berichtet über 11 Fälle von Hodentuberkulose, die er als Militärarzt unter den Soldaten seit 1897 zu beobachten und zu operieren Gelegenheit hatte. Er gibt zuerst eine eingehende Übersicht über die Literatur dieses Gebietes und läßt die ausführlichen Krankengeschichten der elf Fälle folgen. In 3 Fällen waren die Hoden allein erkrankt, in vier die Nebenhoden, in den übrigen Hoden und Nebenhoden gemeinsam. Die Behandlung bestand in Auskratzung mit nachfolgender Kauterisation, in Epididymectomie, in Kastration. Alle operierten Fälle kamen zur Heilung; in einem kam es durch Hinzutreten einer Meningitis zum Exitus, bevor die Operation ausgeführt werden konnte. Bartsch (Breslau).

Rovsing, Th. Über die Bedeutung der Blasentuberkulose und die Heilbarkeit derselben. Archiv für klinische Chirurgie (Langenbeck) Band LXXXII. pag. 1.

Nach Rovsings Erfahrungen, die er an dem umfangreichen Material von 56 Fällen gesammelt hat, ist die „Blasentuberkulose gewöhnlich von einer primären Tuberkulose der einen oder der anderen Niere

verpflanzt“. Diese Ansicht steht im Gegensatze zu der so lange bestehenden und von den Chirurgen allgemein akzeptierten Lehre Gyons. Nur die Exstirpation der erkrankten Niere kann Heilung der Blasentuberkulose bringen. Die Diagnose ist sicher nur durch Uretheren-Katheterismus, in besonderen Fällen durch Ureterostomie von einem explorativen Lumbalschnitt herzustellen. Die Entfernung der erkrankten Niere bringt häufig Spontanheilung; sonst empfiehlt Rovsing Injektionen von 50 ccm einer 6%igen warmen Karbollösung, die, 3—4mal wiederholt, je 3—4 Minuten in der Blase bleibt. Die Heilung trat, abgesehen von einem Todesfall, immer ein. Bartsch (Breslau).

Mirabeau, Sigm. Über Nieren- und Blasentuberkulose bei Frauen. Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. Bd. XXIII. pag. 197.

Mirabeau berichtet über einen Fall von linksseitiger Nierentuberkulose bei einer 38jährigen Frau, den er, trotz Abwesenheit von Tuberkelbazillen, vermittelst Kystoskop diagnostizierte und mit gutem Erfolge operierte. Daran anschließend gibt Mirabeau seine Erfahrungen betreffs Nieren- und Blasentuberkulose bei Frauen wieder. Verf. hält die Blasentuberkulose bei Frauen ausnahmslos für sekundär, deszendierend, von der Niere aus entstanden. In mindestens 50% der Fälle soll die Nierentuberkulose einseitig sein. Sie kann mit Hilfe des Kystoskops und des Ureterenkatheterismus mit Sicherheit konstatiert werden. Als wertvolles Symptom will Verf. die bimanuell feststellbare Verdickung des Ureters hinzugefügt wissen. Mirabeau glaubt, daß die Funktionsfähigkeit der nicht erkrankten Niere sich durch die klinische Beobachtung und die chemische und mikroskopische Untersuchung des isoliert aufgefangenen Urins mit genügender Sicherheit feststellen lasse. Die Therapie bei einseitiger Erkrankung besteht einzig in der frühzeitigen Exstirpation wobei bestehende Schwangerschaft eine Kontraindikation nicht bedingt.

M. Winkler (Luzern).

Spitzer. Association de lupus érythémateux et de lupus tuberculeux. Ann. de dermat. et de syph. 1907. p. 189.

Spitzer weist darauf hin, daß Lupus vulgaris und erythematodes, wenn sie die gleiche Ätiologie hätten, häufiger kombiniert vorkommen müßten. Er fügt den beiden derartigen, von Besnier und Lacavalerie mitgeteilten Fällen einen weiteren an. Ein 36jähriger Patient zeigt eine 5 Jahre zurückdatierende Hautaffektion im Gesichte, die wiederholt als Lupus erythematodes behandelt wurde. Innerhalb theils narbiger, theils erythematös geröteter Partien an beiden Wangen und am rechten Ohr finden sich an verschiedenen Stellen isolierte oder konfluierende Lupusknötchen. Die Herde werden excidiert; in späterer Zeit stellt sich Patient wiederholt mit Recidiven von Lupus erythematodes vor. Histologisch fand sich an den Erythematodesstellen ein theils diffuses, theils perivaskuläres Infiltrat, in den Vulgarisstellen Tuberkel mit zentraler Nekrose und Riesenzellen; in zwei Schnitten Tuberkelbazillen.

Walther Pick (Wien).

Polland. Lupus pernio. Derm. Zeitschr. Bd. XIII. p. 791

Pollands Fall betrifft einen 52jähr. Landmann, welcher seine Hauterkrankung seit einigen Monaten bemerkt. Anamnestisch wäre zu bemerken, daß er seit kurzer Zeit an Herzklopfen, Atemnot und Magenbeschwerden leidet, weswegen er das Spital aufsucht. Die Hauterkrankung hat sich seit Auftreten obiger Symptome wesentlich verschlimmert. Bei dem an einer Mitralinsufficiens leidenden Patienten finden sich zweierlei Effloreszenzen. Erstens zwei große bläulichrote Herde, von polsterartigem weichelastischem Baue an der Nase und Glabella, und zweitens eine Reihe kleiner leicht prominenter Knötchen von gelblicher Farbe, welche stellenweise zu Gruppen konfluieren sind und sich an verschiedenen Stellen der Haut vorfinden. Der mikroskopische Befund ergibt, daß die Hauptveränderungen in der Cutis propria sitzen. Diese ist von zahlreichen Knötchen durchsetzt, deren Zentrum aus epitheloiden Zellen besteht. Vereinzelt finden sich auch Riesenzellen. Polland kommt zu dem Schlusse, daß sein Fall eine weitere Bestätigung für die Berechtigung der Aufstellung des Lupus pernio als eigenartige in die Gruppe der Hauttuberkulosen gehörige Erkrankung sei. Fritz Porges (Prag).

Neutra, Wilhelm. Über Jodophilie bei Scarlatina. Zeitschr. für Heilk. Bd. XXVII. Heft 11. 1906.

Die Jodreaktion ist zu den konstanten Symptomen bei Scarlatina zu zählen. Sie konnte stets bereits bei der ersten Untersuchung eines jeden Falles konstatiert werden. Ihre Intensität war gewöhnlich in den ersten Tagen der Erkrankung am deutlichsten, um dann gewöhnlich sehr rasch abzuklingen, doch war in einzelnen Fällen die Jodophylie noch längere Zeit nach der Entfieberung im Stadium der starken Abschuppung zu beobachten. Die Eosinophilie zeigte dabei ein verschiedenes Verhalten. In einem Teile der Fälle konnte während der Eruption und im Höhe-stadium des Exanthems überhaupt keine oder nur eine geringe Vermehrung der eosinophilen Zellen nachgewiesen werden, während ihre Prozentzahl in den späteren Stadien der Erkrankung zu bedeutenden Werten anwuchs. In anderen Fällen zeigte sich der entgegengesetzte Typus, indem anfänglich ein gewisser Grad von Eosinophilie zu konstatieren war, und im weiteren Verlaufe der Erkrankung, also nach Ablauf des Fiebers, eine Verminderung der eosinophilen Zellen eintrat. Neutra macht darauf aufmerksam, daß bei bestehendem intensiven, vielleicht zweifelhaften Exanthem das einfach herzustellende Jodgummipräparat eines getrockneten aber nicht fixierten Blutaussstriches die Diagnose auf Skarlatina sicherstellt, wenn Jodophilie und Eosinophilie erhoben werden können. Weder bei anderen akuten Exanthemen noch bei Arzneiexanthemen konnte er die Koexistenz der beiden Erscheinungen im Blutbilde beobachten. In prognostischer Beziehung zeigte sich, daß das rasche Verschwinden der jodophilen Zellen für einen günstigen Verlauf, das massenhafte Auftreten derselben und ihre Beständigkeit mit der Schwere der Erkrankung parallel gehen.

Alfred Kraus (Prag).

Jenkins, Lynn. The incubation of scarlet fever. The British Med. Journal. 1907. Jan. 26. pag. 199.

Jenkins weist auf die vielen Scharlachverdächtigen hin, die auf falsche Diagnose hin in Scharlachhospitälern Aufnahme finden. Diese Personen geben durch den bekannten Infektionstermin im Hospital selbst Gelegenheit, die Inkubationszeit des Scharlachfiebers, über die noch Zweifel bestehen, festzustellen. Er beobachtete 13 derartige Fälle, die 3—4 Wochen nach dem Kontakt die Charakteristika der Krankheit zeigten.

Fritz Juliusberg (Berlin).

Gooding, Simonds. Scarlatiniform rash after burn. The British Med. Journal. 1907. Feb. 9. pag. 313.

Goodings Patient bekam nach einer Verbrennung am linken Arm und an linker Schulter ein scharlachähnliches Exanthem am ganzen Körper, das unter Abschuppung abheilte.

Gooding glaubt in diesem Fall Scharlach ausschließen zu können, erstens wegen Fehlens des Fiebers und der allgemeinen Initialsymptome, zweitens weil der Ausschlag so lange bestand, als die Verbrennung nicht geheilt war, also offenbar durch septische Absorption veranlaßt war und drittens weil die nicht isolierten Geschwister des Patienten keinen Scharlach bekamen.

Fritz Juliusberg (Berlin).

Berry Poole. The persistence of the infection in certain cases of scarlet fever. The Lancet 1907. Jan. 12. pag. 88.

Berry beobachtete bei einer größeren Scharlachepidemie, wo er mehrere Kinder derselben Familie behandelte, daß zwischen der Heilung der erstinfizierten und den späteren Infektionen derselben Familie oft viel größere Zwischenräume bestanden, als die Lehrbücher angeben. Er nimmt an, daß die Genesenden noch längere Zeit Träger des infizierenden Virus sind.

Fritz Juliusberg (Berlin).

Scholz, Wilhelm. Über Miliaria epidemica. Zeitschrift für klinische Medizin. Bd. LIX. pag. 542.

Scholz hatte Gelegenheit, anlässlich einer Miliaria-Epidemie in Niederösterreich im Mai 1905 31 Fälle dieser Krankheit zu untersuchen, deren Krankengeschichten er kurz resümiert. Der ganze Krankheitsverlauf kann nach Scholz in 3 Stadien eingeteilt werden: 1. das Stadium des Schweißes, 2. das Stadium des Hautausschlages und 3. das Stadium der Rekonvaleszenz. Ein Prodromalstadium ist nicht immer vorhanden. Selten ist der Beginn ein plötzlicher, meist stellen sich zuerst allgemeine Krankheitsgefühle ein, wie Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend, Frösteln, Kopfschmerz, Schwindel, Halsweh etc. Unter Hitzegefühl oder Frösteln, seltener unter Schüttelfrost entsteht ein profuser Schweißausbruch von 3—6 stündiger Dauer. Nach mehrstündigen Pausen kann sich letzterer wiederholen oder auch ohne Unterbruch mehrere Tage (9—10 Tage) anhalten. Die Temperatur steigt während des Schwitzens selten über 38°. Häufig Schmerzen oder Beklemmung auf der Brust. In diesem Stadium kann es schon zu Exitus letalis unter den Zeichen der Herzschwäche kommen.

Nach dem Schweiße kann die Temperatur bis 40 und 41° C. steigen (Stadium der trockenen Hitze). Hierauf folgt das Exanthem in Form von linsen- bis stecknadelkopfgroßen Bläschen, welche zuerst am Halse oder an den oberen Brustpartien auftreten und sich über den Stamm ausbreiten. Die Bläschen sind serös ohne deutlichen roten Hof, die Haut in weiter Ausdehnung diffus gerötet. Nach 1—2 Tagen trübt sich der Inhalt und es kommt zur Borkenbildung. Fallen die Borken ab, so bleiben noch längere Zeit dunklere Pigmentationen zurück, häufig kommt es zu kleinförmigen Abschuppung. Während des Exanthems gehen das Fieber und die Schmerzen zurück. Allmählich tritt das Rekonvaleszenzstadium ein, die Kräfte kehren aber nur langsam zurück. Im Bläscheninhalte fanden sich reichlich eosinophile Zellen, Kokken und kleine Stäbchen. Ob letztere mit dem Bazillus Eppingers identisch sind, wagt Scholz nicht zu entscheiden. Betroffen wurden hauptsächlich Frauen, Wochenbett und Menses wirkten prädisponierend. Wie die Übertragung zu stande kam, ließ sich nicht feststellen. Die hygienischen Verhältnisse in der Epidemiegegend sind laut Verf. sehr ungünstig.

M. Winkler (Luzern).

Erythematöse, ekzematöse, parenchymatöse Entzündungsprozesse.

Milian. Érythème miliaire leucogénique prurigineux chronique. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 48.

Bei einem 48jährigen, sonst gesunden Patienten, der seit 6 Jahren häufig an Urticaria litt, trat ein aus kleinsten roten, von einer weißen Zone umgebenen Flecken bestehendes flüchtiges Exanthem auf; nach Abklingen des mit heftigem Jucken einhergehenden Erythems blieben weiße Flecke zurück; die Affektion besteht seit drei Monaten und trotz jeder Therapie. Auf vegetabilische Diät und Milch leichte Besserung. Der Autor nimmt an, daß es sich um eine atypische Urticariaform handelt.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Rey. Sur un érythème de l'avant-bras et ses caractères particuliers. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 53.

Auf dem l. Vorderarm einer Patientin, welche alte Narben nach vereiterten Lymphdrüsen am Halse und einen frischen tuberkulösen Prozeß in den Lungenspitzen aufweist, finden sich mehrere, nahezu in einer Linie angeordnete Knoten. Die Autoren halten die Affektion für ein Erythema induratum, das bemerkenswert erscheint durch die geringe Ausdehnung der Affektion und durch die lichtere Färbung der einzelnen Knoten.

Walther Pick (Wien).

Audry et Combéleran. Suite et fin d'une observation d'érythrodermie pustuleuse prémycosique terminée par la mort avant l'apparition des tumeurs.

Die Autoren bringen die Fortsetzung der Krankengeschichte eines bereits wiederholt demonstrierten Patienten, bei welchem eine universelle Erythrodermie bestand, welche durch das Auftreten von Phlyktänen und nußgroßen Tumoren, die nach einem Bestand von nur wenigen Tagen wieder schwanden, kompliziert war. Keine Leukocytose. Im Gefolge einer Nephritis trat Kachexie und Tod ein. Die Autoren glauben nicht an eine Beziehung der Mykosis zur Leukämie, halten dieselbe vielmehr für eine Infektionskrankheit, möglicherweise durch einen Blutparasiten hervorgerufen.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau. Sur l'apparition d'exanthèmes identiques après d'ingestion d'antipyrine, d'aspirine et de pyramidon. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 383.

Bei einer 57jährigen Patientin trat stets wenige Stunden nach der Einnahme von Antipyrin ein zum Teil bullöses Erythem am linken Bein, am Unterbauch und am linken Daumen auf. Den gleichen Effekt hatte Aspirin und nach 0.3 Pyramidon trat zu diesem Bilde noch Dysurie und hochgradige Schwellung mit Blasenbildung auf der Vulva auf.

Walther Pick (Wien).

Nicolas et Favre. Érythème cutané en larges placards extensifs avec atrophodermie a type maculeux chez un tuberculeux. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 625.

Bei einem 54jährigen Patienten, der vor 8 Jahren eine Pleuritis durchgemacht hat, traten im Anschluß an diese auf der Haut der Extremitäten, besonders aber am Stamme, erythematöse, stellenweise leicht juckende Flecke auf, die seit einigen Monaten sich peripher ausbreiten, infiltriert erscheinen und eine glänzende, hie und da feine Schuppung zeigende Oberfläche aufweisen. Im Zentrum der Herde atrophische, zu meist runde Flecke von 50 Centimes- bis zu Frankstückgröße, weiß, deprimiert. Innerhalb der erkrankten Partien erscheint die Epidermis zart gefältelt und über den tieferen Schichten beweglich, als ob sie von denselben losgelöst wäre. Die histologische Untersuchung zeigte eine Verdünnung der Epidermis, wobei die Zellen ganz abgeflacht erscheinen. In den oberen Cutisschichten, deren Papillen abgeflacht erscheinen, findet sich ein hauptsächlich perivaskulär angeordnetes Infiltrat, das sich aus kleinen Rundzellen mit einigen Mastzellen zusammensetzt. Plasmazellen fehlen gänzlich. Innerhalb der atrophischen Partie ist die Epidermis von der Cutis durch eine mehr oder weniger infiltrierte Bindegewebsschicht getrennt, innerhalb welcher das Netz der elastischen Fasern gänzlich geschwunden ist. Die Autoren identifizieren ihren Fall mit den von Heuss, Jadassohn etc. publizierten Fällen von makulöser Hautatrophie, wobei sie aber, wie sie dies auch in der von ihnen gewählten Bezeichnung der Erkrankung ausdrücken, auf das Erythem das Hauptgewicht legen. Sie reihen die Krankheit unter die Toxituberkulide.

Walther Pick (Wien).

Brocq et Fage. Éruption érythémateuse et papuleuse causée par la vanille. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 926.

Bei einer 23jährigen Patientin, welche 14 Tage lang mit der Packung von Vanille beschäftigt war, tritt ein Erythem auf, durch welches das Gesicht rot, geschwollen erschien (ähnlich dem Erysipel), die Stirne ist dicht mit kleinsten Knötchen besetzt, die Augenlider und Ohren sind geschwollen, die letzteren auch mit bräunlichen Krusten besetzt. Auch auf den oberen Brustpartien finden sich kleine, flache Papeln auf erythematöser Basis. An Händen und Vorderarmen, wesentlich auf der Streckseite, ferner am Thorax finden sich entzündliche Knötchen zum Teil mit Neigung zur Gruppierung. Unter indifferenter Paste rasche Besserung.

Walthar Pick (Wien).

Wende, Grover W. Erythema perstans, with report of two cases involving circinate lesions. The Journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. Nr. 6. 1906.

Wende zieht aus einer Beschreibung von zwei eigenen Fällen des Erythema perstans und mehreren Fällen der Literatur (Ward, Payne, Hartigan, Radcliffe Crocker, Colcott Fox, Arning, Winfield) folgende Schlüsse: Die Affektion tritt in einfachen, chronisch entzündlichen Flecken, ein anderesmal in diffusen Flecken, Papeln oder Knötchen auf; häufig tritt Rückbildung im Zentrum ein und bleiben ringförmige und gewundene Figuren zurück.

Es gibt kein Gesetz bezüglich ihrer Dauer, welche Wochen, Monate, Jahre, aber auch die ganze Lebenszeit betragen kann.

Die Ätiologie ist unbekannt; kein Alter ist verschont; häufiger erscheinen Männer erkrankt. In den berichteten Fällen scheinen intestinale Toxämie, gichtische oder rheumatische Diathese und atmosphärische Verhältnisse die Ursachen gewesen zu sein.

In allen Fällen, die untersucht wurden, waren mikroskopisch oberflächliche Entzündung, Erweiterung der Blutgefäße, Zellinfiltration und Ödem nachzuweisen.

In der Diskussion spricht sich Fordyce bezüglich ähnlicher von ihm gesehener Fälle für eine paralytische Störung des neurovaskulären Systems aus; der Hochfrequenzstrom war in zwei seiner Fälle von vorzüglichem Einfluß; Schamberg sah in einem Fall guten Erfolg von Chrysarobin, Winfield sah in einem Falle mit dem Eintritt der Menstruation das seit 21 Monaten bestehende Exanthem (Gesicht, Hals, Brust) rapid verschwinden.

Rudolf Winternitz (Prag).

Symes, Odery. A clinical lecture on erythema nodosum and rheumatism. The Lancet 1907. Jan. 26. p. 207 ff.

Über die Auffassung des Erythema nodosum — führt Symes aus — bestehen zwei verschiedene Meinungen: die einen halten das Erythema nodosum für eine akute Infektionskrankheit von bestimmter spezifischer Natur; die anderen für eine rheumatische Erkrankung, wie die Chorea, die Endokarditis etc. Er bespricht die Differenzen und die Ähnlichkeiten des akuten Gelenkrheumatismus und des Erythema nodosum: beide be-

fallen in der Regel relativ junge Personen, der Rheumatismus besonders männliche, das Erythema nodosum mehr weibliche; der akute Rheumatismus tritt besonders reichlich im Herbst auf, das Erythema nodosum ist an keine Jahreszeit gebunden; beim Rheumatismus ergibt die Anamnese oder Untersuchung Zeichen eines früheren Rheumatismus, das ist beim Erythema nodosum seltener; Rezidive sind beim Erythema nodosum im Gegensatz zum Rheumatismus selten. Durch Salizylpräparate tritt beim Erythema nodosum keine Erleichterung wie beim Rheumatismus ein.

Symes ist eher geneigt, das Erythema nodosum für eine akute spezifische Erkrankung zu halten; die Infektion findet durch die Tonsillen oder Lungen statt. Fritz Juliusberg (Berlin).

Kreibich, K. Ein Fall von Erythema perstans faciei (Erysipelas perstans faciei Kaposi). Monatshefte für praktische Dermatologie. Bd. XLIII.

Der von Kreibich ausführlich geschilderte Fall, welcher eine 32jährige Frau betraf und bei dem es unter hohem Fieber und unter Zunahme der lokalen Erscheinungen im Gesicht zu einer Dissemination von Effloreszenzen auf die Extremitäten, später auf den Stamm, Schleimhauterscheinungen, Auftreten von kroupösen Belägen an Herden der Ohren, des Kinnes gekommen war, ist dadurch besonders bemerkenswert, daß dem Ausbruch des Erythema perstans kein chronischer Lupus erythematosus vorausgegangen. Äußere Reize, mechanischer oder chemischer Natur, haben auf Entwicklung und Verlauf sicher großen Einfluß. Bezüglich der Ätiologie ließ sich nichts eruieren, weder im Sinne einer tuberkulösen oder andersartigen Infektion, noch einer Intoxikation. Auffallend war das reichliche und konstante Vorkommen von Fett im Serum, was vielleicht mit der bestehenden Schwangerschaft der Kranken zusammenhängt. Diese Gravidität war überhaupt das einzige pathogenetisch und ätiologisch verwertbare Moment in der Beurteilung des Falles.

Ludwig Waelsch (Prag).

Hallopeau et Herck. Sur une dermatite exfoliative généralisée par un pansement local avec solution d'acide picrique. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 309.

Ein Patient, dessen Hand durch heißen Dampf verbrüht wurde, appliziert einen feuchten Verband mit Pikrinsäure. Trotzdem er den Verband des heftigen Juckens halber kaum zwei Tage anwendet, tritt 7 Tage später eine universelle, schuppige Dermatitis auf; die Verspätung des Auftretens der Dermatitis erklären sich die Autoren dadurch, daß das Toxin zunächst in dem verbrühten Gewebe festgehalten wurde.

Walther Pick (Wien).

Moty. Éruption jodique retardée. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 496.

Ein 47jähriger Patient erhält wegen Ischias durch ca. 1 Monat Jod in steigender Dosis (4—12 g). Drei Tage nach Aufhören der Jodmedikation tritt unter heftigem Jucken ein sich vom Bauch allmählich über den ganzen Körper, mit Ausnahme von Gesicht, Händen und Füßen, ausbrei-

tendes Exanthem auf, bestehend aus länglichen, im Zentrum grau gefärbten, an der Peripherie einen rosa Saum zeigenden Herden, die an frische Striae erinnern. Fournier findet das Aussehen des Exanthems so ungewöhnlich, daß es recht schwer scheint, dasselbe auf Jod zurückzuführen. Später berichtet Moty (Ann. 1906. p. 684), daß das Exanthem unter reichlicher Desquamation nach einem Zeitraum von drei Monaten abgeheilt ist. Walthers Pick (Wien).

Audry et Boyreau. Sclérémie de l'adulte avec pigmentation de la muqueuse buccale. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 972.

Bei einem 70jährigen Patienten, der früher Cholera, Dysenterie und Malaria durchgemacht hatte, entwickelte sich ganz plötzlich eine Erkrankung der Haut, wodurch dieselbe allenthalben geschwollen, derb induriert, an der Unterlage festhaftend erscheint; die Haut ist braun, später braunschwarz verfärbt und es besteht heftiges Jucken. Auch an der Wangenschleimhaut finden sich braune Flecke. Durch die Spannung der Haut ist die Bewegungsmöglichkeit stark behindert und Patient ganz verkrümmt. Exitus außerhalb des Spitals. Walthers Pick (Wien).

Audry. Hyperidrosis nigricans. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1080.

Bei einem 18jährigen Patienten tritt am Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, entsprechend den Berührungsstellen eines Federhalters, eine dunkelbraune Verfärbung der Haut auf, die sich nicht wegwaschen läßt; gleichzeitig ist die an der Hand bestehende Hyperidrose an diesen Stellen noch gesteigert. Während der Ferien schwinden die Symptome, um wiederzukehren, sobald Patient wieder den Federhalter (einen ganz neuer Korkfederhalter) benützt. Der Schweiß selbst ist nicht gefärbt. Walthers Pick (Wien).

Mestchersky. Étude sur l'acrodermatite continue de Hallopeau. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1007.

Die 24jährige Patientin Mestcherskys litt seit 8 Jahren an einer sich wesentlich an Händen und Füßen lokalisierenden, mit einem schuppenden Erythem einsetzenden Hauterkrankung. Die Haut der Handrücken ist geschwollen, die Finger sind in Beugung und Streckung behindert, verdickt, keulenförmig, die Haut an der Streckseite intensiv gerötet, gespannt, mit feinen lamellosen Schuppen bedeckt, bildet um die Nägel herum eine lebhaft gerötete, polsterförmige Auftreibung. Die Nägel selbst sind teils längsgestreift, teils punktiert, am freien Rande verdickt, abgehoben. An den Handtellern und den Beugeseiten der Finger erscheint die Haut intensiv gerötet, verdickt, mit gelblichen, am Rande leicht abgehobenen Schuppen bedeckt, die im Zentrum einen dunkleren Punkt zeigen. Stellenweise konfluierend zu großen, lamellosen, braungelben Auflagerungen. Zwischen diesen Schuppen finden sich kleine nässende Erosionen. Nach Entfernung der Schuppen durch feuchten Verband zeigen sich auf dem geröteten Grunde mohnkorn- bis stecknadelkopfgroße Phlyktaenen von gelblicher Farbe, von dünner Hornschicht bedeckt, hie

und da zu kleinen Eiterseen konfluierend. Die Erkrankung wiederholt sich in Anfällen ohne Pause, die Dauer eines Anfalles (von der Phlyktänenbildung bis zur Abschuppung) beträgt 34 Tage. Arsen intern und feuchte Verbände mit Borsäure, Lapislösung etc. haben keinerlei Effekt. Histologisch fand sich als primäre Effloreszenz ein kleiner intraepithelialer Abszeß mit geringen Entzündungserscheinungen an den zugehörigen Papillargefäßen. Die bakteriologische Untersuchung ergab ein negatives Resultat. Unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur bespricht der Autor die Beziehung der Akrodermatitis Hallopeau zur Impetigo herpetiformis einerseits und zur Dermatitis herpetiformis Duhring andererseits, ohne sich diesbezüglich dezidiert auszusprechen.

Walther Pick (Wien).

Rusch. Über idiopathische Hautatrophie und Sklerodermie. *Dermatol. Zeitschr.* Bd. XIII. p. 749.

Die Erkrankung des 55jährigen Patienten lokalisiert sich ausschließlich an den unteren Extremitäten und begann vor 8 Jahren an einer, vor 4 Jahren an der anderen Unterextremität. Die Erkrankung ist beinahe über die ganzen unteren Extremitäten ausgebreitet, nur die Innenfläche derselben, von den Knöcheln beginnend bis zur Schenkelbeuge, ist normal. Die übrige Haut zeigt Zeichen hochgradigster Atrophie; außerordentlich verdünnt, gefältelt, erscheint sie in mannigfachen Schattierungen gerötet, livide bis braunrot verfärbt. In der rechten Trochanterengrube findet sich ein 3—4 cm breites, streifiges Infiltrat von gelblich-weißer, elfenbeinartiger Farbe und glatter Oberfläche. Diesem großen Herde sind noch einige kleinere Verdickungen angelagert. 2 Jahre später waren die einzigen Veränderungen der Erkrankung an dem oben beschriebenen Infiltrat zu sehen. Dasselbe war bedeutend dünner geworden, die früher glatte Oberfläche war gerunzelt, an Stelle der Sklerodermieherde treten allmählich die Charaktere der Hautatrophie zutage. Die mikroskopische Untersuchung einer atrophischen Hautstelle bestätigte die klinische Diagnose der idiopathischen Hautatrophie. Die atrophischen Veränderungen beschränken sich jedoch hauptsächlich auf die obersten Hautschichten, während das Bindegewebe und der Fettpolster vollkommen normal ist. Ein weiteres Interesse bietet der Fall dadurch, daß inmitten der atrophischen Hautdecken Sklerodermieherde auftreten, an denen man den langsamen Übergang in idiopathische Hautatrophie nachweisen kann. Eine weitere mikroskopische Untersuchung erstreckt sich auf die Haut einer an diffuser Sklerodermie und Sklerodaktylie erkrankten Frau, die einen, vom ersten Fall verschiedenen Befund gibt, indem sich die Veränderungen als „narbiger“ Zustand der Haut darstellen. Seinem ersten Fall stellt Rusch jene Erkrankungsformen gegenüber, bei denen es sich um dieselben Erscheinungen, jedoch in umgekehrtem Sinne genommen, handelt. Das sind Fälle von circumscripter Sklerodermie, bei denen es im Anschluß an ein erythematöses Vorstadium unmittelbar zum atrophischen Gewebsschwund kommt, ohne daß ein Stadium der Infiltration aufgetreten

wäre. Auch einen Fall solcher Art bringt Rusch nebst ausführlichem mikroskopischen Befund. Fritz Porges (Prag).

Constantin et Levrat. Observations sur l'état du sang dans la sclérodémie. Ann. de dermat. et de syph. 1907. p. 130.

Constantin und Levrat fanden in zwei Fällen von diffuser Sklerodermie eine geringe Leukocytose und auch Abweichungen in dem perzentuellen Verhältnis der verschiedenen Unterarten der weißen Blutkörperchen. Da diese Befunde aber nicht bei allen Untersuchungen konstant waren, konnten keine weiteren Schlüsse gezogen werden. Die Thyreodinbehandlung hatte in beiden Fällen einen guten, allerdings nur teilweisen Erfolg. Walther Pick (Wien).

Nixon, J. A. Scleroderma and Myositis. The Lancet 1907. Jan. 12. p. 79.

Nixon, der schon früher (Bristol Medico-chirurgical Journal. Dez. 1903) auf Beziehungen zwischen Muskelatrophie und Sklerodermie hinwies, bespricht diese Koinzidenz an der Hand weiterer Fälle aufs neue. Die eigenen Beobachtungen und die aus der Literatur sprechen ihm dafür, daß die Muskelveränderungen bei der Sklerodermie zusammen mit den Hautstörungen nur die Manifestationen einer allgemeinen Erkrankung darstellen, die er sich als infektiös-entzündliche vorstellt.

Für die Abhängigkeit der Sklerodermie und der mit ihr verknüpften Muskelatrophie von Nervenläsionen hat weder die Autopsie noch die klinische Beobachtung sichere Anhaltspunkte gegeben; dagegen bestätigen Tatsachen aus der Klinik und Pathologie eine primäre Entzündung der Muskeln akuter oder chronischer Natur, die in der Regel in Fibrose ausgeht. Fritz Juliusberg (Berlin).

Petges et Cléjat. Sclérose atrophique de la peau et myosite généralisée. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 550.

Die Autoren berichten über einen Fall von diffuser Sklerodermie bei einer 30jährigen Patientin, die nach dreijährigem Bestande der Erkrankung zum Exitus kommt. Bei der Autopsie zeigen sich als Todesursache beiderseits ausgedehnte tuberkulöse Kavernen in den Lungen. Außerdem Myokarditis und Nephritis. Histologisch finden sich in der Haut die gewöhnlich bei Sklerodermie nachweisbaren Veränderungen, Verdünnung der Epidermis und der oberen Cutispartien, fibröse Hyperplasie der Subcutis, Hypertrophie der glatten Muskelfasern, Meso-, Peri- und Endarteriitis. Außerdem fanden die Autoren in verschiedenen Schichten der Cutis, zum Teil in Gruppen, runde, homogene Gebilde mit zentraler Vakuole, die Darier für hyalin degenerierte Plasmazellen hält. Die Muskeln zeigten histologisch das Bild einer sklerosierenden Myositis. Die Autoren denken an die Möglichkeit eines tuberkulo-toxischen Ursprungs der Erkrankung.

Walther Pick (Wien).

Johnston, J. C. Eczema. A Sketch of the Process and Its Management. New-York Med. Journ. LXXXIV. 774. Okt. 20. 1906.

Johnston gibt in dem ursprünglich für seine Zuhörer in Cornell Univ. bestimmten Artikel ein übersichtliches, klares Bild des Ekzems;

insbesondere wird den wirklich vorhandenen pathologisch-anatomischen Veränderungen viel mehr Rechnung getragen, als gewöhnlich, besonders in den Lehrbüchern der Fall ist. Im allgemeinen wird das Ekzem als eine katarrhalische Dermatitis bezeichnet.

Auf Grund der Ätiologie wird das Ekzem eingeteilt in:

1. E. aus inneren Ursachen: autotoxische, reflex (?) und medikamentös (z. B. Lebertran);
2. aus äußeren Ursachen: Gewerbeekzem, seborrhoisches und klimatisches E.

Die klinischen Merkmale, welche das durch innere Schädlichkeiten erzeugte Ekzem von dem äußeren unterscheiden, werden dann kurz angeführt. Eine Einteilung nach den Effloreszenzen ist bequem für die Behandlung; bei der akuten Form wird unterschieden: erythematöses, papulöses, vesikuläres, pustulöses (impetiginöses), nässendes und krustenförmiges; das subakute ist meist schuppend, die chronischen zeigen Verdickung und Lichenifikation. Die Einteilung je nach den befallenen Körperregionen ist nicht von großer Bedeutung; die Unterschiede beruhen auf den anatomischen Verhältnissen.

Die Symptomatologie ist einfach: der erythematösen Färbung der Haut folgt in Kürze der Ausbruch stecknadelkopfgroßer Papeln, auf deren Spitze alsbald ein kleines Bläschen erscheint, weiter erfolgt die Abstoßung der Epidermis, später ist Verunreinigung (Eiter bildende Bakterien) häufig, besonders bei Kindern und kachektischen Individuen. Der Sitz der Entzündung ist der Papillarkörper, die Menge des in demselben auftretenden Exsudats bestimmt die Art der Effloreszenz. Kein Ekzem kann heilen ohne Schuppenbildung.

Histologisch folgt auf die Periode der Kongestion ein Strom von beinahe reinen Serums, das die Bindegewebsfasern auseinanderdrängt, die Papillen erweitert und sich einen Weg in die Interzellularräume der Schleimschicht sucht. Hier wird es anfangs durch die Hornschicht zurückgehalten, nach Loslösung derselben fließt es auf die Oberfläche ab. Aus dem niedergeschlagenen Fibrin, nekrotischen Gewebsteilen und Bakterien bilden sich Krusten. Wenn die seröse Exsudation nicht so ausgesprochen ist, so kommt es mehr zur Proliferation der Epithelien, Endothelien und Fibroplasten, begleitet von mehr weniger ausgesprochener Parakeratosis. Bei dem chron. Ekzem handelt es sich nur um höhere Grade derselben Vorgänge.

Betreffend die Ätiologie gesteht Johnston bakteriellen Ursprung nur dem seborrhoischen Ekzem zu, obwohl auch bei diesem das schädliche Agens noch nie nachgewiesen wurde. Das von Ekzem befallene Individuum muß an irgend einer Intoxikation leiden; da dieselbe nicht bakteriell ist, so muß sie chemischen Vorgängen im Körper zugeschrieben werden (dies ist in Wirklichkeit die Bedeutung von „Diathese“, vielleicht auch von Idiosynkrasie). Es ist also anzunehmen, daß im Haushalt des Körpers ein Gift ausgebildet wird, das Ekzem verursacht. Ob dieses toxische Agens einfach und spezifisch oder mehrfach ist, scheint nicht

von so großer Bedeutung, als nachzuweisen, wo es gebildet und wie es ausgeschieden wird. Die Harnuntersuchung ist bei weitem nicht genügend entwickelt, um sicheren Aufschluß zu geben, aber verschiedene Umstände deuten auf eine Störung des Stickstoffwechsels. Abgesehen von Kreatinin und Oxalsäure kommen im Prodromalstadium und im Beginn des Ausbruchs ziemlich häufig Änderungen der Stickstoffverteilung vor, die sich im prozentischen Verhalten der Harnsäure und „unbestimmten Stickstoffs“ bemerkbar machen. Dieselben sind besonders schwierig festzustellen. Ähnliche Vorgänge sind auch bei Dermatitis herpetiformis, Pruritus etc. anzunehmen.

Nach kurzen Bemerkungen über die Diagnose der auf äußeren und inneren Ursachen beruhenden Formen wird die Prognose als eine unter allen Umständen günstige bezeichnet.

Die Behandlung anlangend, so glaubt J., daß Ekzem durch äußere Mittel beseitigt werden könne, aber erst nachdem die Intoxikation aufgehört hat. Diätetisch ist Einschränkung der Proteidzufuhr geraten; Fette und Kohlehydrate schaden nicht, außer bei Gärungsvorgängen; reichlicher Wassergenuß, frische Luft, Körperbewegung etc. sind von günstigem Einfluß, gelegentlich ein Cholagogum mit nachfolgendem salinischem Abführmittel. J. glaubt, daß kleine Kinder oft erkranken infolge ungenügender Ernährung. Äußere Anwendung des Wassers ist möglichst zu beschränken, da dasselbe ein starkes Reizmittel für die erkrankte Oberfläche darstellt. Die eigentlich medikamentöse Lokalbehandlung unterscheidet sich nicht wesentlich von der herkömmlichen; genauere Betrachtung erfährt die Lassarsche Paste, deren Wirkung erklärt wird. Unter den keratoplastischen Substanzen nimmt das Blei die erste Stelle ein (Ungt. diachyl.). Ein mäßig ausgebreitetes Ekzem sollte in 4–6 Wochen zur Heilung gelangen, auf den Handflächen und Fußsohlen dürften wenigstens 4 Monate nötig sein.

H. G. Klotz (New-York).

Fox, T. Colcott. Klinische Mitteilungen. The Brit. Journal of Dermatology. Sept. 1906. (Mit 2 Tafeln und 2 Abbildungen im Text.)

1. Eczema seborrhoicum mit Stacheln. Elfjähriger Knabe. Haarboden bedeckt von einer trockenen Borkenkappe, zwischen deren Rissen Serum austritt. Pediculosis capitis. Am Stamme fast allenthalben, an den Gliedmassen in weniger großer Ausdehnung, die Follikel gerötet, erhaben, mit Schüppchen bedeckt; aus vielen Follikelmündungen ragen Stacheln, die sich, herausgezogen, als etwa $1\frac{1}{2}$ mm lang, weniger verhornt als bei Lichen spinulosus, mehr aus Schuppen zusammengesetzt erweisen; stellenweise deutliche Gruppierung. — Die Differentialdiagnose wird erörtert, die Entscheidung fällt trotz der Jugend des Kranken zu gunsten des Eczema seborrhoicum. Die Beschreibung eines ähnlichen, nicht durch Stachelbildung ausgezeichneten Falles von einem sechzehnjährigen Burschen wird kurz angeschlossen.

2. Granulosis rubra nasi, Neunjähriger Knabe. Die apfelgeleeartigen Knötchen, die auch bei Glasdruck dieses Aussehen nicht verloren;

veranlaßten die Diagnose *Lupus vulgaris*, die erst durch das Auftreten von Bläschen mit klarem Inhalt, *Hydrocystomen*, umgestoßen wurde.

3. Ringelhaare. Eine 25jährige Frau, die seit kurzem an Kopfschmerz litt, verlor im Laufe von etwa $\frac{5}{4}$ Jahren zweimal das gesamte Haupthaar, die Augenbrauen und Wimpern; der Haarausfall wurde jedesmal durch das Erscheinen von Ringelhaaren (*pili annulati*) am Haarboden des Kopfes eingeleitet. Die pigmentiert bleibenden Strecken der Ringelhaare waren etwa $\frac{1}{2}$ mm breit, die weißen etwas schmaler. Es erfolgte vollständige Wiederherstellung. Paul Sobotka (Prag).

Mac Leod, J. M. H. „*Granulosis rubra nasi*“ (*Jadassohn*). Ein weiterer Beitrag. *The Brit. Journ. of Dermat.* Okt. 1906.

Mac Leod führt zunächst die Geschichte eines früher von ihm beschriebenen Falles (*Brit. Journ. of Derm.* 1903. XV. p. 197) weiter. Er erwähnt dabei unter anderem des späten Auftretens der Hyperidrose an den Handflächen und Fußsohlen längere Zeit nach der vollen Entwicklung der typischen Veränderungen im Gesichte, ferner besonders eines außerordentlich starken und mit Schwellung und Rötung einhergehenden Anfalles von Hyperidrose der Nase, nach des Verf. Meinung reflektorisch ausgelöst dadurch, daß — wohl zu zahnärztlichen Zwecken — von dem Gebisse des Kranken ein Abdruck genommen wurde. — Es folgt die Beschreibung eines zweiten Falles, betreffend einen neunjährigen, zarten, mit „schwacher Zirkulation“ an Händen und Füßen behafteten Knaben, bei dem die eigentliche Papelbildung gegenüber den auffallenden Gefäßerscheinungen (blaurote Färbung, Kälte, auch Teleangiectasien) und der Hyperidrose an Nase und Oberlippe stark zurücktrat. Eine kurze Wiedergabe der seit dem Jahre 1902 beschriebenen 15 Fälle und eine eingehende zusammenfassende Besprechung der Krankheit vom klinischen, pathologischen und ätiologischen Standpunkte aus beschließt die Arbeit.

Paul Sobotka (Prag).

Weber, F. P. Spontane symmetrische Ekchymosen der Augenlider und Bindehäute mit ungewöhnlicher Steigerung aller Sehnenreflexe als Vorläufer von urämischem Koma mit tötlichem Ausgange. *The Brit. Journ. of Dermat.* Sept. 1906.

Von den im Titel der Arbeit erwähnten Erscheinungen werden die Ekchymosen und die Reflexsteigerung als von der beginnenden Urämie abhängig angesehen. Es war eiterhaltiger (Blasenstein), aber offenbar auch davon abgesehen eiweißhaltiger Harn vorhanden. Gegen Ende des Lebens ging die Zahl der roten Blutkörperchen herab und stellte sich Leukocytose ein. Die Obduktion wies Hydronephrose und chronische interstitielle Nephritis nach. Paul Sobotka (Prag).

Meade, F. E. und Freeman, W. T. Ein Fall von *Dermatitis repens*. *The Brit. Journ. of Dermatology.* Okt. 1906.

Insektenbiß oberhalb des rechten Handgelenks, Entstehung einer Pustel; innerhalb weniger Tage Ausbreitung einer sehr schmerzhaften, ganz erysipelartigen Hautentzündung mit Blasenbildung über den ganzen

Arm, die rechte Schulter, den Hals, die linke Schulter und den linken Arm bis ans Handgelenk; keine Temperatursteigerung; Abheilung unter starker Schuppung und Schälung. — 3 Wochen nach der Genesung neuerliche Dermatitis ganz gleicher Art, ausgehend von einer kleinen Verletzung am rechten Daumen, von gleichem Verlaufe, doch schon vor Erreichung des linken Handgelenks erschöpft. — Wiederum einen Monat nach der Heilung Bläschen auf rotem Grunde am linken Daumen, Jucken, Ausbreitung einer Entzündung gleich den vorherbeschriebenen bis an den Ellbogen. 3—4 Tage nach dem Auftreten dieser Erkrankung erst an dem einen, dann an dem anderen Fuß je ein sich ausbreitender roter Fleck. Die Beschränkung der Entzündung auf ein geringes Gebiet bei den letzten Anfällen wird auf die Behandlung mit 20% Ichthyolsalbe zurückgeführt. Die Heilung erfolgte stets unter lange nachbleibender Pigmentation.

Die Mutter der Kranken, welche deren Pflege oblag, wurde bald nach der ersten Wiederkehr des Leidens von einer phlegmonösen Entzündung befallen, die in der Nähe eines Unterschenkelgeschwürs begann und unter schweren Allgemeinerscheinungen und Abszeßbildung bis an das Leistenband weitergriff. Hier war wohl der *Streptococcus erysipelatis* im Spiele. Bakteriologische Untersuchungen wurden in keinem der beiden Fälle vorgenommen. Paul Sohotka (Prag).

Dubreuilh. *Engelures gangreneuses héréditaires.* Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 67.

Gleichzeitiges Auftreten von Erfrierungen dritten Grades bei einer 35jährigen Frau und bei zwei ihrer Kinder. Walther Pick (Wien).

Le Play et Déhu. *Un cas de maladie des vagabonds.* Ann. de dermat. et de syphiligr. 1906. p. 141.

Ein Fall von *Cutis vagantium* bemerkenswert durch die nahezu universelle Ausbreitung der Pigmentation, welche auch auf Nägeln und Mundschleimhaut sichtbar ist. Walther Pick (Wien).

Le Play et Déhu. *Ulcère trophique rebelle du sein.* Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 144.

Eine 21jährige, sehr nervöse Patientin, zeigt ein immer wiederkehrendes, mit einer schwarzen Kruste bedecktes Geschwür an der Brust; die Autoren glauben traumatische Einflüsse ausschließen zu können und nehmen einen trophoneurotischen Ursprung der Affektion an.

Walther Pick (Wien).

Mink, O. J. et Mc Lean, N. T. *Gangosa.* Journ. Am. Med. Ass. XLVII. 1166. 13. Okt. 1906.

Mink und Mc Lean, Ärzte in der Ver. Staaten-Armee, definieren Gangosa (*Ogo*, *Rhinopharyngitis mutilans*, *Ley's*) als eine durch zerstörende Geschwürsbildung charakterisierte Krankheit, die gewöhnlich am weichen Gaumen, Gaumenbögen oder Uvula beginnend, sich per contiguitatem auf den harten Gaumen und die Nasenhöhle, Larynx und selbst das Gesicht verbreitet. Der aktiven Ulzeration folgt nach verschiedener Frist Narbenbildung und chronische Geschwürsbildung. Verstümmelung ist die unausbleibliche Folge, während Allgemeinsymptome gering sind oder ganz

fehlen. Der besonders in den Ladronen und Karolinen-Inseln gebrauchte Name bedeutet im Spanischen „gedämpfte Stimme“. Die Autoren fanden Beweise, daß die Krankheit seit wenigstens 150 Jahren in Guam existiert hat; sie scheint auch in Westindien und Zentralamerika vorzukommen. Ein von Fordyce und Arnold (J. cut. Dis. Jan. 1906) beschriebener Fall wird als zweifelloser Fall der Krankheit bezeichnet. Obwohl dieselbe hauptsächlich den Nasenrachenraum befällt, ist sie von dermatologischem Interesse wegen der häufigen Verstümmelungen der Nase und des Gesichts, die durch eine Anzahl Abbildungen dargestellt sind. Die Gangosa ist in Guam ziemlich verbreitet; 18 bis 22 per Tausend in einer Gesamtbevölkerung von 11.000; in einem Jahr kamen 125 Fälle zur Beobachtung; in einer Tabelle sind 81 Fälle zusammengestellt — mit Beziehung auf Alter, Geschlecht, Familiengeschichte, Dauer der Krankheit, Zustand der Tonsillen, Uvula, Gaumen, Larynx, Nase, Augen und Allgemeinzustand. Die lokalen Symptome scheinen ganz im Anfang nichts spezifisches zu zeigen, aber Geschwüre treten sehr bald auf und der Verlauf ist anfangs meist ein rascher, in einzelnen Fällen ein fulminanter, der Diphtherie ähnlicher, mit tödlichem Ausgang infolge von Toxämie. Ein spezifisches Agens für die Infektion ist zur Zeit noch nicht gefunden worden. In den frühesten Stadien scheint lokale Behandlung (Tinct. Jod. und Ätzmittel) einigermaßen gute Resultate zu geben. Die Ver. Staaten-Behörden haben die Isolierung der Kranken in einer Kolonie, ähnlich wie für die Leprösen, ins Werk gesetzt.

H. G. Klotz (New-York).

Wende, Grover W. und Bentz, Charles A. Infectious Dermatitis gangraenosa. The Journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. X. 1906.

Im Falle von Wende und Bentz handelte es sich um infektiöse Gangrän, die aus einer Blaseneruption hervorgegangen und vielleicht durch Autoinokulation von einem chronischen Ulcus cruris entstanden war. Der Tod erfolgte durch Sepsis. Aus den Blasen, den Geschwüren, sowie den inneren Organen (nach dem Tode) wurden Staphylo-Streptokokken und Bazillen gefunden. Die mit der Blasenflüssigkeit des Kranken intraperitoneal geimpften Meerschweinchen verendeten nach 1 und 3 Tagen und boten eine dieselben Mikroorganismen enthaltende Peritonitis.

Rudolf Winternitz (Prag).

Pollitzer, S. (New-York). A case of chronic ulceration in the pubic and inguinal regions. The Journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. 6. 1906.

Pollitzer beschreibt einen Fall, bei welchem sich angeblich nach einer Verunreinigung ein Blätterchen auf der Glans penis bildete, aus welchem ein Geschwür wurde. Nach wenigen Tagen entstanden kleine eiternde Geschwüre an der Eichel, später ähnliche in der Regio pubis und ungefähr zu derselben Zeit an der linken Stirnhälfte, welche er wegen einer heftigen Supraorbitalneuralgie häufig gerieben hatte.

Manche der so entstandenen Geschwüre wuchsen beträchtlich (so das an der Stirne) und heilten unter einer lokalen Behandlung unter Narbenbildung ab, andere, wie jene in der Regio pubis, wuchsen und

trotzten der Behandlung. Zuletzt war neben zahlreichen, flachen, deprimierten Narben eine ganze Anzahl von scharfrandigen, infiltrierten, nekrotisch belegten, übelriechenden Geschwüren in der Regio pubis des Abdomens, der Leisten und der Oberschenkel vorhanden und in ihrer Umgebung entstanden immer wieder Eiterbläschen, die sich in Geschwüre umwandelten. Da Pollitzer aus einem frischen Geschwür einen dem *Bacillus Mallei* ähnlichen Bazillus isolierte und auf denselben die Affektion bezog, so excidierte er die ganze erkrankte Haut der Regio pubis bis ins Gesunde und deckte den Substanzverlust teils durch Entspannungsnähte, theils durch Heranziehen der Skrotalhaut. Während der Rekonvaleszenz trat aber eine unzweifelhafte Sarcocoele syphilitica des einen Hodens auf und erst jetzt wurde anamnestisch eine vor Jahren stattgefundenen venerische Affektion erhoben.

Pollitzer glaubt dennoch die Geschwürsbildungen nicht auf Syphilis beziehen zu sollen, hauptsächlich weil sie einen lokal infektiösen Charakter darboten. In der Diskussion sind die Meinungen diesbezüglich geteilt.

Rudolf Winternitz (Prag).

Hallopeau et Roy. Sur une forme spéciale de prurigo d'origine vésanique (variété nouvelle). Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 63.

Auf der Vorderseite des Stammes und an den Beugeseiten der Extremitäten finden sich Myriaden kleinster, schwarzer Krusten; Knötchen und Kratzeffekte fehlen gänzlich; das Bild der Affektion unterscheidet sich so deutlich von der Prurigo. Die Krusten entstehen dadurch, daß die Patientin, wenn sie an einer Stelle ein Jucken verspürt, an dieser Stelle eine Hautfalte zwischen Daumen und Zeigefinger maximal komprimiert, bis zum Austritte einer klaren, serösen Flüssigkeit.

Walther Pick (Wien).

Williams, M. W. A case of peliosis rheumatica. The Brit. Med. Journal. 1907. Jan. 12. p. 79.

Williams 13jähriger Patient bekam im Anschluß an eine unter Fieber entstandene Schwellung des rechten Kniegelenks eine Purpura, blutige Stühle und Blut im Sputum. Dieser Zustand währte einige Tage, dann trat langsam Heilung ein; während der Rekonvaleszenz erfolgte noch ein Purpuraausbruch mit Urticaria. Der Bruder des Patienten hatte mit 16 Jahren dasselbe Krankheitsbild dargeboten und leidet an häufigen Anfällen von Epistaxis.

Fritz Juliusberg (Berlin).

Russel, W. B. Purpura and calcium chloride. The British Med. Journal. 1907. Jan. 26. p. 199.

Russel behandelte zwei Fälle schwerer Purpura mit je 3—4 g Kalziumchlorid pro die mit gutem Erfolg.

Fritz Juliusberg (Berlin).

West, Samuel und Clarke, Thomas Wood. Idiopathic cyanosis due to sulph-haemoglobinaemia. The Lancet 1907. Feb. 2. pag. 272 ff.

West und Clarke hatten Gelegenheit, einen der Fälle von idiopathischer Cyanose längere Zeit zu beobachten, bei denen im Blute der spektroskopische Nachweis von Sulf-Hämoglobin möglich ist. Das auffallendste Symptom der Erkrankung war die bleigraue Verfärbung der Haut. An Herz und Lungen ließ sich nichts pathologisches feststellen. Der Puls war regelmäßig, schwach, nicht beschleunigt. Der Urin bot keine Besonderheiten. Die Verdauungsorgane waren bis auf vorhandene Obstipation in Ordnung. Neben dieser und der Hautverfärbung bestanden die Symptome der Erkrankung in Kopfschmerzen und Schwäche. Die eingehende Blutuntersuchung ergab den Nachweis von Sulf-Hämoglobin.

Bisher sind 13 Fälle dieser idiopathischen Cyanose bekannt, bei 8 derselben wurde eine Meth.-Hämoglobinämie, bei 5 eine Sulf-Hämoglobinämie gefunden.

Die bakteriologisch-kulturelle Untersuchung des Blutes ergab in diesem Falle dessen Sterilität. Aus diesem Grunde und wegen der langen Dauer des Bestehens der Erkrankung (1½ Jahre) glauben die Autoren eine spezifische mykotische Infektion ausschließen zu können.

Fritz Juliusberg (Berlin).

Coe, John W. The Treatment of Purpuric Conditions and Hemophilia. Journ. Am. Med. Ass. XLVII. 1090. 6. Okt. 1906.

Coe empfiehlt für die Behandlung von Purpura und namentlich Hämophilie den innerlichen Gebrauch von milchsaurem Kalzium und rühmt den Einfluß desselben auf die Koagulationsfähigkeit des Blutes. Unter den beschriebenen 5 Fällen ist nur einer von Purpura mit ziemlich schweren Symptomen.

H. G. Klotz (New-York).

Risel, H. Ein Beitrag zu den Purpura-Erkrankungen. Zeitschrift für klinische Medizin. Bd. LVIII. p. 163.

Einen Fall von stürmisch verlaufender Purpura — Purpura fulminans — beschreibt Risel. Ein ungefähr 4 Jahre alter, gesunder Junge bekam 16 Tage nach Scharlach unter Nasenbluten Hauthämmorrhagien, die symmetrisch an den Extremitäten, dann am Rücken auftraten und rasch eine große Ausdehnung erreichten. An einer Zehe kam es zu einer makroskopisch sichtbaren Blasenbildung. Kurz vor dem Tode auch Blutungen in die Schleimhaut des Mundes. 48 Stunden nach dem ersten Auftreten der Hämmorrhagien Exitus. Die Sektion und die bakteriologische Untersuchung gaben keine Aufklärung über die Ätiologie der Blutungen.

M. Winkler (Luzern).

Brandweiner, A. Purpura annularis teleangiectodes. Monatsh. f. prakt. Dermat. Bd. XLIII.

Purpura annularis beginnt mit Bildung kleiner sattroter Flecke an den Extremitäten, welche durch gehäuftes Auftreten kleinster Fleckchen, die auf Druck sich nicht verändern, entstehen. Diese Flecke wachsen bei längerem Bestande, bilden oft Ring- oder Streifenformen mit blaß-bräunlichem Zentrum und peripherem Ring satt- bis blau- und braunroter Pünktchen, von denen einige auch im Zentrum erhalten bleiben oder neu auftreten können. Nach Monaten verschwinden diese Symptome, können

aber auch rezidivieren, belästigen nicht ihre Träger. Histologisch findet man kleinste kapillare und präkapillare Ektasien mit spärlichen Blutaustritten. Ätiologisch erscheint die Annahme einer vasomotorisch-trophischen Grundlage am plausibelsten; wenngleich kleinste Traumen die unmittelbare Veranlassung zur Entstehung der primären Veränderungen abzugeben scheinen, so genügen sie allein zur Erklärung der Veränderungen nicht, sondern es setzt die Affektion noch eine Disposition voraus, eine periphere vasomotorisch-trophische Labilität. Ludwig Waelsch (Prag).

Pasini. Über Purpura senilis Monatshefte für praktische Dermatologie. Bd. XLIII.

P. tritt auf Grund der Beobachtung von 13 Fällen von Purpura senilis, die er in extenso mitteilt, dafür ein, daß das genannte Krankheitsbild die ihm schon von Bateman zugesprochene Selbständigkeit verdient, da sie eine besondere Lokalisation besitzt, die auf bestimmte Körperstellen beschränkt bleibt (Streckseiten der Extremitäten, bes. der Vorderarme), die Plaques ein typisches Aussehen haben (rote, angiektatische und hämorrhagische Herde), sich typisch evolvieren und involvieren und zu Rezidiven neigen und endlich der allgemeine Gesundheitszustand unberührt bleibt. Die P. s. verdankt ihre Entstehung einem Bluterguß in die Cutis [(sowohl durch Diapedesis als auch Rhexis) infolge von Degeneration der Haut (senile Veränderungen). Der degenerative Prozeß in der Cutis wird durch die Hämorrhagie bedeutend verschlimmert.

Ludwig Waelsch (Prag).

Crowley, R. H., Honeyburne, R., Campbell, H. J. Two cases of purpura haemorrhagica, one with a peculiar retinal condition and a case of Bantis disease treated by the X rays. The Lancet 1907. Feb. 2. p. 289 ff.

Die 2 ersten der drei Fälle, die Crowley, Honeyburne und Campbell beschreiben, hatten eine Purpura haemorrhagica. In einem Falle ergab die Augenuntersuchung in der linken Macularegion einige kleine unregelmäßige Flecken von grauweißer Farbe. Auch am rechten Auge traten diese Flecken in gleicher Lokalisation 2 Tage später auf. Sie schwanden mit der Abheilung der Purpura.

Fritz Juliusberg (Berlin).

Vörner. Urticaria depressa. Derm. Zeitschr. Bd. XIII. p. 687.

Im Anschlusse an eine Dyspepsie kommt es bei einem jungen, sonst gesunden Mann zum Ausbruch eines Exanthems, welches nicht aus typischen Urticariaquaddeln besteht, sondern sich aus roten, deprimierten, unter dem Hautniveau gelegenen Plaques zusammensetzt. Die in letzteren sichtbaren erhabenen Inseln stellen normale Hautstellen inmitten eingezogener Partien dar, welche den Eindruck von Erhebungen machen, es aber nicht sind. Es handelt sich um eine in die Gruppe der Erytheme fallende Erkrankung, welche mit diesen auch die große Flüchtigkeit gemein hat.

Fritz Porges (Prag).

Kanitz, H. Über einen Fall von *Pemphigus foliaceus* (nebst einigen Bemerkungen über das Wesen der „Hämatodermiden). Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. XLIV.

40jährige Frau; Krankheitsdauer 4 Monate. Typischer *Pemphigus foliaceus* mit wenigen matschen Blasen, blättriger Beschaffenheit der Schuppen, peripherem Wachstum der Läsionen und zentrifugal fortschreitender Unterwühlung der Hornschicht. Intromittierendes Fieber. Tod nach 3 Wochen. Patholog.-anatomische Diagnose: Pemph. fol. Meningitis seroso-purulenta convexitatis hemisphaerae sin. cerebri. Pleuritis sero-fibrinosa purulenta sin. Compressio pulm. sin. Infarctus haemorrhagicus et suppuratio lobi inf. pulmon. sin. ex embolia septica ramuli arteriae pulmonal. Tumor acutus lienis. Degeneratio parenchymat. renum. Hepatitis parenchym. Histologisch fand sich an der Haut Ödem, mäßige, hauptsächlich lymphocytäre Infiltration, eosinophile Zellen zerstreut und spärlich. Die Epidermis ist in toto oder auch nur die Hornschicht abgehoben, stellenweise liegt das Corium zutage. Kanitz wendet sich gegen die Anschauungen Lereddes, der das Wesen des Pemph. foliaceus, vegetans und des Morbus Duhring in der Eosinophilie sieht, sie auf Erkrankung des Knochenmarks zurückführt und als „Hämatodermiden“ zusammenfaßt. Die Blutuntersuchung seines Falles ergab Kanitz Verringerung der Zahl der Leukocyten u. zw. waren diese überwiegend Lymphocyten. Im Knochenmark waren die kleinen, dunkelkernigen, mononukleären, weißen Blutzellen vermindert, die großen, blassen Mononukleären reichlich. Es ergab sich also eine gewisse Übereinstimmung zwischen dem nativen Blutpräparat und dem Befund im Knochenmark. Pelagatti erhob einen ähnlichen Befund bei universellem Pemphigus und hält diese Krankheit für eine Krankheit des Blutes, ebenso wie Leredde, nur glaubt er, daß der Eosinophilie keine solche Bedeutung zukomme, vielmehr der größte Wert auf das Verhalten der großen Mononukleären zu legen sei. Auch diese Anschauungen hält K. für nicht genügend gestützt.

Ludwig Waelsch (Prag).

Morichau-Beauchant. Les oedèmes aigus circonscrits de la peau et des muqueuses. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 22.

Das akute circumscribte Ödem entsteht bei hiezu durch (hereditäre) arthritische Diathese disponierten Individuen, unter dem Einfluß abnormer Fäulnisvorgänge im Darm. Hiedurch entstehen toxische Eiweißsubstanzen, die in den Kreislauf kommen und eine lymphagoge Wirkung ausüben. Kälte und andere Traumen bedingen dann sekundär die Lokalisation der Ödeme.

Walther Pick (Wien).

Pasini. Sur la pathogénie des éruptions bromiques. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1.

Bei einer 25jährigen Patientin, die wegen Hypoacidität des Magensaftes und Achylie auf hysterischer Basis, Brom genommen hatte, trat ein teils pustulöses, teils tuberöses Bromoderm auf; Brom konnte in den Effloreszenzen nicht nachgewiesen werden. Der Autor macht besonders auf eine gleichzeitig mit dem Bromoderm einsetzende und mit diesem

abklingende Volumezunahme der Thyreoidea aufmerksam, welche als Reaktion durch eine besondere Affinität dieses Organs zum Brom (und Jod) bedingt wird.

Histologisch fanden sich Leukocytenhaufen in der Epidermis und Cutis, Epithelproliferation, Cutisödem, Verlust des Kollagens und der elastischen Fasern. Durch verschiedene Färbungen, u. a. durch die Methode von Pelagatti, konnte der Autor Veränderungen an den Bindegewebszellen nachweisen, durch welche dieselben die Charaktere der Unnaschen Schaumzellen annahmen. Diese Zellen zeigten dann phagocytäre Eigenschaften, insoferne sie bis zu 5 und 6 Leukocyten aufnahmen, weshalb der Autor für diese, seiner Ansicht nach für das Bromoderm charakteristischen Zellen, die Bezeichnung „Schaumphagocyten“ vorschlägt.

Den negativen Ausfall der Bromreaktion im Gewebe erklärt sich der Autor durch eine feste Bindung desselben durch Eiweiß, die auch im Reagenzglas gelang. Andernteils konnte der Autor durch Einführung von mit entsprechenden Lösungen gefüllten Kapillaren unter die Haut von Kaninchen, eine negative Chemotaxis für Bromkalium, Bromnatrium, Kalium und Natrium, eine positive Chemotaxis für Brom nachweisen, wodurch sich der Autor die Entstehung der in den Präparaten sichtbaren Leukocytenhaufen erklärt.

Bezüglich der Genese ist Pasini der Ansicht, daß durch eine Störung im Magendarmtraktus (in seinem Falle Hypoacidität) eine Spaltung des Bromsalzes statthat, freies Brom gelangt in die Blutbahn und führt insbesondere dort zu Veränderungen, wo die Vaskularisation eine besonders reiche ist (Drüsel, Follikel). Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Macé de Lépinay. Sur un nouveau cas d'iodisme végétant. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 580.

Bei einem Patienten, der durch nahezu 15 Jahre täglich 0.75 Kal. jod. und 2 g K. br. einnimmt, finden sich im Gesicht, insbesondere an Nase und Wangen, filiiforme, zum Teil gestielte Vegetationen, bis zu 6 mm Höhe, zum Teil in Herden gruppiert. Patient gibt an, daß diese Herde Reste blasiger Effloreszenzen darstellen. Hallopeau führt die Affektion auf Jodismus zurück und erinnert an seinen i. J. 1888 publizierten Fall von Jodpemphigus, bei welchem sich auch Blasen auf der Cornea bildeten, in deren Gefolge Narben und Blindheit auftrat.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Granchamp. Sur une dermite végétante avec éléphantiasis entée sur une asphyxie locale mutilante des extrémités. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 168.

Bei einem 54jährigen Patienten trat nach heftigen Schmerzen Mutilation der 1. und 5. Zehe des r. Fußes, unter Hinterlassung eines sich immer weiter verbreitenden Geschwüres auf. Im weiteren Verlaufe kommt es zu elephantiastischer Schwellung der Unterschenkel, deren Haut gerötet, nässend, mit Krusten und zahlreichen erhabenen Exkreszenzen bedeckt erscheint. Da auch die Hände Erscheinungen von lokaler

Asphyxie zeigen, nehmen die Autoren an, daß diese den günstigen Nährboden für die Erreger der kutanen Hyperplasie abgegeben hat.

Walther Pick (Wien).

Gaucher et Boisseau. Érythème polymorphe circiné, purpurique. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 202.

An oberen und unteren Extremitäten und am Halse finden sich hämorrhagische Herde, zum Teil mit Bläschen mit blutigem Inhalt, zum Teil mit Krusten bedeckt. Abheilung im Zentrum mit Pigmentation, Weiterschreiten an der Peripherie. Dermatitis herpetiformis wegen des fehlenden Juckreizes auszuschließen.

Walther Pick (Wien).

Nicolas et Favre. Sur un cas de pemphigus chronique congénital et familial à forme d'ichthyose bulleuse. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 705.

Der Großvater, eine Tante und ein Onkel des Patienten litten an der gleichen Erkrankung; der Patient selbst gibt an, daß er bei seiner Geburt am ganzen Körper behaart gewesen wäre; im Alter von 18 Monaten traten zum erstenmal Blasen auf, die seither in Attacken wiederkehrten. Gegenwärtig besonders an den Extremitäten ichthyotische Hautbeschaffenheit; innerhalb dieser treten auf Traumen oder auch spontan, in den obersten Epidermisschichten Blasen auf, die innerhalb weniger Stunden entstehen, Nußgröße erreichen, einen eitrigen Inhalt zeigen und 3—5 Tage bestehen bleiben. An Stelle der Blase tritt dann wieder hyperkeratotische Epidermis auf. Die kruralen und inguinalen Drüsen sind geschwollen. Patient ißt und trinkt sehr viel; im Harn kein Zucker. Die Autoren gruppieren den Fall unter die Ichthyosis. Lenglet (Ann. 1906, p. 924) wendet sich gegen die Diagnose in diesem Falle. Der Name kongenitaler Pemphigus sei überhaupt zu perhorreszieren, da er zu Verwechslungen führe. Epidermolysis bullosa lag nicht vor, bei dieser würden die Blasen nie von Dyskeratose begleitet. Das Vorhandensein dicker, fetter, wenig adhärenter Schuppen, die Bevorzugung der Beugefalten spricht gegen Ichthyosis, und so sei der Fall in die Gruppe der kongenitalen ichthyosiformen Erythrodermien einzureihen.

Walther Pick (Wien).

Petrini-Galatz. Contribution à l'étude clinique et histopathologique de l'épidermolyse bulleuse dystrophique et congénitale. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 766.

Petrini berichtet über drei Fälle von Epidermolysis bullosa, von welchen zwei einer Familie entstammen, in welcher 5 von 7 Geschwistern an der Krankheit litten. Die Erkrankung tritt in Schüben auf, die einzelnen Schübe sind selten. Die oft ganz vereinzelter Blasen haben einen serösen oder leicht blutigen Inhalt. Die Prädispositionsstellen sind: Die Streckseiten der Extremitäten, Ellbogen, Metacarpo-Phalangealgelenke, Knie, Malleolen, Streckseite der Zehen. Durch häufig wiederholtes Auftreten an diesen Stellen wird die Haut daselbst atrophisch, es bilden sich weißliche, keratotische Narben und Milien. Auch die Nägel erscheinen alteriert, geschrumpft, schmutzig-schwarz gefärbt und fallen auch wohl

gänzlich ab. Diese trophischen Störungen hält Petrinì für diagnostisch äußerst wichtige Symptome; eine traumatische Genese der Blasen glaubt er nicht annehmen zu sollen, da eine experimentelle Provozierung nicht gelang; auch die Jahreszeit hat keinen Einfluß. P. ist der Ansicht, daß es sich bei den Fällen, welche mit trophischen Störungen, insbesondere der Nägel einhergehen, um eine Störung im peripheren Nervensystem handeln dürfte. Histologisch erscheinen die Blasen oberflächlich gelegen, von mehreren Lagen der Malpighischen Zellschicht begrenzt; die Milien fanden sich in den oberen Coriumschichten, in einer Ebene gelegen; sie schienen aus soliden Zellbalken durch Verhornung und Resorption des Inhaltes hervorzugehen. Entzündliche Erscheinungen fehlen.

Walther Pick (Wien).

Lichty, D. Dermatitis from Butter Coloring. Jour. Am. Med. Ass. XLVII. 2012. 15. Dez. 1906.

Lichty beschreibt einen Fall von Dermatitis durch zufällige, nicht gewerbliche Berührung mit einem zur Färbung von Butter gebrauchten Farbstoff. Verf. glaubt, daß es sich um einen Anilin- oder Kohlteerfarbstoff „Turmerin“ handle (obwohl der Name eher auf Ursprung von der Turmericpflanze [*Curcuma longa*] hinzudeuten scheint. Ref.).

H. G. Klotz (New-York).

Gaucher et Malloizel. Maladie de Hallopeau (pyodermite végétante). Ann. de dermat. et de syph. 1906.

Demonstration eines typischen Falles von Pemphigus vegetans bei einem 36jährigen Manne, mit polyzyklischen, am Rande pustulösen Herden, insbesondere an den Gelenkbeugen, in der Gegend des Nabels und der Mundöffnung, die mit Pigmentation abheilen. Besserung unter Resoreineinstaubung, feuchtem Verband, Bädern. Im Pustelinhalt *Staphylococcus aureus*.

Walther Pick (Wien).

Bloch. Erythème circiné récidivant. Dermite herpétiforme, variété érythémateuse (?). Ann. de dermat. et de syph. 1907. p. 126.

Ein 16jähriges Mädchen leidet seit 7 Jahren an einer in Schüben wiederkehrenden, hauptsächlich am Stamm sowie in den Gelenkbeugen an der Vorderseite [der Arme und Innenseite [der Schenkel lokalisierten Hautaffektion. Wenige Stunden nach Eintreten leichten Juckens an der betreffenden Stelle treten kleine Knötchen daselbst auf, die ein peripheres Wachstum zeigen und durch Konfluenz polyzyklisch begrenzte Herde bilden, deren mehrere Millimeter breiter Rand von hellroten Knötchen gebildet wird, ganz wenig infiltriert ist und gegen das Zentrum hin einen zarten, nicht adhärennten Schuppenfransensaum zeigt. Einmal fanden sich auch kleine Bläschen am Rande. Das Zentrum selbst ist deutlich pigmentiert, die Haut daselbst leicht gefältelt und schuppig. Nach einigen Tagen sind die Herde, deren Entstehungsursache während einer einjährigen Beobachtungszeit nicht festgestellt werden konnte, wieder verschwunden. Das histologische Bild ist nicht charakteristisch: Diffuse und perivaskuläre kleinzellige Infiltration.

Walther Pick (Wien).

Koblanck. Über Pemphigus neonatorum. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. LVII. p. 339.

Koblanck beobachtete einen Fall von angeborenem Pemphigus. Sofort nach der normal verlaufenen Geburt stellten sich am Rumpf und an den Oberarmen des Kindes Pemphigusblasen ein. Handteller und Fußsohlen frei. Haut des Gesichtes und des Schädels bläulich-rot, mit Spuren eingetrockneter Blasen versehen. Die Blasen heilten in wenigen Tagen und das bei der Geburt schwache Kind entwickelte sich späterhin gut. Die Mutter blieb gesund. Lues ausgeschlossen.

Koblanck glaubt, daß die Infektion von der Scheide aus erfolgt sei. Er hält den Staphylococcus aureus für den Erreger des Pemphigus neonatorum und zwar auf Grund eigener bakteriologischer Untersuchungen, die er in den 90er Jahren ausgeführt hat.

M. Winkler (Luzern).

Engmann, M. F. und Mook, W. H. (St. Louis). A Contribution to the Histo-pathology and the theorie of Drug Eruptions. The jouru. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. 11. 1906.

In einem Asyl, dessen aus Epileptikern, Dementen etc. bestehende Insassen, vielfach Jod und Brom erhielten, haben Engmann und Mook Erfahrungen über die betreffenden Arzneiexantheme gesammelt. Diese sowie die Ergebnisse histologischer Untersuchungen legen sie in einigen Sätzen nieder:

1. Die lokalen Eruptionerscheinungen treten gerne an Stellen, wo vorher eine Entzündung bestanden, auf; also um Comedones, Akne, seborrhoische Läsionen, Narben, Traumen, Kratzeffekte usw.

2. Traumen, Druck, schneller Temperaturwechsel können eine Eruption in den die Arzneistoffe enthaltenden Geweben beschleunigen.

3. Idiosynkrasie oder Empfindlichkeit ist wie bei andern toxischen Verhältnissen anzunehmen.

4. Die Drüsen der Hautfollikel nehmen nur durch Vermittlung der umgebenden Gefäße, also nur sekundären Anteil.

5. Die histologischen Erscheinungen sind die verschiedenen Grade der Entzündung bis zur Abszedierung und Nekrose.

6. Histologisch sind nachzuweisen: Wucherung der Bindegewebszellen und lymphoide Zellen um die Gefäße u. zw. in der sonst normalen Haut; multinukleäre Leukocyten mit granulären und vacuolisierenden Bindegewebszellen und Abszeßbildung an Stellen, wo auch andere toxische Faktoren einwirken.

Rudolf Winternitz (Prag).

Corlett, William Thomas. An analysis of sixty-five cases of bulloes diseases of the skin. The journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. 10. 1906.

Corlett bestimmt die Häufigkeit des Pemphigus unter seinen 11.964 Hautfällen auf 0.16%; die Schleimhaut war primär nur in 1 Falle erkrankt; keine Autoinokulationsfähigkeit; Verhältnis der erkrankten Frauen zu den Männern 16 : 4; der jüngste Patient 3½, der älteste 60 Jahre. Arsen hatte keinen besonderen Effekt.

Pemphigus foliac 1 : 9094 Fällen; die klinische Beschreibung ergibt die bekannten Züge. Ebenso die Schilderung eines eigenen Falles. Die Bedeutung der Staphylokokkenbefunde in den Läsionen ist zweifelhaft.

Pemphigus neonat. 3 Fälle; die Beschreibung des einen Falles entspricht vielleicht einer *Dermat. exfol.* (Ritter).

Impetigo bullosa: 15 Fälle unter den im spanisch-amerikanischen Krieg dienenden Soldaten. Autoinokulabler Blaseninhalt; Staphylokokken.

Dermatitis herpetiformis: 12 Fälle.

Epidermolys. bullos. heredit. 3 Fälle.

Urticaria bullosa: 1 Fall nach Influenza.

Rudolf Winternitz (Prag).

Ravogli, A. (Cincinnati). *Pemphigus vegetans*. The Journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. 7. 1906.

Die an Pemphig. veg. erkrankte 25jährige Patientin, eine russische Jüdin, stammte aus gesunder Familie, beobachtete die ersten Erscheinungen vier Monate nach ihrer Verheiratung als rote, lebhaft brennende, leicht juckende Flecken und Knötchen an der Brust, die sich auf den Nacken verbreiteten und von einem Arzte als luetisch angesehen wurden, weshalb sie eine antispezifische Behandlung durchmachte. Nach Geburt eines gesunden Kindes traten am Nabel Blasen auf, die ebenfalls zu einer kräftigeren antisypilitischen Behandlung Veranlassung gaben; später verschiedenen große Blasen in der Reg. genitalis, Abdomen, Achseln, welche nässende und granulierende Flächen zurückließen und sich durch randständige Blasen vergrößerten. Sie bot später ausgedehnte und oberflächlich nekrotisierende Stomatitis und Gingivitis, und, die ganzen Achseln, die Partien unter den Brüsten, um den Nabel und die Leisten ausfüllende Vegetationen, welche von Blasen kreisförmig umgeben waren. Im Blute betrugen kleine und große Lymphocyten je 20%; viel Albumen im Harn. Nach mehrfachen unter Arsen, prolongierten Bädern und Resorzinsalben erzielten Besserungen ging Patientin während einer nicht zu behebenden Enteritis zu Grunde.

Ravogli erörtert verschiedene Momente im klinischen Verlauf, den Beginn an deckenden Hautflächen, die öfter anfänglich vorgekommenen Verwechslungen mit Syphilis, den remittierenden Gang des Fiebers, die möglicherweise infektiöse Ätiologie (Waelsch, Stanziale), das Vorhandensein von Nephritis in seinem Falle (und auch in anderen). Er hält den Pemphigus vegetans nur für eine Varietät des Pemphig. vulg. die Vegetationen bedingt durch die reizenden und toxischen Eigenschaften des Blaseninhaltes, ähnlich dem Jododerma: der Gang des Fiebers, die Temperatursteigerung zur Zeit der neuen Blasenausbrüche sprächen für eine allgemeine infektiöse Ursache.

Die Dermatitis herpetiformis Duhring läßt sich leicht vom Pemph. vegetans durch die große Eosinophilie des Blutes, Polymorphismus der Eruptionen, heftiges Jucken, lange Dauer und das Wohlbefinden des Patienten unterscheiden.

Die anatomische Untersuchung der Vegetationen hat die bekannten Bilder der Epithelproliferation, der ödematösen Beschaffenheit der Epithelien, Vergrößerung der Interzellularspatien, Pigmentvermehrung, Vergrößerung der Papillen und ihrer Gefäße, Verbreiterung der kollagenen Fasern, Schwund der elastischen Fasern in den tieferen Schichten des Darmes ergeben.

Ravogli sieht den Prozeß als durch toxische Stoffe, welche in der Zirkulation sind, bedingte Trophoneurose an. Die Therapie sei bis auf temporäre und lokale Besserungen machtlos.

Rudolf Winternitz (Prag).

Pusey, Allen Wm. (Chicago). Vegetating Dermatoses; with report of two cases. The Journ. of cut. diseases incl. Syph. XXIV. 12. 1906.

Fall 1. Beginn als akutes vesicul. Ekzem, dessen Herde zum Teil ein bedeutend hypertrophisch wucherndes Aussehen von blumenkohlähnlicher Beschaffenheit bekamen. Diese Herde waren mit Epidermis bedeckt, oder ohne letztere mit Eiter und Krusten versehen. Jucken war mehr an den eigentlich ekzematösen Stellen vorhanden, als an den vegetierenden. Allgemeinerscheinungen fehlten. Bakteriologisch wurden nur Staphyl. (in den uneröffneten Pusteln) gefunden. Die Röntgenbehandlung erwies sich als nutzlos, dagegen brachten Waschungen und Umschläge mit Borlösungen Heilung.

Fall 2. Beginn unter dem Bilde eines seborrh. Ekzems Entwicklung von blumenkohlähnlichen, roten Vegetationen an der unteren Bauchpartie, der Vulva, den Inguines, den oberen Partien der Oberschenkel. Mikroskopisch: Retewucherung, Vacuolisation der Retezellen, Granulationsgewebe im Corium. — Bakteriolog.: Staphylokokken. Der Verfasser konnte alle ähnlichen Erkrankungen mit Vegetationen, wie Pemphig. vegetans, Ringwurm, Blastomykosis, Mykosis fungoides, Jod- und Bromexantheme ausschließen; er glaubt auch, daß Fälle von Hartzel u. a., welche als Pemphigus vegetans oder Dermatitis herpetiformis geführt wurden, letztere Diagnosen nicht mit Recht tragen, vielmehr dieselbe Erkrankung darstellen, wie die beiden von ihm (Pusey) hier beschriebenen.

Mit Wende, der ebenfalls Vegetationen auf Basis eines seborrhoischen Ekzem gesehen, hält er eine sekundäre Infektion von mäßiger Virulenz, welche die ekzematösen Hautstellen trifft, als Ursache der Vegetationen. Letztere können somit bei verschiedenen nässenden oder eiternden Hautaffektionen sich entwickeln. Die den Vegetationen ähnlichen Formen von Granuloma pyogenicum sind, weil chronischer, schwerer zu beseitigen, als die Vegetationen bei Ekzem. Die Deutung der Vegetationen als sekundäre Infektionsprodukte dürfte auch für die hypertrophischen Granulationen bei der akquirierten Folliculitis, beim Kerion und anderen Affektionen der Haut, vielleicht auch für den Pemphig. veget. und die Dermat. vegetans mit Vegetationen gelten.

In der Diskussion sprechen sich Grover W., Wende und Frank H. Montgomery in dem gleichen Sinne aus, daß die Vegetationen in

den Fällen Hartsells und Hallopeaus, sowie in jenen Puseys Folgen einer Eiterinfektion wären. Rudolf Winternitz (Prag).

Fordyce, John A. und Gottheil, William S. Dermatitis vegetans in its relations to Dermatitis Herpetiformis. The Journ. of cut. diseases. incl. Syph. XXIV. 12. 1906.

Hallopeau hat unter der Bezeichnung „Pyodermite végétante“ fünf Fälle zusammengefasst, deren Merkmale folgende waren: In der Umgebung der Genitalien, Lippen, an den Fingern von Erwachsenen, später ohne Symmetrie an anderen Körperstellen entwickeln sich ohne bestimmte Ursache Vesicopusteln auf entzündeter Basis, die sich rasch vermehren, während das Zentrum nach Abwerfen einer Borke eine düstere, papillar gewucherte Oberfläche bietet. Im Munde werden die Effloreszenzen rasch papillär wuchernd und widerstehen im Gegensatz zu den an der Haut lokalisierten der Heilung hartnäckig.

Mikroskopisch interessant war die Eosinophilie der Infiltratzellen (95%) und die Blutesinophilie (16%). Im Eiter wurde ein nicht näher definierter Bacillus gefunden.

Die Erkrankung ist weder mit Dermat. herpetiformis, noch mit Pemphigus vegetans zusammenzuwerfen, obzwar sie aus ihnen hervorgehen kann, gibt eine gute Prognose und ist antisept. Behandlung zugänglich.

Ähnliche Fälle haben Hartzell, Jamieson und Wickham sowie Fordyce publiziert, die zum Teil auf dem Boden einer Dermatitis herpetiformis-ähnlicher Affektion sich entwickelt hatten.

Auch der von Fordyce und Gottheil hier veröffentlichte Fall gehört in diese Gruppe. Bei einem 42jährigen Manne war zuerst am behaarten Kopf eine Eruption von Blättern („blisters“) aufgetreten und hatten sich letztere seither an verschiedensten Körperpartien durch Jahre wiederholt, teils Narben, teils ausgedehnte erodierte und krustöse Stellen zurücklassend. Ausgedehnte Ulzerationen im Leistendreieck (Penis und Skrotum), Hypertrophie und papillare Dermatitis der Unterschenkel und Füße. Während der Beobachtung traten zeitweise Schübe von Vesicopusteln auf, die teilweise zu größeren flachen Blasen, Pusteln und zu gezierten Effloreszenzen zusammenflossen, und wurde der papillomatöse Zustand (des l. Beines) beträchtlicher. Gaumen, Lippen und beide Conjunctiven wurden gleichfalls betroffen. Die Substanzverluste heilten unter örtlicher Behandlung nur sehr langsam. Die Untersuchung ergab geringe Albuminurie; 17% Eosinophile; Verminderung des Stickstoffs im Urin (trotz bedeutend vermehrter Nahrung); histologisch Wucherung des Rete, Bläschen in letzterem, welche ausschließlich mit eosinophilen Zellen gefüllt waren, Infiltration (mit meist eosinophilen Zellen) und Ödem im Corium; Mast-Plasmazellen in großer Zahl; Schwund der elast. Fasern. Von Bakterien wurden Staphylo-Streptokokken und ein grambeständiger Bazillus gezüchtet.

F. und G. lassen es unentschieden, ob ihr Fall, der den Eingangs zitierten gleicht, eine selbständige Affektion oder eine Varietät d. Pemph. vegetans, der Dermat. herpetiformis etc. sei. Alle diese Fälle stimmen

in manchen klinischen und mikroskopischen Punkten überein, doch dürfte der Pemphigus vegetans gemäß Lokalisation, Schwere und seinen letalen Ausgang einen besonderen Platz unter den Formen der Vegetating dermatitis beanspruchen.

Rudolf Winternitz (Prag).

Williams, A. W. Klinische Mitteilungen. The Brit. Journ. of Dermatol. Januar und Februar 1907.

1. Epidermolysis bullosa mit offenbar intrauterinem Beginn. An dem 5j. Mädchen waren an verschiedenen Körperstellen Narben zu sehen, herrührend von der operativen Lösung angeborener Verwachsungen zwischen Rumpf und Gliedmaßen, beziehungsweise Gliedmaßen untereinander. Blasen selbst waren im Alter von 2 Wochen zuerst beobachtet worden.

2. Lupus der Vaccinationsnarben. Die Mutter hatte auf die Impfpusteln Kuhdünge aufgelegt.

3. Urticaria gigantea, anscheinend verursacht durch Resorption von Toxinen einer chronischen Mittelohreiterung. Mit der Beseitigung der Otorrhöe verlor sich das Hautleiden fast gänzlich.

4. Eigenartiger Fall von multiplen Haut- und Unterhautgeschwülsten. 61j. Frau. Anamnese weist nicht auf Lues. Seit 15 Jahren treten ausschließlich an der linken Körperhälfte, an Schulter, Wange, Bein Knoten auf; das Leiden verschwand mehrere Male vollständig, kehrte dann wieder. Jetzt in den genannten Gegenden teils atrophische pigmentierte Narben, teils aus der Subcutis emporwachsende, am Bein gedrängt stehende Knoten, erbsen- bis taubeneigroß, weich elastisch bis knorpelhart; erreichen sie die Oberhaut, so trägt diese hellrote bis tiefbraune Papeln in zuweilen serpiginöser Anordnung. Einige papelbesetzte Knoten sind in der Mitte weicher, doch nirgends ist Durchbruch erfolgt. — Der behandelnde Arzt — der Verf. sah den Fall als Konsiliaris — heilte die von ihm als Lues angesehene Krankheit durch Jod innerhalb weniger Monate anscheinend dauernd.

5. Beispiele für den Heilwert der Behandlung mit fluoreszierenden Stoffen und Sonnenlicht. Von 6 Fällen von Gesichtslupus wurde durch äußerliche Behandlung mit halbprozentiger wässriger Eosinlösung einer geheilt, die übrigen wurden sehr gebessert. Ein Fall von tuberkulösem Lippengeschwür wurde (wie dem Verf. ein Kollege berichtete) durch das Mittel zur Heilung gebracht. Die Geschwürsfläche eines Ulcus rodens epithelisierte sich, doch wurde der Rand wenig beeinflußt. In 2 Fällen von Herpes tonsurans war der Erfolg ein geringer. Multiple „Paraffinome“ (Injektionsmasse von zu niedrigem Schmelzpunkt) an Nase und Augenlidern mit starkem Ödem und Bindegewebswucherung blieben unverändert.

Paul Sobotka (Prag).

Vollmer, E. Über Schälblasen. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin. Bd. XXXI. pag. 154.

Über eine kleine Epidemie von Pemphigus neonatorum berichtet Vollmer. Er beobachtete im ganzen 7 Fälle, wovon 2 tödlich verliefen. Das Krankheitsbild war nicht außergewöhnlich. Verf. empfiehlt zum

Schutze der Kinder die Desinfektion der Vagina vor der Geburt oder wenigstens eine gründliche Reinigung der äußeren Genitalien. Zur Bekämpfung der Epidemie ist es nötig, daß sämtliche Kinder, bei denen die betreffende Hebamme 8 Tage vor und 8 Tage nach dem Ausbruch der Schälblasen tätig war, untersucht und sofort behandelt werden. Die Hebamme selbst soll baden, Hände und Arme desinfizieren und Kleider und Instrumente von kompetenter Seite desinfizieren lassen. Das Betreten der Wohnung der Pemphiguskinder ist ihr strengstens zu untersagen.

M. Winkler (Luzern).

Danlos et Dehérain. *Herpès circoné trichophytique chez un enfant de 15 jours.* Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 412.

Die Autoren demonstrieren ein Kind, bei welchem sich seit dem 15. Lebenstage mehrere, sich rasch verbreitende Trichophytieherde am nates vorfinden. Sabouraud hat aus diesen Herden einen Pilz gezüchtet, den er stets bei den von ihm als „Trichophytie des plis“ bezeichneten und an den Inguinalfalten lokalisierten Trichophytien jugendlicher Individuen nachweisen konnte.

Walther Pick (Wien).

Lassueur. *Contribution a l'étude de la trichorrhexie nouvelle.* Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 911.

Lassueur konnte bei vier Patienten durch dreimal im Tag vorgenommene Seifenwaschung nach 21 bis 32 Tagen Trichorrhexis nodosa des Schnurrbartes erzeugen. Durch Einreiben mit einem das gleiche Symptom zeigenden Haarpinsel gelang eine Infektion nicht, ebensowenig eine Kontrolle des Lespinnischen Versuches durch Mischung kranker und gesunder Haare eine Infektion zu erzeugen.

Bei einer großen Zahl von Dachshaarpinseln konnte Trichorrhexis nachgewiesen werden, und Lassueur hält die Affektion für einfach traumatischen Ursprungs, wozu möglicherweise noch eine Disposition der Haare kommt.

Walther Pick (Wien).

Adamson, H. G. Mitteilung über die Ätiologie der Trichorrhexis nodosa. The Brit. Journ. of Dermat. März 1907.

Trichorrhexis nodosa hat nichts mit Mikroorganismen zu tun, sondern ist eine Folge mechanischer Einwirkung auf anderweitig geschädigte, besonders in ihrer Ernährung gestörte Haare. Schon an viel gebrauchten Pinseln und Zahnbürsten ist sie zu finden; die freien Haarenden bei Alopecie oder Ringworm bilden halbe Trichorrhexisknoten; bei 2 Frauen mit „seborrhoischer Kahlheit“ und mikroorganismenfreier Trichorrhexis konnte ein Schlag mit dem Papiermesser auf ein Haar zwischen zwei Knoten oder auch auf ein unverändertes Haar T. n. künstlich hervorrufen; ähnliches gilt in geringerem Grade für die meisten Fälle von Schuppung des Haarbodens mit Haarausfall. Völlig gesunde Haare erleiden durch einen solchen Hieb viel geringere Zerschleifungen. (Abbildungen im Text.)

Paul Sobotka (Prag).

MacLeod, J. M. H. Ein Fall von Knotenbildung an den Haaren. The Brit. Journ. of Dermat. Febr. 1907.

13j. Singalesin, deren Haare regelmäßig, sobald sie eine bestimmte Länge erreicht haben, abbrechen. Die Haare sind bandartig flach, an den Enden meist gekräuselt und aufgesplittert oder zugespitzt. Viele von ihnen tragen einen oder mehrere Knoten und zwar wahre oder „Schleifknoten“ (Abb. im Text). Erklärung der Knotenbildung: Durch zu reichliches Kämmen werden gerade Haare von so flachem Querschnitt stark gekräuselt; die so gebildeten Schlingen können durch weiteres Kämmen fester zugezogen werden. Paul Sobotka (Prag).

Danlos et Gastou. Lichen obtusus et vitiligo; examen histologique. Ann. de dermat. et de syphil. 1906. pag. 46.

Histologisch fand sich bei dem von Danlos bereits demonstrierten Falle eine hochgradige Hypertrophie der Epidermis und ein zentrales entzündliches Infiltrat enthaltend zahlreiche neugebildete Gefäße, lymphoide und epitheloide Zellen zum Teil perivaskulär gelagert. Histologisch steht, nach Ansicht der Autoren, die Affektion den epithelialen Neubildungen nahe,

Walther Pick (Wien).

Evans, Willmott. Erasmus Wilson lecture on leucoderma and analogous changes in the pigmentation of the skin. The Lancet. 1907. Feb. 16. pag. 407 ff.

Nach einigen Worten über die Häufigkeit der Vitiligo und ihren klinischen Verlauf spricht Evans über ihre Ätiologie. Die Theorie ihres nervösen Ursprungs stützt sich auf ihre symmetrische Verteilung, auf die Coincidenz der Vitiligo und der Erkrankungen des Nervensystems, auf die histologische Feststellung degenerativer Veränderungen an den peripheren Nerven bei dieser Erkrankung. Die Richtigkeit der nervösen Theorie weist Evans zurück. Eine häufig symmetrische Verteilung einer Hauterkrankung beweist nichts für ihren Zusammenhang mit dem Nervensystem; dazu kommen, daß die Flecke der Vitiligo gar nicht mit den Gebieten der peripheren Nerven zusammenfallen. Die Coincidenz der Vitiligo mit Nervenerkrankungen sei nicht häufig (Streit fand bei 1026 Fällen von Geisteskrankung nur sechsmal Vitiligo). Der histologische Nachweis degenerativer Veränderungen beruht allein auf eine Beobachtung von Leloir und Chabrier und ähnliche Befunde wurden seitdem nicht wieder erhoben.

Evans weist darauf hin, daß vielen Fällen von Leukoderm Erkrankungen des Darmtrakts vorausgingen. Ebenso wie verschiedene chemische Stoffe (Silber, Brom, Jod) eine symmetrische Hauteruption durch ihre Verteilung und Deponierung auf dem Blutwege zur Folge haben, stellt sich Evans vor, daß toxische Stoffe vom Darmkanal auf dem Blutwege zur allgemeinen Verbreitung kommen. Durch diese toxische Stoffe werden Makrophagen zum Angriff auf das Pigment der Haut veranlaßt, wobei die die Vitiligo lokalisierenden Faktoren mechanisch oder chemisch durch Trauma oder Licht bedingt sind. Diese Annahme stimmt in ihren Hauptzügen mit der Theorie überein, durch die Metschnikoff das Weißwerden der Haare zu begründen sucht.

Fritz Juliusberg (Berlin).

Danlos et Gastou. Lichen plan à localisation pilaire, simulant le pityriasis rubra de Devergie; étude histologique. Ann. de dermat. et de syphiligr. 1906. pag. 47.

In diesem Falle fand sich histologisch an Stelle der Lichenpapel die gewöhnliche Hyperkeratose, Verbreiterung des Str. granulosum, Infiltration und Gefäßveränderungen; daneben und im Zusammenhange damit ein Infiltrat um die in gleicher Weise veränderten Haarfollikel. Die Autoren sind auf Grund dieses histologischen Befundes der Ansicht, daß es sich nicht um eine Kombination von Lichen und Pityriasis handelt, sondern daß nur das Bild des Lichen durch die Lokalisation an den Haarfollikeln alteriert ist.

Walther Pick (Wien).

Nicolas et Favre. Lichen plan à grande extension de la peau et des muqueuses avec poussées multiples érythémateuses et oedémateuses. Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 701.

Eine 52jährige Patientin zeigt neben einem ausgedehnten Lichen der Haut und Mundschleimhaut plötzlich auftretende Ödeme, die sich rasch ausbreiten, Gesicht und Extremitäten ergreifen, ohne Schmerzen oder Einfluß auf das Allgemeinbefinden. Außerdem plötzliches Auftreten von Erythemen, die bald wieder schwinden und stets verbunden sind mit einer Steigerung des Pruritus und einer weiteren Ausdehnung des Lichen, so daß die Autoren, da jegliche Anhaltspunkte für eine medikamentöse Ätiologie fehlen, diese Störungen mit dem Lichen in ätiologische Beziehung bringen.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau. Sur un lichen de Wilson, tubéreux et vitiligoïde, variété nouvelle. Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 51.

Bei einem 53jährigen Patienten finden sich in der Analgegend und am Vorderarm typische Licheneffloreszenzen; in der Analregion Effloreszenzen, die sich von den anderen nur durch das Fehlen des Pigmentes unterscheiden; am Skrotum ein Herd, der einer Vitiligo ähnlich sieht, aber sich von dieser durch deutliche Induration, vertiefte, glänzende Hautfölderung, lokalen Pruritus unterscheidet, und vom Autor als „Vitiligoid“ gleichfalls zum Lichen gezählt wird.

Walther Pick (Wien.)

Dubreuilh. Histologie du lichen plan des muqueuses. Ann. de dermat. et de syphiligr. 1906. pag. 123.

Dubreuilh hält die Lokalisation des Lichen planus auf der Mundschleimhaut für häufiger als auf der Haut, und das Bild für charakteristisch, da es allein für sich schon die Diagnose gestattet. Mitteilung dreier einschlägiger Fälle. Das histologische Bild deckt sich völlig mit dem der Hautaffektion. Das nach unten scharf abgegrenzte, in den oberen Cutispartien sitzende Infiltrat besteht größtenteils aus mononukleären, lymphoiden Zellen, spärlichen polynukleären und sehr wenigen Plasmazellen. An der Zunge findet sich das Infiltrat hauptsächlich zwischen den Papillen, am Grunde der interpapillaren Zapfen, welche auch eine starke Epithelproliferation zeigen. Die übrige Epidermis

erscheint nicht verdickt. Die Gefäße weisen keine groben Veränderungen auf.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Grandchamp. Sur un lichen de Wilson systématisé en bandes avec envahissements poplités secondaires en nappe, contagiosité possible. Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 303.

Bei einem 75jährigen Mann besteht seit zwei Jahren ein bandförmig in der Voigtschen Linie lokalisierter Lichenherd an der Hinterfläche des rechten Oberschenkels, in der Kniekehle mit einem großen scheibenförmigen Herde endigend. Seit 8 oder 9 Monaten ein ähnlicher Herd in der linken Kniekehle, welcher nach Ansicht der Autoren durch trophische Reflexwirkung (symmetrischer locus minoris resistentiae gegen das supponierte infektiöse Agens) entstanden ist.

Walther Pick (Wien).

Danlos et Dehéraïn. Tache ardoisée de la muqueuse buccale dans un cas de lichen de Wilson. Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 271.

Bei einem an Lichen planus leidenden Patienten fand sich an der Innenseite der linken Wange ein dunkelgelb gefärbter Fleck, teilweise bedeckt von weißlich durchscheinendem Epithel. Da die Starrheit und netzförmige Zeichnung fehlt, glauben die Autoren keine Beziehung zum Lichen annehmen zu dürfen.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Weill. Sur un nouveau cas de lichen de Wilson pemphigöide. Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 377.

Bei einer 60jährigen Frau findet sich am Bauch und an den Extremitäten ein typischer Lichen planus, der heftiges Jucken verursacht; wenige Monate nach Beginn der Erkrankung treten unter Fiebererscheinungen große konfluierende Blasen auf, die nach einigen Wochen wieder, unter Hinterlassung von Pigmentationen, schwinden. Derartige Attacken (bei einer derselben tritt auch eine leichte Albuminurie auf) wiederholen sich in den folgenden Monaten noch zweimal, dann aber nimmt die Erkrankung wieder ganz das Bild des Lichen planus an.

Walther Pick (Wien).

Balzer et Deshayes. Kératodermie palmaire et plantaire familiale. Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 386.

Mitteilung eines typischen Falles von Keratoma hereditarium. Vater, Schwester des Vaters, drei Geschwister und die älteste Tochter des Patienten zeigten die gleiche Affektion, acht Kinder des Patienten waren frei davon.

Walther Pick (Wien).

Brault. Cas de pityriasis rubra pilaris chez une femme. Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 489.

Der Autor teilt den ersten von ihm in Algier beobachteten ganz typischen Fall einer Pityriasis rubra pilaris, bei einer 30jährigen Frau, mit. (Abbildungen beigelegt.)

Walther Pick (Wien).

Hallopoau et Mocé de Lépinay. Sur un cas d'une nouvelle eruption acnéiforme de la face: acnéides hémisphériques agminées. Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 589.

Bei einem 35jährigen Patienten finden sich am r. Nasenflügel und an der rechten Wange gruppierte, derbe, halbkugelige Knoten von Haferkorn- bis Erbsengröße, dunkelrot gefärbt. Einer der Knoten in der Nasolabialfalte ist von einer Schuppe bedeckt, unter welcher sich eine Exkoration vorfindet. Ein Knoten ist pustulös geworden. Da Hallopeau die Affektion weder mit Lues noch mit Tuberkulose identifizieren kann, schlägt er den Namen: gruppiertes, halbkugeliges Akneid vor.

Walther Pick (Wien).

Lesseliers. Contribution à l'étude du lichen scrophulosorum. Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 897.

Lesseliers hat in der Berner Klinik 17 Fälle von Lichen scrophulosorum histologisch untersucht und in 14 Fällen in den Schnitten Tuberkeln (runde, epitheloide und Riesenzellen) gefunden, in einem Falle einen Tuberkel ohne Riesenzellen, in einem Falle einen solchen mit einer nicht charakteristischen Riesenzelle, endlich in einem Falle keinen Tuberkel, sondern bloß einfache Entzündung. Der Autor diskutiert die einschlägige Literatur und ist im Gegensatz zu Porges der Ansicht, daß der Lichen scrophulosorum, welcher früher latent, erst durch die Tuberkulininjektion manifest wird, von der gewöhnlichen Form nicht zu trennen ist.

Walther Pick (Wien).

Balzer et Poisot. Lichen scrophulosorum chez un adulte. Ann. de dermat. et de syph. 1906. pag. 964.

Bei einem 31jährigen Patienten finden sich am Stamm auf erythematöser Basis gruppierte, kleinste, blaßrosa oder gelblich gefärbte, follikuläre Knötchen mit zentraler Delle. Die Differentialdiagnose gegenüber Lichen syphiliticus schwierig, doch wird dieser bei negativer Anamnese auf Grund des Fehlens der Eruption an den Extremitäten, der blassen Färbung und geringen Infiltration der Knötchen ausgeschlossen. Rasche Besserung durch Arsen und Jodtannin innerlich, Methylenblau in alkoholisch-wässriger Lösung (1%) äußerlich. Walther Pick (Wien).

Milian. Nature tuberculeuse du pityriasis rubra pilaire. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1067.

Bei einem 33jährigen Maurer findet sich die Haut der Handrücken, Vorderarme, Beine diffus gerötet und infiltriert, die Hautfärbung vergrößert. Am Stamm neben geröteten Herden follikuläre erythematöse, im Zentrum kugelförmige Effloreszenzen. Zarte lamellöse Schuppung der Haut des Gesichtes und des Kopfes, Hyperkeratose an den Fußsohlen. Der Autor hält den Fall für eine typische Pityriasis rubra. Auf 6 mg Tuberculin allgemeine Reaktion und Steigerung der Rötung sowie Hervortreten früher nicht sichtbarer follikulärer Kegel an den Phalangen. Der Autor glaubt an eine tuberkulöse Ätiologie der Affektion u. zw. auf Grund der Häufigkeit der Tuberkulose bei diesen Patienten, auf Grund von Übergangsfällen zum Lichen scrophulosorum, auf Grund der lokalen

Tuberkulinreaktion und der Besserung der Erscheinungen nach der Injektion. Möglicherweise gehören auch das Eczema folliculorum, der Lichen planus und die Broquische „Pseudopelade“ zu den tuberkulösen Hautaffektionen. Walther Pick (Wien).

Darier. Le groupe des maladies dites séborrhéiques. La „Kérose.“ Ann. de dermat. et de syph. 1907. p. 3.

Nach einem Überblick über die Geschichte der seborrhoischen Hautaffektionen von Willan bis Sabouraud, Jacquet und Besnier gelangt Darier dazu, den Namen „Kérose“ für die bisher als Seborrhoe bezeichnete Hautbeschaffenheit vorzuschlagen. Der Name „Seborrhoe“ hatte den Nachteil, daß er gleichzeitig sowohl für eine Erkrankung der Haut, als auch für ein diese Erkrankung häufig begleitendes Symptom, die gesteigerte Sekretion der Talgdrüsen, gebraucht wurde. Der Stamm des Wortes „Kérose“ soll ausdrücken, daß es sich um eine Veränderung der verhornten Epidermis handelt, seine Endung, daß es sich um einen chronischen, nicht notwendigerweise entzündlichen Zustand handelt. Der Begriff der Kérose wäre zu definieren als ein krankhafter Zustand der Haut, charakterisiert durch eine gelbliche oder leicht graue Färbung derselben, mit Verdentlichung der Follikelmündungen, einer bald fetten, bald mehr trockenen Konsistenz mit Neigung zu kleienförmiger Abschuppung und einer besonderen Vulnerabilität, die zu bestimmten Infektionen der Oberfläche disponiert.

Die eigentümliche gelbliche Färbung dürfte mehrere Ursachen haben: Eine Verdickung und geringere Durchsichtigkeit der Hornschicht, Zirkulationsstörungen, ein gewisser Grad oberflächlicher Anämie und ein leichtes Ödem. Die Follikelmündungen sind bald deprimiert (durch Verdickung der zwischen ihnen liegenden Epidermis oder durch ödematöse Schwellung der Papillen), bald dilatiert, bald zeigen sie eine Hyperkeratose und sind von fest zusammenhängenden bräunlich oder leicht grau gefärbten Hornlamellen gekrönt. Die kerotische Haut ist zwar für gewöhnlich anämisch, wird aber leicht rot durch Kratzen, Druck, Erregung etc., und zeigt später Teleangiektasien an Wangen, Stirne, Nase, Ohrmuscheln; sie zeigt einen leicht ödematösen Zustand und erscheint hiedurch insbesondere an den Falten und Furchen verdickt; für ihre verminderte Spannung, welche eine leichtere Faltung gestattet, adoptiert Darier die Bezeichnung Hypotonie.

Die Abschuppung bei der Kérose, als Pityriasis bezeichnet, findet sich in allen Variationen, von der Norm bis zu den höchsten Graden ausgesprochen, unter Bildung trockener oder mehr oder weniger fetter Schuppen; sie ist nicht entzündlicher Natur. Die Pityriasis simplex faciei der Kinder gehört nicht hierher; sie ist eine oberflächliche, infektiöse, kontagiöse und epidemische, leicht heilbare Dermatoe. Auch die Seborrhoe (Steigerung der Talgsekretion) findet sich in allen Graden; doch kann die kerotische Haut fett und glänzend erscheinen, ohne daß Seborrhoe besteht. Bei der Kérose findet sich zuweilen, besonders an Nase und Kinn, eine Hypertrichose; häufiger ist eine Alopecie, welcher zunächst

eine gesteigerte Haarbildung vorangeht. Bald aber ermüdet die Papille und atrophiert. Es ist zweifellos, daß auch dem Schweiß bei der Kerosis Fett in verschiedenem Grade beigemischt ist; ob dasselbe aus dem Glomerulus der Schweißdrüsen stammt oder dem Schweiß erst bei der Passage durch die Haut beigemischt wird, ist nicht entschieden. Darier konnte nachweisen, daß der Fettgehalt mit der Dauer der Sekretion abnimmt.

Die *Acne vulgaris*, *neerotica*, *nuchae* und die *Keloidakne* entwickeln sich auf kerotischem Boden, sind Komplikationen der Kerosé; *Seborrhoe* kann hiebei fehlen. Das gleiche gilt von der *Acne rosacea* und dem *Eczema seborrhoicum* in seinen verschiedenen Formen. Sowohl bei der *Acne vulgaris* als beim Ekzem scheinen *Staphylokokken* als infektiöses Agens auf kerotischer Basis zu wirken. Als Ursachen der Kerosé spielen *Heredität*, Ernährungsbedingungen, Störungen im Sexual- und Gastro-Intestinalsyst $\ddot{u}$ m eine Rolle; ob die regelmäßig nachweisbaren Mikroorganismen einfache *Saprophyten* sind oder durch ihr gesteigertes Wachstum auch die Haut alterieren, ist nicht zu entscheiden.

In Bezug auf die Histologie glaubt Darier bei der reinen Kerosis eine Verdickung der Hornschicht, insbesondere an den Follikelmündungen, und eine Verdünnung der Malpighischen Schicht bemerkt zu haben, doch bewegen sich die Veränderungen noch innerhalb der normalen, durch Alter und Lokalisation bedingten Grenzen.

Was die Natur der Erkrankung betrifft, so ist die Kerosé eine regionäre, eine bestimmte Entwicklung einhaltende Dystrophie. Die Diagnose ist leicht; vor Verwechslungen mit leichten Formen von ichthyotischen Zuständen schützt die Lokalisation. Die Therapie muß allgemein (Bekämpfung der in jedem Falle nachweisbaren Allgemeinstörungen) und lokal (reduzierende Mittel) sein.

Walther Pick (Wien).

Fruhinsboiz. Un cas de malformation cutanée à type cicatriciel héréditaire. *Ann. de dermat. et de syph.* 1907, p. 194.

Mitteilung eines Falles von kongenitalen Narben bei Mutter und Kind; bei der Mutter haben die Narben das Aussehen alter Verbrennungsnarben; sie sitzen symmetrisch an beiden Knien und reichen mit ihren Ausläufen bis in die Trachantergegend; kleinere ähnliche Narben über den Sprunggelenken und über der linken Sakralgegend; am Kopf zwei kleine Herde von *Aplasia cutis*. Der 3000 g schwere Neugeborene zeigt eine einer kurz vernarbten Verbrennung ähnliche Stelle am Rücken, diesen fast ganz einnehmend; an der Hüfte und am Schenkel kleinere Narben wie nach der Entnahme von Thiersch-Lappen. Am Amnion finden sich linsengroße, weißliche, durchscheinende Stellen, die aber histologisch keine Epithelauflagerungen zeigen.

Walther Pick (Wien).

Jamieson, W. Allan. Clinical remarks on ichthyosis and its treatment. *The British med. Journal* 1907, Feb. 16., p. 362 ff.

An der Hand einschlägiger Fälle spricht Jamieson über das Wesen und die Behandlung des Ichthyosis. Man muß sie als eine über-

normale Entwicklung von Epidermis auffassen, als eine „Hyperkeratose mit Atrophie der tieferen Schichten des rete mucosum“ (Thibierge). Die von Unna und Tommasoli beschriebenen entzündlichen Symptome sind vielleicht nur akzidentelle. Ihr Wesen besteht in einer abnormen Retention der Hornschicht. Die Behandlung muß darauf gerichtet sein, die reguläre systematische Abstoßung der abgenutzten Hornzellen zu fördern.

Aus Rücksicht auf die Reizwirkung des Schwefels und auf die Gefahren einer über große Flächen sich erstreckenden Salizylbehandlung wendet Jamieson mit Vorliebe Resorcin mit Glycerin und Stärke gemischt an. Daneben kommen überfettete Schwefelseifen in Betracht.

Den internen Mitteln legt Jamieson bei dieser Erkrankung wenig Wert bei.

Fritz Juliusberg (Berlin).

Montgomery, Frank Hugh and Bassoe, Peter (Chicago). A case of Pityriasis rubra of Hebras type, with autopsy report. The Journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. 7.

Der Patient von Montgomery und Bassoe war ein 46j. wohlgenährter, temporärer Alkoholiker, der auch ziemlich viel Kaffee trank und exzessiv rauchte. Die typische Pityriasis rubra begann bei ihm mit einer Blatter an der Sohlenfläche des rechten Fußes, um sich von hier als erythematöse und leicht vesikulöse Eruption über die Extremität und innerhalb eines Monats über den Körper zu verbreiten. Zuerst bestand heftiges Jucken, nach allgemeiner Verbreitung des Exanthems stellte sich Exfoliation ein und in diesem Zustand der Rötung, stellenweise Verdickung und Schuppenbildung, verblieb die Affektion, mit welcher gleichzeitig extremste Kälteempfindung verbunden war, bis zu dem 18 Monate später erfolgten Ableben. Der Patient war zeitweilig stupid oder nervös und hysterisch.

Besserungen seines Hautleidens wurden durch salinische Mittel, Milchdiät, etwas Strychnin und Chinin innerlich und eine indifferente Salbenbehandlung erzielt.

Die Sektion ergab außer einer leichten interstitiellen Nephritis keinerlei Aufschluß über die Ursache des Todes, so daß eine Toxämie infolge der Hauterkrankung angenommen wurde.

Ätiologisches für die Natur des Hautleidens können die Autoren nichts erbringen; sie sprechen sich mit Jadassohn für die klinische Wesenheit des Prozesses aus, den sie nicht mit anderen exfoliierenden Dermatitiden zusammengeworfen wünschen.

In der Diskussion berichten Bowen und White über ähnliche Fälle, Pusey weist auf die Verwirrung hin, die durch das Zusammenwerfen morphologisch ähnlicher Fälle sich ergibt, die aber aus verschiedenen Exanthemen entstanden sein können, Elliot will ebenfalls scharf den primären Typus Hebras von den übrigen, als Folgen anderer Exanthemen resultierenden, roten, exfoliierenden Dermatitiden getrennt wissen. Er weist auch auf den als primäre exfoliierende Dermatitis mit Fieber beginnendem Typus von Erasmus Wilson hin, welcher nach einigen Monaten mit völliger Gesundheit endigt.

Alle echten Fälle von Pityr. rub. Hebrae enden letal und die meisten unter einer Form von Tuberkulose (S. Jadassohn); Duhring betont die große Seltenheit der rechten Pityr. Hebra, C. White bemängelt es, daß Hebra die übrigen Formen exfoliierender Dermatitis nicht scharf beschrieben und dürfte Hebra die Pityr. rubra von den letzteren Formen nicht scharf unterschieden haben.

Rudolf Winternitz (Prag).

Bowen, John T. (Boston). A case of Lichen spinulosus. The Journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV.9. 1906.

Bei einem 19j. Mann, der bis auf ein im Kindesalter überstandenes Gesichtsekzem gesund gewesen, entwickelte sich zur Sommerszeit zuerst am Nacken, später vornehmlich an den Streckseiten der Extremitäten Gruppen von follikulären Hyperkeratosen mit kleinen Hornstacheln. Die Affektion schwand unter Applikation von Ol. cadmi und Salizylglyzerin amyllum. In Amerika scheint diese zuerst von Crocker und Colcott Fox 1888 in England beschriebene und daselbst ziemlich häufige Affektion recht selten zu sein. Fox hat auf das Vorkommen der fadenförmigen Stacheln beim Lichen cachecticorum und specificus aufmerksam gemacht.

Mikroskopisch Hyperkeratose und Acanthose follicul. daher nach Unna die Bezeichnung Keratosis follicul. spinulosa zweckmäßig erscheint. Ätiologisch kommt vielleicht ein toxischer Ursprung gleich der Arsenkeratose in Frage (Adamson).

Rudolf Winternitz (Prag).

Malinowski, J. Die Darriersche Krankheit (Psorospermiosis follicularis vegetans). Monatshefte für prakt. Dermatologie, Bd. XLIII.

Ausführliche klinische Schilderung und eingehende histologische Untersuchung eines Falles von Darrierscher Krankheit nebst Würdigung der einschlägigen Literatur. Nach Ms. die verschiedenen Entwicklungsstadien der Erkrankung berücksichtigenden mikroskopischen Untersuchungen handelt es sich hier um Akantholyse (Zerfall der Stachelzellen) und Dyskeratose, die zur Bildung der corps ronds führt. Die unregelmäßige und übermäßige Hornbildung führt zur Ansammlung horniger Massen, die einen Druck auf die Cutis ausüben und den entzündlichen Zustand derselben und Atrophie der Papillen bedingen, während die Papillen an der Peripherie der Effloreszenz sich verlängern und dadurch ein Wulst von der Farbe der normalen Haut entsteht. Nach Stillstand der Akantholyse und Dyskeratose bleibt narbenartige Hautatrophie zurück. Der ausschließliche Zusammenhang der Erkrankung mit den Follikeln ist nicht anzuerkennen, daher auch die Bezeichnung Psorospermiosis follicularis nicht zutreffend, zumal die corps ronds keines Psorospermien sind; zu empfehlen wäre der Name „Darriersche Krankheit“ oder „Darriersche Dyskeratose“.

Ludwig Waelsch (Prag).

Anthony, Henry G. (Chicago). The report of a case of Parakeratosis variegata. The Journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV.10. 1906.

Anthony hält es nicht für entschieden, daß die Dermatitis psoriasiformis nodularis (Jadassohn) mit der Keratosis variegata identisch

sei (resp. verschiedene Manifestationen derselben Krankheit). Er berichtet über einen Fall von *Parakeratosis variegata* bei einem Minenarbeiter, bei dem sich die Affektion offenbar aus einem Schweißausschlage entwickelt hatte und differenziert seinen Fall von *Lichen ruber planus* durch folgende Momente: *Parakeratosis variegata* hat eine andere klinische Entwicklung als der Lichen; es fehlt das Jucken, die Behandlung ist erfolglos, die Affektion ist rein oberflächlich. Die Pigmentierung ist ein essentielles und nicht ein Folgesymptom wie beim Lichen plan.

Rudolf Winternitz (Prag).

Bulkley, L. Duncan. The Cure of Psoriasis, with a Study of 500 Cases of the Disease Observed in Private Practice. Journ. Am. Med. Ass. XLVII. 1630. 17. Nov. 1906.

Bulkley wiederholt in diesem Vortrag im allgemeinen nur seine früher schon ausgesprochenen Ansichten über Psoriasis, die in der Hauptsache kein neues Licht auf den Gegenstand werfen. Psoriasis ist nicht eine reine lokale Hautkrankheit, sondern hat wichtige Beziehungen zu der Konstitution des Patienten. Sie ist nicht parasitischer Natur und nicht ansteckend, aber die lokalen Ausbrüche werden durch die gewöhnlichen Hautparasiten begünstigt. Eine dauernde Heilung durch lokale Behandlung ist nicht möglich; wo eine solche scheinbar erzielt wurde, scheint es sich um seborrhoische Dermatitis gehandelt zu haben. Erbllichkeit ist nur von untergeordneter Bedeutung, mit Syphilis besteht kein Zusammenhang. Wahrscheinlich handelt es sich immer um Unregelmäßigkeiten des Stoffwechsels, deren Beurteilung durch wiederholte Urinuntersuchungen befördert wird. Kein inneres Arzneimittel ist von absolutem Wert, auch nicht Arsenik, von größerer Wichtigkeit sind diätetische Maßregeln, besonders soviel wie möglich absolute vegetabilische Nahrung. Unter Umständen ist eine längere Behandlung notwendig.

In der Diskussion in der Sektion für Hautkrankheiten der Am. Med. Gesellschaft werden von einzelnen Anwesenden Berichte über persönliche Erfahrungen mit der Krankheit gegeben, die allgemein verbreitete Ansichten bestätigen aber auch den nur relativen Wert der Arsenbehandlung. Sylvester sah die Psoriasis verschwinden nach einer Laparatomie wegen Uterusfibroid mit Polypen und starker Leukorrhoe. Gottheil berichtet über einen Fall, in welchem nervöse Aufregung die Ausbrüche auslösten. Shepherd und andere bestätigen den wohlthätigen Einfluß von Regulierung der Diät in manchen Fällen. James C. White betont namentlich die Neigung der Krankheit zu unregelmäßigem Verlaufe; deshalb könne man nicht ohne weiteres Schlüsse auf die Wirksamkeit einer Behandlungsweise ziehen. Mit zunehmender Erfahrung verringere sich sein Vertrauen auf innere Behandlung, namentlich auf Arsenik; in chronischen Fällen finde er Jodkali wirksamer. Betreffend die Diät, so seien ganz gleiche Erfahrungen mit absolut animalischer wie mit absolut vegetabilischen in den Händen verschiedener Beobachter gemacht worden. Die Röntgenbehandlung habe nur ein weiteres unsicheres Mittel in die Psoriasisbehandlung eingeführt.

Stelwagon schreibt der Erbllichkeit eine größere Bedeutung zu; der Erfolg der Behandlung hänge wesentlich davon ab, zu welcher Zeit dieselbe ins Werk gesetzt werde, d. h. je näher der Periode, in der spontane Besserung eintritt; er berichtet über Erfolge mit Karbolsäure. Baum erkennt auch den größeren Einfluß der Heredität an; Vaccination und namentlich Antitoxineinspritzungen geben häufig Veranlassung zu Ausbrüchen. Lieberthal betont die Schwierigkeiten bei der Durchführung strikter Diätvorschriften. H. G. Klotz (New-York).

Boesi, C., Oberstdorf. Ein Beitrag zur Ätiologie der Psoriasis. Wiener klinische Rundschau 1906, Nr. 48.

Ein junger 17jähriger, kräftiger Bauernbursche erkrankte an einer ausgebreiteten typischen Psoriasis vulgaris numularis. Für die Entstehung war keine hereditäre Belastung nachzuweisen, dagegen machte der Patient als Ursache übermäßigen Kochsalzgenuß während vieler Monate bei seiner Beschäftigung als Salzer in einer Käserei geltend. Groß hat bei Psoriasis die Ausscheidung von großen Chlormengen nachgewiesen, welche auf Rechnung der Kochsalzeinfuhr zu setzen sind. Es tritt aber auch nach Groß eine Kochsalzretention ein, welche eine Begleiterscheinung der Ausbildung der pathologischen Psoriasisprodukte ist. Auch in diesem Falle hatte ein intensiver Salz hunger den Patienten veranlaßt, beständig große Mengen von Kochsalz zu sich zu nehmen. Schließlich erwähnt der Autor, daß die im oberen Allgäu in relativ großer Zahl zur Beobachtung kommenden Fälle universeller oder lokaler Psoriasis eine ähnliche Erklärung damit finden könnten, daß mit dem bekanntermaßen den Hauptbestandteil der Ernährung bildenden Käse fortgesetzt große Mengen von Kochsalz aufgenommen werden, die dann unter ähnlichen Bedingungen wie im oben erwähnten Falle die Psoriasis hervorzurufen imstande wären. Viktor Bandler (Prag).

Hallopeau et Macé de Lépinay. Localisations psoriasiques sur des syphilides. Ann. de dermat. et de syphiligr. 1906, p. 960.

Bei einem 60jährigen Patienten finden sich typische Herde von Psoriasis an den Ellbogen, den Handflächen und den Oberschenkeln. Ein Herd am Stamm und ein weiterer an der Innenseite des linken Knies zeigen in serpiginöser Umgrenzung auf bräunlichem oder rötlichem Grunde einestheils hellrote Effloreszenzen, die schuppen und nach Ablösung der Schuppe punktförmig bluten, andertheils mit grünlichen, festhaftenden Krusten bedeckte Effloreszenzen. Die Autoren glauben, daß die Syphilide den lokalen Reiz für die Lokalisation der Psoriasis abgegeben haben. Pautrier hat einen ähnlichen Fall beobachtet.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Macé de Lépinay. Sur une arthropathie psoriasique aiguë blennorrhagiforme (variété nouvelle). Ann. de dermat. et de syph. 1906, p. 693.

Demonstration eines Psoriatikers, bei welchem während einer Eruption eine akute, schmerzhafte Entzündung im linken Handgelenk, ganz

unter dem Bilde des gonorrhoeischen Gelenksrheumatismus aufgetreten war. Gonorrhoe nicht nachweisbar. Walther Pick (Wien).

Balzer et Deshayes. Psoriasis atypique au cours d'une infection blennorrhagique. Ann. de dermat. et de syphil. 1906, p. 55.

Bei einer Patientin, die an gonorrhoeischem Gelenkrheumatismus leidet, tritt vier Monate nach Beginn dieser Erkrankung eine ausgebreitete Psoriasiseruption auf, die ausgezeichnet ist durch das hochgradige Befallensein der Flachhände, Interdigitalfalten und der Beugeseite des Vorderarmes, doch finden sich an Kopf, Extremitäten, Nabelgegend ganz typische Herde. An den Lippen besteht gleichfalls eine Verdickung der Epidermis. Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Macé de Lepinay. Nouveaux cas d'aplasie moniliforme des cheveux. Ann. de dermat. et de syph. 1906, p. 958.

Bei einem 6jährigen Knaben erscheint die Kopfhaut gerötet, körnig, nur mit Lanugo besetzt; die Körnelung ist durch die Erhabenheit der Follikelmündungen bedingt; vereinzelte längere, schwarze, abgebrochene Haare vom Typus der Pili moniliformes. An der Streckseite der Arme besteht Keratosis pilaris. Die sonstige Haut normal, nur die Augenbrauen defekt. Die Erkrankung läßt sich bis auf die Urgroßmutter des Patienten zurückverfolgen (genauer Stammbaum beigelegt). Walther Pick (Wien).

Danlos et Dehérain. Pelade et vitiligo. Ann. de dermat. et de syph. 1906, p. 268.

Bei dem Patienten Danlos' besteht seit 26 Jahren eine Alopecie; dieselbe setzte ungefähr gleichzeitig mit einerluetischen Infektion ein, wurde in wenigen Monaten komplett und zwei Jahre später von einer Vitiligo gefolgt. Jaquet macht auf die Häufigkeit des Vorkommens der Alopecie und der Vitiligo bei Luetikern aufmerksam. Er hat auch bei sehr alten Fällen von Alopecie noch Lanugo in den Follikeln gefunden, so daß in diesen Fällen immer noch Hoffnung auf Heilung besteht. Walther Pick (Wien).

Kingsbury, Jerome (New-York). Alopecia congenita. The Journ. of cut. dis incl. Syph. XXIV. 9. 1906.

Verfasser betont die Schwierigkeit, die Fälle von kongenitaler Alopecie (der Kopfhaut) von jenen einer allgemeinen Atrichie, einer frühzeitig erworbenen Kahlheit etc. abzusondern. Die frühere Annahme eines neurotischen Faktors bei der angeborenen Alopecie ist gefallen. Es gibt mehrere entwicklungsgeschichtliche Möglichkeiten für die Entstehung der Anomalie. Die bisherigen Einteilungen scheinen dem Autor nicht alle Verhältnisse, wie Zusammenhang mit Erkrankungen der Haut, zu berücksichtigen. K. berichtet über drei Kinder mit angeboren dürtigsten resp. fast fehlendem Kopfhaar, keulenförmigen Fingerenden und verdickten brüchigen Nägeln. Die Mutter der Kinder hatte ebensolche Finger und Nägel, der Groß- und Urgroßvater mütterlicherseits hatten dieselbe Haar- und Nagelanomalie, ebenso die Brüder des letzteren.

Die mikroskopische Untersuchung der Kopfhaut an einer vollständig kahlen Stelle zeigte spärliche Follikel, von meist atrophischer Beschaffenheit, einzelne zeigten aber einen distinkten Bulbus und die Papille, sowie beginnende Haarbildung, die aber nirgend die Hautoberfläche erreichte.

Verfasser schließt: die bisherigen Fälle sind für bleibende Schlüsse zu spärlich; gewisse Fälle deuten auf entwicklungsgeschichtliche Momente, welche bei der Bildung der Menschenrassen eine Rolle spielen; die häufige Konzidenz mit Nagel-, Zahn- und Hauterkrankungen in gewissen Fällen deuten auf in den frühen Embryonalmonaten das Epiblast treffende pathologische Momente. Die mikroskopischen Befunde sind wenig bezeichnend. Die Diagnose ist leicht; die Prognose zumeist hoffnungslos.

Rudolf Winternitz (Prag).

A propos de la contagion peladique. Ann. 1906 p. 39, 131.

Hauptsächlich zwischen Hallopeau und Jacquet sich abspielende Diskussion über die Kontagiosität der Alopecie areata im Anschluß an Beobachtungen von Dr. Giry (Briey), der in einer Schule 11 von 45 Kindern erkrankt fand und in einer Familie 6 Mitglieder in kurzen Intervallen erkranken sah. Hallopeau tritt für, Jacquet gegen die Kontagiosität ein; die interessante aber recht ausführliche Diskussion eignet sich nicht zu kurzem Referate.

Walther Pick (Wien).

Jacquet. Pelade par projectiles intracraniens. Ann. de derm. et de syph. 1906, p. 248.

Der Patient Jacquets leidet im Anschluß an eine Schußverletzung seit 22 Monaten an Kopfschmerzen; von 3 Revolverkugeln wurde die eine an der Stirne extrahiert, die zweite, welche angeblich durch das rechte Ohr eindrang, zeigt das Radiogramm etwas vor und unter dem Meatus auditor. ext., die dritte liegt in der linken Hinterhauptgegend, an der gleichen Stelle, an welcher seit 3 Wochen eine Alopecie besteht. Rechts besteht Hemiparese. Für Jacquet ist der Fall ein neuer Beweis der trophoneurotischen Natur der Alopecia areata.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Gastou. Sur un cas d'hydradénomes éruptifs chez une malade atteinte de lupus érythémateux. Ann. de derm. et de syph. 1906, p. 61.

Eine Patientin mit Lupus erythematodes am Kopf, Gesicht und Fingern zeigt auf der Brust Syringocystadenome. Im histologischen Bilde heben die Autoren Veränderungen an den Gefäßen, in Gestalt hochgradiger Endothelproliferation, hervor. Diese Gefäße bilden dann oft zystische Gebilde, ganz ähnlich den sonst bei dieser Affektion sichtbaren Cysten; deshalb und wegen des Umstandes, daß einige Effloreszenzen des Syringocystadenoms wieder verschwinden können, werfen die Autoren die Frage auf, ob es sich bei dieser Affektion wirklich um einen Tumor handelt oder um eine Gefäßneubildung, die wie der Lupus erythematodes durch Tuberkeltoxine bedingt ist.

Walther Pick (Wien).

Schamberg, Jay Frank (Philadelphia). A case of lupus erythem. in early childhood. A clinical memorandum. The journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. 8.

Lupus erythemat. von vascul. typus an den Wangen eines 4 $\frac{1}{4}$ —5 Jahre alten, sonst gesunden Mädchens. Eine Tante väterlicher-, ein Großonkel mütterlicherseits an Tuberkulose gestorben. In der Literatur sind die Fälle von Lupus erythem. des Kindesalters sehr selten.

Rudolf Winternitz (Prag).

Bildungsanomalien.

Schüller, M. Bemerkungen zu L. Karwackis „Beitrag zur Kenntnis der Geschwulstflora“. Zentralblatt f. Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. XL. p. 212.

Schüller wendet sich in dem kurzen Artikel gegen Karwacki, dem er ohne jeden Beweis bestreitet die sogenannten Parasiten Schüllers gesehen zu haben, die bekanntlich Carcinom, Sarkom und Syphilis erzeugen sollen. Die ganze Mitteilung ist sonst ohne Interesse.

Wolters (Rostock).

Waljaschko, G. A. Über das elastische Gewebe in Neubildungen. Virchows Archiv. Bd. CLXXXVII. Heft 2.

Die Beziehungen des elastischen Gewebes, u. zw. des schon bestehenden zum Geschwulstgewebe sind von großem Interesse. Die verschiedenen Arten von Geschwülsten verhalten sich während ihres Wachstums gegen das elastische Gewebe verschieden. Diese Beziehungen können wertvolle Kennzeichen abgeben sowohl für die Diagnose der Geschwulst und ihrer Wuchseigentümlichkeit, als auch für die Aufklärung der feineren topographischen Beziehungen.

Die Gesamtzahl der auf elastisches Gewebe untersuchten Geschwülste betrug 240. Davon waren gutartig 49, Endotheliome 16, Sarkome 40 und Carcinome 135. Die Resultate der ganzen Arbeit werden in allgemeiner Form wiedergegeben. Bezüglich des näheren verweist Verf. auf seine diesbezügliche Monographie „Über elastisches Gewebe in Neubildungen“. Petersburg 1906.

Die wesentlichen Folgerungen aus seinen Untersuchungen faßt Waljaschko in folgende Schlußsätze zusammen:

1. Das elastische Gewebe stammt nicht vom Geschwulstgewebe ab. Gemischte Geschwülste machen eine Ausnahme.

2. Das elastische Gewebe nimmt insofern an der Geschwulst teil, als in letzterer Muttergewebe da ist. Dabei zeichnet sich die Elastica im Vergleich zu anderen Geweben durch größere Festigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.

3. Geschwülste mit expansivem Wachstum enthalten elastisches Gewebe in spärlicher Menge in den peripherischen Teilen.

4. Geschwülste mit infiltrierendem Wachstum enthalten elastisches Gewebe in verschiedener Menge, aber in den tiefen Teilen entbehren sie dessen vollständig.

5. Die Menge des elastischen Gewebes in Geschwülsten steht in engem Zusammenhang mit dessen Menge im Muttergewebe.

6. Das elastische Gewebe wird in allen Geschwülsten zerstört, wobei es hauptsächlich der mechanischen Einwirkung seitens der Geschwulstzellen ausgesetzt wird.

7. Die entzündlichen reaktiven Prozesse im Muttergewebe üben einen schädlichen Einfluß auf das elastische Gewebe aus, je nach ihrer Stärke und Dauer.

8. Eine Hypertrophie der normalen, elastischen Gebilde, analog den anderen Geweben, kann in durch Geschwulst betroffenem Gewebe beobachtet werden und begleitet oft eine Hypertrophie des elastischen Gewebes im ganzen Organ.

9. Die Anwesenheit einer großen Menge elastischen Gewebes bei Krebs erklärt sich aus seiner Vermehrung im ganzen Organ, durch Ausnützung des letzteren hervorgerufen, sowohl natürlicher (das Alter), als auch vorzeitiger im jungen und mittleren Lebensalter.

10. Die Regeneration von elastischen Fasern wird in Anbetracht der Langsamkeit dieses Prozesses in bösartigen Geschwülsten kaum stattfinden können.

11. In Sarkome und den größten Teil der Endotheliome gerät elastisches Gewebe, im Verhältnis zu Carcinomen, weniger, weil diese Geschwülste diffus knotig wachsen.

12. Die elastischen Fasern können in inniger Berührung sowohl mit den epithelialen, als auch mit den Bindegewebgeschwulstzellen stehen; im allgemeinen aber ist das elastische Gewebe, ähnlich dem Stroma, in Krebsen vom Parenchym schärfer isoliert.

13. Die Elektivfärbung des elastischen Gewebes ist, außer theoretischem Interesse, von verschiedenartiger praktischer Bedeutung.

Alfred Kraus (Prag).

De Beurmann et Gougerot. *Lymphadénomes cutanées primitifs.* Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 284.

Ein 75jähriger kräftiger Bauer zeigt einen die ganze linke Wange einnehmenden Herd, innerhalb dessen sich 4 Zonen erkennen lassen: 1. ein weißlich abschuppendes Zentrum, 2. eine dunkelvioletrote Partie mit dilatierten Kapillaren, 3. eine mehr diffuse blässere Rötung, endlich 4. nach außen hin eine unter normaler Epidermis tastbare Infiltration. Ähnlich gebaute Herde finden sich an den Beinen, dazwischen, wie auch sonst am Körper pigmentierte Flecke und Narben als Residuen alter Herde. Ad nates hat sich aus einer derartigen Effloreszenz ein nicht weiter charakteristisches Ulcus gebildet. Die Autoren glauben Lues, Tuberkulose und Mycosis fungoides ausschließen zu müssen. Histologisch

findet sich ein Infiltrat bestehend aus mononukleären Lymphocyten in einem feinen Reticulum; dieselben stammen nur zum geringen Teil aus Blut und Lymphe, sondern sind größtenteils durch Wucherungsvorgänge aus den fixen Bindegewebszellen entstanden. Hierauf gestützt, halten die Autoren den Prozeß für ein autochthones Lymphadenom. Trotz antiluetischer Behandlung traten immer wieder neue Knoten an den Beinen, zum Teil an das Erythema nodosum erinnernd, auf. Ausgezeichneten Erfolg gab die Radiotherapie.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Gastou. Sur un cas de tumeurs lymphoïdes de la peau. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 962.

Bei einem 85jährigen Patienten entstanden innerhalb eines halben Jahres aus zwei kleinen juckenden Knoten an den beiden Unterschenkeln handtellergröße, indurierte Geschwüre mit flachem, rötlichem, leicht eiterndem Grunde und erhabenen, nach außen gerollten Rändern. Histologisch findet sich eine Wucherung der Epidermis und ein Tumor bestehend aus lymphoiden Zellen in einem Reticulum gelegen. Keine sonstigen Infiltrationszellen, keine Mast- oder Plasmazellen. Infolge der Uniformität der Zellen, ihrer Gruppierung, ihrer Anordnung um die zahlreichen Kapillaren halten die Autoren den Fall eher für ein Lymphadenom als für eine Mykosis fungoides, während Darier sich für letztere ausspricht.

Walther Pick (Wien).

De Beurmann et Gougerot. Lymphadénome primitif de la lèvre avec surinfection secondaire. Ann. de dermat. et de syphiligr. 1906. p. 172.

Bei einem 30jährigen Fleischergehilfen trat ein sich rasch ausbreitendes Geschwür an der Unterlippe auf; dasselbe ähnelte ursprünglich einer Sklerose, nahm aber später ganz den Charakter des phagedänischen Ulcus molle an. Die regionären Drüsen schwellen an, vereiterten, und hierdurch entstanden stellenweise neue Geschwüre von gleichem Charakter. Auch an den Armen, Beinen und im Gesicht traten Effloreszenzen auf, die in kurzer Zeit den Entwicklungsgang von Knötchen, Bläschen, Pusteln und Geschwüren durchmachten. Dieselben vernarbten zum Teil wieder, nur das Geschwür an der Unterlippe wuchs unaufhaltsam weiter und führte zum vollständigen Verlust derselben. Gleichzeitig besteht Fieber, Albuminurie und schwere Störung des Allgemeinbefindens.

Die Autoren schließen Lues, Tuberkulose, Anthrax und Ulcus molle aus und gelangen dazu, ein primäres Lymphadenom anzunehmen, auf welchem sich sekundär eine phagedänische Infektion lokalisiert hat. Die bakteriologische Untersuchung läßt hauptsächlich einen dem Staphylococcus ähnlichen Diplococcus nachweisen, die Überimpfung auf Meerschweinchen ergibt ein negatives Resultat. Histologisch fanden sich teils in Haufen, teils perivaskulär liegende lymphoide Zellen in einem Reticulum liegend, daneben entzündliche Erscheinungen.

Fournier hält die Affektion für Syphilis und empfiehlt energische antiluetische Kur.

Walther Pick (Wien).

Thibierge et Bord. Note sur deux cas de sarcoides sous-cutanées. Ann. de dermat. 1907. p. 113.

Bei einer 56jährigen Patientin, welche mit Tuberkulose belastet ist und selbst vor vier Jahren eine Pleuritis durchgemacht hat, sind an der Außenseite des linken Oberschenkels teils isolierte, teils zu großen Herden konfluierende Knoten von Erbsen- bis Mandarinengröße durch die nur wenig vorgewölbte und nur stellenweise blaßrosagefärbte Haut durch tastbar. Die Knoten sind derb, knorpelhart, mehr oder weniger scharf umgrenzt, mit der Haut verwachsen, bei starkem Drucke schmerzhaft. Entlang den varicös dilatierten Venen sind stellenweise kleinere Knoten von gleicher Beschaffenheit zu fühlen. Besserung auf Arsen und Röntgenbehandlung. Histologisch findet sich ein Infiltrat der tieferen Cutisschichten und der Subcutis bestehend aus epitheloiden und Riesenzellen und Lymphocyten; in der Subcutis fehlen die Riesenzellen, dafür findet sich ausgedehnte Nekrose der zwischen den Fettläppchen gelegenen Bindegewebsbündel.

In dem zweiten Falle, eine 32jährige Patientin betreffend, handelte es sich um einen Übergangsfall von den Sarkoiden zum Erythema induratum. Patientin hat gleichfalls eine Pleuritis durchgemacht; seit 3 Jahren beobachtet sie das Auftreten von Knoten an den Beinen; ein Teil der Knoten brach auf und hinterließ die jetzt noch sichtbaren Narben. Über der rechten Tibia findet sich eine im Zentrum von einer Kruste bedeckte adhärente Narbe (nach einem Sturz vor 4 Jahren entstanden), an deren Peripherie ein von intakter Haut unterbrochener Kranz kleiner, cyanotisch gefärbter, makulöser oder papulöser Effloreszenzen. Die Umgebung schuppt nicht und erscheint bräunlich verfärbt. An der Innenseite des Knies zwei über fünf frankstückgroße, derbe, in die Tiefe reichende Knoten von lila Farbe; der eine Knoten zeigt eine zentrale, deprimierte Narbe. Unterhalb des Knies finden sich abgeflachte, kutane, makulo-papulöse Effloreszenzen über einer ins subkutane Gewebe reichenden Infiltration. Daneben ein im Zentrum eine lineare Narbe zeigender, infiltrierter Herd, der an der Peripherie mehr oder weniger vorspringende, rot-violett gefärbte Effloreszenzen aufweist. Der jüngste, erst 14 Tage alte Herd am Oberschenkel stellt eine große, unregelmäßig konturierte Infiltration der Cutis und Subcutis dar, über welcher die Haut rot-violett gefärbt erscheint. Patientin erhält durch 6 Wochen je eine Injektion von Kalomel (0.06) intramuskulär. Auffallende Besserung der Erscheinungen nach den ersten Injektionen, doch bleibt die Induration der Herde zum Teil persistent. Histologisch fanden sich bei einer jungen Effloreszenz multiple Infiltrationsherde in Cutis und Subcutis, bestehend aus mehr oder weniger degenerierten Rund- und Bindegewebszellen und epitheloiden Zellen. Auch wo das Infiltrat ganz dicht ist, finden sich noch intakte Gefäße. Derartige Bilder würden nach Ansicht der Autoren die Affektion zu den Sarkoiden einreihen, während die später innerhalb dieser Knoten eintretende Ulzeration dieselben als zum Erythema induratum gehörig erscheinen läßt.

Walther Pick (Wien).

Gougerot. Lymphosarcoide (variété nouvelle de sarcoïde). Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 721.

Bei einem 70jährigen Patienten findet sich neben einer typischen Prurigo an den Extremitäten seit einem Monat am Stamm ein Exanthem, bestehend aus zahlreichen 4–6 mm großen, derben, orange oder violett gefärbten Knoten; die Epidermis ist intakt, im Zentrum ist eine 1–2 mm große, grau durchscheinende Stelle insbesondere bei Glasdruck deutlich sichtbar, ähnlich wie bei Lupusknötchen. Die Knoten finden sich, zumeist isoliert, hie und da in Gruppen von 5 oder 6, nur am Stamm; die Extremitäten sind, mit Ausnahme eines Knoten am rechten Ellbogen, frei davon. Histologisch bestehen die Knoten, welche sich scharf gegen die Umgebung absetzen, aus einer zentralen Partie mit epitheloiden und spärlichen Riesenzellen (die sich aber von den tuberkulösen Riesenzellen unterscheiden) und einer peripheren Partie, welche ein Stroma und zellige Elemente aufweist. Das Stroma wird gebildet einerseits von den zarten Bindegewebsfibrillen, andererseits von den feinen Ausläufern der Bindegewebszellen, welche sich im Zustande entzündlicher Reaktion befinden, d. h. sie zeigen zahlreiche Mitosen in granuliertem (δ -Granulationen) oder nicht granuliertem Protoplasma, sind aus ihrem Verbandsverbande losgelöst, oft mehrkernig (Riesenzellenbildung), zeigen phagocytaire Eigenschaften. Das Infiltrat besteht außer aus diesen Bindegewebszellen noch aus Lymphocyten, spärlichen Plasma- und Mastzellen. Aus den Lymphocyten bilden sich reichliche eosinophile Zellen, die zum Teil auch aus den Plasmazellen durch eine erythrophile Degeneration entstehen. Bakterien nicht nachweisbar.

Gougerot differenziert die Affektion klinisch von den Boeckschen Sarkoiden, anatomisch von diesen, vom Lymphosarkom, von Mykosis fungoides und Leukämie; er bezeichnet sie als Lymphosarkoid; sie gehört möglicherweise in die Gruppe der Tuberkulide. Walther Pick (Wien).

De Beurmann et Gougerot. Sarcome globo-cellulaire multiple hypodermique chez un enfant de 6 mois. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 392.

Bei einem 6 Monate alten Kinde finden sich in Unmenge über die ganze Körperoberfläche verstreut, 5 mm bis 10 cm große, im Subkutangewebe gelegene Sarkomknoten vom Typus Perrin. Nur an einer Stelle erscheint die Haut selbst durch die Tumoren verändert, u. zw. leicht rosa gefärbt und vergrößerte Follikel zeigend. Das Allgemeinbefinden nicht gestört.

Walther Pick (Wien).

Polland, R. Über Cyldindroma epitheliale. Monatshefte f. pr. Dermatologie. Bd. XLIII.

Der 77jährige Kranke Ps. wies neben mehreren geschwürig zerfallenen flachen Tumoren des Gesichtes kleine, teils exulcerierte Knötchen von wachsartig-transparentem Aussehen, teils vereinzelt (an Stirn, Ohren, Hals, Wange usw.), teils dichtgedrängt (Nasolabialfurche) auf. Histologisch erwiesen sich diese kleinen Tumoren als Geschwülste vom Charakter des Ulcus rodens.

Das Bindegewebe zeigte stellenweise myxomatöse Degeneration mit schließlicher Bildung cystischer Hohlräume mit Resten degenerierten Gewebes. P. bezeichnet diese Geschwülste als *Cylindroma epitheliale* und rechnet hierher auch jene multiplen gutartigen Geschwülste des Gesichtes und Kopfes, die *Cylindrom*, *Endotheliom* etc. genannt werden.

Die Zellstränge des Geschwulstepithels lassen deutlich ihren Zusammenhang mit der Epidermis erkennen.

Ludwig Waelsch (Prag).

Beatty, W. Ein Fall von multiplen *Leiomyomen* der Haut. *The Brit. Journ. of Dermat.* Januar 1907. (Mit 2 Tafeln.)

28j. Mann. An der linken Stirnhälfte, dem mittleren Teile der Brust, in der linken Schultergegend und an gewissen Teilen des linken Armes sehr zahlreiche, in der rechten Schultergegend spärliche Knötchen, hellrot oder von der Farbe der normalen Haut, rundlich mit einem Durchmesser von 2–4 mm, stellenweise zu etwas größeren Gebilden zusammenfließend, oder zu Reihen, entsprechend der Richtung der Haare, an einander geschlossen. Keine Drückempfindlichkeit; bei kalter Außentemperatur leichte Schmerzhaftigkeit. Histologisch ergab sich der Befund von *Leiomyomen*; Beziehungen zu den Arrektoren waren nicht sicher festzustellen.

Paul Sobotka (Prag).

Legrain. *Sarcome du sein chez une femme kabyle.* *Ann. de dermat. et de syph.* 1906. p. 69.

Die Eingeborenen von Algier zeigen nur selten maligne Tumoren; das Epitheliom findet sich nur ganz ausnahmsweise, häufiger Fibrome, Lipome und Sarkome.

Walther Pick (Wien).

De Beurmann et Gougerot. *Chéloïdes des muqueuses.* *Ann. de dermat. et de syphiligr.* 1906. p. 151.

Bei einem Patienten, der zahlreiche Keloide auf der Haut aufweist, bildet sich ein solches im Anschluß an ein phagedänisches, Vincentische Bazillen und Spirillen enthaltendes Geschwür auf der Schleimhaut der Unterlippe. Die Keloide am Körper hatten sich aus ulzerösen luetischen Effloreszenzen entwickelt, doch war gegen die Keloide selbst die antiluetische Therapie ohne Effekt. Die Autoren nehmen als Ursache der Keloide ein infektiöses Agens (Tuberkulose?) an.

Walther Pick (Wien).

Dubreuilh. *Fibromes miliaires folliculaires; sclérodémie consécutive.* *Ann. de dermat. et de syph.* 1906. p. 569.

Bei einer 44jährigen Patientin finden sich, seit 9 Monaten bestehend, insbesondere am Stamm zahlreiche kleinste mattweiß- oder gelblich gefärbte, prominente, harte Knoten von 1–2 mm Durchmesser, mit glatter Oberfläche, die wie Bleikörner zwischen den Fingern rollen. Am Hals, an den Schultern, im Gesicht und an den Extremitäten neigen die in immenser Zahl vorhandenen Knötchen zur Konfluenz, so daß die Haut dieser Partien das Aussehen der Sklerodermie bekommt; die normalen Hautinseln, die sich innerhalb dieser Partien vorfinden, schützen aber vor Verwechslung.

Die histologische Untersuchung ergibt nur geringgradige Veränderungen, bestehend in einem schlecht abgrenzbaren perifollikulären Fibrom, dessen Fasern zarter sind als die des umgebenden Bindegewebes, und das eine Verdickung der bindegewebigen Hüllen des Follikels auf das 5—6fache darstellt. Die elastischen Fasern innerhalb des Fibroms erhalten, sind nur weniger gewunden als normal.

Walther Pick (Wien).

Pernet, G. *Naevi cystepitheliomatosi disseminati* (Lymphangioma tuberosum multiplex Kaposi; Hidradénomes éruptifs Jacquet et Darier). The Brit. Journ. of Dermat. März 1907.

Klinisch entspricht Ps. Fall fast ganz einem von Radcliffe-Crocker in den Clinical Society's Transactions f. 1899 (Bd. XXXII.) geschilderten. Die Cysten sind bestimmt epithelialer Natur; des Verf. Anschauung, daß sie von abortiv entwickelten Schweißdrüsen und Schweißgängen abstammen, läßt sich aus seinen Präparaten nicht sicher beweisen.

P. Sobotka (Prag).

Hallopeau et Roy. Sur un naevus systématisé acnéiforme du membre inférieur avec loci minoris resisténtiae. Annal. de dermat. et de syph. 1906. p. 194.

Ein 5jähriges Kind zeigt eine strichförmige Hautaffektion von entzündlichen Erscheinungen begleitet, stellenweise nässend und mit Krusten bedeckt, an anderen Stellen trocken und komedonenartige Bildungen aufweisend.

Walther Pick (Wien).

Audry. Sur une observation de naevi symétriques de la face, publiée par Rayer. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 315.

Audry macht darauf aufmerksam, daß sich bereits im Rayer'schen Atlas (Taf. XX, Fig. 1. Text pag. 657, 659) eine Abbildung der später von Pringle als Adenoma sebaceum bezeichneten Affektion vorfindet, und tritt für die Priorität Rayers, der den Fall als „élevures et végétations vasculaires de la face“ bezeichnet, ein.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Boudet. Sur un cas de naevi systématisés lichénoides très nombreux. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1045.

Demonstration eines Falles von sehr ausgedehntem, am Stamm und den Extremitäten strich- oder handförmig lokalisiertem Naevus.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Macé de Lépinay. Sur la production d'ulcérations profondes et étendues dans un naevus angiomateux. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 956.

Bei einem 3 Monate alten Kinde finden sich verschiedentlich am Körper angiomatöse Naevi; ein solcher am Hinterhaupt ist exulceriert und bildet ein großes, ziemlich tiefes Geschwür das reichlich grünlichen Eiter sezerniert; gleichzeitig Schlaflosigkeit und Störung des Allgemeinbefindens. Langsame Epithelisierung des Geschwüres unter feuchtem

Verband. Die Autoren sind der Ansicht, daß die venöse Stase in derartigen Tumoren den Boden für die entzündlichen Erscheinungen abgibt.

Walther Pick (Wien).

Pollitzer, S. Lymphangioma circumscriptum. The Journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. 11. 1906.

Pollitzer beschreibt zwei Fälle dieser Affektion bei jungen Mädchen, bei welchen schon in den ersten Monaten die ersten bläschenähnlichen Herde an der Haut aufgetreten waren. Der eine Fall betraf bloß die Haut, der andere scheint mit einem Varix lymphangiomatosus oder haematolymphangiomatosus des Unterhautgewebes kombiniert gewesen zu sein. Die histologische Untersuchung des ersten ergab die bekannten Bilder der Lymphangiektasien des Papillar-, subpapillaren und retikulären Gewebes mit deutlicher Proliferation den Lymphendothelien.

Pollitzer hält mit Freudweiler, Török und Waelisch eine Proliferation von Lymphgefäßen mit späterer Erweiterung für die Ursache. Er macht weiters auf drei Arten von Attacken aufmerksam, die im Verlauf dieser Lymphangiome zu beobachten sind, u. zw. periodische Schwellungen durch infektiöse, thrombotische und vielleicht menstruelle Prozesse. In seinem Falle scheinen Thrombosen des unterliegenden varix mitgespielt zu haben.

Rudolf Winternitz (Prag).

Newman, E. D. (Newark N. J.) A case of multiple Keloid The Journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. 10. 1906.

Multiple Keloide an verschiedenen Körperstellen, die sich bei einem 40j. Manne nach der Ulzeration resp. Extirpation zweier unter den Ohren lokalisierter knotiger Hautaffektionen entwickelten.

R. Winternitz (Prag).

Bosselini. Sur deux cas de pseudo-milium colloide familial. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 751.

Bosselini beobachtete bei zwei Brüdern im Alter von 9 und 12 Jahren eine seit wenigen Monaten beziehungsweise bei dem älteren Knaben seit 3 Jahren bestehende Hautaffektion, die sich wesentlich an der Nase und Unterlippe, weniger an Ohren, Wangen und Kinn lokalisiert. Dasselbst finden sich bis hanfkorngroße bläschenähnliche, zitronengelb oder leicht rosa gefärbte Knötchen von derber, elastischer Konsistenz; die kleineren Knötchen sind kegelförmig, die größeren flach oder sogar gedellt. Zwischen den Knötchen finden sich zahlreiche dilatierte Gefäßreiserchen und kleine rundliche, depressive, stärker pigmentierte Herde, die mit den Knötchen selbst in Beziehung zu stehen scheinen. Derartige Pigmentflecke finden sich auch auf den oberen Partien des Stammes und über den Schultern.

Die gelblichen Knötchen sind auch auf der Schleimhaut der Lippen sichtbar. Histologisch fanden sich in den Knoten rundliche, mehr oder weniger homogene, mit sauren Farbstoffen intensiv färbbare Massen, in deren Nachbarschaft sich eine Proliferation des Epithels nachweisen läßt, die stellenweise die Tendenz zu haben scheint, die genannten Massen zu unterminieren und als Sequester auszuscheiden. An Stellen, welche klinisch

normal erschienen, finden sich namentlich in der subpapillären Zone die elastischen Fasern verkürzt, gerissen oder zu kollagenen Massen, welche die oben genannten färberischen Eigenschaften zeigen, homogenisiert. An den pigmentierten, atrophischen Partien fehlen die Papillen, die Bindegewebsbündel und die elastischen Fasern verlaufen gestreckt horizontal.

Nach des Autors Ansicht geht die Veränderung zunächst vom kollagenen Gewebe aus, dessen Bündel anschwellen, während die Fibrillen schwinden unter Bildung glänzender, stark lichtbrechender Schollen; gleichzeitig scheint es zur Zersetzung des elastischen Gewebes — das aber niemals Elacin bildet — zu kommen, mit dessen Produkten die Schollen des kollagenen Gewebes imbibiert werden und die sich deshalb mit Orcein färben; dieses Endprodukt durch Vereinigung von Kollagen und Elastin entstanden ist das Kolloid. Auch diese pathologischen Substanzen sind wie das normale Kollagen und Elastin als Sekretionsprodukte der Bindegewebszelle aufzufassen, und der spontane Stillstand der Produktion ist möglicherweise durch den Tod der Zelle bedingt.

Der Autor glaubt nicht, daß die kolloide Degeneration und die senile Involution der Haut identisch sind, und weist auf das familiäre Vorkommen der ersteren, die er für eine (kongenitale) Dystrophie hält, hin.

Walther Pick (Wien).

Morestin. Angiomes des lèvres. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1036.

Demonstration zweier Fälle von operierten Angiomen. Im ersten Falle handelte es sich um einen bohngroßen Tumor in der Muskelsubstanz der Oberlippe, der leicht von der Schleimhautfläche aus exstirpiert werden konnte. Patientin ist 18 Monate nach der Operation rezidivfrei.

Im zweiten Falle bestand ein großer Tumor der Unterlippe bis zu deren Mitte reichend, seitlich auf die Wange bis fingerbreit hinter die Kommissur übergreifend und unten sich an der Umschlagstelle der Lippenschleimhaut auf den Unterkiefer begrenzend. Heilung durch Excision von der Schleimhaut aus. Abbildungen beigelegt.

Walther Pick (Wien).

Dubreuilh. Kystes épidermiques traumatiques à siège anormal. Ann. de dermat. et de syph. 1907. p. 35.

Dubreuilh unterscheidet zwei Arten von akquirierten Epidermiskysten: 1. solche, die dadurch entstehen, daß ein spitzes Instrument Teile der Epidermis mit den versorgenden Gefäßen in die Tiefe verpflanzt, während die überliegende Haut sich schließt, 2. solche, welche bei Operationen entstehen, wenn die Wunde über versenkten Epidermistheilen geschlossen wird. Dubreuilh bringt als Beispiele der ersten Art drei eigene Beobachtungen. Im ersten Falle handelte es sich um einen 12j. Knaben, bei welchem sich 6 Monate nach einem Sturze, unter einer an der Stirne sitzenden Narbe ein erbsengroßer, runder, harter, nicht schmerzhafter und unter der Haut wie über der Unterlage verschieblicher Knoten vorfindet. Histologisch findet sich die Cyste nach außen zu

begrenzt von einem, auf ein Drittel seiner normalen Dicke reduzierten Cutisgewebe, das zum Teil noch abgeflachte Schweißdrüsen und Haarfollikel enthält, in den seitlichen Partien findet sich Fettgewebe. An der oberen Umgrenzung bildet dieses Cutisgewebe lange, schmale Papillen, die gegen das Zentrum vordringen. Die Epithelauskleidung ist an der oberen und seitlichen Umgrenzung der Cyste, durch eine bedeutende Volumzunahme der Zellen des Str. spinosum ausgezeichnet, während dieselben im Gegensatz hiezu an der unteren Umgrenzung abgeflacht erscheinen. Das Zentrum der Cyste wird von verhornten Massen eingenommen, die neben Kernen und Kernlücken unregelmäßige, eckiggeformte verkalkte Gebilde enthalten.

In einem zweiten Falle entwickelte sich bei einer 65jährigen Frau eine Cyste in der Zunge, zwei Jahre nach einer Bißverletzung; dieselbe schwand spontan wieder, wie D. annimmt, durch Phagocytose.

In einem dritten Falle bestand eine Cyste im Oberlide entstanden nach einer Verletzung durch einen Fußtritt, die später vernäht wurde.

Die einschlägige, hauptsächlich chirurgische Literatur ist eingehend berücksichtigt.

Walther Pick (Wien).

Jamieson, W. A. und Huie, L. H. Molluscum fibrosum pendulum und Adenoma sebaceum. The Brit. Journ. of Dermat. Nov. 1906. Mit 1 Tafel.

Bei einem 26j. Manne und bei einem 11j. Mädchen wurde das Zusammentreffen von Adenoma sebaceum des Gesichtes mit Molluscum fibrosum pendulum verschiedener Stellen des Stammes, beziehungsweise auch des Halses, beobachtet. Im ersten Falle ergab die histologische Untersuchung des „Adenoms“ den nicht ungewöhnlichen Befund einer großen Anzahl von mehr oder weniger rudimentären Haarfollikeln und zugehörigen Talgdrüsen und einem zentral gelegenen wohl erhaltenen Follikel mit Drüse, nicht denjenigen einer Drüsenhypertrophie. In den Fibromen dieses Falles fand sich mikroskopisch ein Kern aus lose gewebten aber dicken Kollagenfasern, eine große Anzahl von Zellen von der Art geschwollener Bindegewebszellen, ferner Plasmazellen, Mastzellen, normale Bindegewebszellen, lymphocytäre Elemente, in ganz jungen Geschwülsten eine Art von embryonalem Bindegewebe. Elastische Fasern fehlten im eigentlichen Tumor stets, waren nur an seinen Grenzen vorhanden, nach der Oberfläche zu übrigens nur in geringer Menge. Dieser Mangel an elastischem Gewebe bietet die Erklärung dafür, daß man bei der Betastung großer Fibromata mollusca mit dem Finger förmlich in ein wohlbegrenztes Loch gerät und daß gestielte Geschwülste dieser Art („Taschen“), zwischen den Fingern gerollt, das Vorhandensein eines Hohlraumes in ihrem Inneren vortäuschen. — Im zweiten Falle wurden die Fibrome nur auf die Anwesenheit markhaltiger Nervenfasern untersucht, die sich denn auch fanden (Osmiummethode Heller-Mann).

Paul Sobotka (Prag).

Darnall, William Edgar. Multiple Neuromata of the Skin. Journ. Ann. Med. Ass. XLVII. 1810. 1, Dez. 1906.

Darnall berichtet 3 Fälle von multiplen Neuromen der Haut. Er glaubt, daß die Krankheit nicht so selten vorkomme, wie im allgemeinen angenommen wird.

H. G. Klotz (New-York).

Lipschütz, B. Wien (Abteilung Ehrmann). Zur Kenntnis des *Molluscum contagiosum*. Wiener klin. Wochenschrift 1907, Nr 9.

Lipschütz hat eine Reihe von *Mollusca contagiosa* einer genauen mikroskopischen Untersuchung unterworfen und im Inhalt von 7 solcher *Mollusca* kleinste, morphologisch und tinktoriell wohl charakterisierte Gebilde gefunden. Die Technik der Untersuchung war folgende: Es wurde entweder das in toto flach excidierte *Molluscum* oder nur der ausgedrückte Inhalt in einer sterilen Reibschale mit einigen Tropfen destillierten Wassers oder NaCl-Lösung fein verrieben und mit der Emulsion einerseits Untersuchungen im nativen Präparat ausgeführt, anderseits in Alkohol abs. oder in Alkoh. Äther fixierte dünnste Deckglasausstriche verschiedenen Färbungsmethoden unterworfen. Bei der Untersuchung mit Zeißscher Apochromatlinse 2 mm, Apert. 1.30 und Kompensationsokular 4 fand Lipschütz kleinste, punktförmig erscheinende, gleich große Gebilde, welche bei stärkerer Vergrößerung (Okul. 8, 12, 18) rundlich oder kugelig erscheinen. Gute Färbungen dieser Gebilde ergab die Geißelfärbungsmethode nach Löffler, ferner zweistündiges Färben in verdünnter Giemsa-Lösung bei 56° und schließlich das von Benignetti und Gino empfohlene Färbungsverfahren mit alkoholischer Gentianaviolett-lösung. Im Ultramikroskop erscheinen die Gebilde als helle, nicht glitzernde, rein weiße, rundlich kugelige, in der Regel einzeln gelegene, hie und da auch zu Diploformen zusammentretende feinste Körperchen, die keine Spur von Beweglichkeit zeigen. Viktor Bandler (Prag).

Macewen, A. C. Note on a case of sebaceous horn of the head. The Lancet 1907, Feb. 9, p. 359 ff.

Macewen entfernte auf operativem Wege ein Hawthorn vom Kopfe einer Patientin. Dasselbe bestand bereits 14 Jahre, war aber erst in der letzten Zeit erheblich gewachsen. Fritz Juliusberg (Berlin).

Hallopeau et Boudet. Sur une variété lipomateuse de la maladie de Dermum avec caractères particuliers. Ann. de derm. et de syph. 1906. p. 1065

Bei einem 47jährigen Patienten finden sich an beiden Seiten des Nackens, zwischen den Schultern und über den Schulterblättern, an den Hüften große Lipome. Heftiger Pruritus, zeitweise Bewußtseinsstörungen, Facialisparesie, Schwierigkeiten beim Sprechen, Gefäßstörungen an den Extremitäten.

Walther Pick (Wien).

Shoemaker, John V. et Boston, L. Napoleon. Benign Cystic Epithelioma. Journ. Am. Med. Assoc. XLVII. 1147. Okt. 13. 1906.

Shoemaker und Boston liefern eine eingehende Beschreibung eines Falles der unter verschiedenen Namen geschilderten gutartigen Epitheliombildung. Bei einem 22jährigen, sonst völlig gesunden und aus sehr gesunder Familie stammenden Mädchen fanden sich innerhalb mehr weniger intensiv pigmentierter Haut eine Anzahl ungefähr erbsengroßer

Geschwülste, unterhalb der r. Clavicula eine Gruppe bildend und von dort aus wie eine Kette nach der Schulter und dem Arm sich erstreckend. Mikroskopische Untersuchung zeigte, daß die Zellanhäufungen im Corium und Unterhautzellgewebe ihren Ursprung von den Haarfollikeln nahmen. Cysten waren nur spärlich vorhanden. H. G. Klotz (New-York).

Hallopeau. Sur un état papillomateux du cuir chevelu (forme morbide nouvelle). Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 691.

Bei einem 40jährigen Patienten findet sich links vom Occiput ein halbmondförmiger Herd, nahezu ganz kahl, besetzt mit hanfkorngroßen runden oder polygonalen Erhabenheiten. Außerdem finden sich lichenoiden Herde in der Hinterohrgegend, ad Nates und am l. Schenkel. Histologisch zeigt die Kopfaffektion das Bild eines verhornten Papilloms mit reaktiven Entzündungserscheinungen. Brocq hält die Affektion für einen Naevus.

Hallopeau bekämpft diese Ansicht (Annales 1906. p. 1048) unter Berufung auf die weitere Entwicklung der Knötchen, aus deren Zentrum sich komedonenartige Gebilde exprimieren lassen, während andernteils an den Stellen, wo die Knötchen verschwunden sind, die Haut glatt, weniger gefärbt und narbig erscheint. H. nimmt eine parasitäre Ursache an.

Walther Pick (Wien).

Gaucher et Hallopeau. Sur un mycosis fongicoïde à forme ulcéreuse et serpiginieuse. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 697.

Ein Patient zeigt seit seinem 11. Lebensjahre auf dem ganzen Körper eine papulöse Eruption. Die Papeln stehen bald isoliert, bald in Gruppen, vereitern zum Teil und heilen mit Pigmentflecken ab. Seit 14 Monaten zeigen sich Geschwüre, die aus diesen Effloreszenzen entstanden sind, peripher weiterschreiten und im Zentrum vernarben. So entstehen ad Nates und am Oberschenkel ausgedehnte, polyzyklische, am Rande pigmentierte Narben. Innerhalb der Narbe am Oberschenkel bestehen noch ausgedehnte Geschwüre mit erhabenem, dickem, intensiv rotgefärbtem und über die gesunde Haut der Umgebung überhängendem Rande. Dieser Rand erweist sich histologisch als aus weitmaschigem Bindegewebe bestehend, das große Massen lymphoider Zellen enthält.

Dem Patienten mußte späterhin wegen eines großen Schmerzens verursachenden, exulzierten Tumors am rechten Knie das Bein im Hüftgelenk exartikuliert werden. Milian (Annales 1906. p. 1021) nahm die histologische Untersuchung dieses Tumors vor, und fand neben großen runden oder unregelmäßig konturierten Zellen Myeloplaxen in großer Zahl; zwischen diesen beiden Zellarten fanden sich alle möglichen Übergänge. Außerdem Lymphocyten und reichlich neugebildete Gefäße. Milian hält den Fall für ein primäres Lymphosarkom (Darier) der Haut.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Macé de Lépinay. Sur un cas de xanthome tubereux et en tumeurs juvénile offrant les caractères du xanthome diabétique. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 471.

Bei einem 46jährigen, schwächlichen Patienten finden sich an beiden Ellbogen und an den Beinen ziemlich große, gelbliche, gelappte

Tumoren, die zum Teil oberflächlich exkoriert sind und Entzündungserscheinungen zeigen; sonst verschiedentlich am Körper ballonierende Narben mit mehr oder weniger deutlicher gelber Färbung. Im Harn kein Zucker, Spuren von Eiweiß. Der histologische Befund fehlt. Die Autoren sprechen die Affektion als Xanthom an. Nach ihrer Ansicht ist die Glykosurie, Albuminurie oder der Ikterus der Xanthomkranken auf eine viszerale Lokalisation der Xanthome zurückzuführen; die Entzündungserscheinungen beim Xanthoma diabeticum sind auf die, durch den Diabetes bedingte, veränderte Hautbeschaffenheit zurückzuführen; jedes Xanthom kann zum Xanthoma diabeticum werden, wenn es sich auch am Pankreas lokalisiert.

Walther Pick (Wien).

De Beurmann et Gougerot. Syndrome rappelant le xeroderma pigmentosum au cours d'un épithélioma gastrique. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 391.

Bei einem an Magencarcinom leidenden Manne finden sich an Kopf, Hals und Schultern weiße, atrophische, von einem Pigmentsaum umgebene Flecke. Dieselben stellen möglicherweise nur Narben nach einer juckenden Hautaffektion, die Patient durchgemacht zu haben angibt, dar, bieten aber, mit gleichzeitig vorhandenen Angiomen das Bild des Xeroderma pigmentosum.

Walther Pick (Wien).

Nicolas et Favre. Deux observations pour servir de contribution à l'étude clinique et histologique du xeroderma pigmentosum. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 536.

Die Autoren bringen die Krankengeschichte und Abbildung eines typischen Xeroderma pigmentosum bei einem 7jährigen Knaben; bei einem zweiten Falle, eine 71jährige Frau betreffend, stellen sie die gleiche Diagnose auf Grund folgender Symptome: Seit zwei Jahren bestehendes, exulzeriertes Carcinom an der Nase; im Gesicht und an den Armen findet sich außerdem ein Erythem, leicht schuppig, innerhalb dessen die Haut in geringem Maße atrophisch erscheint. Innerhalb dieser Partien, namentlich an den Armen zahlreiche braune oder schwarze Leutigines. Innerhalb der erythematösen Partien des Gesichtes finden sich harte, verhornte, warzige Gebilde, die sich histologisch gleichfalls schon als epitheliale Wucherungen darstellen. Walther Pick (Wien).

Balzer et Merle. Xeroderma pigmentosum avec épithélioma de la face. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1054.

Demonstration eines typischen Falles von Xeroderma pigmentosum an Gesicht und Händen mit multiplen Carcinomen auf der Haut des Gesichtes, die sich auf Röntgenbestrahlung um die Hälfte verkleinern. Die histologische Untersuchung zeigt, daß es sich um Basalzellencarcinome handelte.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Macé de Lépinay. Cas probable de Xeroderma pigmentosum fruste. Ann. de dermat. et de syph. 1900. p. 1059.

Bei einem 11jährigen Mädchen finden sich an der Haut des Gesichtes zahlreiche kleine, unregelmäßige Pigmentflecke, zum Teil depri-

miert. Dazwischen kleine deprimierte Narben. Die Haut der Hände normal. Vier Geschwister zeigen keine Hauterkrankung.

Walther Pick (Wien).

Audry. Sur un cas de xeroderma pigmentosum de Kaposi sans pigmentation. Ann. de dermat. et de syph. 1907. p. 199.

Bei einem 24jährigen Patienten findet sich ein die ganze Unterlippe einnehmender exulcerierter Tumor; die Haut des Gesichtes schuppt leicht, die Nase ist rot und zeigt kleine Teleangiectasien; 2 solche finden sich auch auf der linken, 1 auf der rechten Wange, zahlreiche am Ohr. Die übrige Haut des Körpers, insbesondere an den bedeckt getragenen Partien (Stamm, Nates usw.) erscheint gerötet, stellenweise atrophisch, im ganzen ichthyotisch verändert. Über den Metakarpo-Phalangealgelenken depigmentierte, nicht narbig veränderte Stellen, daneben große gelblich-braun gefärbte Flecke; sonst nirgends Pigmentanomalien nachweisbar. Diese Hautbeschaffenheit besteht seit Geburt. Histologisch erwies sich der Unterlippentumor als Carcinom, eine besonders gerötete Stelle an der Ellenbeuge zeigte eine diffuse Atrophie des Epithels, eine lymphocytaire Infiltration, Schwund der elastischen Fasern in den oberen, Hypertrophie derselben in den tieferen Cutisschichten, Auflockerung der Bindegewebsbündeln.

Trotz der universellen Lokalisation, der diffusen Entzündungserscheinungen und trotz des Fehlens der abnormen Pigmentationen glaubt der Autor den Fall als Xeroderma pigmentosum ansehen zu müssen.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Macé de Lépinay. Valeur comparative de l'examen clinique et de l'examen histologique dans le diagnostic des tumeurs ulcérées de la peau. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1060.

Am linken Handrücken einer 72jährigen Patientin findet sich ein seit zwei Jahren langsam wachsender exulcerierter Tumor mit steilerhabenen, nach außen überhängenden, nicht besonders derben Rändern. Die histologische Untersuchung der klinisch nicht klassifizierbaren Geschwulst erwies dieselbe als Carcinom.

Walther Pick (Wien).

Morestin. Épithélioma de la lèvre inférieure et de face. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1027.

Morestin. Épithélioma de la tempe adhérent au squelette; extirpation; greffes dermo-épidermiques appliquées secondairement. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1027.

Demonstration von operierten Epitheliomen. Abbildungen beigelegt.

Walther Pick (Wien).

Pautrier. Épithélioma lobulé corné de la langue guéri depuis dix-huit mois, après opération chirurgicale et radiothérapie consécutive. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 1023.

Bei einem Zungencarcinom wurde zunächst durch vier Monate eine Röntgenbehandlung mit 65 H. versucht; im Anfange günstiger Erfolg, dann rasches Wachstum des Tumors, infolgedessen Excision desselben

und der bereits affizierten Drüsen am Unterkieferwinkel. 14 Tage später neuerliche Röntgenbehandlung, im ganzen 5 Sitzungen in vierzehntägigen Intervallen zu 4 H. Patient ist seit 18 Monaten rezidivfrei.

Walther Pick (Wien).

Morestin. Épithélioma du gland traité par la décortication du gland; presentation du malade guéri, quatre mois après l'intervention. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 970.

Bei einem Patienten mit verhornten Papillomen an der Glans penis, von welchen eines sich bereits in ein Epitheliom umgewandelt hatte, wurde statt der Amputatio penis eine Losschälung des Überzuges der Glans und des Sulcus vorgenommen und der Substanzverlust durch Heranziehung der Haut des Penischaftes (Patient war im Vorjahre circumcidiert worden) gedeckt. Heilung. Die Erektion normal, der Coitus möglich und nicht schmerzhaft. (Abbildungen beigelegt.) Wather Pick (Wien).

Morestin. Cancer de la face interne de la joue, guéri sans récidive plus de trente mois après l'intervention. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 969.

Demonstration eines Patienten, dem vor 2½ Jahren wegen eines 1 Frankstück großen Carcinoms der Wange, mit Schwellung der submaxillaren Drüsen, ein großes Stück des Unterkiefers reseziert und die Drüsen und der Tumor excidiert worden waren; Patient blieb seither rezidivfrei.

Walther Pick (Wien).

Hallopeau et Donzé. Sur une corne probable de la lèvre. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 476.

Bei einem 42jährigen Patienten findet sich an der linken Seite der Unterlippe ein 5 mm hohes, hornartiges, von einem rosagefärbten Epithel bedecktes, spitz zulaufendes Gebilde, das an der Basis eine kleine Ulzeration zeigt. Die Autoren halten die Affektion für ein cornu cutaneum und betonen die Seltenheit des Sitzes derselben in der Lippen Schleimhaut.

Walther Pick (Wien).

Morestin. Épithélioma du dos de la main. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 485.

Bei einem 72jährigen Manne bleibt nach der Exstirpation eines Epithelioms am rechten Handrücken ein 4 Finger breiter, 3 Finger hoher Substanzverlust zurück; die Deckung mit Thierschlappen mußte infolge einer interkurrenten Phlegmone am linken Arm aufgeschoben werden; inzwischen heilte der Substanzverlust unter aseptischem Verband mit glatter, elastischer, nicht adhärenter Narbe. (Abbildung beigelegt.)

Walther Pick (Wien).

Morestin. Épithélioma du pavillon de l'oreille propagé à la région parotidienne. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 487.

Der Autor hebt die großen Vorteile des zweizeitigen Operierens bei der Thierschen Plastik hervor; der 9 cm hohe, 8 cm breite Substanzverlust nach Exstirpation eines Carcinoms des äußeren Gehörganges verkleinerte sich innerhalb 24 Tagen auf die Größe eines 5 Frank-Stückes und wurde dann durch Thiersche Lappen gedeckt.

Walther Pick (Wien).

Audry. Sur un cas d'épithéliomatose de Paget à forme pigmentaire. Une théorie du cancer du sein. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 529.

Bei einer 54jährigen Frau erscheint die rechte Mamma hart und weist zahlreiche Erhabenheiten auf; die Mamilla wenig prominent; der Warzenhof gerötet, wie lackiert aussehend, weist an einer Stelle einen schwärzlich marmorierten Fleck auf, der mit einem tief schwarz gefärbten, verrukösen Herd in der benachbarten Haut in Verbindung steht. Auf der Haut der Mamma fanden sich noch 3 weitere derartige 3—4 cm große Herde, leicht hervorragend, bedeckt von einer Art trockenen Schuppe, nach deren Entfernung eine trockene, glatte, nicht ulzerierte, blauschwarze Fläche zutage tritt. Diese starke Pigmentation, welche sich auch im histologischen Bilde dokumentiert, führt der Autor darauf zurück, daß der Ausgangspunkt dieser Carcinomatose die Pagetsche Erkrankung der Mamilla war. Die Mamilla, welche sehr oft akzessorisch als kongenitale Mißbildung vorkommt, würde als Naevus aufzufassen sein, das Mammacarcinom als Naevo-Carcinom.

Walther Pick (Wien).

Audry. Ulcus rodens chez une fillette de 3 ans. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 379.

Bei einem 3jährigen Mädchen findet sich ein seit 8 Monaten bestehender ulzerierter Tumor an der linken Nasenöffnung, der sich histologisch als Epitheliom erweist.

Walther Pick (Wien).

Robinson, A. R. Errors in the Treatment of Cutaneous Cancer. New-York Med. Journ. LXXXIV. 1257. 20. Dezbr. 1906.

Robinson ist überzeugt, daß es verschiedene Ursachen der Krebsbildung gebe, teils prädisponierende, teils direkt lokal reizende. Er beabsichtigt in dem Artikel zu zeigen, daß es keine Behandlungsmethode gebe, die für alle Fälle von Hautkrebs als die wirksamste oder beste angesehen werden könne, daß daher jeder Fall besonderes Studium und besondere sorgfältige Auswahl der Behandlungsmethode erfordere.

Keins der zur Zeit bekannten inneren Mittel oder Sera ist verläßlich, aber Thyroidextrakt ist ein wertvolles Mittel besonders bei älteren Kranken mit ausgesprochen seniler Hautbeschaffenheit und sollte in allen solchen Fällen gegeben werden, nicht nur um weiteren Neubildungen vorzubeugen, sondern auch zur Unterstützung der Entfernung schon bestehender. Als Beleg wird die Krankengeschichte eines Falles von Mycosis fungoides berichtet, in dem der letale Ausgang die Folge der Anwendung hochfrequenter Ströme gewesen zu sein scheint. Bei visceralen Krebsen konnte eine ähnliche Wirkung des Thyroidextrakts nicht beobachtet werden.

Die verschiedenen Behandlungsmethoden und ihre Vorteile für gewisse Fälle und die Anzeigen für dieselben werden dann eingehender besprochen; Excision, Kurette, Ätzmittel (Chlorzink, Hydr. nitric., Arsen und Kali caustic.) und R.-Strahlen. Besonders aufmerksam gemacht wird auf den Wert einer 25%igen Lösung von Kali caustic. zur Feststellung, ob eine anscheinende Heilung wirklich als solche angesehen werden kann,

da diese Lösung die noch kranken Stellen zur Anschauung bringt. Die Anwendung der Röntgenstrahlen ist eine ziemlich beschränkte, oft sind dieselben von absolut schädlicher Wirkung.

Aus den Schlußsätzen des Verf. ist hervorzuheben, daß alle Fälle von multiplem Hautkrebs und alle Fälle von Hautkrebs überhaupt bei älteren Personen immer innerlich teils diätetisch, teils medikamentös neben den äußeren Methoden behandelt werden sollten. Empfohlen werden außer dem Thyroidextrakt: Milch und grüne Gemüse; zu vermeiden sind: Fleisch, bes. Leber und Nieren und Alkohol.

Zur Auswahl einer passenden Methode ist es notwendig, die Art des Krebses im einzelnen Falle festzustellen, dessen pathologische Anatomie, die Art der Ausbreitung etc. Alle Fälle müssen wenigstens ein Jahr vom Beginn der Behandlung an gerechnet unter Beobachtung bleiben.

H. G. Klotz (New-York).

Harlingen, Arthur van. Notes on the treatment of Epithelioma by means of caustic Potash. The Journ. of cutan. dis. incl. Syph. XXIV. 8. 1907.

Unter den alle Gewebe zerstörenden Causticis hat sich dem Autor das Kali causticum am meisten bewährt. Es kann in seiner Tiefen- und Weitenwirkung durch Essigsäure gehemmt werden, seine Schmerzwirkung ist nicht so bedeutend wie die des Arsens und seiner Pasten.

Alle von v. H. behandelten Epitheliome saßen im Gesicht, waren zumeist klein und wurden mit Kali causticum meist radikal entfernt; nur in wenigen war eine spätere Nachhilfe mit einer Mineralsäure, Formalin oder Pyrogallol, nötig. Gewöhnliche Heilungsdauer 4 Wochen.

v. Harlingen berichtet gleichwohl über einige schlecht verlaufende Fälle, wo sich nach der Ätzung Rezidive mit Metastasen und eventuell letalem Ausgang einstellte oder das kosmetische Resultat kein befriedigendes war. In einigen Fällen ausgedehnter serpiginöser Krebsgeschwüre hätte v. H. die Röntgenbehandlung vorgezogen, wenn ihm früher ein Apparat zu Gebote gestanden hätte. Aus seinen Fällen schließt er, daß sich namentlich kleine ($\frac{1}{2}$ —2 cm große), scharf begrenzte, perlenähnliche Epitheliome des Gesichts für Kali caustic. eignen, daß größere am besten mit Röntgenstrahlen behandelt würden, wobei Kali causticum zur Erweichung und Ablösung der Hornschichten verwendet werden könnte. In Fällen, die mit Kali causticum behandelt wurden, scheint die nachherige Anwendung von Röntgenstrahlen keinen Einfluß auf die Beschleunigung der Heilung oder die Narbenbildung zu haben.

In der Diskussion empfiehlt Hartzell vorherige gelinde Anwendung von Kali causticum, Entfernung desselben, sobald Schmerz erfolgt und hierauf ein 40—50% Pyrogallolpflaster.

Rudolf Winternitz (Prag).

Hartzell, M. B. Two cases of Paget's disease treated by the X-ray, with a report of the mikroskopische findings in one of them after prolonged treatment. The Journ. of cut. diseases. incl. Syph. XXIV. 7. 1906.

Zwei Frauen, welche eine Pagetsche Erkrankung der Brustwarze boten, wurden wiederholt und durch längere Zeit mit Röntgenstrahlen behandelt, wodurch die Affektionen jeweilig sehr gebessert wurden. Doch entwickelte sich bei beiden Mammacarcinome und Metastasen in den Lymphdrüsen und machten die chirurgische Entfernung der Mamma nötig.

Die histologische Untersuchung zeigte in einem durch längere Zeit bestrahlten Falle an der Oberfläche Parakeratosis, hie und da vakuolierte Epithelien mit geschrumpften Kernen, nur an einzelnen Stellen Coccidien gleichende Zellen. In der Warze wurde eine Art Verdichtung des Rete mit fast vollständigem Schwund der Interzellularräume und der Stacheln bemerkt. In den Milchgängen war eine große Anhäufung von geblähten, vakuolirisierten Epithelzellen und zentral eine Menge nekrotischer Epithelzelltrümmer zu konstatieren. Die Brustdrüse carcinomatös verändert.

In der Diskussion sprechen sich fast alle Redner bis auf Allen für eine von vorneherein radikale Operation der Erkrankung (resp. chirurgische Entfernung der Brustdrüse) aus.

Rudolf Winternitz (Prag).

Wickham et Dyrais. Radium et rayons X comparés dans un cas d'épithéliomatose; utilisation thérapeutique de l'eau radifère et de l'eau radioactivée. Ann. de dermat. et syph. 1906. p. 929.

Bei einem 78jährigen Patienten findet sich ein ulzeriertes Epitheliom an der Nase, das nach 14 Sitzungen (5 H.) in 8tägigen Intervallen mit glatter Narbe abheilt; die Heilung dauert jetzt seit 19 Monaten an. Zwei gleichfalls ulzerierte Epitheliome, eines an der linken, das andere an der rechten Hand, werden mit Radium behandelt. Innerhalb 33 Tagen 14 Sitzungen zu einer resp. einer halben Stunde; die Heilung ist 14 Tage nach der letzten Sitzung perfekt. Ein drittes, sich sehr rasch entwickelndes Epitheliom an der Schläfe ging ebenso rasch innerhalb 22 Tagen (13 einstündige Sitzungen) zurück.

Ein ausgedehnter Lupus des Nackens wurde von den Autoren mit 12 Injektionen von 1—2 cm^3 einer Lösung von Radiumbromid 1 mg:1000 und 10 Injektionen einer Lösung von 1 mg:100; 2 Injektionen per Woche. Nach 3 Monaten deutliche Besserung; die Autoren empfehlen Versuche nicht nur mit radiumhaltigen, sondern auch mit radioaktiv gemachtem Wasser.

Walther Pick (Wien).

Parasiten.

Strauch, August (Chicago). Myiasis dermatosa. The Journ. of cut. diseas. incl. Syph. XXIV. 11. 1906.

Zwei Fliegengattungen, die Musciden und Oestriden, lagern ihre Eier in die Haut resp. in gewisse nach außen kommunizierende Körper-

höhlen (Nase, Pharynx, Ohr, Magendarmtrakt) von Tieren und Menschen ab. Die verschiedenen Musciden wählen meist faulende pflanzliche und tierische Substanzen, manchmal verschiedene lebende Tiere, nicht allzu selten auch den Menschen. Vom Geruche des Blutes und fauliger Substanzen angelockt, suchen sie Wunden, gangränöse Geschwüre, ekzematöse Herde; die Nasen-, Ohren- und weiblichen Genitalhöhlen (bei vorhandenen Katarrhen) auf, die äußerst gefräßigen Maden verzehren die umgehenden Gewebe manchmal bis auf die Knochen, so Defekte der Nasen- und Ohrbegrenzungen erzeugend und in die Nebenhöhlen vordringend. Die begleitenden bakteriellen Entzündungen können zu Meningitis mit letalem Ausgang führen.

Die von den Larven befallenen Wunden heilen erst, nachdem die ersteren sie verlassen. Diese Form Myiasis muscosa (kutaner, nasopharyng., genital,) ist in Rußland, Norwegen, manchmal Frankreich, Deutschland zu finden (erzeugt durch die *Sarcophila* und *Sarcophaga*). Doch ist ihr eigentliches Verbreitungsgebiet das warme Klima (in Argentinien der Schraubenwurm).

Die Oestriden (Beißfliegen) befallen als echte Parasiten die normale Haut, in deren subkutanen Gewebe sich die an der Oberfläche entwickelte Larve einbohrt. Im Bindegewebe erzeugen sie, an einer Stelle verharrend, eine chron. indolente Entzündung, die sogenannte Dasselbeule (Myiasis dermat. oestrosa). Gewöhnlich gelangen erst die fertigen Maden auf die Haut des Menschen, nachdem sich die Eier in der Haut verschiedener Tiere entwickelt haben. Strauch berichtet nun über die letztere Affektion von seiner eigenen Haut: zwei zufällig bemerkte, bis erbsengroß werdende, heftig juckende Knoten, die an der Spitze eine kleine Öffnung boten, aus welcher zeitweilig einige Tropfen gelblich-blutiger Flüssigkeit austraten. Aus dem einen Knötchen wurde die 6 mm lange, dünne, weiße Larve durch Kratzen entfernt; der andere im Unterhautfettgewebe sitzende Knoten wurde bis zur Größe einer Walnuß wachsen gelassen, worauf er exstirpiert wurde.

Die Larve konnte jedoch nicht sicher als jene d. *Oestrus dermatol. noxialis* bestimmt werden.

Der excidierte Knoten hatte eine Höhlung von 0.7 cm im Durchmesser. Die Innenfläche war mit einer endothelähnlichen Lage bekleidet, die umgebende Schichte zeigte ein entzündliches Granulationsgewebe; aus der Höhle führte ein mit Epitel ausgekleideter Gang zur Oberfläche. Die ganze Bildung entsprach einem erweiterten, entzündeten Haarfollikel, was zur Angabe von Stricker (Wien), daß die Larven vom *Oestrus* (Hypoderma) im Haarfollikel sitze, stimmt.

Rudolf Winternitz (Prag).

Schüffner. Über den neuen Infektionsweg der Ankylostoma-Larve durch die Haut. Zentralblatt f. Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. XL. p. 683.

Schüffner geht auf die bisher vorliegenden Mitteilungen genauer ein, besonders auf die von Loos, der zuerst das Eindringen der Anky-

Iostoma-Larven in die Haut behauptet und bewiesen hat. Weiterhin schildert der Autor die eigenen Untersuchungen, durch die er den normalen Vorgang der Infektion durch die Haut möglichst nachzuahmen strebte. Er konnte feststellen, daß die Larven in das intakte Epithel einzudringen vermögen, daß sie dasselbe rasch durchwandern, um in das Bindegewebe, in die Blut- und Lymphbahnen zu gelangen. Interessante mikroskopische Abbildungen illustrieren die geschilderten Vorgänge und beweisen, daß es sich nicht um ein Eindringen in die Follikel handelt. Die subjektiven Empfindungen sind die eines leichten Juckens, was eventuell noch nicht einmal bemerkt oder beachtet wird.

Wolters (Rostock).

Hutchins, M. B., Atlanta. Report of two cases of Larva migrans, with special reference to the treatment. The Journ. of cut. dis. incl. Syph. XXIV. 6. 1906.

Hutchins rät eine Subkutannadel in den Gang, den die Larve in die Haut gräbt, einzuführen, bis zu dem vermuteten Sitz der Larve vorzustoßen, hierauf Cocain und dann Chloroform einzuspritzen. Auf letzteres ist er durch die Erfahrungen der Entomologen gebracht worden.

Rudolf Winternitz (Prag).

Smith, Claude, A. The Causative Factor in the Production of the Dermatitis of Ground Itch (Uncinariasis). Jour. Am. med. Ass. XLVII. 1693. 24. Nov. 1906.

Smith war bemüht durch Versuche festzustellen, ob die in Begleitung des Uncinariasis beobachtete Dermatitis allein durch den mechanischen Reiz der Anwesenheit der Larven von *Uncinaria americana* verursacht werde oder ob die Larven eine reizende, heftiges Jucken verursachende Substanz produzieren. Die Versuche mit einem alkoholischen Extrakt der Larven ergaben in der Tat, daß eine solche Substanz vorhanden ist; die künstlich durch dieselbe hervorgerufene Hautentzündung war aber viel milder als die durch die Larven selbst produzierte; dies ist leicht verständlich, da bei der Krankheit selbst die reizende Substanz von Zeit zu Zeit wieder neu abgesondert wird und zwar direkt in die Gewebe. Das durch das heftige Jucken bewirkte Kratzen scheint die Larven in der Durchdringung der Haut zu unterstützen. Die reizende Substanz selbst wurde noch nicht dargestellt; in ihrer Wirkung scheint sie ähnlich der von Pfaff aus dem *Rhus toxicodendron* dargestellten Substanz zu sein.

H. G. Klotz (New York).

Barabaschew, P. N. Echinococcus der Augenhöhle. Journal russe de mal. cut. 1906.

Die Besonderheiten des Falles sind: 1. Die feste Verwachsung der Echinococcus-Kapsel mit dem Auge, wodurch die Technik der Operation sehr erschwert wurde. 2. Der fieberlose Verlauf nach der Operation und die rasche Vernarbung ohne Eiterung. 3. Während sich bei Leber- und Milzechinokokken im Blaseninhalt Bernsteinsäure findet, wird sie in diesem Falle wie gewöhnlich bei der Lokalisation in der Augenhöhle vermißt. Dagegen fanden sich Chloride sehr reichlich.

Richard Fischel (Bad Hall).

Balzer et Poisot. Accidents causés par la piquûre de l'Argas. Ann. de dermat. et des syph. 1906. p. 604.

Ein Patient, der in einem seit 4 Jahren verlassenem und seit einem Jahr in ein Zimmer umgewandeltem Taubenhaus wohnt, bekommt im Anschluß an Insektenbisse eine phlegmonöse Entzündung der Haut des l. Ellbogens und Vorderarms. Innerhalb der geröteten, sehr schmerzhaften Haut über dem Ellbogen sind vier flache blässere Papeln, im Zentrum durch Kratzen exkoriert, sichtbar. Das mitgebrachte Insekt stellt sich als Argas reflexus seu marginatus, einem der Wanzen ähnlichen Parasiten der Taube, dar.

Walther Pick (Wien).

Brault. Quelques cas de phthiriasis anormales. Ann. de dermat. et de syph. 1906. p. 70.

Bei einem Patienten fanden sich die Pediculi pubis bloß an den Cilien, bei einem zweiten ad pubis, an den Cilien und auf dem Kopf u. zw. in drei scharf abgesetzten Bezirken an der Stirnhaargrenze, in der Hinterohrgegend und am Nacken. Bei einem dritten, an Pediculose leidenden Patienten ist die starke Pigmentierung der Schleimhäute bemerkenswert.

Walther Pick (Wien).