植物學雜誌第三十卷

第三百五十五號

大正五年七月

○みづきニ於テ物質轉移ノ上ニ及ボス輪截ノ影響

日比野 信 一

Shin-ichi Hibino: — Effekt der Ringelung auf die Stoffwanderung

bei *Cornus controversa*, HENSL.

輪截ノ研究ハ第十七世紀ノ末葉ニ於ケルマルセロ、マルビギ氏ノ實驗以來、幾多ノ學者ニ依ツテ行ハレタルモノニシテ是等ノ諸研究ハ大要三段ニ區別スルヲ得ベク、第一ニハ水液上昇ニ關スルモノ、第二ニハ物質轉移ニ關スルモノ、及ビ第三ニハ諸多ノ生長關係ニ關スルモノ等即チ是レナリ。

第一ノ問題ナル水液上昇ニ關シテハ多數ノ輪截試驗アリ、茲ニ其ノ詳細ヲ舉グルノ遑ナキモ要スルニ從來大多數ノ學者ノ得タル結果ヲ見ルニ、樹株ハ輪截ニ因リテ其ノ皮層部ヲ除去セラル、モ、若シ輪截裸部ニ於ケル木質部ガ諸種ノ外的傷害ニ對シテ適當ニ保護セラル、ニ於テハ、何等水液通導作用ノ阻害ヲ起スニ至ラザルモノナルコト何レモ首肯セラル、處ノ如シ。彼ノトレキュール氏ガ輪截セルばだいじゆノ爾後四十有餘年間、猶ホ依然トシテ其ノ生活ヲ繼續セルノ事實ヲ示セルガ如キ其ノ著例ト云フベシ。輓近ウルスブルング氏ハ多數ノ樹種ニ就テ該研究ヲ行ヒシ結果、樹株ノ水液通導作用ハ主トシテ木質外部ノ新層ニ於テ行ハレ、皮層部ハ單ニ其ノ通導ニ際シ、木質表面ノ保護作用ニ必要ナル任務ヲ有スルモノナリトノ結論ニ達セリ。

次ニ第二ノ物質轉移ニ關スル問題ハ既ニハルチヒ、ハンスティン、フエッファー、ハーバーラント、フイッシャー、ストラスブルグル其他諸家ノ研究アリテ、其ノ結果含窒素并ニ炭水同化物質ノ下方輸動作用ハ常ニ輪截ニ因ツテ著シク阻害セラレ、更ニ之ニ因ツテ輪截局部附近ニ是等同化物質ノ堆積ヲ誘導シ、從ツテ篩管部ガ物質ノ下方輸動作用ニ

重大ノ意義アルモノナルコト既知ノ事實タリ。嘗テシンバー氏ハおほばこの葉柄ニ於テ特殊ノ輪截手術ヲ行ヒ、皮層部以外ニ通導鞘(Lenticels)モ亦該作用ニ缺クベカラザルモノナルヲ唱ヘタルガ、其後ツァベック氏ニヨツテ反證セラレタリ。ルクラー、ド、ザボン氏ハ樹幹ノ基底部ニ於テ輪截ヲナシタルニ、其ノ結果貯藏物質ハ正常株ニ比シ、根部ニ饒多ニ、幹部ニ寡少ナルノミナラズ、前者ニ於ケル葉器ハ色澤劣ルモ却ツテ貯藏物質ニ富ムコトヲ觀察セリ。三好博士ハ嘗テ輪截セル桑樹ノ葉器ニ於ケル同化物質ノ轉移不能、并ニ其ノ局所堆積ヲ證セリ。近時シュルテ氏ハ約四十種ノ被子及ビ裸子類樹種ニ就テ其ノ葉器ニ及ボス輪截ノ影響、并ニ局所堆積ヲナス處ノ貯藏物質ノ位置ニ就テ攻究シ、其ノ際澱粉、還元糖及ビ單寧等ノ物質ガ常ニ輪截ニヨツテ著シク増加スルノ事實ヲ確メタリ。而シテ將ニ吾人ノ論ゼントスルみづきト同屬ナル *Cornus alba*, *C. mas* ノ兩種モ亦如上ノ例ニ漏レザルヲ見タリ。

果實形成ニ及ボス輪截ノ効果ハ古ク園藝家、殊ニ果樹栽培家ニヨツテ實地ニ注意セラレ、其ノ多クハ陽性ノ効果ヲ齎スコトヨリ輪截ヲ稱シテ魔環(Saubering)トサヘ云ヘリ。ボドック氏ハ此等ノ事實ヲぶどうニ就テ實驗シタルガ、其ノ輪截株ハ正常株ニ比シ、約 $\frac{2}{3}$ 箇月結實期ヲ早ムルコトヲ知レリ。ダニエル氏ハ「トマト」ヲ以テ同様ノ試驗ヲ行ヒ、常ニ輪截株ニ於テ果形ヲ増大スルヲ證シタルモ、反之ヘドリック氏ノ如キハ同植物、并ニ菊科植物ヲ以テ實驗シ、輪截ハ却ツテ一般ノ生長機轉ヲ阻害スルノ傾向アルヲ見タリ。斯ノ如ク其ノ結果ニ多少ノ差異ヲ見ルハ一般ニ樹株各個ノ特性、并ニ手術方法及ビ其ノ時期ノ如何ニ基因スルモノト思考セラル。

又輪截ノ影響トシテ特ニ葉器ニ於テ「アントチアン」色素ノ形成ヲ促スノ事實モ夙ニ學者ノ注意ヲ惹ケル處ニシテ、キュスター、ゾラウエル、ラバッツ、コンベス等諸家ノ實驗アリ、皆輪截ノ結果其ノ上部ニ著生スル葉器ニ於テ該色素ノ形成ヲ立證セリ。

最後ニ第三ノ問題トシテ輪截ガ諸多ノ生長機轉ニ及ボス影響ニ就テハ、先ヅ當該局部ニ於ケル癒合組織ノ形成、并ニ局所附近ニ於ケル枝條及ビ根ノ異常の形成ヲ其ノ主ナル現象ト見做スベク、而シテ是等ノ關係ハ何レモ輪截ノ傷害刺撃ニ因リ一次的ニ誘起セラル、モノナリト雖、續テ爾後物質ノ轉移機能ノ二次的關係ニ支配セラル、モノナ

リ。乃チ其ノ枝條及ビ根ノ形成ニ就テハフエツアー、デトメル其他諸氏ノ實驗アリ。是等傷害刺撃ニ因ル器官形成及ビ爾後ノ發達ガ輪截局部ノ上下兩側ニ於テ夫レ夫レ消長アルハ、是レ其ノ莖部ニ含蓄セラル、處ノ貯藏物質ノ多寡、并ニ各側ニ於ケル物質通導ノ連絡阻害ノ結果トシテ、相互間ノ流用不能ヲ起スニ基因スルモノトナセリ。而シテ癒合組織ノ形成ニ關シテハチトマン、ゾラウエル氏等ノ觀察ニ依レバ、該組織ハ常ニ輪截局部ノ上縁ニ於テ特ニ著シク發達スルコトニ於テ相一致シ、何レモ其ノ原因ヲ莖ノ上側ニ於ケル物質ノ堆積作用ニ歸セシメタリ。

上述ノ如ク特ニ物質轉移ニ關スル輪截ノ影響ニ就テハ從來多數ノ研究アルモ、多クハ單ニ皮層部輪截ノ場合ニ限ラレタリ。余儕曩ニ此ノ問題ニ就テ少シク實驗スル處アリ。皮層部輪截ノ外、更ニ後段述ブル所ノ諸種ノ手術ヲ行ヒ、夫レニ因ツテ起ル種々ノ外的効果、即チ葉器ニ及ボス傷害、「アントチアン」色素ノ形成、癒合組織并ニ不定芽ノ生成及ビ莖部肥厚生長ノ關係等ノ事項ヲ驗シ、次ニ内的効果トシテ、同化、貯藏物質ノ轉移機轉ニ關シ、即チ葉器内ニ於ケル其ノ輪轉作用、莖部ニ於ケル貯藏物質ノ堆積作用、并ニ葉器ニ於ケル糖素及ビ酸化、過酸化酵素ノ異常的形態ニ就テ少シク其ノ間ノ消息ヲ知り得タルヲ以テ、以下逐次其ノ大要ヲ述ベ讀者ノ高教ヲ仰ガント欲ス。

一、實驗材料及ビ其ノ方法

余儕ノ使用セル材料ハ主トシテ小石川植物園内ニ生ゼル樹齡數年乃至數十年ノ多數ノみづか (*Cornus controversa* Hemsl.) ニシテ總テ野外ニ於ケル實驗ナリ。尙ホ本種ノ外、他ノ二三ノ樹種ニ就テモ同様ノ試驗ヲ行ヒ、略々同様ノ結果ヲ得タルガ、茲ニハ主トシテみづきニ就テ述ブ。

抑々輪截トハ普通莖周ニ沿ヒ、其ノ表面ノ一部ヲ輪狀ニ剝離スルノ操作ニシテ、先ヅ莖軸ニ垂直ニ相近接スル二ヶ所ニ於テ木質部ニ達スル截傷ヲ作り、其ノ中間ニ位スル皮層部ヲ剝離シ去ルモノ、之ヲ皮層部輪截 (Rinde-Ringelung) ト云ヒ、普通ノ輪截トハ是ノ如キ手術ヲ稱ス。此ノ場合ニ於テハ樹皮ハ形成層ノ中間ニ於テ剝離セラル、ヲ以テ、其ノ除去セラル、皮部ニハ表皮、皮層(篩管ノ全部ヲモ)及ビ形成層ノ外半部ヲ含ミ、而シテ殘リノ莖部ニハ木質層ノ表面ニ形成層ノ薄層ヲ殘留ス、依ツテ靜ニ其ノ裸面ヲ布片ニテ磨擦スレバ形成層ハ容易ニ除去セラレ、木質

部ヲ裸出セシム。

次ニ皮層部ノミナラズ、更ニ深ク木質部ノ外側、即チ液材ノ部分ヲモ除去セル輪截、即チ木質部輪截 (Holz-Ringelung) アリ。余儕ノ手術ニ於テハ常ニ液材ノ一部ヲ莖幹ニ殘留セシム。

以上二種ノ輪截法ヲみづきノ主幹、并ニ枝條ニ於テ施シ、尙是等ノ全輪截ノ外、莖幹ノ半側ヲ殘ス所ノ半輪截、及ビ輪截ニハ非ザルモ樹幹ノ基底部約一「メートル」ノ部分ニ於テ、幹ノ全周ニ互リ孔徑三「センチメートル」、深サ五「センチメートル」ニ達スル約三十箇ノ孔ヲ穿チ、傍ラ其影響ヲ見タリ。故ニ本論文ニ記スル手術株ハ左ノ五通ナリトス。

一、皮層部輪截株

二、木質部輪截株

三、皮層部半輪截株

四、木質部半輪截株

五、穿孔株

手術局部ニハ何等被包ヲ施サズ。

二、輪截樹株ノ外形的變化

ウルスブルング氏ハ (*Cornus sanguinea*) ニ就テ皮層輪截ヲ行ヒ、爾後一ヶ月乃至二ヶ月間、尙ホ其ノ葉器ハ何等ノ變化ヲ受ケズ、又樹幹ノ1/2乃至1/4周ヲ扇形的ニ輪截シタルモノハ能ク四ヶ月半ニ互リ、其ノ葉ノ傷害的變化ヲ現ハサバリシコトヲ記載セリ。余儕ノ場合ニ於テモ亦皮層輪截ハ何等急劇ノ被害ヲ現ハスコトナク、氏ノ結果ト相似タリト雖、輪截ノ種類ニヨリ其ノ經過ノ趣ヲ異ニスルハ當然ノコトニシテ余儕ハ明治四十五年初夏各樹株ニ於テ手術ヲ施シ、以後連續シテ翌年ニ互リ一ケ年間其ノ外的變化ニ就テ觀察ヲ試ミタルガ、其ノ内二三ノ表ヲ掲ゲテ左ニ概況ヲ示サント欲ス。(第一表—第八表)

(附記)、枝條ノ實驗ハ主幹ト略々同様ナルヲ以テ之ヲ略シ茲ニハ主幹輪截ノ場合ノミヲ示ス。

第 一 表

試験樹株 (みづき主幹輪截)

	手術ノ時日	幹ノ底周	樹高	地上ヨリ手術部マデノ距離
正 常 株 I II		ca. 45 cm " 59 "	ca. 7.6 m " 9.0 "	
皮 層 部 輪 截 株 I II III IV V	23/VII	" 38 "	" 6.0 "	3 m.
	"	" 28 "	" 6.0 "	"
	"	" 68 "	" 9.5 "	1/2
	20/VII	" 15 "	" 4.5 "	"
	"	" 32 "	" 6.0 "	"
木 質 部 輪 截 株 I II III IV	"	" 31 "	" 6.0 "	3
	23/VII	" 30 "	" 6.0 "	"
	"	" 37 "	" 6.5 "	1/2
	"	" 49 "	" 7.5 "	"
皮 層 部 半 輪 截 株 I II	22/VII	" 30 "	" 6.0 "	3
	"	" 49 "	" 8.5 "	1/2
木 質 部 半 輪 截 株 I II	"	" 30 "	" 6.0 "	3
	"	" 43 "	" 7.5 "	1/2
穿 孔 株 I II	"	" 73 "	" 10.5 "	1
	"	" 38 "	" 7.0 "	"

(輪截部ノ幅ハ約 5cm.)

第 二 表

手術後十日 (みづき主幹輪截)

	手術部ニ於ケル癒合組織	手術部ノ直下ニ生ズル不定芽數	手術部ノ上方ニ於ケル葉ノ色調	葉ノ状態
正 常 株 I II			濃 緑 色	健 全
皮 層 部 輪 截 株 I II III IV V	局部ノ上縁ニ於テノミ發達ス	3	濃 緑 色	健 全
		2		
		0		
		0		
		0		
木 質 部 輪 截 株 I II III IV	全然發達セズ	4	濃 緑 色	健 全
		3		
		3		
		1		
皮 層 部 半 輪 截 株 I II	局部ノ上縁ニ於テノミ發達ス	2 2	濃 緑 色	健 全
木 質 部 半 輪 截 株 I II	全然發達セズ	2 2	濃 緑 色	健 全
穿 孔 株 I II	全然發達セズ	0 0	濃 緑 色	健 全

第三表

手術後三十日（みづき主幹輪截）

	手術部ニ於ケル 癒合組織	手術部ノ直下ニ 生ズル不定芽數	手術部ノ上方ニ 於ケル葉ノ色調	葉ノ狀態
正 常 株 I II			濃 綠 色	健 全
皮 層 部 輪 截 株 I II III IV V	上 緣 著 明 下 緣 微 弱	11 5 0 3 0	綠 色	健全、葉ノ先 端少シク紅色
木 質 部 輪 截 株 I II III IV	發 達 セ ズ	23 20 21 5	稍々黃綠色	稍々凋縮ス
皮 層 半 部 輪 截 株 I II	上緣及ビ兩側緣 ニ著明、下緣微 弱	7 9	綠 色	健 全
木 質 部 半 輪 截 株 I II	兩側緣ニ著明、 上下緣微弱	4 4	濃 綠 色	健 全
穿 孔 株 I II	兩側緣ニ著明、 上下緣微弱	0 0	濃 綠 色	健 全

○みづきニ於テ物質轉移ノ上ニ及ボス輪截ノ影響 日比野

第四表

手術後五十日（みづきノ主幹輪截）

	手術部ノ直下ニ 生ズル不定芽數	手術部ノ上方ニ 生ズル葉ノ色調	葉ノ狀態
正 常 株 I II		濃 綠 色	健 全
皮 層 部 輪 截 株 I II III IV V	11 4 0 5 0	少 シ ク 紅 色 帶黃綠色、一部紅色 綠 色 少 シ ク 紅 色	稍々凋縮ス 健 全
木 質 部 輪 截 株 I II III IV	26 23 22 14	帶 黃 綠 色 帶黃綠色、一部稍々紅色	凋 縮 ス
皮 層 半 部 輪 截 株 I II	9 12	深 綠 色	健 全
木 質 部 半 輪 截 株 I II	4 4	深 綠 色	多少凋縮ス
穿 孔 株 I II	0 0	深 綠 色	健 全

第 五 表
手術後八十日 (みづき主幹輪截)

	癒 合 組 織	手術部ノ直下ニ生ズル不定芽數	手術部ノ上側ニ於ケル葉	手術部ノ下側ニ於ケル葉
正 常 株 I II			濃綠色 健全	
皮層部輪截株 I II III IV V	上 緣 著 明 下 緣 微 弱	11 4 0 6 0	{ 帶紅色ノ樹頂ノ葉ハ凋落シ 新葉歪曲ス 「アントチアン」ノ形成著明 深紅色、葉歪曲ス 紅色、綠葉ヲ交ユ樹頂落葉 綠色、稍々紅色、歪曲ス	{ 綠色、輪截部ニ近 キモノハ稍々「ア ントチアン」ヲ形 成ス —— —— ——
木質部輪截株 I II III IV	發達セズ 上緣ニ於テノミ微 弱	30 26 23 16	{ 帶綠黃色、強ク歪曲シ落葉 多シ 帶黃綠色、樹頂ノ葉稍々紅 色、強ク歪曲ス、落葉多シ 深紅色、強ク歪曲ス、落葉多シ 帶紅色、帶黃色葉ヲ交ユ、 歪曲ス	{ 綠色 健全 —— ——
皮層部半輪截株 I II	{ 兩側緣顯著、上緣 之ニ亞ギ下緣微弱	9 14	微ニ帶黃綠色、殆ド健全	綠色 健全 ——
木質部半輪截株 I II	{ 兩側緣及ビ上緣ニ 於テノミ微弱	5 5	微ニ帶黃綠色、殆ド健全	綠色 健全 ——
穿 孔 株 I II	{ 孔ノ全緣ヨリ發達 ス	0 0	濃綠色健全	綠色 健全 ——

第 六 表
手術後百日 (みづき主幹輪截)

	手術部ノ直下ニ於ケル不定芽數	手術部ノ上側ニ於ケル葉		手術部ノ下側ニ於ケル葉	
		色 調	落 葉 期	色 調	落 葉 期
正 常 株 I II		{ 濃綠色、健全、「アントチアン」ヲ形成セズ		{ 十一月三十日全落葉	
皮層部輪截株 I II III IV V	11 4 0 6 0	{ 落 葉 後、 (十月初旬一 同二十日ノ間 ニ於テ全葉美 紅色ヲ呈ス)	{ 十月三十日 (手術後百日) 十月廿五日 (同九十五日)	{ 綠色、健全 「アントチアン」ヲ少 シク形成ス —— —— ——	{ 十一月廿五日 —— —— ——
木質部輪截株 I II III IV	30 26 23 23	{ 落 葉 後	{ 十月十五日 (同八十五日)	{ 黃 綠 色 「アントチアン」ヲ少 シク形成ス —— ——	{ 十一月二日 —— ——
皮層部半輪截株 I II	9 14	{ 帶黃綠色ノ葉 ヲ少シク交ユ	{ 十一月十五日 (同百十五日)	綠 —— 色	十一月二十日 ——
木質部半輪截株 I II	15 6	{ 帶 黃 綠 色	{ 十一月十五日 (同百十五日)	綠 —— 色	十一月二十日 ——
穿 孔 株 I II	0 0	{ 綠 色	{ 十一月卅日 (同百三十日)	綠 —— 色	十一月三十日 ——

(此ノ時期ニ於テハ癒合組織ノ發達休止ス)

第七表
手術後二百五十日（みづきノ主幹輪截）

	手術部ニ於ケル根 壓液流出ノ状態	葉芽ノ開展		
		手術部ノ上方 ニアルモノ	手術部直下ノ 不定芽葉芽	手術部ノ下方 ニ於ケルモノ
正 常 株 I II		全葉未ダ開展セズ		
皮層部輪截株 I II III IV V	輪截線全癒シ流出セ ズ	未開展 樹頂ヲ除キ 未開展	未開展 稍々開展 開	開 展 — —
木質部輪截株 I II III IV	上下緣ヨリ多量ニ流 出 上下緣ヨリ少量流出 上下緣ヨリ多量流出	未開展 稍々開 開展	著シク開展 開 展	開 展 — —
皮層部半輪截株 I II	流出セズ	未開展	開 展	開 展 —
木質部半輪截株 I II	上下緣ヨリ少シク流 出、側緣ヨリ流出セズ	未開展	開 展	開 展 —
穿 孔 株 I II	流 出 ス	未開展	開 展	開 展 —

第八表
手術後三百日（みづき主幹輪截）

	花 期	手 術 部 ノ 癒 合 組 織	手術部ノ 直下ニ於 ケル不定 芽總數	幹ノ肥厚成 長(幹周) [※]		手 術 部 ノ 上 側 ニ 於ケル葉ノ状態
				上部	下部	
正 常 株 I II	盛花時					濃綠色健全
皮層部輪截株 I II III IV V	經 過	上 緣 著 明 下 緣 微 弱	18 15 7 5 12	32.5 ^{cm} 19.5 60.5 14.0 28.0	32.0 ^{cm} 18.5 60.0 12.0 27.0	綠色、歪曲セズ、葉芽ハ 始メ「アントチアン」ヲ 含有スルモ後一時全部 綠色トナリ正常形ニ發 達スルニ及ビ葉緣存在 ノ傍再ビ之ヲ形成シ暗 紅色ヲ呈ス
木質部輪截株 I II III IV	未開花	上緣ニ於テノミ微弱 發達セズ	35 30 24 9	21.0 20.0 33.5 46.5	21.5 20.5 33.5 46.0	黃綠色、稍々「アントチ アン」ノ形成微弱、葉ハ 著シク葉緣ニ乏シク 般ニ歪曲ス
皮層部半輪截株 I II	盛花時	兩側緣著明、上 緣之ニ亞ギテ緣微 弱	12 12	20.0 46.5	20.0 46.0	濃綠色
木質部半輪截株 I II	盛花時	前者ニ比シ稍々 發達微弱	13 18	19.5 37.5	19.5 37.5	濃綠色
穿 孔 株 I II	盛花時	孔ノ全周(殊ニ兩 側)ヨリ發達ス	0 0	65.0 34.5	65.0 34.0	濃綠色

* 不定芽數ハ前年枯死セルモノヲ省キ現在數ヲ示ス
 ** 幹周ハ輪截線ヨリ上下へ各三「センチメートル」ノ距離ニ於テ測定ス

○みづきニ於テ物質轉移ノ上ニ及ボス輪截ノ影響 日比野

前表ヲ總括スルニ、木質部輪截株ニ於テハ最モ迅速ニ葉ノ凋縮ヲ起シ早キハ手術後約十日ニシテ其ノ局部以上ノ樹體ニ於テ、樹頂ヨリ下方ニ向ヒ漸時ニ葉ノ傷害の徵候ヲ現シ來リ、九十乃至九十五日後ニシテ終ニ全樹葉ヲ凋落セシメタリ、皮層部輪截株ニ於テハ之ニ反シ傷害微弱ニシテ、葉ハ三十乃至六十日後ニシテ稍々徵候ヲ示シ來リ、百日後ニシテ凋落セリ。半輪截株(皮層部及ビ木質部共)ニ於テハ何レモ正常株ト何等著シキ差別ヲ見ルニ至ラズ、約百三十日後ニシテ全部落葉セリ。

輪截株ニ於テハ手術局部ノ直下ヨリ多數ノ不定芽ヲ誘發セシメ、是等不定芽ハ能ク發達ス。而シテ不定芽形成ハ特ニ木質部輪截ニ於テ著明ニシテ、其ノ數主幹輪截ニ於テ九乃至三十五ヲ算シ(枝條輪截ニ於テ四乃至十三ヲ算セリ)、之ニ比シテ皮層部輪截ニ於テハ、主幹輪截ニ五乃至十八ヲ示シ(枝條輪截ニ一乃至三)、著シク前者ニ劣ルノ觀アリ。半輪截ニ於テハ主幹、十二乃至十八(枝條、一乃至三)、而シテ何レモ輪截ノ半側直下ニ於テノミ形成セラレ、概シテ木質部半輪截ニ於テ稍々促進セラル。

如上ノ不定芽形成ハ先ヅ第一ニ傷害刺撃ニ因ツテ起成セラル、器官形成ノ一例ニシテ、又其ノ局部附近ニ於ケル營養關係ニ起因スト雖モ(特ニ木質部輪截株ニテハ)、殊ニ極性現象(Polarity)ヲ考察ノ外ニ措ク能ハズ。如何トナレバ不定芽形成ハ全然營養過多ナル輪截局部ノ上側ニ起ルコトナク、常ニ營養寡少ナル下側ニ於テノミ誘起セラル。是レ樹幹ハ輪截ニ因ツテ恰モ上下二部ノ互ニ獨立ナル生理的個體ノ關係ヲ表シ、其ノ下側幹頂ハ莖極トナリシニ他ナラズ。以テ有力ナル證左トスルヲ得ベシ。而シテ不定芽形成ガ特ニ木質部輪截ニ於テ著明ナルノ事實ハ、是レ該株ニ於テハ水液上昇ニ主要ナル導管部ヲ傷害セラル、ノ結果、其ノ下側ニ於テ一定度ノ營養堆積ヲ來シ、以テ不定芽ノ發達ヲ助成スルニ必然的有利ナル二次的効果ヲナスニ外ナラズ。

次ニ癒合組織形成ノ狀態ヲ見ルニ、其ノ關係、不定芽形成ガ木質部輪截ニ於テ甚著ナルニ反シ、却ツテ皮層部輪截ニ於テ最モ著シキヲ見ル。而シテ該組織ハ一般ニ輪截局部ノ上緣ニ於テ著シク形成セラレ下緣ニ於テハ遙ニ微弱ナルヲ常トス。

普通皮層部輪截ニ於テハ手術後約十日ニシテ既ニ該組織ノ形成ヲ始メタルガ、木質部輪截ニ於テハ極メテ微弱ニ起ルカ、若シクハ殆ド之ヲ形成スルコトナクシテ第一年ヲ終レリ。皮層部半輪截ニ於テハ左右ノ兩輪截縁ニ於テ甚著ニ發達シ、上縁之ニ亞ギ、下縁最モ微弱、木質部半輪截ニ於テハ一般ニ著シク其ノ形成微弱ナリ。

みづきハ新春、根壓液ノ多量ナル事實ニ因ツテ著明ナル樹種ナルガ、今其ノ輪截株ニ就テ見ルニ、翌春同時期ニ至ルヤ、木質部輪截株ニ於テハ其ノ傷害裸部、殊ニ上下液材ノ截縁ヨリ著シク水液ヲ溢流セシムルヲ見タリ、然ルニ皮層部輪截株ニ於テハ全然水液ヲ漏洩セシメズ、是レ前者ニ於テハ其ノ傷害部ハ尙ホ癒治セザルモ、後者ニ於テハ前年中已ニ全ク傷部ノ癒著セルヲ示スモノト云フベク、又半輪截ニ於テハ、皮層部半輪截株ハ水液ヲ漏洩セシメズ、木質部半輪截株、并ニ穿孔株ニ於テハ水液ノ溢流著シ。

クリーグ氏ハぶどうノ輪截實驗ニ於テ、其ノ創傷材 (Wundholz) ハ髓質部ニ於テ形成セラレタル事實ヲ見、尙ホ氏ハ斯カル創傷材ノ成因ヲ輪截部ニ於ケル死木質組織ノ分解產物ノ刺撃作用ナリト說ケリ。みづきノ場合ニテハ斯ノ如キ髓質部創傷材ノ形成ヲ見ズ、唯其ノ形成層ヲ中心トシ、附近ノ皮層及ビ木質部ニ於テ其ノ形成ヲ認メタルノミ。

如上ノ癒傷組織ハ一般ニ細胞ノ形狀頗ル不規則ニシテ、其ノ内容著シク澱粉、糖類、蛋白質等ノ養分并ニ磷酸石灰ノ結晶ニ富ム。

凡ソ癒傷組織ノ形成ガ一定ノ濕度ニ關係アルコトハ既知ノ事實ニシテ、今上述ノ場合、皮層部輪截ニアリテハ、創傷部ハ比較的水分ノ供給ニ便ニ、能ク相等ノ濕度ヲ保チ得ルモ、木質部輪截ニアリテハ漸時其ノ上下縁ハ著シク水分ニ缺乏シテ乾燥シ來リ、殆ド該組織ノ發達ヲ不可能ナラシムルモノナリ。

チトマン氏ハやまならし屬植物ノ樹幹ヲ輪截シ、以テ其ノ輪截部ノ上下兩縁ヨリ發達スル癒傷組織ハ恰モ輪截セザル一莖幹ノ兩端ニ於テ該組織ノ形成セラル、狀態ニ髣髴タルヲ見、此ノ事實ヨリシテ輪截ハ癒傷組織形成ニ對シ一個ノ幹莖ヲシテ恰モ二個ノ生理的個體タラシムルガ如キ作用アリトナシ、而モ其ノ極性ハ何等關與スルモノニ非ズ

圖 一 第

こころま (Pinus
Thunbergii) 主幹、
木質部輪截ヲ施シ
約二年後、輪截部
上側ニ於ケル物質
堆積ノ結果、上下
側ノ幹ノ肥厚成長
ニ著シキ差アルヲ
示ス、猶ホ四年後
ノ現今ニ於テモ輪
截部ノ上方幹部ハ
能ク其ノ生活ヲ繼
續シ居レリ。

トナセリ。余儕ノ場合ニ於テモ癒傷組織ノ形成ハ全ク極性ニ無關係ナルヲ示セリ。而シテ其ノ上縁ニ於テ下縁ニ比シ、良好ナル發達ヲナスハ全ク上側ニ於ケル幹部ニ多量ノ貯藏物質ヲ含有セラル、ノ結果ニ歸著スベキモノナルベシ。次ニ輪截ノ翌年新春新葉ノ展開ニ際シ、各株ニ就イテ比較スルニ、正常株ニ於テハ葉ノ展開最モ早ク、下部ヨリ上方ニ及ボシ、次デ半輪截株并ニ皮層部輪截株ニ於テ起リ、木質部輪截株ハ最後ニ位シ、且ツ葉色及ビ葉形正常株ニ於ケルガ如ク健全ナラズ。

一般ニ輪截ニ因ツテ葉器ニ「アントチアン」色素ノ形成セラル、コト、本種ニ於テハ顯著ナリ。特ニ皮層部輪截ニ於テ最モ著シ。(後段參照)

輪截後新ニ生ゼル葉ハ特ニ木質部輪截株ニ於テハ正常株ノ夫レニ比シ、葉綠素ニ乏シキノミナラズ、往々著シク不規則ニ褶曲シテ下垂スルコトアリ。

花ノ形成ハ皮層部輪截ニ於テ就中顯著ニシテ、更ニ花期モ亦早メラル、ヲ常トシ結實良好ニシテ豊富ナリ、木質部

輪截ニ於テハ遙ニ之ニ劣リ、寧ロ正常株ノ後ニアリ。

輪截局部ノ上側ニ著生スル葉ハ以上ノ如キ影響ヲ受クルモ、一般ニ其ノ下側ニ著生スルモノハ殆ド肉眼の影響ヲ見ルコトナク全ク正常株ノ葉ト其ノ消長相一致セリ。

最後ニ輪截局部ノ上下兩側ニ於ケル莖幹ノ肥厚成長ノ關係ハ普通老幹ニ比シ、若キ幹莖ニ於テ其ノ差著シク、

第九表
みづきノ葉ノ含水量比較

		含水量 %	
		九月十三日	十月九日
正 常 株	上部	59.4 ₇	58.6 ₅
	中部	58.9 ₄	57.4 ₇
	下部	59.8 ₂	57.6 ₈
		平均量 59.4 ₁	平均量 57.9 ₄
皮層部輪截株	輪截部ノ上側	54.9 ₈	45.5 ₅
		56.7 ₁	48.8 ₆
		57.0 ₄	53.0 ₃
	輪截部ノ下側	60.2 ₁	63.3 ₉
		平均量 56.2 ₄	平均量 49.1 ₅
木質部輪截株	輪截部ノ上側	55.0 ₄	41.3 ₂
		55.6 ₉	47.5 ₆
		54.9 ₈	52.8 ₅
	輪截部ノ下側	61.0 ₁	60.3 ₂
		平均量 55.2 ₄	平均量 47.2 ₄
皮層部半輪截株	輪截部ノ上側	58.4 ₂	56.8 ₈
		59.3 ₂	54.2 ₃
	輪截部ノ下側	59.0 ₅	59.7 ₀
		平均量 58.8 ₇	平均量 55.5 ₅
木質部半輪截株	輪截部ノ上側	57.4 ₄	54.8 ₂
		57.1 ₈	58.8 ₃
	輪截部ノ下側	59.1 ₂	59.9 ₀
		平均量 57.3 ₁	平均量 56.8 ₂
穿 孔 株	穿孔部ノ上側	58.7 ₅	58.9 ₂
		61.0 ₁	61.2 ₃
	穿孔部ノ下側	61.3 ₄	61.7 ₀
		平均量 59.8 ₈	平均量 60.0 ₇

○みづきに於テ物質轉移ノ上ニ及ボス輪截ノ影響 日比野

一般ニ皮層部輪截株ニ於テハ局部ノ上側ニ多量ノ物質堆積ヲ來スノ結果、最モ肥厚成長著シキヲ見ル、尙みづきノ他くろまつ（第一圖）竝ニなしニ於テハ更ニ此ノ關係ノ甚著ナルヲ觀察セリ。

三、正常株并ニ輪截株ノ葉器ニ於ケル含水量ノ變化

みづきノ樹株ヲ輪截セルノ結果、局部ノ上方ニ於ケル葉ノ含水量ノ變化ヲ知ラント欲シ、夫レ々々各種ノ輪截株ニ就テ之ヲ測定セリ、上ニ掲グル第九表ハ手術ヲ施セル年ノ九月十三日及ビ十月九日ニ於ケル比較ニシテ、蓋シ此ノ間、凡ソ二十五日間ハ最モ含水量ニ變化ヲ見タル時期ナリキ。

其ノ際各株ニ於テ輪截部ノ上下兩側ニ於テ葉ヲ採集セルノミナラズ、特ニ上側ノ葉ニ就テハ上下樹枝ノ各位置ヨリ採レリ。

上表ニ見ルガ如ク、第一回（九月十三日）ノ測定ニ於テ、正常株ノ葉ノ含水量ハ五九%—六〇%ノ間ニアリ。皮層部輪截株ニテハ

五五%—五七%、木質部輪截株ニテハ五五%—五六%、皮層部半輪截株ニテハ五九%—六〇%、木質部半輪截株ニテハ五七%—五八%、及ビ穿孔株ニテハ五八%—六二%ニ上下セルヲ見ル。即チ此ノ時期ニ於テハ未ダ輪截ノ影響ヲ現ハスニ至ラズ。

次ニ第二回(十月九日)ニ於ケル測定ヲ見ルニ、正常株ニテハ五七%—五九%、皮層部輪截株ニテハ稍々減ジ四六%—五七%、木質部輪截株ニテハ最モ減少シテ四一%—五三%、皮層部半輪截株ニテハ五四%—五七%、木質部半輪截株ニテハ五五%—六〇%及ビ穿孔株ニテハ五九%—六二%ヲ示シ、最後ノ三者ハ共ニ正常株ト大差ナシ。是ニ依ツテ之ヲ見ルニ一般ニ全輪截ヲナシタル株ハ其ノ含水量ヲ多少減失シ、特ニ木質部輪截株ニアリテハ最モ著シキ現象ヲ見ル。

此ノ外前表ニ於テ見ルガ如ク、同一輪截株ニアリテモ一般ニ樹株ノ上方ニ位スル葉ハ下方ニ於ケルモノニ比シ、水量ノ減少著シ。斯ノ如キ上下ノ差ハ全輪截ノ場合ニ於テ著シク例ヘバ皮層部輪截ニテハ最上部ノ葉ニ於テ四五・五%、最下部ノ葉ニ於テ五三・〇%ヲ示シ、木質部輪截ニ於テハ最上部ニ四一・三%、最下部ニ五六・〇%ヲ示シ、前者ニ於ケルヨリ其差顯著ナリ。然ルニ正常株ニ於テハ當時猶ホ斯ノ如キ差異ナク、又半輪截株及ビ穿孔株ニ於テモ其ノ差微少ナリ。

次ニ輪截部ノ下側ニ著生スル葉ニ就テ見ルニ、第二回ノ測定ニ於テ、木質部輪截株ニテ六〇・三%、皮層部輪截株ニテ六三・四%、半輪截株ニテ約六〇・〇%、及ビ穿孔株ニテ六一・二%ヲ算シ、之ヲ正常株ノ葉全體ノ平均値五九・四%ニ比スルニ寧ロ數値上大ニシテ即チ何等傷害の影響ヲ見ズ。

要スルニ樹株ハ木質部輪截ニ因リ著シク其ノ葉器ヲ害セラル、モ、皮層部輪截ニ因リテ其ノ傷害遙ニ微弱ニ、更ニ半輪截及ビ穿孔等ニ因リテハ殆ド葉器ノ傷害セラル、コトナキヲ見ル。

四、輪截ニ因ル葉ノ「アントチアン」色素形成

凡ソ「アントチアン」色素形成ノ原因ハ植物體器官ニ從ツテ一樣ナラズ。而シテ輪截竝ニ類似ノ機械的傷害ニ因ツテ

葉ニ該色素ノ形成ヲ促セル事實ハ種々ノ植物ニ就キ諸學者ノ觀察セル所ニシテキュスター氏ノゆきのした屬植物ニ於ケル、ゾラウエル氏ノさんざし屬植物ニ於ケル、ローレン、及ビラバツ兩氏ノぶどうニ於ケルガ如キ即チ是ナリ。其ノ際ラバツ氏ハ該色素ヲ形成セル葉ガ常ニ炭水化合物ニ富ミ、尙ホ其ノ莖葉ガ「マグネシウム」「カルシウム」ニ豊富ナルコトヲ證セリ。次デコンベス氏、及ビシュルテ氏ノ如キ更ニ多數ノ樹株ニ就テ何レモ多少ニ係ハラズ「アントチアン」色素ノ形成ヲ見、尙ホ當該葉器中ニ還元糖、單寧等ノ多量ノ有機的物質ノ含蓄ヲ立證セリ。且ツシュルテ氏ノ研究材料中ニハ本文記スル所ノみづきノ同屬植物ナル (*Cornus mas*, *C. alba*) ニ於テ同様ノ事實ヲ觀察セリ。

余儕ノみづきニ就テ見ルニ、輪截ニヨル葉ノ「アントチアン」色素形成ハ毎回頗ル著明ニ顯ハレ、特ニ其ノ主幹ニ皮層部輪截ヲ行ヘルモノニアリテハ極メテ美觀ヲ呈セルモノアリ。(其ノ詳細ハ本誌第二十七卷第三百二十三號及ビ本文第十九表第二十表參照)

みづきニ於ケル場合ノ結果ヲ再ビ左ニ約言スレバ次ノ如クナルベシ。

一、輪截ニヨル葉ノ「アントチアン」形成ハ夏時手術後、早キハ一ヶ月後ニ於テ顯ハレ、皮層部輪截株ニ於テ殊ニ其ノ形成盛ニ、木質部輪截株ニ於テハ稍々之ニ劣リ、半輪截株及ビ穿孔株ニ於テハ殆ド現ハレズ。又主幹ヲ輪截セルモノニ於テ強盛ニ、枝條ヲ輪截セルモノニ於テ微弱ナリ。

二、「アントチアン」形成ハ輪截部ノ上側ニ於ケル葉ニ於テ著シキノミナラズ、下側ノ輪截部ニ近キ葉ニ於テモ之ヲ見ル。

三、手術年度ニ於テ該色素ヲ形成セル樹株ハ其ノ翌年新葉ノ發展ニ際シ、先ヅ其ノ幼葉ノ時代ニ該色素ヲ形成シ(輪截ノ影響ニ非ズ一般のモノナリ)亞デ一ト度之ヲ消失シテ綠色ノ常態トナリ、更ニ五月、葉器ノ最モ旺盛ナル時期ニ至リテ、再ビ急激ニ該色素ノ形成ヲ促サレ(輪截ノ影響)、爾後落葉期ニ至ル迄、其ノ狀態ヲ繼續ス、此ノ事實ハ皮層輪截ニ於テ最モ顯著ナリトス(然レドモ創傷部ノ癒合スル場合ニハ爾後ノ年次次第ニ其ノ影響ヲ消失

第 十 表

みづきノ葉内ノ「アントチアン」色素

	組 織	樹 株	正 常 株	輪 截 株
葉	表 皮	表面組織	—	—
	裏面組織	裏面組織	—	— (但シ葉脈ニ於テハ多量)
	柵 狀 組	柵 狀 組	±	+++ (ニ存在ス)
肉	海 綿 上 組	海 綿 上 組	—	++
葉	表 皮	皮部組織	+	++
	層 柔 組	層 柔 組	—	++ (表皮ニ於ケルヨリ多量)
	木 質 射 髓	木 質 射 髓	—	+
柄	木 質 射 髓	木 質 射 髓	—	++ (特殊ノ細胞内ニ散在的)
			—	+
			—	++ (特殊ノ細胞内ニ散在的)
			—	+

(—)不存, (±)稀少時ニ不存, (+)存在, (++)多量, (+++)過多

スベシ)。

四、一般ニ葉ノ「アントチアン」形成力ハ同一みづきノ種類ニアリテモ個體ニヨリ著シキ強弱アリ。

五、一般ニみづきノ正常株ハ秋期、其ノ葉ノ著シキ「アントチアン」形成ヲ誘起スルコトナク（枝條ノミハ個體ニヨリ紅色トナルモノ多シ）、普通葉ハ單ニ黃色トナリテ落葉スルモノ多ク、時ニ「アントチアン」ヲ形成シテ暗褐色ヲ呈スルモノアルモ、斯ノ如キ葉ト輪截ニヨツテ異常的ニ形成セシ葉トヲ比較スルニ著シキ差アリ。

即チ今其ノ正常株ニシテ葉中ニ比較的能ク「アントチアン」ヲ形成セルモノト、輪截ニヨツテ之ヲ形成セルモノトヲ採リ、此等兩株ノ葉ヲ比較スルニ第十表ノ如ク、輪截株ニアリテハ葉ニ於ケル該色素ノ形成ハ常ニ著シク促進セラレ、一般ニ其ノ存在スル組織區域ノ正常株ニ比シテ遙ニ擴張セラル、ヲ見ルベシ。

以上ノ外、後段述ブル所ノ如ク「アントチアン」形成葉ハ綠葉ニ比シ常ニ多量ノ還元糖及ビ化糖素ヲ含有スルコトヲ知り得タルガ、更ニ輪截株ノ枝條ニ於テ著シク諸多ノ物質ノ堆積ヲ惹起スルノ狀況亦後章ニ述ブルガ如シ。

糖分ノ饒多ガ葉ノ「アントチアン」形成ノ原因ヲナスモノナルコ

トハ嘗テオバートン氏ノ實驗セル所ナルガ、輪截ノ場合ニ於テモ亦恐ラクハ其ノ主因ヲナスニ非ザルカ、尙種々ノ物質ノ堆積作用及ビ一定度ノ水分ノ缺乏等、樹株ニ對シ多少有害的ノ事項ガ亦該色素ノ形成ニトリテ間接的ニ或ル必要ナル因子ヲナスモノニ非ザルナキカ、然リト雖モ其ノ精細ナル化學的經路ニ至リテハ之ヲ後來ノ研究ニ俟タザル可ラズ。

六、同化物質ノ轉移及ビ堆積

諸種ノ輪截ノ結果葉内同化生産物(主トシテ澱粉)ノ轉移作用ガ阻害セラレ終ニ堆積ヲ起スノ狀態ヲ知ルノ目的ヲ以テ、手術後連續シテ一定時、夫レ夫レ完全ナル葉ヲ採集シ、沃度試法ニ依リテ轉移ノ狀況ヲ檢シ、猶時々顯微鏡的觀察ヲ行ヒ、物質堆積ノ狀態ヲ見タリ。葉ノ採集始メハ毎朝八時(正常葉ニ於テ殆ド内容ノ轉移セラルル時刻)ニ於テ行ヒタルガ其ノ漸ク堆積ヲ起スニ至リ、更ニ午後五時(比較的多量ニ内容ノ充實セラルル時刻)ニ於テモ之ヲ行フコトトナセリ。又便宜上葉ハ全部ヲ採ラズ、一定小面積ニ就テ相互ノ比較ヲ行ヘリ。左(第十一表)ニ其ノ結果ヲ拔萃表示スベシ。

上表ニ見ルガ如ク正常株ノ葉ニ於ケル同化澱粉ノ轉移作用ハ完全ニ行ハレ、常ニ其ノ同化形成セル澱粉ヲ夜間轉移シ去ルニ反シ、輪截株ニ於テハ既ニ手術後二十日乃至三十日ニシテ漸ク不完全トナリ、從ツテ葉内ニ澱粉ノ堆積ヲ起シ、就中皮層部輪截株ニ於テハ最モ其ノ堆積顯著トナレルヲ見ル。然ルニ木質部輪截株ニアリテハ其ノ堆積ヲ現出スルノ時期最モ速ナルニ係ラズ、爾後ノ堆積ハ皮層部輪截株ノ夫レニ及バズシテ凋落セルヲ見ル。是レ該株ニアリテハ既ニ早キ時期ニ於テ葉器ノ同化并ニ轉移機能ノ著シク傷害セラル、ノ事實ヲ示セルニ外ナラズ。而シテ皮層部輪截株ニ於テハ葉内物質轉移作用ノ遲緩トナレルニ係ラズ、尙ホ能ク其ノ同化作用ヲ營ミ得ルモノト見ルヲ得ベシ、次ニ半輪截株及ビ穿孔株ニアリテハ殆ド正常株ト大差ナク、能ク其ノ常態ヲ保持シ得ルヲ見ルベシ。尙ホ其ノ澱粉ノ葉内ニ堆積セル狀況ハ第十二表ノ如シ。

第十表

沃度試法ニヨル葉内同化澱粉ノ比較量

手術後ノ日數		九月二十二日—十月十一日 一日二回午前八時及午後五時採集											
		七月二十日—九月十二日 一日一回午前八時採集		六 十 日	六 十 一 日	六 十 二 日	六 十 三 日	六 十 九 日	七 十 五 日	七 十 八 日	八 十 日		
試驗葉	上部	0-1	0	0-1	0-1	0-1	1 3-5	0-1 2	1 4	0 3-4	0-1 2-3	0-1 4-5	0 4
	中部	1	0	0	0-1	0	3-5	0-1 2-3	0 3-4	0 4-5	0 4-5	0 4-5	1 4-5
正 常 株	下部	0	0-1	0	0-1	0	3-5	0-1 2	0 4	0 4	0 4-5	1 4-5	0 4-5
	上部	0-1	1	1-2	1-2	3 3	3 3	3 4	3 4	3 4	3 3-4	3 4-5	4 4-5
皮 層 部 輪 截 株	上部	0	1	1	2	2	2-3 3	4 4	4 4	3 4	2-3 4	3 4	3 4
	中部	0	0-1	1-2	2	3 3	2-3 3	2 4	2 4	3 3	3 3-4	3 4-4	2 4
木 質 部 輪 截 株	下部	0	0	0-1	0-1	1 2	0	0-1 0-1	0-1 0-1	0-1 2	0-1 3	0-1 3	0-1 3-4
	上部	0-1	0-1	1	2	1-2	2 2	1-2 4	2 4	2 4	*		
皮 層 部 半 輪 截 株	上部	0-1	0-1	1	2	2 2	3 3	2 3-4	2 3	3 3	3 4	3 4	2 3
	下部	0-1	1-2	1-2	1-2	2 2	3 3-4	1-2 4	1-2 3	0 4-5	0 3	0-1 3-4	2 3
木 質 部 半 輪 截 株	上部	0-1	0-1	0-1	0-1	1 1	0-1 2-3	0-1 3-4	0 3-4	1-0 3-4	0 3-4	0-1 3-4	0 4
	下部	0-1	0-1	0	0-1	1	0-1 4	0-1 3-4	0 4	1-0 3-4	0-1 3-4	0-1 3-4	0 4
穿 孔 株	上部	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1 3	0-1 4	0-1 4	0-1 3	0 4	0-1 4-5	0-1 5
	下部	0-1	0-1	0-1	0-1	1	0-1 2-3	1 4	1 4	1 4	0-1 4	0-1 4-5	0 4-5

(0-5, ハ沃度試法ニヨル葉ノ色調ヲ表ハス、0 澱粉ナシ、5 澱粉最多) * 以後落葉ス

第十二表
みづきノ葉内ノ澱粉
(手術後八十日、大正元年十一月十一日午前七時)

	組織	樹 株	正 常 株	皮 層 部 輪 截 株	木 質 部 輪 截 株
葉	表 皮		—	+	+
	皮 層 部	外層	—	+	+
		内層	—	++ (大顆粒)	++
	篩 管 部		—	+	—
	形 成 層		—	—	—
	木 質 柔 組織		—	+	+
	射 出 髓 部		++ (小顆粒)	++ (同)	+++
柄	髓 界 部		±	++ (小顆粒)	++ (小顆粒)
	髓		+	++ (小顆粒散在的)	++ (小顆粒散在的)
葉 肉	柵 狀 組 織		±±	+++ (顆粒大)	++
	海 綿 狀 組 織		±	++++ (同)	+++

(—)不存 (±)稀少、時ニ不存 (+)存在 (++)多量、……以下ノ表之ニ準ズ

七、貯藏物質分布ノ位置及ビ其ノ量

皮層部輪截ニヨリテ物質轉移作用ノ阻害セラル、コトハ已ニハーバーラント、シャウビユー、ツァベック其他ノ學者ニヨリテ觀察セラレタル所、尙ホレクラード、ド、ザボン氏ハ幹底ニ於テ輪截セラレタル樹株ガ正常株ニ比シテ其ノ根中ニ莖部ヨリ多量ノ貯藏物質ヲ含有スル事ヲ見、且ツ其ノ葉ハ綠色度ヲ減ズルコトヲ實驗セリ。此ノ手術ハ初春ノ時期ニ行ヒタルモノニシテ、物質ノ上方轉移ノ恐ラク阻害セラレタルコトヲ證スルモノノ如シ。氏ハ又常綠樹ニ於ケル物質貯藏ノ最大期ハ普通春期、葉ノ展開ノ時期ニシテ落葉樹ニ於テハ秋期落葉ノ時期ナルコトヲ證セリ。

今ヤ余儕ノみづきニ就テモ其物質貯藏ノ最大期ニ於ケル輪截ノ影響ヲ驗セント欲シ晚秋乃至冬期ニ亘リ、先ヅ其ノ枝條内ニ於ケル分布狀態ノ顯微化學的比較ヲ行ヘリ。

(一)澱粉

正常株ニ於テハ皮層部ノ内外層、射出髓及ビ髓界部ニ於テ豊富ニ、又皮層ノ中層部及ビ髓部ニ於テ比較的大形ノ顆粒ニ富ミ、表皮及ビ形成層ニハ殆ド無、篩管部ニハ極少量極メテ小顆粒ヲナシテ存在ス、而シテ木質

部ニハ一般ニ散在的ナリ。

皮層部輪截株ニ於テハ更ニノ其組織内分布ヲ廣メ、且ツ其ノ量モ亦大ニ正常株ニ優リ、即チ皮層部、木質部、髓部、射出髓及ビ髓部ニ於テハ大形ノ顆粒トシテ多量ニ存在シ、尙ホ表皮、篩管部及ビ形成層ニ於テスラ小顆粒トシテ之ヲ含有スルヲ見ル。次ニ木質部輪截株ニ於テハ其ノ分布ノ所在ハ殆ド皮層部輪截株ト相似ルモ、其ノ含量ノ稍々彼ニ劣レルヲ見ル。是ニ依ツテ大略澱粉ノ堆積ハ皮層部輪截ニ因ツテ最モ顯著ナルヲ知リ得ベシ(第十二表)。

(二)還元糖

還元糖ノ證明ニハマイエルシンパー氏法、モーリッシ氏「フルフロル」法及ビゼンフト氏法、「フェニルヒドラジン」法ヲ用ヒ、何レモ明瞭ニ之ヲ證明シ得タリ。正常株ニ就テ還元糖ノ存在ヲ檢スルニ、皮層部ノ内層、篩管部及形成層ニ於テ多量ニ存在シ、皮層ノ外中兩部、射出髓、木質組織及ビ髓部ニハ多少證明シ得ラルルニ過ギズ。然ルニ皮層部輪截株ニ於テハ其ノ所在ノ狀態正常株ト大差ナキモ、彼ニ比シテ其ノ反應ノ毎回著シク顯ハル、ヲ見タリ。而シテ木質部輪截株ニ於テハ

第十三表

みづきノ枝條内ノ澱粉
(大正元年十二月)

		正 常 株	皮 層 部 輪 截 株	木 質 部 輪 截 株
表	皮	—	+	+
	外 層	++	+++ (小顆粒)	+
皮 層 部	中 層	+	+++ (大顆粒)	++
	内 層	++	+++	++
篩 管 部		—	+	+
形 成 層		—	+	—
射 出 髓		++	+++ (多少轉化セラル)	++
木 質 柔 組 織		++ (射出髓ニ近キ部分ニ散在ス)	+++	++ (射出髓ニ近キ部分ニ散在ス)
髓 界 部		+++ (大顆粒)	+++++ (大顆粒)	+++++ (大顆粒)
髓		+++ (大顆粒散在的)	+++++ (大顆粒散在的)	+++++ (大顆粒散在的)

第十四表
みづきノ枝條内ノ還元糖
(大正元年十二月)

組織	樹株	正 常 株	皮 層 部 輪 截 株	木 質 部 輪 截 株
表	皮	—	—	—
皮 層 部	{ 外 層	—	+	+
	{ 中 層	+	+	+
	{ 内 層	++	+++	+
篩 管 部		+++	++++	+++
形 成 層		++	++	+++
射 出 髓		+	+++	+
木 質 柔 組 織		+	+++	+
髓 界 部		±	+	+
髓		±	+	+

第十五表
みづきノ枝條内ノ蛋白質
(大正元年十二月)

組織	樹株	正 常 株	皮 層 部 輪 截 株	木 質 部 輪 截 株
表	皮	—	—	—
皮 層 部	{ 外 層	—	—	++
	{ 中 層	—	+	++
	{ 内 層	+	++	+++
篩 管 部		++	+++	++++
形 成 層		+	++	+++
射 出 髓		—	—	+
木 質 柔 組 織		—	±	±
髓 界 部		—	—	+
髓		—	—	+

○みづきニ於テ物質轉移ノ上ニ及ボス輪截ノ影響 日比野

唯其ノ反應前者ニ比シテ稍々微弱ナリ。(第十四表)

(三) 蛋白質

一般ニ「ビュレット」反應ハ稍々微弱、アダムキューウ^{キッ}チー氏反應ハ稍々明瞭、ミロン氏反應ハ多クハ不明瞭、而シテアルノルド氏法ハ稍々明瞭ナル結果ヲ得タリ。

正常株ニ於テハ篩管部ヲ中心トシテ形成層及ビ皮層ノ内側部ニ於テノミ之ヲ證明シ得、然ルニ輪截株ニ於テハ如上ノ諸反應、何レモ比較的ニ顯著ニシテ、殊ニ木質部輪截株ニ於テ最モ著シク、上述ノ組織以外更ニ射出髓、髓部ニ於テモ亦其ノ反應ヲ見得ベク、而シテ皮層部輪截株ニ於テハ稍々微弱ナリ。(第十五表)

(四) 脂油質

本樹種ハ所謂澱粉樹ニ屬シ、脂油ノ含量極メテ些少ナリ。一般ニ正常株ニ於テハ「オスミウム」酸反應ハ顯著ナルモ(寧ロ此ノ際脂油以外ノ物質ヨリ起ル

第二圖

みづあ (Cornus

canadensis) 皮層部

輪截部ノ木質柔

組織ノ縱斷面、

組織内ニ澱粉及ビ

脂油質ヲ堆積ス

(百九十五倍)

ルモ(寧ロ此ノ際脂油以外ノ物質ヨリ起ル反應)、「ズーダン」第三ノ反應ハ極メテ微弱ナリ。輪截株ニ於テハ形成層・篩管部及ビ髓部ニ於テ少シク證明シ得ベシ、茲ニ特記スベキハ輪截局部ニ於テ、其ノ木質柔組織中ニ多量ノ脂油ガ含蓄セラル、ノ事實ナリトス。(第二圖)

(五) 單寧質

主トシテ用ヒタル試藥ハ重「クローム」酸加里溶液及ビ鹽化鐵ノ「エーテル」溶液ニシテ常ニ反應顯著ナリ。

正常株並ニ輪截株ニ於テ單寧ハ表皮、皮層部、木質柔組織、髓部、射出髓、髓部等ノ特殊細胞中ニ散在ス。而シテ木質部輪截株ニ於テ特ニ其ノ堆積著シク皮層部輪截株之ニ亞グラ見タリ。

(六) 無機物質

一般ニ截片上ニ於テスル無機物質、特ニ加里及ビ硝酸基ノ顯微化學的證明ハ困難ナリキ。「マグネシウム」、「カルシウム」及ビ磷酸基ハ稍々證明シ得ベク、「モリブデン」酸「アンモニウム」法、竝ニ「マグネシヤ」混劑ニヨル磷酸ノ證明及ビソノ可逆法ニヨル「マグネシウム」ノ證明ハ比較的容易ナリシモ、進ンデ各組織内ニ於ケル其ノ分布状態ヲ闡明スルノ良法ナキヲ以テ之ヲ確言シ難シト雖モ、多數操作ノ結果、「マグネシウム」及ビ磷酸ハ殊ニ皮層部輪截株ニ於テ、皮層及ビ篩管部ニ稍々多量ニ存在セルモノノ如シ。

「カルシウム」ノ檢出ハ組織内ニ既ニ存在スル所ノ磷酸石灰結晶ニ妨ゲラレ、以テ組織内ニ於ケル可溶性「カルシウム」鹽ヲ決定スルコト最モ困難ナリ。而シテ磷酸石灰ノ結晶ハ輪截株ニ於テ著シク多量ニシテ、殊ニ傷害局部ニ形成セラレタル癒合組織中、其ノ皮層部ニ堆積スルコト顯著ナリ。以上ノ諸無機物質ハ灰化セル稍々厚キ截片ニ於テハ何レモ檢出容易ナルモ、而モ各樹株間ニ於ケル關係ヲ窺知シ得ルノ限ニアラズ。

上述ノ顯微化學的研究ハ各物質ノ組織内ニ於ケル分布ノ狀況、竝ニ各樹株間ニ於ケル相互ノ關係ヲ定性的ニ示スモノナリト雖、余儕ハ更ニ其ノ定量的關係ヲ明ニセント欲シ、左ノ二三物質ニ就キ之ヲ試ミタリ。(第十七表)

今其ノ際行ヒタル方法ヲ述ブルニ次ノ如シ。
最モ貯藏物質ニ富ム冬期ニ於テ正常株并ニ輪截株ノ輪截局部ノ上方ニ生ズル枝條ニ三年生ノモノヲ採リ、夫レ夫レ皮層及ビ木質部ノ全量ト共ニ薄片ニ截削シ、徐ニ百度ニ於テ乾燥シ、碎粉器ヲ以テ細末トナシ、次法ニヨリ定量ス。

澱 粉、「オートクラフ」ヲ使用シ、轉化後アリーソン氏重量法ニヨル。

還 元 糖、アリーソン氏重量法。

非 還 元 糖、稀鹽酸ニテ轉化シ、アリーソン氏重量法ニヨル。

「エーテル」浸出物、ソックスレット氏法。

蛋白質、デューマ氏法ニヨリ得タル

總窒素量ニ係數六・二五ヲ乘シタルモノヲ以テ表ハス。

粗組織、維、ホルデフライス氏法、(濾過法ヲ改良シ、遠心器ヲ使用セリ)。

單寧、シユレーデル氏皮粉法。

尙ホ枝條含水量ノ定量ニ於テ、余儕ノ採レル方法次ノ如シ。

各枝條ヲ約三「セ、メ」ノ長サヲ有スル短片トナシ、一々野外ニ於テ順次濕室中ニ採集シ、直チニ室内ニ齎シテ生量ヲ測リ、後約五日間大氣中ニ放置シ、次デ百〇五度ニ於テ十時間乾燥シ、之ヲ除濕器内ニ置クコト約二十日間、後定量シ、更ニ百〇五度ニ於テ十時間乾燥シ、定量シ、其ノ二回ノ定量ヲ比較セラルニ單ニ些少ノ増減の變化アルヲ見タルノミ。下表ノ數字ハ其ノ平均値ナリ。

(第十六表)

第十六表
みづきノ枝條ノ乾燥物質
(大正二年一月)

%	正 常 株	皮 層 部 輪 截 株	木 質 部 輪 截 株
乾 燥 物 質	48.05 ₇	50.66 ₅	52.50 ₈
含 水 量	51.94 ₃	49.33 ₅	47.49 ₂

第十七表
みづきノ枝條内ノ貯藏物質
(大正二年一月)

乾 燥 物 質 = 100	正 常 株	皮 層 部 輪 截 株	木 質 部 輪 截 株
澱 粉	10.53 ₇	18.41 ₁	14.50 ₆
非 還 元 糖	0.21 ₃	0.66 ₁	0.73 ₈
還 元 糖	3.48 ₀	4.13 ₈	3.86 ₀
「エーテル」抽出物	1.07 ₇	1.12 ₁	0.95 ₆
單 寧 質	1.12 ₀	1.83 ₃	2.64 ₇
蛋 白 質	5.74 ₃	6.31 ₃	7.81 ₉
粗 織 維	49.90 ₀	54.75 ₀	57.09 ₀
灰 分	1.45 ₂	1.75 ₁	1.32 ₅

○みづきニ於テ物質轉移ノ上ニ及ボス輪截ノ影響 日比野

右表ニ於テ見ルガ如ク含水量ハ正常株最モ多ク、木質部輪截株最モ少ク、蛋白質及ビ非還元糖ヲ除キ、他ノ主要ナル貯藏物質ハ皮層部輪截株ニ於テ最モ著シキ堆積ヲ示シ、而シテ蛋白質、非還元糖及ビ單寧ハ常ニ木質部輪截株ニ於テ最大量ヲ示セリ。

已ニ余儕ノ說ケルガ如ク、皮層部輪截株ニ於テハ葉器ノ同化機能ハ比較的ニ阻害セラレズ、而シテ生成セラレタル同化物質ハ更ニ下方轉移ノ途ヲ絶タル、ヲ以テ、輪截部ノ上方ニ其ノ堆積ヲ惹起スルニ至ル、然ルニ木質部輪截株ニアリテハ水液上昇ノ阻害ニヨリ、其ノ葉器ノ同化機能ハ著シク阻害セラレ、以テ澱粉還元糖等ノ堆積量ハ皮層部輪截株ニ劣ルニ至ルモ、而モ亦下方轉移ノ途ヲ絶タル、ヲ以テ遂ニ正常株ニ比シ、多量ノ堆積ヲナスモノナリ。而シテ蛋白質、非還元糖及ビ單寧質ノ特ニ木質部輪截株ニ最大量ヲ示ノ事實ハ尙ホ之ヲ後來ノ研究ニ俟ツ。

第三圖

トホ (*Cydonia*

japonica)ノ皮層部

輪截主幹

輪截部ノ上側ニ於

テノミ著シキ虫害

ヲ見ル

一般ニ半輪截株ニ於

テハ其ノ枝條ニ於ケ

ル貯藏物質ノ異常的

堆積ヲ見ズ、常ニ正

常株ト伯仲ノ間ニア

リ。是レ全輪截ニ於

テ下方通導器官タル

篩管部ヲ缺如スルニ

反シ、之ニ於テハ能

ク其ノ半側ニ於ケル

篩管部ニヨリ同化轉

移ヲ完成シ得ルコト

ヲ示スモノナリ。

余ハみづきノ外、同年夏、杉及ビ櫻ニ於テ上述ノ種々ノ輪截ヲ行ヒタルニ、是等輪截株ノ内、特ニ皮層全輪截ヲナセルモノニ於テ、翌春其ノ手術局部ノ上方ニ位スル枝幹全體ガ甚著ナル蟲害ヲ受ケ、爲メニ樹面ニ無數ノ小穿孔ヲ印スルニ至レリ。而シテ手術部ノ下方ニ於ケル幹部ハ全然斯ノ如キ蟲害ヲ受ケズ。如上ノ蟲害ハ木質部輪截株ニモ多少顯ハレタルモ前者ノ比ニ非ズ。是等ノ輪截株ハ凡テ他ノ正常株ト同一ノ林中ニ生ゼルモノナリシガ、相并立セル正常株并ニ半輪截株ニ於テハ全然蟲害ナシ。上記ノ蟲害現象ハ皮層部輪截株ニ於ケル顯著ナル物質ノ堆積ガ其ノ主要ナル一因ヲナシタルモノト見做スヲ得ベシ。

八、輪截ニ因ル葉ノ二三酵素含有量ノ變化

皮層及ビ木質部外層ノ除去ニヨリテ葉器ニ形成セラレタル同化物質ガ手術局部ヲ超ヘテ下方ニ轉移セラレザルノ結果トシテ、玆ニ同化物質ノ堆積ヲ惹起スルノミナラズ、更ニ葉ニ於ケル二三酵素モ恐ラク其ノ含量ヲ増加スルナルベシトノ推測ハ強チ不當ノコトニ非ザルベシ。今其ノ一例トシテ桑樹ノ萎縮病ニ於テ其ノ通導器官ノ不完全ナル發達ニヨリ如上ニ類似セル現象ヲ見ルコトハ嘗テ三好、柴田、鈴木諸氏ニヨツテ研究セラレタル處ニシテ、即チ該病葉ガ常ニ化糖素、蛋白質分解酵素、酸化酵素及ビ過酸化酵素ノ過量ヲ含有スルコト既知ノ事實ナリ。

今ヤみづきニ於テモ輪截ニヨル下方輪轉機能ノ不能ニヨリ、同様ノ結果ヲ來スヤ否ヤヲ檢セント欲シ、先ヅ葉内ニ於ケル化糖素、酸化酵素并ニ過酸化酵素ノ含量ニ就キ研究セリ。而シテ蛋白質分解酵素ニ就テハ毎回ノ實驗常ニ顯著ナル結果ヲ得ザリシハ余ノ遺憾トスル所ナリ。

(第一) イ、化糖素 (Diastase)

みづきノ輪截株及ビ正常株ノ葉ニ於ケル化糖素含量ヲ檢セント欲シ、大正二年九月二十日午前種々ノ樹高ニ於ケル葉ヲ輪截部ノ上下ニ於テ採集セリ。試料ニ供セル葉ハ完全ニ發達セル成葉ニシテ、其ノ中肋ヲ去リシモノ各生量一〇瓦ヅ、ヲ採リ、少許ノ砂粒ト共ニ乳鉢中ニ磨碎シ、七五ccノ水ヲ以テ滲出シ、放置シ、上澄液ヲ綿ヲ以テ濾過シ、其

第十八表
みづきノ葉ノ化糖素量比較
(大正元年九月二十日)

	輪截局部ノ上下 ニ於ケル葉ノ位置	「フエーリング氏液」ノ消費量	
		二十四時間後	四十八時間後
正 常 株	(平 均 値)	0.57 cc	0.89 cc
皮層部輪截株	輪截部ノ上方 { 上部 中部 下部 輪截部ノ下方……	2.06	2.76
		0.86	1.98
		0.34	1.27
		0.26	1.16
木質部輪截株	輪截部ノ上方 { 上部 中部 下部 輪截部ノ下方……	0.86	1.33
		0.54	0.94
		0.43	0.89
		0.30	0.70
皮層部半輪截株	輪截部ノ上方 { 上部 下部	0.53	0.94
		0.55	0.99
木質部半輪截株	輪截部ノ上方 { 上部 下部	0.67	1.37
		0.60	1.33
穿 孔 株	穿孔部ノ上方 { 上部 下部	0.70	1.05
		0.51	1.01

○みづきニ於テ物質轉移ノ上ニ及ボス輪截ノ影響 日比野

ノ五 cc フトリ、〇・五%澱粉糊液五〇 cc ト混ジ、數滴ノ「トルオール」ヲ以テ防腐シ、約二〇度ノ溫度ニ於テ放置シ、以テ二十四時間後及ビ四十八時間後各ソノ一〇 cc ヲ採リ其ノ化糖力ヲ測定セリ。糖量ノ測定ハ凡テ「フエーリング氏液」ヲ用ヒ、豫メ生葉内ノ含糖量ヲ測定シ、之ヲ差シ引ケリ、第十八表ニハ其ノ結果ヲ示ス。

以上ハ葉内化糖素量ノ一例ナルガ、此ノ他種々ノ時期ニ行ヒタル多數ノ實驗ニ於テ何レモ殆ド同様ノ結果ヲ得タリ。是ニ依ツテ見ルニ輪截株ニ於テ其ノ輪截部ノ上方ニ著生セル葉ハ常ニ正常株ノ葉ニ於ケルヨリモ過多ノ化糖素ヲ含有スルヲ見ル。而シテ皮層部輪截株ニ於テ最モ著明ニシテ正常株ノ約二乃至三・五倍強ヲ示シ、木質部輪截株ニ於テハ一乃至二倍強ヲ示セリ。然ルニ半輪截株及ビ穿孔株ニ於テハ殆ド正常株ニ於ケルト大差ナキヲ見ル。更ニ葉ノ種々ノ樹高ニ於ケル位置ニヨリ化糖素ノ含有量等シカラズ、一般ニ葉ノ位置ノ高キ程大ナリ。此ノ事實ハ皮層部輪截株ニ於テ顯著ニシテ木質部輪截株ニ於テハ上述前後二回ノ測定ニ於テ等シカラズ。是レ恐ラク

第十九表

みづきノ綠葉及ビ「アントチアン」葉ノ化糖素量比較

(大正元年十月六日)

葉	二十四時間後「フェーリング氏」液消費量
正 常 株 { 綠 色 葉 「アントチアン」葉	0.54 cc 0.62 "
皮 層 部 輪 截 株 { 綠 色 葉 「アントチアン」葉	2.06 " 2.41 "
木 質 部 輪 截 株 { 綠 色 葉 「アントチアン」葉	0.86 " 1.32 "

第二十表

みづきノ綠葉及ビ「アントチアン」葉ノ還元糖量比較

(大正元年十月六日)

葉	還 元 糖 量 生 量 = 100
正 常 株 { 綠 色 葉 「アントチアン」葉	1.0 % 1.1 "
皮 層 部 輪 截 株 { 綠 色 葉 「アントチアン」葉	2.3 " 2.6 "
木 質 部 輪 截 株 { 綠 色 葉 「アントチアン」葉	1.1 " 1.4 "

ハ其ノ著シキ傷害作用ニ基因ス
ルモノナルベシ。

又輪截部ノ下方ニ於ケル葉内化
糖素ノ量ヲ檢スルニ輪截株ニ於
テハ常ニ正常株ニ比シテ減少
ス。

(第二)

正常みづき株及ビ輪截株ニ於テ
「アントチアン」色素ヲ有スル葉
ト普通ノ綠葉トノ化糖素量并ニ
還元糖量ヲ比較スルニ第十九表
及ビ第二十表ノ如シ。而シテ普
通正常株ニ於テハ「アントチア
ン」色素ヲ有スル葉ハ稀ナルガ
可及的其ノ著シキモノヲ撰擇シ
テ試料ニ供セリ。又輪截株ニ於
テ葉ハ常ニ輪截部ノ上方ニ著生
セルモノニ就テ檢ス。化糖素ノ
測定法ハ實驗第一ニ同ジク還元
糖ハ葉ノ生量一〇〇瓦中ノ量ヲ

第二十一表
みづきノ葉ノ還元糖含量
(大正元年十月八日午前十時)

葉ノ位置	葉ノ含糖量 生量 = 100
正 常 株	$\left. \begin{array}{l} \text{上部} \\ \text{中部} \\ \text{下部} \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1.02 \\ 0.92 \\ 1.10 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(平均値)} \\ 1.02 \end{array}$
皮層部輪截株	$\left. \begin{array}{l} \text{輪截部ノ上方} \\ \text{輪截部ノ下方} \dots\dots \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{上部} \\ \text{中部} \\ \text{下部} \end{array} \begin{array}{l} 2.38 \\ 2.10 \\ 1.86 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{〃} \\ 2.11 \end{array}$
木質部輪截株	$\left. \begin{array}{l} \text{輪截部ノ上方} \\ \text{輪截部ノ下方} \dots\dots \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{上部} \\ \text{中部} \\ \text{下部} \end{array} \begin{array}{l} 1.29 \\ 1.09 \\ 0.87 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{〃} \\ 1.08 \end{array}$

○みづきニ於テ物質轉移ノ上ニ及ボス輪截ノ影響 日比野

以テ示ス。

上表ニ於テ見ルガ如ク、正常株并ニ輪截株ニ於テ何レモ「アントチアン」葉ハ常ニ綠葉ニ比シテ多量ノ化糖素及ビ還元糖ヲ含有シ、殊ニ其ノ關係ハ輪截葉ニ於テ著明ナリ。

(第三)

輪截株ニ於テ輪截部ノ上下兩側ニ著生スル葉ノ種々ノ位置ニ於ケル還元糖ノ一般の含量ヲ檢セント欲シ、各株ノ最上位、最下位及ビ中位ニ著生スル完全ナル成葉ヲトリテ測定セリ。左記ハ夫レ夫レ葉ノ生量一〇〇ニ對スル糖量ナリトス。

上表ヲ見ルニ、皮層部并ニ木質部兩輪截株ニ於テ輪截部ノ上方ニ著生スル葉ハ下方ノモノニ比シ常ニ多量ノ糖量ヲ示シ、殊ニ皮層部輪截株ニ於テハ其ノ含糖量遙ニ正常株ニ優ルヲ見ル。即チ正常株ニ比シ一・五倍ノ糖量アリ、而シテ木質部輪截株ニ於テハ其ノ平均値、正常株ト伯仲ノ間ニアリ、次ニ輪截部ノ下方ニ著生スル葉ハ之ヲ正常株ノ一般平均値ニ比シテ減少スルヲ見ル。

化糖素量ノ増加ガ澱粉ノ堆積ニ相伴フモノナルコトハ既知ノ事實ナルガ、桑樹ノ萎縮病ノ場合ノ如キモ其ノ一例ニシテ、三好博士ノ說ニヨレバ該病葉内ニ化糖素ヲ増成スルノ原因ハ實ニ葉内同化澱粉ノ轉移不完全及ビ其ノ堆積ニアリトナセリ。

みづきノ輪截ノ場合ニ於テハ更ニ其ノ同化澱粉ノ堆積ハ著明ナル

第二十二表
みづきノ葉ノ酸化酵素比較
(大正元年十月二日)

葉		「グァヤック脂」反應
正 常 株	<div> <div>上部</div> <div>中部</div> <div>下部</div> </div>	<div> <div>土</div> <div>—</div> <div>—</div> </div>
皮層部輪截株	<div> <div>輪截部ノ上方</div> <div>上部</div> <div>中部</div> <div>下部</div> </div>	<div> <div>+</div> <div>+</div> <div>+</div> <div>+</div> </div>
	輪截部ノ下方……	土
木質部輪截株	<div> <div>輪截部ノ上方</div> <div>上部</div> <div>中部</div> <div>下部</div> </div>	<div> <div>++</div> <div>++</div> <div>+</div> <div>+</div> </div>
	輪截部ノ下方……	土

ヲ以テ、從ツテ上述ノ如キ化糖素ノ異常的形成ヲ現出スルモノト見做スヲ得ベシ。

ロ、酸化酵素

みづきノ正常株竝ニ輪截株ニ於テ完全ナル成葉ヲ採集シ、中肋ヲ去リ、生量一〇瓦ヲ粉碎シ、一〇〇ccノ水ヲ以テ滲出シ、三時間靜置セシム、其ノ上澄液各五ccヲ試験管ニトリ、普通ノ方法ニヨリ一〇滴ノ一%「グァヤック」脂酒精液ヲ以テ操作シ、五分間ノ後一定量ノ「アルコール」ヲ加ヘテ其ノ色調ヲ相互比較ス。第二十二表ハ其ノ結果ナリ。

一般ニみづきノ正常株ニ於テハ葉ノ酸化酵素反應ハ極メテ微弱ニシテ、往々陰性ニ終ルコトアリ。然ルニ輪截株ニ於ケル葉ハ能ク之ヲ現ハシ、其ノ際皮層部輪截株ニ於テハ最モ著明ナリ。但シ輪截部ノ下方ニ著生スル葉ハ其ノ反應程度殆ド正常株ト同様ナリ。

ハ、過酸化酵素

みづきノ正常株竝ニ輪截株ニ於テ完全ナル成葉ヲ採集シ、中肋ヲ去リ各生量一〇瓦ヲ粉碎シ、一〇〇ccノ水ニテ滲出スルコト三時間ノ後、其ノ上澄液一〇ccヲ試験管ニトリ、豫メ酸化酵素ヲ破壊セシガタメニ、五分間八五度ニ熱シ、冷却後一%ノ「グァヤック」脂酒精液一〇滴ヲ加ヘ、五分間後、一定量ノ酒精ヲ加ヘ、以テ相互ノ色調ヲ比較ス。左表ハ其ノ結果ナリ。

第二十三表
みづきノ葉ノ過酸化酵素比較
(大正元年十月二日)

葉		過酸化水素及「グァヤック脂」反應
正 常 株	上部	++
	中部	+
	下部	+
皮 層 部 輪 截 株	輪截部ノ上方	+++
	上部	++
	中部	++
	下部	+
木 質 部 輪 截 株	輪截部ノ下方……	+
	輪截部ノ上方	++++
	上部	+++
	中部	+++
	下部	++
	輪截部ノ下方……	土

○みづきニ於テ物質轉移ノ上ニ及ボス輪截ノ影響 日比野

上表ニ示スガ如クみづきニ於テ葉ノ過酸化酵素ハ一般ニ酸化酵素ニ比シ、其ノ反應著明ナリ。而シテ其ノ最モ著シキハ木質部輪截株ニ於テ其ノ手術部ノ上方ニ著生スル葉ニシテ、皮層輪截株ニ於ケルモノ之ニ亞グ。亦數回ノ結果ニヨレバ、一般ニ同一輪截株ニ於テモ其ノ最モ上方ニ著生スル葉ハ最モ過酸化酵素ノ量顯著ナルガ如シ。(酸化酵素ニアリテハ上述葉ノ位置ノ關係ハ是ノ如ク明ナラズ)。

以上ノ實驗ニヨリ、輪截ノ結果葉内ニ化糖素ノミナラズ酸化酵素及ビ過酸化酵素ノ如キモノモ亦異常的形成ヲ促サル、モノナルヲ知ルモ、而モ其ノ成因ニ關シテハ此種ノ他ノ場合ニ於ケルガ如ク亦闡明ナラズ。單ニ輪截ニヨル一ノ反應的現象トシテ是ヲ保留セントス。

主ナル結果

以上みづきニ就テ得タル結果ノ主ナルモノ次ノ如シ。

- 一、水液ノ上昇作用ハ木質部輪截ニヨリ著シク阻害セラル、モ、皮層部輪截ハ殆ド有害ナラズ、而シテ皮層部半輪截株、木質部半輪截株并ニ穿孔孔株ニ於テハ正常株ト殆ド差異ナシ。

- 二、輪截ニヨリ葉器ニ多量ノ「アントチアン」色素ヲ形成ス、其ノ際輪截局部ノ上方ニアル葉ニ於テノミナラズ、下方ニ於

テモ局部附近ニ著生スルモノニハ其ノ形成ヲ見ル。而シテ該色素形成ハ特ニ皮層部輪截ニ於テ顯著ナリ。

三、輪截株殊ニ木質部輪截株ニ於テ、葉ハ樹株ノ頂ニ著生スルモノヨリ徐々ニ下方ニ及ビテ其ノ正常態ヲ失ヒ、正常株ニ比シ甚ダ早く凋落ス。而シテ其ノ際、葉内ノ同化物質ヲ完全ニ轉移セシメズ。

四、輪截株ハ翌春新葉ノ展開ニ際シ、一般ニ葉形小形ニシテ葉綠素ヲ減却ス。花ノ形成早期のニシテ且豊富ニ、果實ノ形成亦豊富ナリ。

五、輪截株ニ於テ輪截部ノ直下ヨリ常ニ不定芽ヲ形成ス、該不定芽ノ形成ハ木質輪截ニ於テ最も著シテ皮層部輪截之ニ亞グ。

六、輪截局部ノ上下兩緣ヨリ癒合組織ヲ形成スルニ際シ、常ニ上緣ニ於テ顯著ナル發達ヲナス。該組織ノ發達ハ皮層部輪截株ニ於テハ良好ナルモ、木質部輪截株ニ於テハ著シク阻害セラル。半輪截株ニ於テハ上下兩緣ニ比シ左右兩側緣ニ於テ最も良好ノ發達ヲナス。

七、前述不定芽ノ形成ハ主トシテ極性ニ、癒合組織ノ形成ハ主トシテ物質供給ノ如何ニ支配セラル。

八、葉ノ含水量ハ輪截ニヨリ樹頂ヨリ下方ニ向ツテ漸時減却シ、木質部輪截株ニ於テ其ノ變化最も著シ。

九、輪截部ノ上方ニ著生スル枝條内ニ於テ、多量ノ有機并ニ無機物質ノ異常的堆積ヲ見ル、其ノ際皮層部輪截株ニ於テハ澱粉還元糖「エーテル」抽出物及ビ灰分ヲ最も多量ニ堆積セシメ、木質部輪截株ニ於テハ非還元糖、蛋白質及ビ單寧ノ含量最多ナリ。

十、輪截局部ノ上方ニ著生スル葉ハ澱粉ニ富ムノミナラズ、多量ノ化糖素ヲ形成ス、而シテ皮層部輪截株ニ於テ殊ニ著明ナリ。

十一、正常株并ニ輪截株ノ葉ニ於ケル化糖素量及ビ還元糖量ハ綠葉ニ比シ常ニ「アントチアン」色素ヲ形成セル葉ニ於テ優ル。

十二、輪截株ノ葉ハ酸化酵素及ビ過酸化酵素ノ形成ヲ増進ス。

三、半輪截株ハ以上ノ關係總テ正常株ト大差ヲ見ズ。

四、すぎ及びさくらニ於テ輪截ノ結果、該局部ノ上方ニ著シキ蟲害ヲ誘起シ、下方ニ於テ全然之ヲ見ズ。而シテ該現象ハ殊ニ皮層部輪截ニ於テ甚著ナリ。

本問題ハ余ガ植物學教室ニ於テ三好教授指導ノ下ニ研究セルモノナリ。此ノ研究ニ關シ懇篤ナル指導ヲ賜ハリタル恩師三好教授并ニ多大ノ助力ヲ與ヘラレタル柴田助教授ニ對シ、余ハ茲ニ深く感謝ノ意ヲ表スルモノナリ。

○稻いもち病菌 (*Dactylaria parasitans* Cav.) ノ人工培養ニ就テ (其三)

末 松 直 次

Naoji Suematsu : — On the Artificial Culture of *Dactylaria parasitans* Cav. III.
一稻ノ生葉ヲ以テセル培養

(甲) ワード (Ward. H. M., On a Lily Disease. Ann. Bot. Vol. II, 1889, p. 341) ニ倣ヒ稻ノ生葉片ヲ用ヒテ懸滴培養ヲ行ヘリ。

供試菌ハ數回稻煎汁寒天培養基ニ植エカヘタルモノニシテ約二箇月間(四月ヨリ六月)室溫ニ保チタルモノ。培養室ノ溫度ハ二〇度乃至二七度。先ヅ一尺位ニ生長セル信州早生ノ葉ヲ採リ「ミリメートル」平方位ノ小片トシ殺菌水ニテ洗滌スルコト數回。後、少量ノ蒸餾水ヲ懸滴シ其中ニ葉片ヲ置キテ分生孢子ヲ播下シ濕室裝置内ニ置ケリ。凡二七度ニテ二乃至三時間ヲ經レバ發芽ヲ始ム。之ヲ三好氏液ヲ以テセル比較試驗ニ比スルニ約一時間程早シ。發芽管及之ヨリ發育シタル菌絲ハ葉片ニ對シテ向化性ヲ示スコトナシ。然レドモ菌絲ノ末端葉片ニ達スルモノアレバ直ニ其斷面ヨリ進入蔓延スルニ至ルモノトス。カクテ二日乃至三日ヲ經レバ葉片ノ周圍ヨリ擔子梗ヲ簇生シ且多量ノ氣