trennen. Nachdem der Aether verjagt worden war, blieb eine dicke ölige Flüssigkeit zurück, die beim Abkühlen nicht fest wurde. Eine Portion dieser Flüssigkeit versuchte man nun bei gewöhnlichem Druck zu destilliren. Bei 320° fing dieselbe an zu siedend und sich zu zersetzen, ohne dafs etwas überdestillirte. Ein Versuch, die Flüssigkeit unter vermindertem Drucke zu destilliren, war gleichfalls ohne Erfolg. Durch Destillation mit Wasserdämpfen den Aether überzutreiben gelang auch nicht und mußte somit von der Reingewinnung desselben vorläufig abgestanden werden.

Ueber Nitrokresole;

von *Demselben*.

Nitrirung des o-Kresols.

A. W. Hofmann und W. von Miller*) haben ein im Wesentlichen aus o-Kresol bestehendes käufliches Kresol in Eisessiglösung nitrirt und aus dem Rohproduct vier reine Nitroverbindungen abscheiden können, nämlich Nitro-o-Kresol (Schmelzpunkt 69,5°), flüssiges Nitro-o-Kresol, Nitro-p-Kresol (Schmelzpunkt 33°), und Dinitro-p-Kresol (Schmelzpunkt 83°). Genau nach den Angaben von H. und v. M. wurde mit einem von Kahlbaum bezogenen käuflichen Kresol verfahren. Das rohe Nitroproduct stellte eine honiggelbe flüssige Masse dar. Es wurde zunächst der Destillation mit Wasserdämpfen unterworfen. Aus dem wässerigen Destillat schieden sich halbfeste krystallinische Massen aus, in der Retorte blieb ein braunrother Rückstand, der allmählich theilweise krystallinisch erstarrte.

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 14, 567.

Die halbfeste destillierte Substanz wurde zwischen Papier gepresst und der Pressrückstand als das von H. und v. M. beschriebene *Nitro-o-Kresol* (Schmelzpunkt $69,5^{\circ}$) erkannt.

Das Kaliumsalz dieses Nitro-Kresols, prachtvolle grofse glänzende granatrothe Tafeln, wurde in Glasröhren mit Aethylbromid (1 Mol. nebst 10 pC. Ueberschufs) 4 bis 5 Stunden lang auf 120° erhitzt. Der Röhreninhalt war hellgefärbt, beim Behandeln desselben mit Wasser löste sich das gebildete Bromkalium, während eine flüssige Substanz ungelöst blieb. Diese letztere gab an verdünntes Ammoniak noch eine kleine Menge freies Nitro-o-Kresol ab und stellte dann den reinen Aethyläther dieses Nitro-o-Kresols dar. Der Methyläther, den H. und v. M. dargestellt haben, ist ebenfalls flüssig. Nach den Untersuchungen genannter Chemiker ist die vorliegende Säure v-Nitro-o-Kresol. Der Aethyläther, dessen Darstellung beschrieben wurde, hat demnach die Formel :

Der Zweck der Darstellung dieses Aethers war die Vergleichung mit einem durch Nitriren von o-Kresoläthyläther gewonnenen Mononitroäther. (Siehe die später folgende Abhandlung über Nitrirung von Phenoläthern.)

Aus dem oben erwähnten, bei der Destillation des rohen Nitrirungsproductes mit Wasserdämpfen in der Retorte verbleibenden braunrothen Rückstand wurde durch Auflösen in Kaliumcarbonatlösung und Kalilauge ein Kaliumsalz bereitet, das nach mehrmaligem Umkrystallisiren eine kleine Menge reinen Dinitro-p-Kresolkaliums lieferte. Auf die Aufsuchung der anderen von H. und v. M. beschriebenen Nitroproducte wurde zunächst keine Zeit verwendet (dieselben sind enthalten in dem von dem festen v-Nitro-o-Kresol abgepressten Oele), da die Constitution des flüssigen Nitro-o-Kresols von genannten

Autoren nicht mit Sicherheit hat festgestellt werden können. Es bleibt vorbehalten, auch diese flüssige Verbindung noch auf ihren genetischen Zusammenhang mit dem später zu beschreibenden Dinitro-o-Kresoläthyläther zu untersuchen.

Nitro-m-Kresole *).

Unter der Einwirkung von Salpetersäure verhält sich m-Kresol ganz ähnlich wie das Phenol. Versuche, das m-Kresol durch verdünnte Salpetersäure zu nitriren, die beim Phenol so leicht und rasch zum Ziele führen, gaben jedoch nicht gerade günstige Resultate. Das Product der Einwirkung stellte wie beim Phenol eine braunschwarze dickflüssige Masse dar. Im Wasserdampfstrom liefs sich dieselbe theilweise destilliren und der destillirte Antheil, ein schwach gelbliches Oel, schied nach einigem Stehen auch gelbe Krystalle ab. Dereu Menge war jedoch relativ gering. Dem nicht flüchtigen Antheil liefs sich durch siedendes Wasser ein Theil entziehen, der beim Erkalten der heifs gesättigten wässerigen Lösung in gelben Nadeln auskrystallisirte; aber auch an diesem Product ist die Ausbeute gering. Bessere Ausbeuten an krystallisirten definirbaren Nitroproducten, wenn auch noch immer keine sehr guten, erhält man beim Nitriren des m-Kresols in eisessigsaurer Lösung, nach den Angaben arbeitend, welche A. W. Hofmann und W. v. Miller über die Nitrirung des käuflichen Kresols gemacht haben. Trägt man mit Eisessig verdünntes m-Kresol in ebenfalls mit Eisessig verdünnte Salpetersäure (spec. Gewicht 1,4) unter starker Abkühlung in den geeigneten Verhältnissen ein, so erhält man eine dunkelrothe Lösung, welche beim Eingiefsen in Eiswasser ein nahezu schwarzes Oel abscheidet. Dieses letztere läfst sich theilweise mit Wasserdämpfen destilliren. Das Destillat erstarrt vollständig zu gelben nadel-

*) In Gemeinschaft mit H. Orth dargestellt.

förmigen Krystallen. Die wässerige Lösung im Destillationsgefäß scheidet beim Erkalten gleichfalls feine gelbliche nadelförmige Krystalle ab. Die ersten Krystalle, das *flüchtige Nitro-m-Kresol*, sind in Wasser wenig, in Alkohol, Aether und Benzol leicht löslich. Aus Benzol scheidet es sich in schönen compacten gelben, sehr flächenreichen Krystallen aus. Es schmilzt bei 56°. Es bildet ein beständiges, in schönen rothen, sehr leicht löslichen Blättchen krystallisirendes Kaliumsalz. In Ammoniak löst es sich leicht auf; die concentrirte Lösung scheidet beim Stehen nadelförmige Krystalle eines Salzes aus, beim Verdampfen jedoch entweichen Ammoniak und Nitrokresol. Durch Fällung mit Silbernitrat läßt sich aus dem Kaliumsalz ein schön rothes Silbersalz erhalten. Dieses Nitrokresol scheint nach Analogie des m-Kresols mit Phenol ein o-Nitro-m-Kresol zu sein und kommt ihm voraussichtlich eine der beiden Formeln zu: $C_6H_3OHNO_2CH_3$ und $C_6H_3OHNO_2CH_3$.

Das aus der wässerigen Lösung des Destillationsrückstandes sich ausscheidende *nicht flüchtige Nitro-m-Kresol* krystallisirt am schönsten aus Wasser, wobei man es entweder in feinen weißen Nadeln, oder in ziemlich dicken und langen, etwas bräunlich gefärbten Säulchen erhält. Aetherische, alkoholische oder benzolische Lösungen lieferten bis jetzt noch keine schönen Krystalle. Es schmilzt bei 129°. In Kaliumcarbonatlösung löst es sich unter Kohlensäureentwicklung leicht auf. Die Lösung scheidet leicht ein schön gelbes, blätterig krystallisirtes Kaliumsalz aus. Auch Baryumcarbonat wird unter Kohlensäureentwicklung durch dieses Nitrokresol in wässriger Lösung zersetzt. Die Lösung scheidet aber nur höchst unscheinbare Krystalle eines Baryumsalzes aus; die Hauptmenge des Nitrokresols befindet sich in freiem Zustande in der Lösung und krystallisirt beim Stehen derselben in den oben beschriebenen Formen aus. Ein Ammoniumsalz dieses Nitro-

kresols bildet lange gelbe Nadeln und ein durch Fällung aus Kaliumsalz und Silbernitrat dargestelltes Silbersalz einen gelben Niederschlag. Dieses Nitrokresol ist voraussichtlich nach der

Formel : $\text{C}_6\text{H}_3\text{OHNO}_2\text{CH}_3$ ^{1 4 3} constituit.

I. 0,3830 g flüchtiges Nitrokresol gaben 31 cbcm N bei 19° und 734 mm.

II. 0,5013 g nichtflüchtiges Nitrokresol gaben 41 cbcm N bei 21° und 730 mm.

	Berechnet für $\text{C}_7\text{H}_7(\text{NO}_2)\text{O}$	Gefunden	
		I.	II.
N	9,15	8,97	8,95.

Nitro-p-Kresole.

Auch die Nitrirung des p-Kresols wurde nach den oben citirten Angaben von A. W. Hofmann und W. von Miller ausgeführt. Die Ausbeute ist hier jedoch viel reichlicher, als beim o-Kresol, da die Reaction bei einiger Vorsicht, d. h. bei guter Kühlung recht glatt verläuft. So wurden einmal aus 100 g reinem krystallisirten p-Kresol 72 g reines bei 33° schmelzendes m-Nitro-p-Kresol und 14 g bei 85° schmelzendes Dinitro-p-Kresol gewonnen. Allerdings mußte auch hier das rohe Nitrirungsproduct der Destillation mit Wasserdampf unterworfen werden.

Um diese ziemlich zeitraubende Operation zu umgehen und gleichzeitig auch das stets nebenbei entstehende, schwer mit Wasserdämpfen flüchtige Dinitro-p-Kresol leichter zu gewinnen, wurde bei einem Versuche, zu welchem 500 g reines p-Kresol verwendet worden waren, das rohe Nitroproduct nach dem Waschen mit Wasser sofort in Kalilauge gelöst. Die heiße filtrirte Lösung setzte beim Erkalten prachtvolle säulenförmige Krystalle des Dinitro-p-Kresolkaliums in reichlicher Menge ab.

Die Mutterlauge dieser Krystalle erstarrte beim Eindampfen zu einer Masse von kleinen grünschimmernden Kryställchen.

Die darin eingeschlossene Flüssigkeit wurde von den Krystallen abgesaugt und weiter eingedampft, lieferte aber keine Krystalle mehr. Die kleinen Krystalle selbst wurden dagegen in Wasser gelöst, die Lösung mit Salzsäure versetzt und die hierbei in gelben Flocken ausfallende Säure auf einem Filter gesammelt. Zur Reingewinnung dieser, durch ihre leichte Schmelzbarkeit sich als Mononitrokresol verrathende Säure mußte sie mit Wasserdampf destillirt werden. Sie schied sich im Destillat sofort fest, krystallisirt und rein ab; in der Retorte blieb nur eine geringe Menge Rückstand.

Zum Zweck der Herstellung des *m*-Nitro-*p*-Kresoläthyläthers wurde ein Theil der Säure in Silbersalz, ein anderer in Kaliumsalz verwandelt. Beide Salze wurden mit Aethylbromid im Wasserbad am Rückflusskühler digerirt. Das Silbersalz war in einer halben Stunde, das Kaliumsalz dagegen erst nach mehr als 20stündiger Einwirkung zersetzt. Aus diesen Reaktionsmassen wurde zunächst das überschüssige Aethylbromid abdestillirt; der Bromsilber enthaltende Rückstand wurde mit Aether, der Bromkalium enthaltende Rückstand dagegen mit Wasser und Aether durchgeschüttelt. Die ätherischen Lösungen wurden alsdann verdunstet und hinterließen den gewünschten Aether in Form einer dunklen Flüssigkeit.

Da sich bei der Einwirkung von Aethylbromid auf das Kaliumsalz des Nitrokresols stets etwas freie Säure bildet, wenn die Reagentien nicht völlig trocken sind, so mußte die oben erwähnte ätherische Lösung, bevor man sie verdunstete, mit ein wenig verdünntem Ammoniak geschüttelt werden.

Der so erhaltene *m*-Nitro-*p*-Kresoläthyläther ist unter theilweiser Zersetzung bei 275 bis 285° destillirbar und stellt nach dem Destilliren eine hellgelbe, aromatisch riechende Flüssigkeit dar.