Bei der Auffindung von <i>Challis</i> in Cambridge	1850 Dec. 25	$lg. r = 0,290$	$lg. \Delta = 0,349$, also $lg. \Delta r = 0,639$
Bei der letzten Beobachtung in Cambridge	1851 März 4	$= 0,236$	$= 0,416$
Bei der Auffindung in Berlin	1858 Sept. 8	$= 0,229$	$= 0,175$
Bei der letzten Beobachtung in Berlin	1858 Oct. 16	$= 0,237$	$= 0,093$
Berlin 1859 Dec. 14.			$= 0,330$

Carl Bruhns.

Schreiben des Herrn Prof. *Secchi*, Directors der Sternwarte des Collegio Romano, an den Herausgeber.

La discussion que vient de soulever M. *Faye* sur l'existence ou non existence d'une atmosphère solaire transparente, regardant un sujet dans lequel j'ai fait quelques recherches antérieures à celles déjà présentées à l'Académie, je demande la permission de les exposer ici, car cette matière, est très intéressante à cause de la prochaine éclipse. — Après les observations qu'a bien voulu rappeler M. *Faye* sur la température solaire dans les différents points du disque, j'en

Distances au centre	0 (centre)	10	30	50	70	90	104
Intensité en degrés du multiplicateur	50,1 (α)	50,2	50,0	49,8	48,9	46,8	44,4
Degrès proportionels	121,0	122,2	120,0	119,0	114,0	101,5	85,5

Les intensités ont été observées toujours sur quatre points symétriques placés sur deux diamètres orthogonaux. Au centre on a une petite chose du moins, car il y avait une petite tâche très près de lui. On voit ici la marche de la diminution faible près du centre et jusqu' à $\frac{3}{4}$ du rayon, mais qui à $\frac{1}{2}$ du rayon devient seulement 0,7 de la force centrale. Mais la grande ouverture de la pile mas-

Distances au bord en parties du rayon	1 = centre	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{8}$ du rayon
Degrès galvanométriques	40,6	38,5	36,2	28,9
Degrès proportionels	71,0	63,5	57,0	36,8
Rapport des intensités	1,00	0,89	0,80	0,52 de celle au centre.

L'ouverture de la pile correspondant à une extension de 24" environ de largeur, on voit que sur la zone extrême de cette largeur tout autour du disque solaire la force calorifique est la moitié de celle du centre, et on la trouverait encore moindre plus près du bord si l'on pouvait expérimenter. Ceci confirme tout ce que j'ai découvert dès l'an 1852: alors encore je démontra que la théorie de *Laplace* était inadmissible, et je calcula même la proportion de chaleur que l'enveloppe atmosphérique solaire absorbe en me servant des formules données par M. *Plana* dans les Astr. Nachr. N° 813 (Voir les Atti dell'Ac. de Nuovi Lincei, et les Memoires de l'Observ. du Coll. Romain 1851).

Les résultats obtenus pour la chaleur s'accordent en grande partie avec les dernières observations de M. *Chacornac* sur l'intensité de la lumière; je prends la liberté de rappeler

ai fait des autres avec le grand équatorial de *Merz* qui étant un instrument plus puissant que celui de *Cauchois*, rend les résultats plus exacts. Dans une suite faite le 8. Juin 1855 l'image projetée avait un diamètre de 220 millimètres et la pile une ouverture carrée de 12 millimètres de côté.

Voici les températures observées en différentes distances au centre mesurées en millimètres sur l'image:

quait beaucoup la diminution réelle de l'intensité. Pour cela je fis une autre suite d'expériences le 12. Juin en donnant à l'image un diamètre de 330 millimètres, et à la pile une ouverture de 4^{mm} seulement. Le tableau suivant montre la diminution observée en opérant toujours sur 4 points symétriques.

que j'étais moi même arrivé à la même conclusion en employant le même moyen du prisme biréfringent pour ce qui regarde à trouver la lumière du bord presque égale à la lumière de la pénombre des tâches. Je trouva encore que les facules si brillantes lorsqu'elles arrivent près du bord, ne sont cependant pas plus lumineuses que le centre du disque (Voir le Nuovo Cimento publié par M. *Matteucci* Vol. VIII. Août 1858, pag. 86).

Je crois que la difficulté plus forte proposée par M. *Faye* est réellement celle tirée de la netteté avec laquelle nous voyons les détails des tâches, ce qui paraît difficile en admettant une atmosphère semblable à celle des planètes. Mais je remarquerai d'abord que, pourvu que l'atmosphère soit transparente, nous pourrions toujours voir très bien à travers une épaisseur quelconque

surtout en tenant compte de l'immense intensité solaire: seulement près du bord on trouvera quelque détail plus difficile à saisir, ce qui arrive en réalité, car je ne suis jamais réussi à voir près des bords ces légers voils rougeâtres ou cirri que j'ai vu presque toujours dans les larges tâches au milieu du disque. Je crois même que la mauvaise définition des tâches qui est si souvent attribuée à l'atmosphère terrestre peut être causée par celle du soleil.

Cependant l'objection de M. *Faye* a beaucoup de poids, et on y pourrait ajouter que si la couronne exprimait les limites de l'atmosphère solaire, la grande Comète de 1843 serait passée dans l'intérieur de cette atmosphère à son périhélie, et je ne sais guère comment elle aurait pu en sortir. Espérant que des nouvelles observations viennent à éclaircir ces difficultés j'ai cherché si l'on ne pourrait pas trouver sur la Lune la cause de quelqu'un des phénomènes observés dans les éclipses solaires. La constitution de la surface lunaire n'est point connue, et il n'est pas improbable qu'elle puisse contribuer à quelques irradiances extérieures apparentes. Pour cela j'ai fait plusieurs suites d'observations polariscopiques dont les conclusions me paraissent assez remarquables.

1°. Premièrement la lumière est polarisée plus ou moins selon la phase: dans la pleine Lune la polarisation est nulle: le plan de polarisation est celui de réflexion.

2°. Le maximum de polarisation est près du 6^{me} au 7^{me} jour; étant la Lune à une élongation du soleil de 80° à 90°. degrés. Pour le moment je ne saurais déterminer mieux l'époque du maximum, la saison ayant été contraire dans ces derniers temps.

3°. La quantité de polarisation dans le premier quartier est presque égale sur toute la face éclairée de la phase, seulement en employant une pile de glace polarimétrique on trouve une petite différence entre le bord éclairé et la portion qui est près du limite de l'ombre. Une pile polarimétrique de trois lames inclinées environ 45° suffit pour détruire toute la polarisation de la lumière Lunaire au premier quartier. Je m'occuperai de donner des mesures plus exactes à l'avenir.

Rome 1859 Dec. 3.

4°. La quantité de la lumière polarisée sur les montagnes est minime et presque nulle, celle au contraire des parties lisses ou des mers et dans les fonds des cratères est très considérable. Le blanc des montagnes se détache très nettement sur le fond coloré des images du polariscope chromatique le M. *Arago* et de celui à bandes.

Le fait de cette polarisation n'est pas si simple qu'il paraît au premier abord: en effet, la polarisation dans le plan des rayons réfléchis, suppose toujours une réflexion spéculaire et la simple diffusion d'un objet raboteux comme les pierres ordinaires ne saurait la produire: mais si l'on examine la polarisation par réflexion sur une surface courbe lisse, on trouve une quantité très différente de polarisation selon les incidences particulières de chaque rayon, la surface courbe étant équivalente à une infinité de surfaces planes sous différentes inclinaisons et polarisantes en proportions différentes. Au contraire sur la Lune on trouve la proportion de polarisation presque égale malgré toutes les différences d'inclinaison de la surface sphérique: si quelque différence existe, elle est seulement appréciable avec les moyens les plus délicats, et l'oeil seul n'y verrait rien. On en doit conclure, il me paraît, que la surface lunaire ne polarise pas comme une surface réfléchissante unie, mais plus tôt comme une surface miroitante, dans la quelle on trouvera toujours un petit plan convenablement incliné pour renvoyer une même proportion de lumière polarisée sous l'angle général de réflexion des rayons. Son effet est précisément égal à celui que produit une surface courbe recouverte de papier de verre (tel qu'on emploie dans les arts) et celle ci est l'imitation plus parfaite que j'en ai pu trouver. La lumière aussi réfléchie par certains arbres à feuilles lisses, les amas irréguliers de matières cristallines, et surtout des sables volcaniques qui brillent d'un grand nombre de rayons réfléchis par des lames de mica et des fragments de sables cristallines font le même effet. L'analogie de ce dernier fait est frappante pour ce que du reste nous connaissons de la lune.

Or ne pourrait-il pas être que cette constitution miroitante eusse quelque part et quelque influence dans la couronne à l'occasion de l'éclipse solaire? Les savants en jugeront

A. Secchi,
Dir. de l'Obs. du Coll. Romain.