Hautkrankheiten.

Acute und chronische Infektionskrankheiten.

Sturdy, Joseph C. A Case of Anthrax with extensive meningeal Haemorrhage. *British Medical Journal*. 20. Juli 1901.

Ein 33jähriger Wollarbeiter erkrankte unter Schüttelfrost, allgemeinen Schmerzen und Übelkeit. Er schien an Influenza zu leiden. Am 4. Tage fand sich am Nacken eine Milzbrandpustel ohne Entzündungshof. Dieselbe wurde excidiert. Tags darauf plötzlich Erblindung, Bewußtlosigkeit, Temperatur 41° und Unruhe, die Finger blau verfärbt, die Pupillen erweitert, in wenigen Stunden exitus. Bei der Sektion fand man zwischen der Arachnoidea und Pia mater eine ausgedehnte Blutung in der Pleural- und Peritonealflüssigkeit wie im Blute zahlreiche Bazillen

R. Böhm (Prag).

Poncet A. et Bérard, L. De l'actinomycose humaine en France, sa fréquence, son pronostic éloigné. *Gaz. des hôpit.* 1902, Nr. 38.

Auf Grund ihrer eigenen Untersuchungen und speziell einer Arbeit von Du van (*Prognostic éloigné des différentes formes cliniques de l'actinomycose humaine. Th. de Lyon 1902*) kommen Poncet und Bérard zu dem Schluß, daß die Actinomycose in Frankreich so häufig ist wie anderswo, aber oft nicht erkannt wird.

Frédéric (Straßburg i. E.).

Littledale H. E. Clinical and Pathological Notes on a Case of human Actinomycosis. *British Medical Journal* 5. Jänner 1901.

Verfasser beschreibt einen letal verlaufenen Fall von Aktinomykose bei einem 23jährigen Mann, wo die Diagnose zwar schon bei Lebzeiten gestellt war, wo aber weder mikroskopisch noch durch Kulturen Aktinomykose nachweisbar war und zwar wurden aërobe Kulturen angelegt. Post mortem wurde dann Aktinomykose durch Färbung nachgewiesen. Verfasser ist der Meinung, daß Aktinomykose auf verschiedene Arten von *Streptothrix* zurückzuführen sei, da in diesem Falle die aëroben Kulturen zwar negativ, die post mortem angelegten anaëroben Kulturen aber positiv waren. Weiters beschreibt Verfasser auch das Verhalten der

Tuberkelbazillen. Ihm drängt sich nach allem die Ansicht auf, daß die Quelle dieser Erkrankungen in verschiedenen Getreide- resp. Grasarten oder ähnlichen Pflanzen zu suchen ist. R. Böhm (Prag).

Thevenot, L. De l'actinomycose anorectale. *Revue de chirurgie* 1902. Nr. 8.

Thevenot unterscheidet eine primitive und eine sekundäre Form anorektaler Aktinomykose. Erstere entsteht entweder (ascendierend) durch direkte Infektion der Haut der Analgegend oder von oben (deszendierend), indem der Pilz den Darmtraktus passiert und erst am Rektum eine Läsion bewirkt. Bei der sekundären Form handelt es sich um Propagation von benachbarten erkrankten Organen auf den Mastdarm. Der Beckengrund bildet einen sehr guten Entwicklungsboden für den Strahlenpilz, so daß sehr ausgedehnte Prozesse entstehen; die Prognose ist deshalb schlecht. Der Fall, den Thevenot näher beschreibt, ist dadurch interessant, daß der Patient viele Jahre vor seiner Analerkrankung eine Weizenähre in die Urethra eingeführt hatte; der Strahlenpilz ging durch die Blasenwand, ohne eine Läsion derselben hervorzurufen, und infizierte sodann Rektum, Analgegend und Prostata. Im weiteren Verlauf trat ein Carcinom am Anus auf. In einem Blasenstein des gleichen Kranken fand sich ein Weizenkorn, welches ein dem Aktinomyces ähnliches Myzel enthielt.

Frédéric (Straßburg i. E.).

Zollikofer, R. Über Hauttuberkulide. *Korrespondenzblatt für Schweizer Ärzte*. Bd. XXXII. Heft 6, 7.

Zollikofer gibt auf Grund der Literatur eine für weitere ärztliche Kreise bestimmte klare Übersicht der Entwicklung und des heutigen Standes der Tuberkulidfrage.

Frédéric (Straßburg i. E.).

Giordano, V. Di una localizzazione di tubercolosi boccale. *Gazz. degl. Ospedali e delle Cliniche*. 1902. 8. Juni.

Bei einem 32jährigen Phthisiker hat Giordano ein tuberkulöses Geschwür auf der Schleimhaut der linken Wange beobachtet, das bereits seit 3 Monaten bestand. Es hatte ca. 2 cm Durchmesser, war rund, seine Ränder waren unregelmäßig, ausgezackt, scharf mit sehr seltenen gelbgrauen Knötchen; der Grund granuliert, gelblich, schmutzig und blutend. Beim Betasten erwiesen sich die Ränder infiltriert, der Grund aber nicht; das Geschwür war nur bei Bewegungen schmerzhaft. Nach 2 Monaten starb der Kranke und die histologische Untersuchung des Geschwürs erwies die Richtigkeit der klinischen Diagnose.

L. Philippson (Palermo).

Manfredi, L. I gangli linfatici nella difesa dell' organismo contro la tubercolosi. (Lavori di laboratorio dell' Istitute d' Igiene di Palermo Vol. V. (1899—1901).

Aus den im soeben erschienenen Bande der unter Leitung von Prof. Manfredi im hygienischen Institut der Universität von Palermo gemachten Arbeiten veröffentlichten Untersuchungen über die Bedeutung der Lymphdrüsen bei der Infektion mit Tuberkelbazillen, die gemeinsam mit Prof. Manfredi von Dr. Frisco zwei Jahre lang fortgeführt

worden, entnehme ich folgende, die Dermatologie interessierende Experimente und die daraus gezogenen Schlüsse.

Um eine rein in den Lymphdrüsen lokalisierte Tuberkulose hervorzurufen, wurde bei Meerschweinchen und Kaninchen nach vorausgegangener Rasierung der Bauchhaut Einreibung von Tuberkelbazillen vorgenommen, wobei skrupulös jegliche Verletzung der Oberhaut vermieden wurde; man erzielte dadurch die gewünschte intralymphatische Infektion. Das Resultat dieser Inokulation war verschieden nach der Tierart: alle Meerschweinchen erkrankten an Tuberkulose, die Kaninchen nicht. Die Folgen der Infektion bei jenen gestaltete sich nun derart, daß ca. nach 1 Woche die inguinalen Lymphdrüsen anschwellen, darauf auch alle anderen tastbaren Drüsen, daß das Körpergewicht langsam abnahm und daß nach ca. 5 oder 6 Monaten der Tod eintrat. An der Inokulationsregion bildeten sich entweder Läsionen oder sie blieben auch aus. Im ersten Falle traten nach ca. 2 Wochen kleine hyperämische Knötchen auf, die sich allmählich in Geschwüre umwandelten und langsam heilten. Die histologische, bakteriologische und tierexperimentelle Untersuchung derselben bestätigten ihre tuberkulöse Natur. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß mikroskopisch in den frischen Geschwürsnarben von 2 Monaten die Bazillen zum Teil ihre Form eingebüßt hatten und in denjenigen von 3 Monaten nur spezifisch färbbare Granulationen vorhanden waren. Die subkutane Impfung von derartigen Narben in Meerschweinchen rief aber stets Tuberkulose hervor. Was nun die Inokulationsregion der nicht an Geschwüren erkrankten Tiere betrifft, so wurde durch Tierexperimente nachgewiesen, daß trotzdem Bazillen in die Haut eingedrungen waren, denn es war möglich wie in der oben angegebenen Weise Tuberkulose hervorzurufen. Bei den Kaninchen rief die Inokulation scheinbar keine Veränderungen hervor, aber durch Impfung von Hautstückchen, die der Inokulationsregion 48 Stunden nach der Einreibung mit Bazillen entnommen war und von der die oberflächliche Schicht abgetragen wurde, sowie von Inguinal- und Axillardrüsen ließ sich bei Meerschweinchen trotzdem Tuberkulose erzeugen, die aber sehr langsam verlief.

Aus den angeführten und ähnlichen an der Vaginalschleimhaut und am Auge vorgenommenen Untersuchungen über die Erzeugung einer lokalen Lymphdrüsenenerkrankung auf dem Wege der Lymphwege kommen Verfasser zu folgenden Schlüssen:

1. Durch endolymphatische Injektion von minimalen Mengen von Tbc.-Bazillen kann man eine lokale Lymphdrüsentuberkulose erzeugen.
2. Haut und Schleimbäute sind auch im normalen Zustande für Tbc.-bazillen durchlässig. Sie sind daher die natürlichen Eingangspforten für die tuberkulösen Infektionen, die sich ausschließlich oder primitiv in den Lymphdrüsen lokalisieren.

3. Infolge des Eindringens der Tbc.-Bazillen in die Lymphdrüsen allein können sich je nach Menge und Virulenz der Bazillen einerseits

und je nach der Reaktionsfähigkeit des Lymphsystems andererseits drei verschiedene Zustände entwickeln:

a) latente Tuberkulose, charakterisiert durch die Gegenwart von Bazillen ohne spezifische Läsionen im Gewebe;

b) manifeste Tuberkulose mit Bildung von Tuberkeln, auf eine oder mehrere Drüsen beschränkt, ohne weitere Ausbreitung auf andere Organe und mit Ausgang in Heilung;

c) eine zuerst nur glanduläre und später im Organismus generalisierte Tuberkulose.

4. Das Lymphdrüsensystem entfaltet im Kampfe mit den T.-Bazillen eine Reaktion zu eigener und zur Verteidigung des Organismus, die sich aus folgenden bis jetzt festgestellten Faktoren zusammensetzt:

a) einem Mechanismus, der die Weiterentwicklung der Bazillen im Körper verhindert oder verzögert und der teils von der Drüsenstruktur, teils von der mechanischen Wirkung abhängt, welche die entzündlichen Prozesse, die unter Einfluß der Bazillen selbst im Drüsengewebe entstehen, hervorrufen,

b) einem abschwächenden Einfluß auf die Virulenz der Bazillen, der sie schließlich zum Absterben bringt,

c) einer ausgesprochenen Tendenz insbesondere zur Bindegewebswucherung des spezifisch erkrankten Gewebes und im allgemeinen zur partiellen oder totalen Nekrose der infizierten Drüse.

5. Es ist möglich die Widerstandskraft der Lymphdrüse gegen die Tbc.-Bazillen künstlich zu erhöhen oder, mit anderen Worten, einen gewissen Grad von antituberkulöser Immunisation der Lymphdrüsen zu erzeugen u. zw. vermittelt wiederholter endolymphatischer Inokulationen von im Beginne minimalen und allmählich steigenden Quantitäten von tuberkulösem Virus.

L. Philippson (Palermo).

Dalous. Un cas de paronyxis tuberculeux d'inoculation. Ann. de dermat. et de syphilogr. 1902. p. 219.

Der Pat. Dalous, ein Student der Medizin, hatte sich eine alte Rißwunde seitlich vom Nagel des linken Ringfingers bei der Sektion eines Tuberkulösen infiziert. Es entwickelte sich ein immer wieder aufbrechendes Geschwür, das erst nach Auskratzung und Kauterisation heilte. Histologisch fand sich tuberkulöses Gewebe mit Riesenzellen, hingegen keine Bazillen. Der gleiche Befund in einer exzidierten Cubitaldrüse. Ein Impfversuch bei einem Meerschweinchen fiel negativ aus.

Walther Pick (Wien).

Macleod, J. M. H. and Ormsby, Oliver S. Report on the histo-pathology of two cases of cutaneous Tuberculides, in one of which Tubercle bacilli were found. British Journal of Dermatology 1901.

In eingehendster Weise erörtern die Verfasser die Histopathologie der beiden Fälle, von denen der eine ein 25jähriges Mädchen mit einem „akneiformen Tuberkulid“ an den Streckseiten beider Unterschenkel unterhalb des Knies, der zweite einen 17 Monate alten Knaben mit verschieden-

artigen Hautsymptomen (vorwiegend Lichen urticatus) und mit sonstigen tuberkulösen Prozessen betrifft. Bei dem letzteren wurden vier indurierte über erbsengroße Knoten exzidiert und histologisch wie auch im 1. Falle in der Subcutis und Corium tuberkulöse Struktur nachgewiesen; im 2. Falle fanden sich Tuberkelbazillen in den Riesenzellen. Dieser war auch kombiniert mit ausgeprägten klinischen Erscheinungen (Dactylitis, chronischer Husten, Nachtschweiße, abendliche Temperatursteigerungen) auch war familiäre Belastung nachweisbar. Die Verfasser heben am Schlusse hervor, daß die ersten Veränderungen in beiden Fällen in den Gefäßen des Hypoderms angetroffen wurden und zwar mehr in den Venen, wo Endophlebitis und Verdickung der Wand stets konstatiert wurde. Der von den Autoren erhoffte Nachweis von Tuberkelbazillen daselbst blieb ohne Erfolg.

Robert Herz (Prag).

Richter. Zur Spickmethode. Monatshefte f. prakt. Dermatologie. Bd. XXXV.

Richter empfiehlt zur Behandlung des Lupus mit Unnas Spickmethode Spickhölzer aus dem Holz der Rot- und Weißbuche, welche das Ätzmittel (Liquor stibii chlorati) gut aufsaugen und auch die entsprechende Härte besitzen; nach Ausfallen des nekrotischen Pfropfes — nach 3—4 Tagen — wird in die verhältnismäßig große Höhlung ein entsprechend großes Wattabäuschchen von 33% Orthoformwatta eingelegt, und dieses mit 1—3 Tropfen Liqu. stibii chlorati getränkt, darüber ein Pflaster. Nach 2—4 Tagen ist die Nekrotisierung erreicht. Die Abheilung geschieht unter Sublimat-Bleiwasserverbänden.

Ludwig Waelsch (Prag).

Gunson, Charles Herbert. Hydrogen Peroxide in the Treatment of Lupus vulgaris and tuberculous Abscess. British Medical Journal. 22. Feber 1902.

Verfasser empfiehlt bei Lupusgeschwüren sowie auch bei andersartigen Geschwüren und eitrigen Wunden die tägliche Anwendung von Wasserstoffsuperoxyd in Form eines Spray. Die Granulationsbildung und Epithelisierung soll dadurch mächtig gefördert werden, die resultierende Narbe ist fest und hat nicht die Tendenz bei der geringsten Reizung wieder aufzubrechen. Ist die Granulationsbildung zu stark, so ist vorher eine Auskratzung vorzunehmen. Auch bei tuberkulösen Abszessen, die nach ihrer Entleerung mit Wasserstoffsuperoxyd behandelt wurden, will Verfasser diese günstige Wirkung besonders auf die Granulationsbildung bemerkt haben.

R. Böhm (Prag).

The present Position of the Light Treatment of Lupus. British Medical Journal. 4. Jänner 1902

Aufgezählt werden die Orte, an denen sich Institute für Lichtbehandlung befinden, weiters der Prozentsatz der Heilungen, der 23% beträgt. Die Behandlung mit Sonnenlicht wird ihrer Unverläßlichkeit und langen Dauer wegen gegenüber der Behandlung mit Bogenlicht verworfen, welches letztere überhaupt relativ reicher an chemisch wirkenden Strahlen ist. Von den jetzt in Gebrauch stehenden Bogenlichtlampen wird die

von Lortet-Genoud sowie ihre Modifikation beschrieben, weiters die von Kjeldsen, bei der eine Kohlenpol durch metallisches Quecksilber ersetzt ist, ferner die Lampe nach Dr. Bang, die mit Wasser gekühlte Eisenelektroden hat und als die billigste und wirksamste bezeichnet wird, ihr Anschaffungspreis beträgt ungefähr 3 Shilling. Ihre bakterizide Wirkung ist so groß, daß Staphylokokken-Kulturen in ca. $4\frac{1}{2}$ Minuten abgetötet werden. Ein Erythem von mehreren Tagen Dauer wird bereits durch eine 3 Minuten lange Bestrahlung erzeugt, bei einer Stärke von 5 Ampère und zwar auf einer fast 4 Zoll im Geviert messenden Fläche.

R. Böhm (Prag).

Kaltenbracker. Fortschritte auf dem Gebiete der Finsenschen Lupusbehandlung. Zentralblatt f. Chirurgie 1902. Nr. 5. pag. 121.

Da nach Bang (Naturforschervers. zu Hamburg) die therapeutischen Resultate bei Anwendung der Kjeldsenschen Lampe besonders günstig sind, hat Kaltenbracker im Aufrechtschen Institut Versuche über die Wirkung dieser Lampe, deren Eisenelektroden außerordentlich viel chemische Strahlen aussenden, auf Bakterienkulturen angestellt. Er fand, daß bei einer Beleuchtungsdauer von $\frac{1}{2}$ —1 Minute Typhus-, Cholera-, Milzbrand-, Tuberkulose- und Colibacillen, Strepto- und Gonokokken im Wachstum gehemmt wurden und empfiehlt die Lampe wegen ihrer Billigkeit und bequemen Handhabung.

A. Gassmann (Basel-Leukerbad).

Grouven. Erfolg der Röntgentherapie bei drei Lupuskranken. Niederrhein. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 1901.

Grouven berichtet über zwei Lupusfälle, die nach $3\frac{1}{2}$ und 4monatlicher Röntgenbestrahlung an Stelle der Lupusherde hyperämische, glatte, feste Narben aufwiesen, in denen sich Lupusknötchen klinisch nicht mehr nachweisen ließen. Bei mikroskopischer Untersuchung fanden sich jedoch noch ausgedehnte Lupusherde mit zahlreichen Riesenzellen, wenn auch eine bindegewebige Abkapselung der Herde nachzuweisen war. Es bleibt demnach unentschieden, ob trotz der günstigen klinischen Befunde eine völlige, auch histologisch nachweisliche Heilung des Lupus durch Röntgenstrahlen allein zu erzielen ist. Grouven erwähnt sodann die guten Resultate bei Beleuchtung von Sykosis spl., Sykosis parasitaria, Favus sowie bei Lupus erythematodes und Psoriasis. Bei Naevus vasculosus ließ sich ein Erfolg nicht erzielen, ebensowenig gelang bis jetzt eine Enttharung mit dauerndem Erfolg.

Wolters (Rostock).

Doutrelpont. Einfluß der Röntgenbehandlung auf das lupöse Gewebe. Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 1901.

Doutrelpont demonstriert Präparate von einem Patienten, der 10 Wochen bestrahlt worden war. Der Lupusherd ist von einem Leukocytenwall umgeben, und ist fast völlig durch Bindegewebe ersetzt, einzelne lupöse Elemente und eine Riesenzelle sind noch vorhanden. Das Bindegewebe umschließt die Herde nicht allein, sondern durchsetzt sie

und zerlegt sie nach allen Richtungen hin. Dabei degenerieren die lupösen Elemente, werden vacuolisiert, doch scheint eine Hyalinbildung nicht einzutreten. Nach Doutrelepont soll sich der Heilungsvorgang bei Röntgenbeleuchtung so vollziehen, daß zuerst eine Hyperämie eintritt, die zu einer Leukocyten-Auswanderung und zwar an der Peripherie führt, die nach dem Zentrum weiter vordringt; daß die Zellen sich in Spindellen umwandeln und fibrilläres Bindegewebe bilden, welche dann die lupösen Zellen erdrücken, resp. zur vacuolisierenden Degeneration bringen. Es folgt dann Zerfall, Resorption und Ersatz durch das neugebildete Narbengewebe.

Wolters (Rostock).

Morris Malcolm and **Dore** Ernest. Further Remarks on Finsens Light and X Ray Treatment in Lupus and rodent Ulcer. British Medical Journal. 31. Mai 1902.

Die Verfasser haben eine bereits zweijährige Erfahrung in Bezug auf die Lichttherapie, hinsichtlich der Dauer der Erfolge halten sie noch mit ihrer Meinung zurück. Von den Lampen wirken die mit zerstreutem Licht oberflächlicher als die mit konzentriertem Licht. X-Strahlen und Finsenlicht sind in ihren Wirkungen nicht gleichwertig, auf die X-Strahlen reagiert auch das gesunde Gewebe, die Narbe wird hier fester, blässer und straffer, wogegen sie nach der Lichtbehandlung mehr der normalen Haut ähnelt. Weiters bewirken die X-Strahlen Haarausfall im Gegensatz zur Lichtbehandlung; bei ulzerösen Prozessen sind die X-Strahlen wirksamer, doch empfiehlt sich auch hier die direkte Einwirkung der Strahlen, gegenüber der Einwirkung durch die Haut oder andere Gewebe. Die X-Strahlen vermögen eine starke Dermatitis, ja nekrosierende Ulzeration zu erzeugen, besonders bei langer Exposition mit weichen Röhren, auch kann die Wirkung derselben nicht in der Weise abgestuft werden wie bei der Lichtbehandlung. Sowohl bei der X-Strahlen- wie bei der Licht-Behandlung ist für den Erfolg das Auftreten einer Reaktion von Wichtigkeit, wenn auch bei ulzerösen Prozessen dieselbe nicht so prompt in Erscheinung tritt oder erst dann, wenn die Überhäutung eintritt. Die Reaktion auf X-Strahlen ist gewöhnlich stärker als bei Lichtbehandlung. Verfasser gebrauchte eine Tubendistanz von 5 Zoll, Expositionsdauer 10 Minuten, Funkenlänge (Spitze + Platte —) 7 Zoll Volumen $2\frac{1}{4}$ Ampère. Bei Behandlung des Ulcus rodens zeigt sich, daß der wallartige Rand schwerer beeinflußt wird. Hier ist es zweckmäßig, denselben erst mit Finsenlicht oder dem Thermokauter zu behandeln. An diese Betrachtung schließt Verfasser noch die Beschreibung einer Reihe mittelst Phototherapie behandelter Fälle.

R. Böhm (Prag).

Scatchard, Walter. Formalin in the Treatment of Lupus.

Der Fall betrifft einen Patienten, der seit 18 Monaten an Lupus der Nase leidet. Lange sträubte sich Patient gegen eine energische Behandlung, bis nach einer Bronchitis eine rasche Ausbreitung der Affektion eintrat. Verfasser wendete nun, nach gründlicher Entfernung der Borken Einpinselungen von Formalin (40% Formaldehyd) mit Glyzerin zu gleichen Teilen an, nachdem die Stellen ca. 1 Stunde vorher mit Orthoform zur

Verringerung der Schmerzhaftigkeit bestreut wurden. Verfasser war nach 14 Tagen überrascht von der günstigen Wirkung. Die Ulzerationen waren geheilt und durch weiche Narben ersetzt. Nach 3 Wochen erschienen 2—3 verdächtige Flecke, die aber rasch unter Formalinbehandlung schwanden. Von April 1900 bis Jänner 1901 keine Rezidive, als nach einer neuerlichen Bronchitis wieder einige Knötchen auftraten. Nach 10tägiger Behandlung verschwanden auch diese und seit dieser Zeit kein Rezidiv mehr. Die Behandlung war nur wenig schmerzhaft.

R. Böhm (Prag).

Darier, L. Sur la prophylaxie familiale de la lèpre. Ann. de derm. et de syphiligr. 1901 p. 1072; 1902 p. 45.

Darier teilt die Krankengeschichte einer 31jährigen Frau mit, die in Neu-Kaledonien Lepra (Forme mixte) akquiriert hat; scheinbare Inkubationsdauer 2 Jahre. Während der Inkubationszeit konzipiert die Frau und gebärt 2 Monate nach dem Ausbruch der ersten Erscheinungen ein gesundes Kind, das, trotzdem es von der Mutter, bei der sich die Erscheinungen mit großer Rapidität entwickeln, gestillt wird, gesund bleibt. Ebenso sind der Mann und zwei Kinder gesund. Da erfahrungsgemäß in Ländern, wo die Lepra nicht endemisch ist, allmählich eine Abschwächung der Erscheinungen und Besserung eintritt, will Darier der Patientin raten, sich, ins solange sie manifeste Hauterscheinungen bietet, und ihre Schleimhäute bazillenhaltiges Sekret sezernieren, in ein Spital aufnehmen zu lassen; später kann eine relative Isolierung innerhalb der Familie genügen. Da die wiederholte Untersuchung der Milch die vollständige Anwesenheit des Leprabacillus in derselben ergibt, berichtigt Darier seine ursprüngliche Ansicht und läßt den Säugling durch die Mutter ernähren.

Walther Pick (Wien).

Doutrelepont. Ein Fall von Lepra mixta. Sitzungsberichte der Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde 1901.

Doutrelepont stellt einen Patienten mit Lepra mixta vor, der, 46 Jahre alt, aus dem Rheinlande stammt, seit 1877 in Afrika gelebt hat, zuletzt in Kapstadt in der Nähe des Eingeborenen-Viertels. Er will nie mit Leprösen irgendwie in Berührung gekommen sein. Sein Leiden begann vor 6 Monaten mit einer auffallenden Röte des Gesichtes, die als Erysipelas angesehen wurde; wenig später verdickte sich die Stirnhaut. Seit 3 Monaten traten Flecken am Körper auf, die sich nach und nach vermehrten, wogegen sich Paraesthesien nur vorübergehend einstellten. Jetzt ist das Gefühl von Taubsein und auch von reißenden Schmerzen im Bereich des Ulnaris sehr stark, Gefühl in dieser Nervenbahn deutlich herabgesetzt. Sinnesorgane sonst intakt. Befallen ist die ganze Haut des Körpers und zwar in Form von größeren und kleineren Flecken und Infiltraten. Augenbrauen stark verdickt, Haare ausgefallen, linker Ulnaris verdickt, Nasenschleimhaut hyperämisch, rechts eine Erosion. Im Nasensekret sowie im Gewebssaft zahlreiche Bazillen. W o l t e r s (Rostock).