Effemeride di (433) (1898 DQ) per gennaio 1899.

12^h Berlino.

1899	α vera	δ vera	$\log r$	$\log \Delta$	M	1899	α vera	δ vera	$\log r$	$\log \Delta$	M
Gen. 1	22 ^h 53 ^m 27 ^s	+ 3° 47' 1"	0.1499	0.1782	12.1	Gen. 15	23 ^h 27 ^m 48 ^s	+ 6° 50' 2"			
3	22 58 12	4 12.1				17	32 56	7 17.7	0.1336	0.1941	12.1
5	23 3 0	4 37.6	0.1458	0.1827	12.1	19	38 6	7 45.4			
7	7 51	5 3.3				21	43 21	8 13.4	0.1294	0.1973	12.1
9	12 45	5 29.6	0.1418	0.1868	12.1	23	48 38	8 41.6			
11	17 42	5 56.1				25	53 59	9 10.1	0.1252	0.2002	12.1
13	22 44	6 23.0	0.1377	0.1906	12.1	27	23 59 23	9 38.6			
15	23 27 48	+ 6 50.2				29	0 4 51	+ 10 7.4	0.1211	0.2029	12.1

In prima sera a ponente il pianeta può essere osservato coi grandi cannocchiali anche in gennaio; lo splendore, a giudicare dalle attuali osservazioni, sarà intorno a 12^{1/2} compreso l'effetto della fase. La correzione a questa effemeride non dovrebbe essere a mezzo gennaio lontana da -5^s e -0.3, calcolando proporzionalmente in base ad una osservazione recentissima del Dr. Cerulli.

Roma, 1898 Novembre 16.

E. Millosevich.

Beobachtungen des Cometen 1898 . . . (Chase).

From photographs taken at the Harvard College Observatory with the 8 inch Draper telescope.

1898 Nov. 14 21^h 40^m Gr. m. t. RA. = 10^h 5^m 55^s.9 Decl. = + 23° 3' 51" (1875)

22 28 " = 10 5 58.7 = + 23 3 57 " Pickering.

Auf der Sternwarte in Teramo (Telegramm).

1898 Dec. 5 14^h 26^m 6 M. Z. Teramo RA. app. = 159° 28' 35" PD. app. = 65° 17' 25" Gr. 13.5 Cerulli.

Auf der Sternwarte in Kopenhagen von Herrn C. F. Pechüle.

1898	M. Z. Kop.	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Vgl.	α app.	$\log p.\Delta$	δ app.	$\log p.\Delta$	Red. ad l. app.
Dec. 8	12 ^h 43 ^m 7 ^s	+0 ^m 35 ^s 81	-3' 25".4	10.3	10 ^h 41 ^m 33 ^s 58	9.543 _n	+25° 2' 52".7	0.773	+4 ^s 38 -30".3
8	13 37 51	+0 38.92	-3 6.5	10.3	10 41 36.69	9.495 _n	+25 3 11.6	0.738	+4.38 -30.3
8	15 14 45	+0 43.62	-2 39.1	10.3	10 41 41.39	9.312 _n	+25 3 39.0	0.684	+4.38 -30.3

Vergleichstern (1898): $\alpha = 10^h 40^m 53^s 39$ $\delta = + 25^\circ 6' 48".4$ AG. Cambr. 5493.Correction der Ephemeride Möller in A. N. 3530: + 19^s - 0.4. Comet sehr schwach.

Neuer Planet 1898 ED.

Planète Charlois 8 Décembre. Observation: 9 Décembre 8^h 59^m 0 t. m. Nice AR. app. = 70° 11' 58" DP. app. = 67° 45' 55" Mou. diurne - 14' + 5' Gr. 11^m

Perrotin.

Ueber die Benennung der Cometen.

Von Anfang des Jahres 1899 an wird in dieser Zeitschrift die seit Band 101 aufgegebene vorläufige Bezeichnung der Cometen durch die Buchstaben a, b, c . . . in der Reihenfolge der Anmeldung der Entdeckungen bei der Centralstelle wieder zur Anwendung kommen. Dieselbe fällt weg, sobald es möglich ist, die definitive Bezeichnung I, II, III . . . gemäss der Ordnung nach den Perihelzeiten einzuführen.

Kiel, 1898 November 28.

H. Kreutz.

Inhalt zu Nr. 3532. F. R. Helmert, Th. Albrecht. Der internationale Polhöhendienst. 49. — L. Weinek. Beobachtung der partiellen Mondfinsterniss vom 3. Juli 1898. 55. — L. Brenner. Der neue Stern im Andromeda-Nebel. 59. — H. Kobold. Beobachtungen des Planeten (433) (1898 DQ). 59. — E. Millosevich. Beobachtungen des Planeten 1898 DU. 59. — E. Millosevich. Seguito e fine delle osservazioni della cometa 1898 . . . (Coddington-Pauly). 61. — F. Ristenpart. Ephemeride des Cometen 1898 . . . (Brooks Oct. 20). 61. — T. E. Espin. Auszug aus Wolsingham Observatory Circular No. 48. 61. — E. Millosevich. Effemeride di (433) (1898 DQ) per gennaio 1899. 63. — Beobachtungen des Cometen 1898 . . . (Chase). 63. — Perrotin. Neuer Planet 1898 ED. 63. — H. Kreutz. Ueber die Benennung der Cometen. 63.