verdickt, mit eilanzettlichen, dunkler gefärbten, entfernt stehenden Schuppen besetzt. Aehre 2—6" lang, anfangs gedrunken, später locker. Deckblätter aus eiförmiger Basis lanzettlich zugespitzt, etwas kürzer oder fast so lang als die aufgeblühte Corolle, die obren länger als die Knospen, ziegeldachartig über einander liegend, an der Spitze der Aehre einen zugespitzten Schopf bildend. Corolle im Verhältniss der Grösse der Pflanze klein, 9" lang, unter den Lippen 3" breit, am Grunde kahl, sonst, besonders am Rücken, nebst den Deck- und Kelchblättern mit kurzen weissen Drüsenhaaren ziemlich dicht besetzt, am Rücken etwas gekrümmt, fasst dreieckig zusammengedrückt, vorn ziemlich flach, mit zwei breiten Rinnen durchzogen, die sich zur Seite des mittlern Lappens der Krone herabziehen, und nach innen zwei längliche Wülste bilden. Staubfäden lichtviolett, an der Einfügung drüsig-verdickt, gelb, honigerzeugende Griffel blass violett, Narbe wachsgelb, fasst $1\frac{1}{2}$ " breit.

Kommt vorzüglich auf den Wurzeln der *Centaurea Scabiosa*, aber auch vieler anderen Pflanzen, und auch auf denen des *Anthericum ramosum* vor. Dieses letztere Vorkommen war mir desshalb merkwürdig, weil ich mich bestimmt erinnere in einem botanischen Werke gelesen zu haben, dass die *Monocotyledonen* keine Schmarotzer beherbergen, was hiermit widerlegt ist.

Blüht im Juli und August, wenn auch die daselbst wachsenden *O. Galii* und *O. rubens* längst vertrocknet sind. — Ueber die Dauer der *Orobanchen* ein andermal.

Nachricht über zwei bereits in J. 1828 censurirte Handschriften.

In dem Nachlasse des seligen Professors Tausch haben sich zwei botanische Manuscripte vorgefunden, deren Publication aus dem Grunde wünschenswerth erscheinen möchte, weil die Beschreibungen meist nach Sieber'schen Exemplaren von dem sehr genau beobachtenden Verfasser angefertigt wurden, dem die besondere Auswahl derselben von seinem Freunde Sieber gestattet war, und weil sehr viele dieser, von Andern bereits kurz characterisirten Arten in Tausch's Handschriften ihre erstere Priorität behaupten werden. Ich theile sonach im Anschlusse den namentlichen Auszug einstweilen den Freunden der Botanik mit dem Wunsche mit, es möge sich vielleicht denn doch für diese beiden Handschriften ein Verleger finden, damit sie der Wissenschaft nicht entgingen, und damit eine bereits gemachte gute Arbeit nicht nutzlos bleibe.

P. M. Opiz.

I. Nova genera et species plantarum exoticarum auctore Tausch. 1828.

Ranunculaceae.
Ranunculus dyctiocarpus.
 Dilleniaceae.
Tetracera discolor.
Davilla reticulata.
Hibbertia laxiflora.

Hibbertia helianthemoides.
 — *tuberculata*.
 — *canescens*.
Pleurandra lavandulaefolia.
 — *astrotricha*.
 — *rotundifolia*.

Pleurandra fumana
 — *thymbra.*
 — *cistiflora.*
 — *juniperoides.*
 — *acutiflora.*
 — *microphylla.*
Anonaceae.
Unona martinicensis.
Rollinia obtusifolia.
 — *oblongifolia.*
Menispermæae.
Cocculus lateriflorus.
Cissampelos glabra.
 — *emarginata.*
 — *mauritiana.*
 — *reniformis.*
Flacourtiaceae.
Erythrospermum citrifolium.
 — *amplissimum.*
Tiliaceae.
Triumfetta macrocarpa.
Stoanea inaequalis.
Grewia hypoleuca.
 — *velutina.*
Bixineae.
Prockia parviflora.
 — *cerasoides.*
 — *integrifolia.*
Hypericeae.
Vismia mauritiana.
Guttiferae.
Clusia mauritiana.
Catophyllum floribundum.
Erythroxyleae.
Erythroxylum Hilsenbergii.
Malpighiaceae.
Byrsonima nutans.
 — *splendens.*
 — *emarginata.*
 — *latifolia.*
Bunchosia lanceolata.
Botryococca lanceolata.
Triopteris inaequalis.
Psychecarpus indicus.
Banisteria macrophylla.
 — *reticulata.*
 — *orthoptera.*
Sapindaceae.
Cardiospermum crectum.
 — *parviflorum.*
Serjania ilicifolia.
Dodonaea polygama.
 — *ligustrina.*
 — *laurina.*
 — *rosmarinifolia.*
 — *coronopifolia.*
 — *boroniæfolia*

Meliaceae.
Sandoricum denudatum.
Ampelideae.
Leea bitermata
 — *sambucina* ♂ *speciosa.*
Rosaceae.
Hirtella ferruginea.
Grangeria borbonica ♂ *oblongata.*
Prunus emarginata.
 — *citrifolia.*
Acaena villosa.
 — *poterifolia.*
 — *reptans.*
Rubus lateriflorus.
Melastomeae.
Conostegia polyandra.
 — *coerulescens.*
Diptochita aeruginosa.
Miconia plicata.
Clidemia lanata.
 — *erythrotricha.*
Sagraea umbrosa.
Clidemia seminudata.
 — *atopecura.*
Miconia collina.
 — *muscosa.*
Charianthus cuspidatus.
Sagraea aurata.
Rhexia lagopus.
Myrtaceae.
Beaufortia capitata.
Metaleuca sparsiflora.
 — *microcephala.*
 — *pungens.*
Leptospermum retusum.
 — *rugosum.*
 — *myrtifolium.*
 — *nanum.*
Metrosideros capitata.
Baekeae teretifolia.
 — *ericoides.*
Pappolaucium Sieberi.
Jossinia discolor.
 — *chrysophyllum.*
 — *celastroides.*
 — *ferruginea.*
Eugenia costata.
 — *umbellata.*
 — *vaccinioides.*
 — *amplissima.*
 — *chrysophyllioides.*
Myrcia cryptantha.
 — *laevigata.*
 — *evonymoides.*
 — *Kokautii.*
 — *argentea.*
 — *velutina.*

Myrcia gynetricha.
 — *rugosa.*
 — *scariosa.*
Syzygium casearia.
 — *sideroxyloides.*
 — *thyrsoides.*
 — *quadrangulare.*
Eudesmia nerifolia.
Angophora angustifolia.
Memecyleae.
Memecylon strictum.
Rhizophoreae.
Adrimysia serrulata.
Caprifoliaceae.
Pleuricarpus cuneifolius.
Loranthus incurvus.
 — *pendulus.*
 — *congener.*
 — *melanoxyton.*
 — *oleaster.*
Viscum marginatum.
 — *ovatum.*
Glutago aristolochinefloria.
Homorithmia staphyleoides.
 — *ebuloides.*
 — *indica.*
Rubiaceae.
Spermacoce erecta.
Borreria galioides.
 — *radiata.*
Mitraecarpum cannosum.
 — *canescens.*
 — *pilosum.*
Opercularia lithospermifolia.
Myonima buxifolia.
 — *elliptica.*
Cephaelis dentata.
Gastroscyphus indicus.
Viscophyllum parasiticum.
Psychotria nitida.
 — *lateriflora.*
 — *loniceroides.*
 — *cephaëlifolia.*
 — *adunca.*
 — *glutinosa.*
 — *concolor.*
 — *eustipulata.*
 — *leucoxyton.*

Palicourea cinchonifolia.
 — *racemosa.*
Chasalia grandifolia.
 — *coerulea.*
 — *rigida.*
 — *divaricata.*
Gaertnera axillaris.
 — *speciosa.*
 — *nutans.*
 — *fasciculata.*
 — *campanulata.*
 — *vaginata.*
 — *ferruginea.*
 — *Hilsenbergii.*
 — *longifolia.*
Pyrostria acuminata.
Psathura discolor.
 — *parviflora.*
 — *oleaeifolia.*
 — *myrtifolia.*
 — *octomera.*
Exostema macroglossum.
Hosmannia acuminata.
Landia arcuata.
Bertiera Zalzania.
 — *laxa.*
 — *nutans.*
Hamelia pauciflora.
Chitostigmon tinifolius.
Stylocorina mauritiana.
Epacrideae.
Epacris purpurea.
 — *reticularis.*
 — *microphylla.*
 — *pulchella.*
 — *squarrosa.*
 — *rigida.*
Lysinema carinatum.
Styphelia retusa.
 — *fertilis.*
Guajacanae.
Diospyros trifida.
 — *spicata.*
 — *rotundata.*
Royena scabra.
Sapoteae.
Jacquinia trinervia.
Aegiceras obovata.

II. Tausch: Descriptio plantarum minus cognitarum, quas in itinere per Cretam et Palaestinam legit F. W. Sieber, 1828.

(Secale creticum.)
Stipa cretica.
Melica cretica.
 — *nana.*

Sesleria cretica.
 — *triticea.*
Bromus creticus.
Crocus creticus.

Scilla sphaciolica.
Allium tenellum.
Tulipa saxatilis.
Colchicum pusillum.
Luzula cretica.
Aristolochia parviflora.
 — *denticulata.*
 — *rostrata.*
Morus byzantina.
Atriplex hortensis § *laxa.*
Euphorbia polycerata
 — *eneorifolia.*
 — *laeta.*
 — *triflora.*
 — *cretica.*
Thesium maritimum.
Convolvulus divaricatus.
Cuscuta minima.
Teucrium divaricatum.
 — *betonicifolium.*
Lamium flavum.
Stachys mucronata.
Marrubium undulatum.
 — *acetabulorum.*
Ballota dubia.
Phlomis palaestina.
Mentha cretica.
 — *petiata.*
 — *leptostachya.*
Origanum Sieberi.
Thymus creticus.
 — *Bauhini.*
 — *rotundifolius*
 — *flexifolius.*
Clinopodium nanum.
Satureja origanifolia.
Asperula cretica.
Crucianella rigida.
 — *Tournefortii.*
Galium trichanthum.
 — *cotiniflorum.*
Onopordon spinosissimum.
 — *creticum.*
Kentrophyllum creticum.
 — *incanum.*
 — *Alpini.*
 — *purpureum.*
Centaurea pyracantha.
 — *cretica.*
 — *argentea.*

Anthemis asteracantha.
Lactuca pygmaea.
 — *tenella.*
 — *lateriflora.*
 — *grandiflora.*
Crepis auriculaefolia.
 — *apargioides.*
 — *tenerrima.*
 — *barbareaefolia.*
Rodigia hyoseroides.
 — *gracilis.*
Rhizanthus creticus.
Tolpis hirta.
 — *cretica.*
Trifolium Sieberi.
 — *creticum.*
 — *inflatum.*
Metitotus humilis.
Cytisus creticus.
Ononis corymbosa.
 — *campestris.*
Cicer creticum.
Alyssum marifolium.
 — *organifolium.*
 — *pusillum.*
Draba sphaciolica.
Aethionema Sieberi.
Rapistrum verrucosum.
 — *globiferum.*
Sinapis cretica.
Cheiranthus sphaciolica.
Lepidium cinereum.
Dianthus arboreus.
 — *creticus.*
 — *lateriflorus.*
Silene Sieberiana.
Telephium Imperati § *simplex.*
Fagonia palaestina.
Cotyledon cretica.
Sedum creticum.
 — *rigidum.*
 — *glandulosum.*
Semperovium creticum.
 — *annuum.*
Viola fragrans.
Fumaria decipiens.
Negella erithimifolia.
Ranunculus Sieberi.
 — *Tournefortii.*

Monatsitzung des zoologisch - botanischen Vereines in Wien am 1. October 1851.

Vorsitzender: Vice - Präsident H e c k e l.

Der Herr Sekretär theilt die Correspondenz des Vereines seit der letzten Sitzung mit. Namentlich sind aus Stockholm, Moskau, Emden und Neapel Zuschriften eingelangt, welche einen regen Verkehr