SERTUM ANGOLENSE,

SIVE

STIRPIUM QUARUNDAM NOVARUM VEL MINUS COGNITARUM

IN ITINERE PER

ANGOLAM ET BENGUELLAM

OBSERVATARUM

DESCRIPTIO ICONIBUS ILLUSTRATA.

TENTAVIT

FRIDERICUS WELWITSCH.

PRÆFATIO.

INTER cunctos orbis terrestris tractus quos circuli æquinoctiales includunt, illi Continentis Africanæ omnium longius scientiæ occulti remanserunt, ac nonnisi nostris temporibus, et quidem non sine perplurimorum peregrinatorum animi fortitudine et audacia prompta pariter ac doctrina et genio insignium sacrificio, scientiæ paullatim paullatimque innotuerunt.

Ingentes tamen ejusdem Continentis plagæ centrales, intra zonam æquinoctialem cis et trans æquatorem extensæ, ad hodiernum usque diem adhuc penitus ignotæ permanent, in mappis imo recentissimis solum latis spatiis vacuis delineatæ, in scientia, inprimis historiam naturalem spectante, hiatibus profundis indigitatæ.

Attamen jam hodie Africæ æquinoctialis terræ litorales plures, nec non penetralia quædam ipsis propiora, tam in orientali quam occidentali vasti continentis plaga sita, scientiæ naturalis scrutinio quodammodo aperta prostant, id quod respectu plagæ orientalis præcipue laboribus curisque celebratorum peregrinatorum Kirk, Speke, et Grant et inprimis Prof. Guilh. Peters debetur, qui Floram atque Faunam terræ Mossambicensis et descriptionibus et iconibus numerosis iisque elegantissimis illustravit.

Terras æquinoctiales in plaga occidentali sitas quod attinet, Guineæ superioris Flora tam explorationibus clar. Chr. Smith, Palisot, Thonning, aliorumque, quam, præcipue tempore ulteriore, conamine et industria nunquam satis laudanda clar. peregrinatorum E. Vogel, Barter, et inprimis G. Mann, saltem pro majore parte, jamjam cognita patet.

Floræ Guineæ inferioris fragmenta quædam colligere mihi tandem licitum fuit, dum Gubernii Lusitani jussu honoratus ejusdemque auxiliis munitus, annis 1854 usque ad 1860 Regni Congo partem, dein *Angolam* et denique *Benguellam* perlustravi. Iter hoc meum sat longum fuit ac summopere arduum; sæpius atque sæpius morbis in istis terris endemicis nec non Nigritarum invadentium bellis interruptum, aliis locis imo ipsarum terrarum ob perdurantem nimiam siccitatem desolatione perturbatum, nihilominus, Deo favente, feliciter peractum, non tamen sine gravi valetudinis meæ detrimento absolutum.

Varia hujusce explorationis eventa, inprimis quæ ad Floram Angolensem spectant, jam curis benevolis celeberr. Jos. D. Hooker, G. Bentham, Alph. de Candolle, Dan. Oliver, G. Reichenbach, fil., aliorumque rei herbariæ peritissimorum virorum in lucem edita prostant, et siquidem hæc uti et illa, in posterum edenda, quidquam ad Africæ æquinoctialis historiam naturalem elucidandam contribuunt, hoc omnino Augustissimo Regi Populoque Lusitano debetur, quorum auxilium admodum validum, durante omni itinere mihi præstitum, hic publice et gratissimo animo lætus agnosco.

Inter stirpes novas vel parum cognitatas quas ex terris Angolensibus reportavi, non paucae prostant, quæ vel ob florum habitusve totius elegantiam aut singularitatem, vel ob qualitatibus suarum in autochthonum coloniarumque vita quotidiana et sanandis morbis præstantiam, vel denique respectu earum distributionis geographicæ præ ceteris notabiles, illustratione iconographica satis dignæ videbantur.

Hunc in finem proinde earum plurium icones analyticas delineandas curavi et descriptiones uberiores elaboravi, quas hodie sub *Serti Angolensis* titulo Floræ Africanæ fautoribus offero, scriptuli mei imperfectionum nequaquam immemor, simulque magnopere deplorans, ejusdem absolutionem et crebris valetudinis meæ vicissitudinibus aliisque vitæ eventis omnino inopinatis longius retardatam fuisse.

Priusquam autem ad ipsarum stirpium descriptionem progredior, pauca quædam, sed non levioris momenti, præmonenda habeo, quæ inprimis circa Regni Angolensis situm, extensionem et divisionem, ejusdemque territorii in variis latitudinis gradibus variam supra mare elevationem versantur, quibus denique notulas breves, præcipue de montium fluviorumque directione et indole, nec non de temporum imbriumque introitu et decursu agentes, addere liceat, ut quæ infra de specierum singularum stationibus vel habitationibus narranda sunt, melius intelligantur.

Nomine "*Provincia Angola*" sensu generali sumpto, *Lusitani* omnem illum immensum terrarum tractum, ab ipsis olim detectum eorumque nunc dominio subjectum comprehendunt, qui in Africæ tropicæ transæquatorialis plaga occidentali inter 5° 12' et 18° lat. austr.* sese extendit, et penetralia dicti continentis nunc ad 200, nunc fere ad 350 mil. geogr. petit, limitibus tamen his orientem versus necdum ubique rite constitutis.

Vastissimum hocce territorium juxta Oceani Atlantici oram orientalem per tredecim fere latitudinis gradus extensum, quatuor illa antiqua Nigritarum regna, *Loango*, *Congo*, *Angola* et *Benguella* dicta amplectitur, quæ cuncta olim unita regique potentissimo "*Mani-Congo*" appellato subjecta, nomine communi "*Congo*" designabantur†. Postea autem, et quidem jam a seculo XV.‡ ad hodiernum diem usque hic idem terrarum tractus apud geographos et in mappis plurimis nomine "*Guinea inferior*," et apud historiographos Lusitanos "*Guiné Portuguez*," i. e. Guinea Lusitana, designatus invenitur, nominibus tamen antiquis pro singulis regnis nihilominus conservatis.

Antiqui regni "*Loango*" Lusitani hodierni solummodo partem meridionalem inter flumina "*Cacondo*" et "*Zaire*" sitam, in mappa supra citata sub denominatione "*Districto de Cabinda*" indicatam, sibi vindicant, quam, cum illam perlustrare non mihi licuit, hoc loco obiter commemoratam prætermitto.

Regnum *Congo*, sensu hodierno sumptum, ad septentrionem flumine *Zaire*, ad austrum flumine *Loge*, a quibusdam geographis perperam "*Ambriz*" nuncupato, limitatur. *Angola* proprie sic dicta inter flumina *Loge* et *Cuanza* comprehenditur, dum *Benguella* a sinistris ripis ejusdem fluminis *Cuanza* ad flumen *Cunene* et quidquam ultra sese extendit, territorium *Benguellense*, sensu strictiore sic denominatum, simulque ad meridiem terras *Mossamedenses*, continentis interiora orientem versus late longeque pervagantes, includens. Secundum fluviorum indicatorum variam inter se quoad eorum ostia distantiam, etiam cujusvis adductorum regnorum extensionem litoralem variare obvium est, sicque territorii

* Conf. Mappam nitide delineatam nuper Olissipone editam sub titulo: "*Angola, mappa coordenado pelo Visconde de Sá de Bandeira, Tenente general, Ministro da Guerra, e por Fernando da Costa Leal, Tenente Coronel, Governador de Mossamedes.*" Lisboa 1864. Fol. sing. max.

† Conf. *Cavazzi* ap. *Labat* (T. 1. pag. 21), & *Demanet*, *Nouvelle histoire de l'Afrique* etc. Paris, 1767, vol. i. pag. 13.

‡ Inter Lusitaniæ reges qui primus titulum "*Senhor de Guiné*" id est, Guineæ dominus, assumpsit, fuit Dom João II.; Conf. *De Barros* Asia, Dec. 1. Lib. III. Cap. 3, nec non *Lopes de Lima*, *Ensaio sobre a statistica*, etc., Lib. III. pag. v.

Congo litus circiter a $6^{\circ} 10'$ ad $7^{\circ} 50'$, illud Angolæ a $7^{\circ} 50'$ ad $9^{\circ} 20'$, Benguellæ demum ab hoc ultimo ad 18° lat. austr. usque sese extendit.

Præter flumina supra notata, non pauca alia, in longinquis penetralium terris nascentia, Oceanum Atlanticum petunt, inter quæ in Congo flumina *Lilundo* et *Ambrige*, in Angola, *Lifune*, *Dande* et *Bengo*, in Benguella denique *Cuvo*, *Cutumbella* et *Bero* notabiliora sunt, permultis aliis minoribus rivisque innumeris hic prætermisissis, quæ, etiamsi durante pluviarum periodo non raro sat profunda ac dilatata, hiberno tamen tempore (*i. e.* imbribus omnino carente) vix aquis suis oceanum attingunt, sed versus eorum ostia, arenis ardentibus absorbta sensim sensimque disparent, vel ad stagna hinc inde in lacus extensa ab oceano vicino arena accumulata separata restringuntur.

Totius hujus territorii limites occidentales sive oceanici vel planitiebus formantur nunc angustioribus arenosis suaviter undulatis, nunc latius versus terras internas extensis, hinc inde limosis aut paludosis, vel rarius collibus rupestribus clivisve abruptis, ad 100–300 ped. elevatis, quorum cacumina sæpius horizontaliter truncata, præsertim juxta litora Benguellæ australioris frequenter obvia, et jam a primis navigatoribus Lusitanis apte cum mensis comparata, illis litoribus aspectum admodum peculiarem impertiunt, simulque vegetatione peculiari, sparsa quidem sed admodum distincta, arborum pygmæarum ornantur, inter quas *Vitis macropus* et *Bainesii*, *Pachypodium Lealii*, *Sesamothamnus Benguellensis* et *Welwitschia mirabilis* maxime notabiles.

Orientem versus omne territorium ab ora maritima per gradus ad terras internas modo suavius modo abruptius ascendit, montium catenis nempe pluribus, a Lusitanis “*Serras*” sive “*Morros*” nuncupatis, interiora versus gradatim altioribus percurritur, quarum summa juga in Angolæ penetralibus ad 4000, in Benguellæ interioribus ad circiter 6000 ped. elevantur. In universum hæ montium series a septentrione austrum versus decurrunt, latere suo orientali sensim ad radices catenæ sequentis ascendentes, dum contra latere occidentali, oceanum spectante, plerumque abruptius descendunt, unde facile perspicitur quamobrem rivi plurimi et flumina fere omnia nonnisi cataractis pluries repetitis præcipitata, ex terris interioribus in regiones inferiores profluunt. Attamen harum catenarum decursus nequaquam semper continuus, neque ubique directionem supra indicatam sequitur, sed in variis locis illarum una alterave vel omnes magis versus orientem retrocedunt, uti prope urbem “*Loanda*,” dum aliis locis litori propiores emergunt, uti hoc pone urbem “*Benguella*” observatur; hinc etiam catenarum singularam inter se distantia, montiumque quibus componuntur amplitudo magnopere variant, etiamsi generaliter et catenæ ipsæ et montes singuli versus territorii interiora sensim ampliores. Catenæ singulæ rarius insigniter deprimuntur, sed frequentius montibus disjunctis variæ altitudinis interceptæ vel aliis locis jugorum transversorum ope cum proxima interiore serie conjunctæ sunt vel etiam vallibus angustis plus minusve profundis, tempore pluviarum totidem torrentium alveis, persulcatæ. Seriei interioris juga excelsiora, quæ in Benguella jam ad 80–100 mil. geog. a litore distantiam eminent, in Angola autem nonnisi 150–180 mil. intervallo ab oceano divisa surgere incipiunt, pluribus in locis in planities undulatas deplanata inveniuntur, ex quibus dein iterum vel monticuli disjuncti, obtuse aut acutius conici, non raro ad summum usque cacumen silvis fruticetisve ornati, prominent, uti e. g. in Districtu *Huilla*, vel rupes ingentes,

parietibus fere perpendiculariter erectis, nunc vegetatione denudatis nunc fruticulorum variorum viriditate vestitis, columnarum angulatarum ad instar repentius surgunt, quemadmodum hoc in Districtu *Pungo-Andongo* observare licet, ubi petrae giganteae undique praeputae, a colonis nomine "*Pedras negras*" dictae, nec non aliae, circiter 15 mil. geog. orientem versus ab his distantes "*Pedras de Guinga*" nuncupatae, et quoad aspectum non minus singulares, vallem fluminis *Cuanza* ad septentrionem supereminet, in eorum cacuminum rimis faucibusque numerosam herbarum aromaticarum catervam nutriendas, dum juxta basim hinc pascuis latissimis, illinc silvis sempervirentibus cinguntur.

In *Benguellae* maxime australis (i. e. Districtus *Mossamedes*) interioribus, montium catenae, inter quos illa "*Serra de Xella*" (sive *Chella*) dicta, inprimis notabilis, non solummodo latere occidentali sed simul etiam austrum versus, hoc autem latere suavius sensimque descendunt, qua ratione planitiei Huillensis rivi omnes et imo fluvius "*Cacolovar*" qui cunctos pedetentim absorbet, directionem australem sequuntur, fluvio ipso *Cacolovar* demum prope pagum munitum "*Humbe*" in flumen *Cunene* sese effundente.

Lacus [Lusitanis "*Lagoas*"] minoris majorisve extensionis in nulla fere territorii parte desunt, sed in universum in Angola paullo quam in Congo et Benguella frequentiores, omnesque, paucissimis exceptis, in fluminum rivorumque vicinitate siti inveniuntur, eorumque plurimi plantarum aquaticarum, inprimis *Nymphæarum* et *Pistiarum* uberima copia superbientes, *Cyperorum*, praesertim *Papyri* denso agmine marginati, simul *Crocodilorum* et, si profundiores, *Hippopotamorum* deliciae, ast accolarum Europensium sanitatis, pro dolor! inimici. Plerique, et majorum omnes, fluviiis ipsis vel rivis quibus proximis originem suam et, si persistentes, etiam eorum durationem debent, quapropter una cum illis Jove pluvio ampliores, tempore sicco vero valde angustati vel omnino exsiccati, sicque aestate piscatoribus, hyeme contra agricultoribus magnum proventum suppeditantes. Margines enim fere omnium, post aquarum recessum successivum limo relicto laetificati, opimas fructuum agrestium, inprimis *Zea Mayidis*, *Phaseolorum*, *Cucurbitarum* nec non *Arachis hypogaeae* messes largiuntur.

Etiam si territorii Angolensis lacus, imo eorum amplissimi, nequaquam cum illis immensis lacubus comparari possunt, qui in ejusdem continentis plaga orientali cis et trans aequatorem jure celebrantur, ipsis tamen quoad stirpium aquaticarum, quibus ornantur, numerum et varietatem vix inferiores sunt.

Inter illos, quos plantis natantibus praesertim abundantes vel fere omnino oblectos reperi, *Lagoa de Quizembo* in Congo, *Lagoas de Bombo*, de *Libongo*, de *Foto*, de *Quilundo* et de *Quibinda* in Angola, nec non *Lagoa de Giraill* prope Mossamedes et demum *Lagoa Ivantalla* [sive *Yavantalla*] in Districtu Huilla sita, primum locum tenent, omnes non solummodo plantis aquaticis sed simul et aliis, quae eorum ripas palustres vel limo humido tectas inhabitant, ditissimi, et ob stirpium cultarum messes amplas, in eorum areis exsiccatis quolibet anno obtentas, incolis utilissimi. Praeter supra indicatos permulti alii lacus, tam in plaga litorali quam in Provinciae penetralibus siti, nigris ac colonis ejusdem fere utilitatis sunt, inter quos ii, qui juxta ripas fluminis *Cuanza*, intra oppi-

dulum “*Massangano*” et dicti fluminis faucem se extendunt, et numero et amplitudine æque insignes.

Supra commemorata vasti territorii per gradus elevatio, quacum, uti facile intelligitur, etiam imbrium copia increscit earumque duratio protrahitur, dum contra aëris pressio ac soli temperatura sensim diminuuntur, similem quoque vegetationis, qua diversæ elevationis terræ vestiuntur, graduationem sive modificationem provocat, quæ omni peregrinatori e regione inferiore in altiore penetranti, prompte sub oculis cadet, nam non solummodo, herbarum singularum fruticumque atque arborum, quæ tum apparent, ab iis regionis inferioris diversitate indicatur, sed simul etiam agrorum silvarumque diversa indole et vigore, fontium et rivorum numero et frigore aucto, totius demum terrarum ipsorumque habitantium caractere physiognomico mutato interpretatur.

Notabilis hæc naturæ scenarum mutatio, viatori ab ora maritima ad terras internas elatiores progredienti primum ad earum circiter 1000 pedum supra mare elevationem sese manifestat, ubi loco pratorum languescentium virgultorumque sæpius spinosorum nonnisi rarius silvulis clavis interruptarum regionis inferioris modo relictæ propemodum repente prata intensius virentia, herbæ elatiores, fruticeta robustiora et silvæ extensæ arboribus altioribus densiusque sociatis ac frequenter scandentium agmine multiformi ornatis compositæ apparent, nec non rivuli et fontes nunc muscorum amœna viriditate marginati alteram diversam vegetationis regionem annunciant, quæ ad peregrinatorem esurientem, terræ relictæ ardore cruciatum potu refrigerante silvarumque primævarum gratissima umbra beneficiat, et phytologum repentina præsentia complurium stirpium prius non observatarum oblectet. Arbores nunc vastissimæ ac formosissimæ, partim solitariae partim in sylvas densissimas congestæ apparent, inprimis ex ordinibus *Mimosæarum*, *Meliacearum*, *Myrtacearum*, *Myristicæarum* et *Rubiacearum*, et *Palmæ* plures, præcipue *Elais guineensis* et *Raphia* species, formosas suas comas ubique ostendant.

Hæc autem totius fere terrarum circumjacentium indolis immutatio ipsaque silvarum primitivarum magnificentia vix altius quam ad 2500–3000 pedum altitudinem supra oceanum ascendunt; tum enim viator iterum aliam Floræ regionem attingit, non minus generali vestitus vegetabilis sui aspectu quam generum et specierum ibidem occurrentium ab iis præcedentis regionis diversitate indigitatam. Silvæ enim nunc minus densæ et humiliores, pratorum herbæ graciliores arctiusque gregatæ, pascua extensiora et sæpius, modo *Labiatis* vel *Acanthaceis* pygmæis, modo *Orchidearum* terrestrium, *Liliacearum* *Iridiarum*ve floribus fulgidis variegata sese repræsentant, et una cum rivorum fontiumque numero aucto, fruticum quoque atque arborum species mire multiplicantur, ita quidem ut in dato quodam circuitu hujus regionis facile duplus vel hinc inde imo triplus specierum diversarum numerus quam in æquali ambitu regionum inferiorum reperitur. Ast non solum specierum et generum Floram constituentium numerus his locis insigniter auctus invenitur, sed etiam plures plantarum ordines, in terris inferioribus rarissime vel nullibi visi, uti *Santalaceæ*, *Daphnoideæ*, *Proteaceæ*, *Selagineæ*, *Cyrtandreeæ*, et *Ericaceæ*, ceteris stirpibus associatæ obveniunt, sicque alteram tertiam vegetationis regionem, stirpium habitu, numero et indole definitam pronunciant.

Accidit quidem nonnunquam ut species singulæ quædam, terris altioribus peculiare, vel ibidem frequentes, juxta fluminum aut rivorum ripas in regiones inferiores vel

imo ad fluminum ostia usque descendant, sed hoc rarius obvenit, tumque stirpes tali modo migrantes in his locis potius ceu hospites adventicii quam incolæ stabiles considerandæ, et plerumque etiam habitus sui quadam mutatione originem suam denunciant. Sic exempli gratia *Phœnix spinosa* Thon., riparum fluminis *Cuanza* in Districtu *Pungo Andongo* decus formosissimum, hinc inde fere ad limites internos territorii litoralis descendit, sed ibidem, etiamsi fructifera, nana sæpiusque fere acaulis, vel solummodo trunco brevi 1-4-pedali munita permanet. Pari modo etiam Umbelliferarum arbor (*Alvardiæ* spec.) quæ in Districtus *Golungo Alto* silvis primævis trunco ad 25 ped. alto et semipedem crasso vel crassiore occurrit, in territorii litoralis collibus quos hinc inde invadit, solummodo fruticulus vix bipedalem, trunculo fere herbæceo, ægre digitum crasso donatum repræsentat.

Hac stirpium diversarum per tres diversos terrarum elevationis gradus inter limites definitos distributione inductus, etiam tres Floræ Angolensis Regiones phytogeographicas statui posse opinor*, quarum prima *regio litoralis* est†, quæ ab ora maritima ad terras internas circiter 1000 pedes elevatas, nunc longius nunc brevius sese extendit; secunda dein sive intermedia, “*montoso-sylvatica*” denominanda, terras inter 1000 et 2500 circiter pedum altitudinis sitas comprehendens, inprimis silvarum primævarum late extensarum præsentia distincta‡, et denique *regio superior* sive *alto-plana*, quæ omnes illas terras internas amplectitur quarum elevatio supra oceanum 2500 pedes excedit§.

Harum regionum indolis expositionem fusiorem jam olim in commentatione Annalibus maritimis Olissipone editis inserta||, exhibere tentavi, eodemque loco etiam ordinum singulorum fere omnium Floram Angolensem constituentium inter dictas tres regiones distributionem indicare studui, simulque plantarum ab autochthonibus vel colonis in qualibet regione cultarum enumerationem cuivis ordini adducto adnexi, persuasus quod tam totius territorii quam regionum singularum qualitates ac relationes climatologicæ, ex plantarum in una alterave vel in omnibus tribus regionibus majore vel minore abundantia cultarum indice melius tutiusque pateant, quam si istæ solummodo secundum observationes thermometricas, ombrometricas etc. alioquin durante itinere vix sat exacte instituendas interpretentur.

Imbres primi, post hibernum mensibus Junio, Julio, et Augusto regnantem, pluviisque omnino carentem, versus medium vel finem Septembris, veris initium, advenire solent, plerumque, ne dicam semper, inter fulgura et tonitrua summæ vehementiæ de cœlo

* Conf. Journ. Linn. Soc. Lond. 1858, vol. iii. pag. 150 seq., et Diar. ejusdem, 1861, pag. 182 seq.

† Conf. respectu hujus regionis indolis, “Observations on the Origin and the Geographical Distribution of the Gum Copal in Angola,” by Fred. Welwitsch, Journ. Linn. Soc. Lond. vol. ix. pp. 287-302. Necnon: *Sertum Benguellense*, &c. Bearbeitet von Med. Dr. H. Wawra und T. Peyritsch. Wien, 1860.

‡ Quoad arbores notabiliores silvas istas constituentes conf. ‘*Synopse explicativa das amostras de madeiras e drogas medicinaes, &c., collegidas na Provincia de Angola, enviadas a exposicaõ internacional de Londres em 1862, por Frederico Welwitsch.*’ Lisboa, 1862.

§ Conf. “Lettre du Dr. Welwitsch à M. Alph. de Candolle, sur la végétation du plateau de Huilla, et observations de M. de Candolle, à ce sujet,” in Bibliothèque Universelle [Archives des Sciences Physiques et Naturelles], Livr. Juillet 1861.

|| Apontamentos phytogeographicos sobre a Flora da Provincia de Angola, etc., por Fred. Welwitsch. [Annaes do Conselho ultramarino, 1858, n. 55.]

cadentes. Sunt autem hæ pluvie vernaes, etiamsi non raro et inprimis in terris interioribus ad Novembris finem vel Decembris medium repetitæ, nec tam continuæ nec tam copiosæ quam autumnales, quæ mensibus Martio et Aprili adveniunt, quapropter hæ a colonis *pluvie magnæ* [chuvas grandes] et illæ *pluvie parvæ* [chuvas pequenas] nominantur. Quibusdam vero annis pluvie vernaes per longius tempus, etiamsi nequaquam quotidie cadentes, continuantur, simulque autumnales præcocius cadunt, ita ut ab Octobris initio ad Aprilis finem, pluvia paucis tantum hebdomadibus interrupta perdurat, et tum plantarum omnium, ac totius naturæ vegetabilis ubique luxuria summa, sed, pro dolor! etiam inundationes, arva et segetes, pascua et silvas nec non raro domicilia pagosque integros repentino impetu devastantes, præsertim in regionibus inferioribus timendæ. Hoc autem rarius accidit, et in universum cunctæ totius Provinciæ Angolensis terræ, præcipue vero australiores et oceano propiores, magis siccitate quam humiditatis excessu laborant. Perpensa hac imbrium tam in totius territorii ambitu quam in ejus districtibus singulis vicissitudine facile colligitur quod de pluviarum quantitate annua generatim vix aliquid certi ac definiti statui possit.

Idem fere de aëris temperatura valet, quæ in diversis terrarum elevationibus, et in ejusdem elevationis locis nunc ventis magis expositis nunc in vallibus profundioribus reclusis, uti facile expectandum, admodum variat. Generaliter tamen temperatura anni media in regione superiore altoplane, et quidem non ob calorem diurnum, qui ibidem, jugis excelsis exceptis, fere idem, sed ob noctes insigniter frigidiores, ab illa regionum inferiorum 15–20 grad. thermom. F. recedit; in regione superiore secundum observationes plures in Pungo Andongo et Huilla institutis temperatura anni media inter 55° et 60° F., in regionibus vero inferiorioribus inter 77° et 80° F. vacillare videtur, excepto tamen districtu litorali de *Mossamedes*, qui ob ventorum refrigerantium, sæpius ex austro vel austro-occidente flantium accessum liberum, nec non minus ob oceani aquarum ex austri regionibus frigidis affluentium et juxta hæc litora maximo impetu septentrionem versus decurrentium vim moderantem, climate multo frigidiore gaudet, quam hoc in territorio circulum æquinoctialem tangente vel imo pro parte ab ipso incluso, esset expectandum. Hac eadem ex ratione etiam Flora Mossamedensis vix indolem reapse tropicam repræsentat, sed potius subtropicam vel fere Capensem, uti hoc præsentia specierum plurium ex generibus *Juncus*, *Triglochin*, *Ceratogonum*, *Cressa*, *Euclea*, *Mesembryanthemum*, etc., et ipsius *Vogeliæ Africanæ* aliarumque stirpium Capensium frequentia indigitatur, et simul cerealium Europæorum atque *Vitis viniferae* cultura prospera illustratur.

Generalibus hisce de Provinciæ Angolæ constitutione physica et vetegabilium in ejusdem territorio distributione præmissis, pauca quædam adhuc de mensuris et numeri signis adhibitis, nec non respectu nominum locorum natalium specierum describendarum hic adjungere liceat.

Mensuræ hinc inde in specierum descriptione usitatæ, uti et illæ quæ ad terrarum supra mare elevationem spectant, *pedem Anglicum*, in 12 pollices et pollicem in 12 lineas divisum, indicant. Terrarum altitudines methodo thermometrica a cl. Princep* indicata determinare studui, observationibus hunc in finem institutis in eodem loco pluries et non

* Conf. Table for ascertaining the Heights of Mountains from the Boiling-point of Water. By James Princep. London, 1841.

raro etiam ad diversas diei horas repetitis demumque inter se comparatis; valores hacce methodo partos non omnino exactos esse, omnibus notum est, sed ad stirpis cujuscumque loci natalis altitudinem statuendam satis habere veritatis videntur.

Nomina locorum natalium specierum descriptionibus appensa secundum orthographiam Lusitanicam scripsi; sunt autem hæc nomina nunc linguæ Nigritarum illis terris autochthonum omnino propria, nunc Lusitanica, id est a colonis Lusitanicis ibidem introducta, nonnumquam etiam ex ambabus his linguis hybrida, sed jam longo usu vindicata simulque indigenis bene cognita et proinde peregrinatoribus futuris quam nomina scriptis quibusdam vel mappis antiquioribus exarata, duces fideliores.

Nomina vernacula, quibus stirpes quædam vulgariores vel frequentius obvenientes in locis suis natalibus a Nigritis vel colonis designantur, non nisi rarius et caute speciebus singulis adnexi, quoniam ex istorum perplurium, primum sedule collectorum et dein inter se et una cum stirpibus quibus addicta fuerunt comparatorum studio cognovi, eorum plurima nonnisi ambigui valoris, vel solummodo paucis incolis cujusdam loci cognita esse, vel non raro, et imo in uno eodemque loco, stirpibus inter se valde diversis, vel vix habitu aliquantulum similibus attribui.

His missis restat ut viris illustribus qui in conficienda hac commentatione mihi opem tulerunt, gratias meas maximas atque sincerissimas agam, quos inter clarissimi Dr. Jos. D. Hooker, Horti Museique botanici Kewensis omnium amplissimi ac ditissimi Director, nec non Prof. Dan. Oliver, ejusdem Musei custos et bibliothecarius, primo loco prædicandi: viri generosi, eruditione et humanitate æque insignes, quorum benevolento consilio auxilioque efficacissimo, si quid meriti huic scriptulo inhæret, omnimodo et justetribuendum.

Pariter clarissimis viris Joh. J. Bennett, herbarii Musei Britannici præfecto, et Guilh. Carruthers, ejusdem herbarii curatori, pro singulari et semper prompta urbanitate, qua illius herbarii locupletissimi usum mihi faciliorem reddiderunt, me summopere gratum confiteor; lectoris autem benignæ indulgentiæ harum paginarum imperfectiones iterum atque iterum commendo.

DESCRIPTIONES.

Ordo ANONACEÆ.

Trib. III. MITREPHOREÆ, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. p. 21.

MONODORA ANGOLENSIS, Welw. n. sp.* (Tab. I.) Glaberrima, foliis membranaceis vel demum plus minusve coriaceis, obovato- vel elliptico-oblongis, breviter acuminatis cuspidatisve, basi cuneatis, herbaceo viridibus, floribus pendulis, sæpius in ramulis brevibus lateralibus foliiferis solitariis oppositifoliis; sepalis e basi latiuscula lanceolatis crispatis, petalis exterioribus amplis ovatis acuminatis incurvis, lateribus utrinque reflexis, interioribus unguiculatis conniventibus laminis transversim ellipticis

* Primam tam *hujus speciei novæ* quam *Monodoræ Myristicæ*, Dun., olim perperam Floræ Americanæ vindicatæ, in Angola certe indigenæ notitiam jam olim clar. W. W. Saunders in litteris (Loandæ, Sept. 1857) communicavi, denique anno sequente, ambas species in "*Apontamentos phytogeographicos sobre a Flora de Angola*, p. 587," commemoravi.

abrupte cuspidatis basi exauriculatis; fructu ovato-ellipsoideo longitudinaliter sulcis levibus latiusculis percursus.

Habitat in silvis primævis editioribus Distr. Golungo Alto et paullo frequentius in silvaticis rupestribus Distr. Pungo-Andongo ad 2500–3500 ped. altit. A Novembr. usque Januarium florens, Maio-Julio fructificans. *Exsic.* Welw. Iter Angol. n. 774 et 776.

Arbor 20–30-pedalis, coma densiuscula ovoidea, trunco recto ad basim 1–1½ ped. diametri, cortice obiter rimoso aspero nigrescente; rami primarii erecto-patentes, secundarii et ramuli patentissimi cylindracei, juniores et floriferi purpurascens, subdistiche foliati. *Folia* alterna, petiolo brevi 2 lin. longo canaliculato suffulta, obovato- vel elliptico-oblonga, nunc ovato-lanceolata, 4–5½ poll. longa, 2 poll. lata, basi cuneato-angustata, apice abrupte acuminata vel breviter cuspidata, margine integro, penninervia, supra intense viridia nitidula, subtus absque nitore pallide virentia, secundum expositionem arboris nunc membranacea et decidua, nunc plus minusve coriacea et persistentia. *Flores* speciosi, totius ordinis facile elegantissimi, multicolores, suaviter odori, in ramulorum extremorum ramellis abbreviatis solitarii, longius pedunculati, nutantes, demum penduli, pedunculo oppositifolio, gracili, circiter 2 poll. longo, medio bractea ampla, membranacea, herbaceo-viridi, late ovata, vel cordato-ovata acuminata, longitudinaliter plurinervia, semiamplectente, demum decidua munito. *Sepala* a lata basi lanceolata, petalis multoties breviora, herbaceo-viridia, undulato-crispa, a basi supra pedunculum reflexa, longe persistentia. *Petala* (basi semper inter se coalita mox post fecundationem a calyce annulatim soluta et junctim secedentia) tenuiter carnosa, exteriora elongato-ovata sensim acuminata, obtusiuscula, 2–2½ poll. longa, utraque superficie reticulatim scrobiculata, a basi patula arcuatim incurva, lateribus undulato-crispis recurvis, primum e viridi purpurascens basi nivea, demum maculis circularibus rubris, aurantiacis et flavicantibus undique variegata, interiora exterioribus multoties breviora et duplo angustiora, erecto-conniventia, omnino albida vel albedo-rosea, levia, margine plano, spathulata, unguibus latiusculis fere laminæ æquilongis, lamina nunc transverse elliptica, nunc obcuneata abrupte cuspidata, cuspidate obtusiuscula barbulata. *Stamina et gynæcium* generis; antheræ badio-albidæ, loculis contiguæ; pollen albidum. Ovarium bene efformatum, mox post fecundationem verticaliter pluristriatum; stigma nunc integrum peltatum, nunc obscure plurilobulatum vel solummodo obiter radiato-striatum. *Fructus* in pedunculo nunc lignose indurato et incrassato pendulus, suberoso-lignosus, glabriusculus, ovato- vel oblongo-ellipsoideus, 6 poll. circiter longus, 3½–3¾ poll. diametro, basi obtusus, vertice breviter apiculatus, secundum longitudinem sulcis pluribus latis sed parum profundis costisque obiter prominentibus percursus, unilocularis, pulpa farinosa fuscescente semina involvente farctus, indehiscens, vel rima longitudinali apertus. *Semina* numerosa, oblongo-obovoidea, 5–7 lin. longa, ad hilum oblique truncata, mutua pressione non raro varie gibba vel angulata; testa tenuiter coriacea, tenax, levigata, fusco-badia, nitida; albuminis cerasco-carnosi gratissime et fortiter fragrantis lamellæ numerosæ, planiusculæ, æquali fere inter se crassitudine, respectu peripheriæ seminis verticaliter seriatae. Embryo minutus, hilo proximus.

Observatio.—Semina *Monodoræ Angolensis*, uti illa *Monodoræ Myristicæ* ab autochthonibus ob nuclei aroma gratissimum, illud *Myristicæ moschatae* æmulans, nec non ob virtutem egregie stimulantem et restaurantem magni æstimata, hinc inde etiam in condiendis cibis usitata multoque commercio circumvecta, in omnibus mercatoriis Angolensibus prostant et sub nomine “*Xipepe*” vel “*Gipepe*” venduntur. Arbores ipsæ amborum specierum in Angola plerumque “*N-pepe*”, in Insula Sti. Thomæ autem “*Jobo*” nuncupantur. Nomen vero “*Xipepe*” vix idiomatici *Bundico* proprium, sed spurium, et ni fallor, a vocabulo “pepper” (Piper) olim a mercatoribus Anglicis ibidem introducto, derivatum et a Nigritis, commercii gratia, genio linguæ Bundicæ accommodatum.

Trib. IV. XYLOPIÆ, Benth. et Hook. f. *l. c.* p. 27.

XYLOPIA ODORATISSIMA, Welw. n. sp. Arbor parva ramosissima, ramulis pubescentibus, foliis petiolatis coriaceis, ellipticis vel oblongo-ellipticis, obtusis, basi rotundatis, supra glabrescentibus, subtus præcipue in costa piloso-pubescentibus; floribus axillaribus subsessilibus vel breviter pedicellatis solitariis vel 2–3 fasciculatis; calyce trifido lobis ovato-delloideis; petalis exterioribus elongatis, interioribus sæpius paullo brevioribus lineari-subulatis; antheris connectivo truncato leviter dilatato, disco staminifero denique deciduo; ovariis circa 10, pilosis, stylo subulato andrœcium superante, ovulis 4–6; carpellis maturis obliquis, breviter stipitatis, mono- oligospermis, longitudinaliter nervosis glabris.

Habitat frequens in montosis silvaticis editioribus ad plagam australem de Morro de Lopollo Distr. Huilla, inter 5000 et 5500 ped. altit., Decemb.–Febr. florens, Apr. et Maio fructificans. *Ersic.* Welw. Iter Angol. no. 757.

Arbuscula in silvis densioribus circiter 10–15 pedes alta, comæ tunc laxioris forma sat variabili, ramis valde inæquilongis fere horizontaliter patentibus, ramulis extimis vario modo curvis inter arborum vicinarum ramificationes subscandentibus; in declivibus vero apricis petrosisque plerumque frutex 4–6-pedalis, jam paullo supra basim ramosus, ramis erectiusculis, cylindricis, glabris, crebre et patentim ramulosis comulas dense foliosas efformantibus; ramuli juniores et floriferi plus minusve sericeo-pubescentes. *Folia* persistentia, in vivo molliter coriacea, supra halitu glaucescente lætius, subtus pallide viridia, exsiccatione utrinque multo pallidiora et rigidiora, petiolo 2 lin. longo, leviter canaliculato cum ramulo articulato suffulta; lamina $1\frac{1}{2}$ –2 poll. longa, $1-1\frac{1}{3}$ poll. lata, apice obtusa vel rarius subacuminata, basi rotundata vel hinc inde subcordata, subtus inprimis ad petiolum et costam molliter pubescens. *Flores* creberrimi, suavissime fragrantés, ad axillas foliorum solitarii vel plerumque 2–3 fasciculati, brevissime pedicellati, carnosuli, rigiduli, fragiles, extus undique sericeo-tomentelli, primum albidii, demum flavescentes. *Calycis* profunde 3-partiti lobi delloidei, circiter lineam longi, apice apiculati. *Petala* exteriora $\frac{2}{3}$ – $\frac{3}{4}$ poll. longa, obtuse carinata, a basi ovata concava abrupte linearia obtusiuscula; interiora angustiora, paullo breviora et apicem versus subulata, sub anthesi erecto-patula, prompte decidua. *Andrœcium* et *ovaria* descripta. *Carpella* matura 4–8, omnino glabra, nitidulo-rubra, stipite recto 2–3 lin. longo, crassiusculo, subangulato suffulta, nunc monosperma, obovoidea, pisi majoris mole, nunc 2–4-sperma, oblique obovoidea vel claviformia pollicaria, omnia juxta apicem appendice alæformi rostrata.

Observatio.—Stirps ob florum miram copiam eorumque odorem gratissimum, quem late spargunt, inter affines insignis, nec non propter corticem aromatico-amaricantem pharmacographis de futura Africæ tropicæ materia medica scripturis commendanda. Autochthonum illius regionis medici circumforanei (*quibanda* dicti), non semper omnino imperiti, e florum vix apertorum infusione tepida potum parant stimulantem simulque subnarcoticum, de cujus tamen applicatione speciali non edoctus fui.

Ordo VIOLARIEÆ.

Trib. III. ALSODEIÆ, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. p. 118.

ALSODEIA (CERANTHERA) ILICIFOLIA, Welw. n. sp. (Tab. II.) Fruticosa vel subarborescens, glabra; foliis coriaceis, ovali-oblongis, elongatis, acutis, argute et grosse spinuloso-serratis; floribus flavis, brevissime pedicellatis, recurvis, in paniculas angustas terminales folio breviores fasciculatim dispositis; sepalis ovato-ellipticis,

obtusis; petalis obtusis (sepalis subbrevioribus*); tubo stamineo brevi, extus haud producto, antheris connectivo dorsali ovato obtuso, appendicem anteriorem ovalem integram vel emarginatam superante; capsula coriacea, ruguloso-aspera.

Habitat sporadica in rupium convallibus umbrosis Distr. Pungo Andongo, ubi prope Præsidium ipsum, loco dicto "Barrancos de Catete," Febr. c. alabastris et fructu submaturo, Maio denique iterum cum alabastris legi, ad altit. circiter 3500 ped. supra mare. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 889.

Frutex validus, sive arbuscula, 8-12-pedalis, *Ilicis aquifoliae* habitum quodammodo simulans, rigiditate omnium partium insignis, sempervirens. Trunculus rectus cortice cinereo-virescente parum aspero, ligno albido compacto, sæpius jam ad 3 vel 4 pedes altitudinis supra basim ramosus; rami erecto-patuli, laxè ramulosi, cylindrici, adultiores levigati et nitenti-virides; ramuli novelli plus minusve angulati, erectiusculi, firmi et tenaces. *Folia* alterna, breviter petiolata, rigidicoriacea, glaberrima, supra intense viridia, subtus ex albido virentia et prominule venulosa, nunc ovali-oblonga, elongata et acuminata, nunc breviora et late elliptica, penninervia, nervo mediano valido subtus valde prominente, in petiolo firmo erecto-patula; petioli in uno eodemque ramo longitudine variantes, nunc vix semipollicem, nunc plus quam sesquipollicem longi, semiteretes, canaliculati, ad insertionem laminæ dorso gibbi; lamina 7-9 poll. longa, 2-2½ poll. lata, basi breviter angustata vel obtusiuscula, apice acuta vel acuminata, margine argute serrata, serraturis sinu lato obtusissimo sejunctis apice rigido-spinulosis, spinulis 1-1½ lin. longis, subulatis. *Paniculae* terminales, erectæ, angustæ, 5-7 pollices longæ, aphyllæ; pedunculi communis angulati, sub lente tenuiter velutino-pubescentis rami basi bracteis brevibus crassiusculis ovatis muniti, inferiores 1-2 poll. longi, parce ramulosi, erectiusculi, superiores sensim breviores, summi brevissimi. *Flores* (nonnisi in alabastris observati) flavi, ceraceo-carnosuli, pedicellati, juxta ramulos pedunculi per fasciculos pauciflores ⅓-½ pollicis inter se distantes dispositi, ex pedicello ipsis sæpius dimidio breviorè basi bibracteolato, crassiusculo, angulato, arcuatim recurvato nutantes vel fere penduli, vix tres lineas longi. *Sepala* a basi lata ovato-elliptica, erecto-imbricata, concava, obtusissima, margine ciliolata, crassiuscula, rigida, dorso tenuiter pubescentia et sulcato-striata, petalis latiora, in fructu persistentia. *Petala* juvenilia ejusdem fere figuræ ac sepala, sed iis angustiora et breviora. *Stamina* descripta. *Ovarium* glabriusculum; placentæ pauci-(uni-?) ovulata; stylus terminalis, rectus, pro more floris crassiusculus, cylindricus, medio quidquam incrassatus, apice obtusiusculo stigmatosus, staminibus paullo brevior. *Capsula* ovoidea, coriacea, calyce indurato stipata, extus rubro-purpurea, undique rugulis papillisque aspera, elastice dehiscens, 3-valvata, 3-sperma, vel placentæ unius abortu disperma, valvis cymbimorphis sublignosis, medio placentiferis. *Semina* (vix bene matura) subglobosa vel sublenticulari-compressa, diametro longiore circiter 5 lineas longa, pone umbilicum excavatum obtuse rostrata, testa crustacea, levigata, nitidula badio-flavescente. Embryo in albumine copioso axilis excentricus, umbilico approximatus; cotyledones obovato-ellipticæ, planiusculæ, vaginatim conferruminatæ, radícula hilo proxima.

Ordo BIXACEÆ.

Trib. II. ONCOBEÆ, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 125.

ONCOBA WELWITSCHII, Oliv. Flora of Trop. Afr. MS. (Tab. III.) Arborescens, inermis, glabra; foliis membranaceis, longe petiolatis, ovatis, acuminatis, basi late rotundatis; floribus pedunculatis, ad ramulos annotinos vel vetustiores nascentibus 3-5 fasciculatis; sepalis 3 late ellipticis; petalis circiter 10 obovatis longiuscule unguiculatis, sepalis plus quam duplo longioribus; antheris linearibus quam filamenta capillaria multo brevioribus; ovario papilloso-setoso, placentis 5-6; stylo gracili longiusculo

* Flores in nostris speciminibus necdum bene evoluti et solummodo in alabastris anthesi proximis examinati; relatio proinde inter sepala et petala in postero accuratius statuenda.

apice in lobos 5–6 breves patentes diviso, stigmatibus truncatis; capsula ovoidea, dense echinata, 5–6-valvata, valvis intus nudis medio placentiferis post dehiscentiam recurvis; seminibus dense verruculosus.

Habitat sporadica in silvis primævis Distr. Golungo Alto prope Bungo Aquitamba, ad 2300 ped. altit., necnon sub forma fruticis in silvis secundariis circa Sange. Floret Novemb. usque Febr., Martio usque Jul. fruct. maturat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 537.

Arbusecula 12–15-pedalis, hinc frutex vix 8 pedes altus. Truncus in forma arborescente rectus, diametro semipedali, raro crassior, cortice minute rimuloso badio-cinerascente, ligno albido denso, sæpius jam ad altitudinem 4–5 pedum supra basim ramosus, ramis robustis elongatis ascendentibus, infra longe denudatis, apicem versus parce ramulosus; ramuli graciles, patentes, tenuiter sulcati, lenticellis ellipticis obsiti, novelli levigati apice densius foliosi. *Folia* alterna, longe petiolata, ampla, ovata, longe acuminata, supra læte viridia, verniceo-nitidula, subtus pallide virentia, glabra; petioli 3–4½ pollices longi, graciles, patuli, basi obiter canaliculati, ad insertionem laminæ quidquam incrassati et curvati; lamina (in foliis adultis ex apice petioli fere pendula) 6–10 poll. longa, 3–5 poll. lata, margine integro vel obscure repando, basi rotundato-obtusa, apice nunc sensim, rarius abrupte in acumen 1 poll. circiter longum attenuata; stipulæ laterales geminæ, foliaceæ, lineari-subulatae, semipollicem circiter longæ, erectæ, deciduæ. *Flores* polygami, ex speciosissimis inter congeneres, diametro 4-pollicares, quondam in eodem ramo multo minoribus mixti, ad ramulos vetustiores vel imo ad truncum ipsum nascentes, plerumque 3 vel 4 fasciculati, pedunculis 1–1½ poll. longis coloratis basi minute bracteolatis suffulti, evolutione successiva aperti. Alabastra globosa, apiculata, paullo ante anthesim vesiculose turgescientia. *Calyx* tenuiter coriaceus, triphyllus, sepalis æstivatione late imbricatis, concavis, obtuse carinatis, pollicem longis, semipollice latioribus, extus pube minutissima caduca subvelutinis, fusco-rubentibus, demum deciduis. *Petala* 9–12, plerumque 10 vel 11, alba vel albido-rosea, obovato-spathulata, patentia, membranacea; lamina obovata 1–1½ poll. longa, venulis sursum divergentibus percursa, margine integro obiter undulata, sensim in unguem ½–¾ poll. longum compresso-planum 1 lineam latum attenuata, una cum staminibus decidua. *Stamina* numerosissima; filamenta filiformia, ascendentia, albida, pollicem longa; antheræ terminales, intense flavæ, oblongo-lineares, basi subcordatæ, quam filamenta multoties breviora, biloculares, longitudinaliter dehiscentes; pollinis granula globoso-ellipsoidea, levia. *Ovarium* ovoideum, papillis acutiusculis undique echinulatum; ovula juxta placentas parietales 5 vel 6 perplurima; stylus rectus, cylindricus, fere pollicem longus, apice radiato 5–6-lobus, demum indurescens, in fructu persistens. *Capsula* matura globosa vel sæpius ovoidea, undique aculeis rigidulis 1 pollicem longis læte aureo-flavis echinata, tarde dehiscentis, 5- vel 6-valvata, valvis crassis, lignoso-duris, demum arcuato-recurvis, intus nudiusculis, medio placentiferis. *Semina* permulta in pulpa nidulantia, parvula, duabus lineis vix longiora, ovoidea, fuscula, crebre verruculosa, vertice truncato areola in centro umbonata instructa; testa crustacea; embryo rectus; cotyledones planæ, ovatæ; radícula crassiuscula cotyledonum fere longitudine, hilo proxima.

Ordo POLYGALEÆ.

POLYGALA GOMESIANA, Welw. n. sp. (Tab. IV.) Perennis, herbacea; caule erecto 2–5-pedali; foliis lineari-lanceolatis linearibusve, utrinque sæpius angustatis, glabris vel sparse pilosulis; racemis terminalibus amplis multifloris, bracteis bracteolisque membranaceo-scariosis ovato-lanceolatis acuminatis persistentibus, pedicellis patentissimis pilosis; sepalis anterioribus liberis, alis suborbicularibus diametro semipollicaribus, coloratis; capsulis obcordatis, alis dimidio brevioribus anguste marginatis.

Habitat in pratis humidis altius herbidis juxta rivulos Distr. Huilla, frequens circa Lopollo, ad 5000 ped. altit. A Decembr. usque Apr. florens et fructificans. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1032.

Herba elata, radice lignescens oblique descendente, oligocephala, perennans. *Caules* e radicis collo 1-3 erecti, virgati, tri- vel quatuor- rarius quinquepedales, simplices vel apicem versus parce ramosi, cylindrici, obiter sulcato-angulati, pilis raris mox deciduis glabrentes, a basi ad medium densius, supra remote foliati. *Folia* alterna, erecto-patula, subsessilia, plerumque omnino glabra, late herbaceo-viridia; inferiora et media approximata, lineari-lanceolata, $1\frac{1}{2}$ -3 poll. longa, semipollice vix latiora, utrinque sensim angustata, subacuta vel apice obtusiusculo breviter apiculata, margine integro, nervo inprimis subtus ad basim prominulo flavescens percursa; superiora magis distantia, sensimque angustiora, breviora et acutiora, sæpius linearia; floralia sub anthesi plerumque decidua. *Racemi* in caule et ramulis terminales, erecti, stricti, ampli, $\frac{1}{4}$ -1-pedales, multiflori, juveniles bracteis apice densius congestis breviter comosi. *Flores* ex majoribus et speciosissimis totius generis, in pedunculo communi pilis brevibus patulis vestito densiuscule gregati, una cum bracteis, bracteolis pedicellisque amœnissime rosei vel roseo-purpurascens, subnutantes. *Bractea* tenuiter membranaceo-scariosa, 3-4 lin. longæ, ovato-lanceolata, longe acuminata, patula, una cum bracteolis itidem patulis paullo brevioribus obtusioribusque persistentes. *Pedicelli* graciles, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ poll. longi, albido-pilosi, sub anthesi horizontaliter patentes, demum arcuato-deflexi, fructiferi cernui. *Sepala* 5, omnia libera; tria exteriora inter se subæqualia, parva, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa, obovato-elliptica, obtusiuscula, extus sparse pilosa; interiora (alæ) multo majora, lætissime roseo-purpurea, oblique lato-obovata vel fere orbicularia, diametro circiter semipollicaria, ima basi abrupte attenuata, glabra, tenuiter venulosa, obiter convexa, petala occultantia. *Petala* tria, basi inter se et cum staminum vagina concreta; inferius (carina) concavo-galeatum, dorso crista latiuscula intense purpurea profunde bifida auctum, ad verticem leviter emarginatum, ad marginem prope basim utrinque plus minusve profunde sinuatum et pilosum; lateralia quam carina breviora, ovato-oblonga, margine superiore inflexa laxè crispata, ad faciem internam laminæ partis cum vagina staminali connatæ piloso-pubescentia, ad ejusdem partem liberam glabra, verticaliter sursum curvata, apice obtusa vel subtruncata. *Staminum* vagina basi juxta margines piloso-ciliolata; antheræ oblongo-ovoideæ, obiter compressæ, subtiliter puberulæ vel sæpius omnino glabræ, apice oblique truncato biporosæ (septulo parum efformato vel deliquescente?) *uniloculares*. *Pollinis* granula (in una eademque anthera) nunc sphæroidea nunc breviter-ellipsoidea, longitudinaliter costato-striata, sensu directioni costularum contrario et non raro jam intra antheras necdum apertas tubificantia. *Ovarium* obovatum, vertice circa styli insertionem pilosum; stylus compressus latiusculus, medio dilatatus, paullo supra medium arcuatus, ad apicem plus minusve oblique truncatus vel obscure angulatus, anguste stigmatosus. *Capsula* obcordata, rigidulo-membranacea, $2\frac{1}{2}$ -3 lineis vix longior, compressa, anguste marginata, ad apicem nunc pilis raris obsita nunc omnino glabra, disco utrinque bigibba. *Semina* oblongo-obovoidea, circiter $1\frac{1}{2}$ lin. longa, pilosa, vertice areola depressa notata, caruncula pro seminis mole parva; albumen parcum.

Observatio.—Nomine specifico hujusce stirpis elegantissimæ ac culturæ dignissimæ virum saluto, doctrina et urbanitate pariter insignem, clar. Bernard. Ant. Gomes, Med. Doctorem, horti scholæ medico-chirurgici Olissiponensis fundatorem, Floræ fossilis Lusitaniae scrutatorem sedulum, nec non medicum expertissimum, studiorumque meorum fautorem.

Ordo DIPTEROCARPEÆ.

VATICA AFRICANA, Welw. n. sp. (Tab. V.) Frutex vel arbor parva; ramulis novellis tomentoso-pubescentibus, raro glabris; foliis coriaceis, oblongo-ellipticis, obtusis, basi vel obtusis vel anguste rotundatis, nunc subcordatis, supra glabrescentibus, subtus ferrugineo vel albo tomentosis; cymis racemiformibus axillaribus folio brevioribus vel

floribus apices ramulorum versus fasciculatis; sepalis subliberis ovatis obtusis, petalis oblongo-lanceolatis sepalis triplo longioribus; staminibus indefinitis bi- (vel pluri-) seriatis, filamentis filiformibus, antheris ellipticis ovatisve, connectivo breviter apiculatis; fructu globoso subapiculato, calycis fructiferi lobis inter se subæqualibus patentibus oblanceolatis vel oblongo-obovatis, obtusis acutisve, nervis anastomosantibus prominulis grosse reticulatis.

Habitat in silvis et dumetis arenosis Distr. Huilla, inter 4000 et 5500 ped. altit., imprimis frequens ad basim de "Morro de Lopollo." Floret Octobr. usque ad Januar., Apr. et Maio fructificat.

Stirpis hujusce polymorphæ præcipue duæ in Angola mihi obvenerunt formæ, inter se habitu et magis adhuc foliorum indumento diversæ, junctimque vix commode describendæ, quapropter eas hic seorsim tractandas et characteribus utrique peculiaribus limitandas esse existimavi, ut sequitur.

α. denudans. (Tab. V. fig. 1.) Forma plerumque fruticosa, foliis subtus laxe ferrugineo-tomentosis pubescentibusve vel glabratis.

Frutex humanæ altitudinis resinosus, paullo supra basim ramosus, rarius arbuscula vix 8-pedalis, habitu *Grewiæ* speciem æmulans; rami cylindrici, inferiores et superiores breves, medii elongati, patentes, glabrentes, ramulis novellis et florigeris gracilibus subangulatis tomento laxiusculo pubescentibus vel hinc inde furfuraceo tomentellis. *Folia* alterna, petiolata, chartaceo-coriacea, quoad figuram sat varia, plerumque oblongo-elliptica, ad basim et apicem rotundato-obtusa, nunc ad basim angustato-rotundata vel subcordata, ad apicem emarginata, rarius utrinque subangustata fere lanceolata, supra glabrescentia, halitu flavescente virentia, nervis impressis oblique striata, prope basim paullo supra petioli insertionem glandula concava rubra orbiculari vel subelliptica notata, subtus basi ferrugineo-tomentosa vel villosa-pubescentia, aut fere deglabrata æneo-viridia, nervo medio et lateralibus valde prominentibus elevatim costata, inter nervos prominule reticulato-venulosa*; petioli 3–6 lin. longi, cum ramulis articulati, cylindrici, villosa-pubescentes, nunc adultiores glabrentes vel tenuiter verruculosi; lamina 1–2½ poll. longa, ½–1½ poll. lata, ast plerumque pollice angustior. *Stipulae* petiolares geminae, lineari-lanceolatae acuminatae, sub folii evolutione caducae. *Inflorescentia* cymoso-racemosa, axillaris vel spurie terminalis, pedunculo communi tunc ex penultimi folii axilla infra gemmam apicalem evoluta. *Pedunculus*, pedicelli, bracteolæ et calyx villosa-pubescentes. *Sepala* basi breviter coalita, in alabastro linea vix longiora, evidenter imbricata, ovata, obtusa, erecto-subpatula, persistentia, post anthesim sensim aucta. *Petala* oblongo-lanceolata, sepalis duplo subtriplove longiora, sub anthesi patentia, extus tenuissime velutino-tomentella albida, intus flavicantia glabra, solum medio basin versus pilosula, prompte decidua. *Stamina* perplura, ultra 50, circa ovarium annulatim seriata, patula; filamenta gracilia, compressiuscula, plerumque biserialia, albida; antheræ flavæ, connectivo nunc magis producto et robustiore ovatae, nunc illo brevior subellipticae, loculis inter se fere semper magnitudine inæqualibus, introrsum dehiscentibus. *Ovarium* ovoideum, pilosum, tri-, rarissime biloculare, loculis biovulatis; stylus firmulus, rectus, cylindricus, apicem versus parum attenuatus, stigmatibus breviter tri-, rarissime bilobo, lobulis teretibus patulis apice subtilissime fimbriatis. *Fructus* calycis nunc valde aucti fundo insidens, globosus vel ovoideo-globosus, pisi magni mole vel imo paullo major, plus minus pubescens vel subtomentosus, durus, styli basi indurata apiculatus, vix dehiscens, uni-, rarissime bilocularis, mono-, rarissime dispermus; calycis fructiferi sepalia basi breviter coalita in alas subæquales foliiformes

* Facies inferior foliorum, oculis nudis aspecta, tomentosa quidem apparet, et in quibusdam formis revera tomento tenui undique obducta est; sed lente fortius examinata plerumque solum nervi et venularum acies pilis crispulis plus minus dense obsita inveniuntur, areolæ autem e venularum anastomosi ortæ solummodo pilis raris adpersæ vel plerumque centro omnino glabras sese manifestant, id quod in varietate *β. hypoleuca* nunquam observare mihi licuit.

scariose-rigidulas, oblanceolatas, apice obtusiusculo apiculatas, læte rubentes, obiter pubescentes, $1\frac{3}{4}$ poll. longas, 6–8 lin. latas, utrinque elevatim reticulato-venosas expansa. Semina perfecta non visa. Crescit hæc varietas satis frequens in collinis apricis arenosis inter pagum Lopollo et Morro de Lopollo, ad 5000 circiter pedum elevationem; Decembr.–Januar. florentem, Maio demum 1860 fructificantem legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1035.

Observatio.—Stirps, ut videtur, late per Africam austro-tropicam diffusa, a clar. Dre. Kirk (fide spec. herb. Kew.) etiam in Zambesiæ editioribus (Highlands of Batoca-country, Jul.–Octobr. 1860) lecta.

β. hypoleuca. (Tab. V. fig. 12.)

Forma arborea, foliis subtus dense albo-tomentosis.

Arbor parva, 12-pedalis et altior, habitu *Cratægo Ariæ* Linn. non dissimilis, trunco recto, $\frac{1}{2}$ –1 ped. prope basin crasso, coma laxissima, depresso-dilatata; rami patenti-divaricati, crassi, varie curvi, ramulis abbreviatis robustis, apice ad ultimorum foliorum axillas florigeris. *Folia* quoad figuram iis varietatis præcedentis subsimilia, etiam ad petioli insertionem glandulifera, sed omni sensu triplo majora et crassiora, petiolis $\frac{1}{2}$ –1 poll. longis, lamina $2\frac{1}{2}$ – $5\frac{1}{2}$ poll. longa, $1\frac{2}{3}$ – $1\frac{3}{4}$ poll. lata, apice obtuso sæpius emarginata, basi non raro subcordata; juniora utrinque tomentosa, adultiora supra læte viridia et tenuiter pubescentia, subtus tomento denso albido oblecta. *Flores* majores, petala villosa-tomentosa. *Fructus* non observatus. Crescit sporadica et rarior in silvis subumbrosis maxime e *Leguminosis* constantibus ad altit. 4000–4500 ped., inter Mumpulla et Nene, ubi Octobr. 1859 c. alabastris et Decembri cum flore legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1036 [*Vatica hypoleuca*].

Observatio.—Varietas admodum conspicua, extra Angolæ limites hucusque nondum observata, forsán species propria, sed fructu nondum cognito vix bene limitanda. Ceterum monendum habeo, stirpes perennes generatim, et inprimis arborescentes Floræ Huillensis aliorumque districtuum Angolæ et Benguellæ interiorum, ob silvarum incendia a pastori-bus ibidem vagantibus per secula quolibet anno repetita, quoad habitum et variarum partium indumentum maximopere variare, id quod præcipue in variis *Syzygii*, *Parinari*, *Anonæ* et *Fici* speciebus observare licet, quæ in silvis nullo adhuc incendio mutilatis qua arbores proceræ superbiunt, dum eadem species in pascuis proximis post combustionem silvarum enatis (a nobis nomine “*dumeta secundaria*” indicatis) nonnisi sub formis pygmæis, ceu fruticuli humiles sæpius vix palmares sive pedales, ast densis cæspitibus crescentes, et nihilominus hocce in statu læte florentes atque fructificantes occurrunt.

Ordo STERCULIACEÆ.

Trib. 1. STERCULIÆ, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. i. p. 217.

OCTOLOBUS, Welw. gen. n.

Flores unisexuales. *Calyx* campanulatus, tubo subcylindrico limbo octofido; lobi coriacei marginibus late membranaceis induplicatis undulato-crispulis. *Petala* nulla. *Staminum* columna brevis, cylindrica, androphoro elongato-conico tomentoso imposita; antheræ perplurimæ in discum orbicularem vertice depressum connatæ. *Ovarii* carpella perplurima, multiseriata, in capitulum globosum gynophoro brevi impositum conferta, capitulo basi verticillo staminum imperfectorum cincto; carpella turgida, libera, elongato-ovoidea, dense tomentosa, unilocularia; stylus subnullus; stigma sessile obiter bilobum; ovula plurima biseriata. *Carpella* matura 8–10 distincte stipitata, turgida, obovoidea vel

clavata, gibba, rostro obliquo terminata, tarde dehiscentia, 1–3-sperma. *Semina* subglobosa, hilo lato sessilia, testa lævigata, subcoriacea; albumen nullum. *Embryo* subglobosus; cotyledones crassæ, hemisphæricæ; radícula brevissima, inclusa; plumula pilosa.—Arbor Africae tropicæ austro-occidentalis, laxè comosa, ramulis robustis. *Folia* alterna, indivisa, longiuscule petiolata, petiolis apice incrassatis, obovato-lanceolata, obtuse acuminata, obscure sinuata, coriacea, glaberrima. *Stipulae* geminae laterales caducae. *Flores* magni ad ramulos sessiles, subsolitarii, fulvo-villosi. Genus antheris uniseriatim annulatis, albuminis defectu et ovarii loculis pluriovulatis *Colæ*, Schott, proximum et affine, sed calyce constanter 8-fido, coriaceo, carpellorumque numero indefinito sine negotio distinguendum. Species unica.

OCTOLOBUS SPECTABILIS, Welw. sp. n. (Tab. VI.)

Habitat sporadica in silvaticis rupestribus Distr. Pungo Andongo, præsertim prope Præsidium loco dicto “Barranco da Pedra Songue” Jan. 1857 cum flore, Apr. c. fr. legi. *Exsic.* It. Angol. no. 1202.

Arbor 15–20-pedalis, rarius altior, trunco recto, gracili, basi 1–2 ped. circumferentiæ, cortice albido-griseo leviter rugoso, coma laxa sursum dilatata vertice depressa. *Rami* vagi, elongati, erecto-patentes, longe denudati, albicantes, apicem versus parce ramulosi, ramulis patulis, cylindricis, pennæ anserinæ vel hinc olorinæ crassitudine, novellis et junioribus angulato-sulcatis villoque fulvescente mollissimo demum deciduo vestitis, adultis glabris, longitudinaliter rugulosis, albescentibus. *Folia* alterna, versus apicem ramulorum congesta, integra, petiolata, obovato-lanceolata, coriacea, supra læte, subtus pallide viridia, juventute bistipulata; petiolus $\frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{2}$ -pollicaris, angulatus, junior laxè villosus demum glabratus, basi tumescens, subcanaliculatus, apice abrupte calloso-incrassatus, callo subcylindrico 2–3 lin. longo transverse ruguloso, subviscido, modice arcuato ad basim laminæ terminante; lamina utrinque glaberrima, 5–9 pollices longa, 1– $2\frac{1}{2}$ poll. lata, plerumque obovato-lanceolata, nunc, præsertim in ramulorum extremis, lanceolata, basi sensim attenuata, ad insertionem subtruncata, apice obliquo obtusiuscule acuminata, margine integro vel hinc inde obscure sinuato, penninervia, nervo medio basi valido ad apicem usque producto, lateralibus multo tenuioribus in utraque pagina sed subtus argutius prominentibus, versus marginem evanescentibus. *Stipulae* geminae, juxta basin petiolorum laterales, liberae, anguste lineari-lanceolatae, subulato-acuminatae, erectae, rigidulae, 2–3 lineas longae, ad ramulorum novellorum apices comoso-gregatae, caducissimae. *Flores* unisexuales, monoici, apetalæ, sat magni, imo totius tribus maximi, ad ramulos infra foliorum comam apicalem sessiles vel breviter pedunculati, solitarii, vel rarissime 2–3 gregati, bracteis pluribus brevibus, scariosis, late ovatis, extus tomentellis, intus nudis, striatis, demum deciduis, quodammodo calyculati. *Alabastra* globosa vel obovoidea. *Calyx* turbinato-campanulatus, sesquipollicem longus, carnosus-coriaceus, extus undique villosus-tomentosus, villo fulvo-cinnamomeo, post fecundationem deciduus; tubus cylindricus sursum quidquam dilatatus, diametro semipollicari, intus plurisulcatus et papillis minimis cinnamomeo-aurantiacis plus minus dense obsitus; limbi octofidi, æstivatione induplicato-valvati; laciniae lanceolatae, $\frac{3}{4}$ pollic. longae, erecto-patulæ, margine circumcirca membrana latiuscula, tenuiter carnosa, fragili, induplicata, undulato-crispula cinctæ, facie interna papillis tenuibus brevissimis cinnamomeis densissime gregatis velutino-tomentosæ. *Androphorum* anguste conicum, dense tomentellum, una cum staminum columna brevi glaberrima et antherarum disco circiter calycis tubo æquilongum; antheræ numerosæ (25 et plures), rectæ, biloculares, arcte inter se in discum vertice truncatum connatae, singulae fere lineam longae, cinnamomeæ. *Gynæcii* circumscriptione obovoidei carpella perplurima (60–80) pluriseriatim dense congesta, ascendunt, inter se libera, oblique elongato-ovoidea, dense canescentia, unilocularia, biseriatis pluriovulata, ovulis horizontalibus; stigma ad carpellorum apicem oblique sessile, turgidum, obtusum, plus minusve evidenter bilobum, atropurpureum, dense papillosum. *Staminum* imperfectorum basim gynophori annuli ad instar cingentium antheræ liberae, plus minusve arcuatae, dorso connectivo crasso sursum curvato adnatae, illis androphori plerumque breviores, vel varie defiguratae, omnino steriles. *Carpella* matura 6–10, rarius plura,

distincta, stipite 2–4 lin. longo, cylindrico vel subcompresso villosa suffulta, magnitudine et figura inter se inæqualia, obovoidea vel clavata, lateribus subcompressa, ceteroquin turgida, $1\frac{1}{4}$ – $1\frac{3}{4}$ poll. longa, coriacea, oblique vel recurvato-rostrata, extus tomentosa e viridi flavicantia, interna facie plicato-rugulosa denseque resinoso-punctata, unilocularia, 2- rarius 3–4-sperma, tarde dehiscentia. *Semina* subglobosa vel obovoidea pisi maximi mole et majora, hilo latissimo orbiculato vel ellipsoideo sessilia; testa subcoriacea, lævigata, atra vel atropurpurea, nitida, strato interiori tenaci reticulatim fibroso. *Embryo* exalbuminosus, semini conformis, rectus; cotyledones crassæ, hemisphæricæ, radiculam brevissimam obtuse conicam, plumula pilosa superatam, arcute includentes.

Observatio.—Gynæcii structura et configuratio generis præsentis notabilem cum illa quarundam *Anonacearum* offert similitudinem, etiamsi vera affinitas has inter et *Sterculiaceas*, in systemate sub cohorte longius distante militantes, vix, ac ne vix quidem invenienda.

Ordo ZYGOPHYLLÆ.

ZYGOPHYLLUM. Sectio A. FABAGO.

Subsectio a. *Simplicifolia*.

ZYGOPHYLLUM ORBICULATUM, Welw. n. sp. Glabrum, glaucum, fruticulosum, caulis obliquis vel ascendentibus vix sesquipedalibus, crassis, succulentis, rigidis, cylindricis, subflexuosis, ramis patulis, articulatis, ad nodos leviter incrassatis, foliis planis crassissimis, flabellato-orbiculatis vel summis obovato-spathulatis, bene adultis 2– $2\frac{1}{2}$ pollices latis, glaucis, glaberrimis, margine rotundato integris, basi in petiolum brevem cuneato-angustatis, internodiis longioribus, stipulis carnosius ovatis obtusis 3–4 lin. longis, pedunculis geminis (vel ternis!) 3–5 lin. longis, fructiferis pollicaribus, floribus pentameris, calycis tarde decidui carnosuli laciniis obtusis, petalis albis longe unguiculatis, calyce duplo longioribus, stamina superantibus, squamis quam filamenta paullo brevioribus, subliberis, albido-membranaceis, apice fimbriatis; ovario clavato, obtuse 5-gono, stylo staminum longitudine; fructu majusculo late pteroptero, depresso obovoideo, vertice parum emarginato stylo apiculato (axi 9- diametro 7–8-lineari, alis semiobovatis elevatim reticulatis), loculicide 5-valvi, loculis endocarpio solubili 1–2-spermis, seminibus dense foveolatis, raphe ex parte libera.

Habitat frequentissimum in sabulosis et petrosis maritimis Distr. Mossamedes, ex Giraul usque Cabo negro, sæpius in *Zygophylli simplicis*, *Sesuviorum* et *Vogeliæ Africanæ* consortio. Maio–Julio flor., mox et usque ad Sept. fructificat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1637.

Fruticulus dumosus, rigidissimus, 1–2-pedalis, succulentus, quibusdam *Scævola* vel *Crassula* speciebus habitu non absimilis, plagæ maritimæ sabulosæ vel rupestris decus triste. Caules pennæ olorinæ vel hinc inde digiti minimi crassitudine, plerumque tortuosi, lignescentes epidermide tenui flavo-fuscescente facile secedente tecti, nunc oppositi nunc dichotome ramosi. Internodia circiter pollicaria. *Folia* simplicia (anne ceu *phyllodia* consideranda?), inferiora et adultiora, petiolo brevi cuneato excepto, fere orbiculata, diametro non raro bipollicari et majore (lamina $\frac{1}{4}$ poll. crassa, succoso-carnosa, in viva planta, more phyllodiorum *Acaciarum* verticaliter sita), ea ramulorum novellorum flabellato-spathulata, nervis 3–5, solum in folio exsiccato prominentibus percursa et minus glauca; pedunculi 2 vel 3 (rarius sed quondam certe plures ad 5) ex eadem stipularum axilla erecti, fructiferi elongati et patentes. *Calycis* herbaceo-viridis lacinie carnosio-tumidulæ, obovato-oblongæ, obtusæ, concaviusculæ, post anthesin reflexæ. *Petala* flabellata, ungue longo, lateribus integra, apice rotundato

denticulata, nervis purpurascens flabellatim partitis percursa, una cum ungue $3\frac{1}{2}$ –4 lin. longa. *Squamæ* circiter $\frac{2}{3}$ longitudinis filamentorum, filamenta quasi vaginantes. *Ovarium* in disco leviter concavo sessile 5-loculare, ovula in loculis 4 vel 5. *Fructus* plene maturus scarosus, plerumque calyce reflexo suffultus, circumscriptione obovoideus, basi truncatus, vertice quidquam depresso sive emarginato styloque indurato 1– $1\frac{1}{2}$ lin. longo superatus, ad axim usque pentapterus; alæ compressæ, nervo hinc inde evanescente marginatæ, demum ab axi centrali solubiles; loculorum endocarpium solubile, tenuiter pergameum, nitidulum. *Semina* in loculis 1 vel 2, obovato-subreniformia, lenticulari-compressa, marginata, 2– $2\frac{1}{2}$ lin. longa, testa brunnea foveolis alveoliformibus dense obsita.

Ordo BURSERACEÆ.

Trib. I. BURSEREÆ, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. v. i. p. 321.

PAIVAEUSA, Welw. gen. nov.

Flores unisexuales, axillares, apetalæ; masculi subsessiles, plures in capitula involucrata breve pedunculata dense congesti; feminei solitarii vel foliorum abortu subfasciculati, breviter pedunculati.

FLORES MASCULI. *Calyx* subobliquus, profunde 6–8-fidus, laciniis obtusis, erectis, sæpius inæqualibus, æstivatione imbricatis. *Stamina* 6–8 fundo calycis circa discum crenatum inserta, exserta; filamenta filiformia glabra; antheræ breves, erectæ, biloculares, loculis basi subliberis lateraliter dehiscentibus. *Ovarii* rudimentum obsoletum.

FLOR. FEM. *Calyx* maris, sed amplior et basi ad latus externum tribracteolatus. *Ovarium* ovoideum in stylum attenuatum, basi squamulis 6–7 brevibus minutis ciliatis non raro in discum confluentibus cinctum, biloculare; stylus brevis; stigmata duo reniformia; ovula in loculis gemina prope apicem loculi septo inserta, pendula. *Fructus* (immaturus) pedunculo elongato tribracteolato et calyce persistente stipatus, ovoideus, longitudinaliter bicostulatus, stigmatibus persistentibus terminatus, tomentosus; epicarpium coriaceum bivalve; putamen chartaceum incomplete biloculare, pyrenibus 1–2 in quoque loculo; pyrenes ossei, compressi, membrana carnosulo-mucosa obducti, ex apice columellæ centralis funiculo crasso penduli, liberi, monospermi. *Semen* loculo conforme, inversum, compressiusculum, testa membranacea, endopleura solubili. *Albumen* 0. *Cotyledones* rectæ, planæ, late obcordatæ, ad radiculae insertionem emarginatæ, tenuiter membranaceæ, virides; radícula brevis, recta, cylindrico-conoidea, obtusiuscula, supera.

Arbor parva Africæ austro-tropicalis, coma laxa ramulis crassis tuberculato-cicatratis, cinerascens, gemmis novellis rufo-tomentosis. *Folia* ad apices ramulorum patentia, longe petiolata, digitato 5-foliolata, foliolis subsessilibus lanceolato-vel obovato-oblongis obtusiusculis integerrimis cum petiolo articulatis, coriaceis, subtus tomentosis. *Flores* parvi, inconspicui; feminei subsolitarii, masculi numerosi cymoso-fasciculati, cymis in capitula densa bracteis involucrata contractis.

Genus insigne sed valde anomalum, *Burseraceis* quidem absque fere dubio adnumerandum, ast nulli ex generibus cognitæ arcte affine, imo ab omnibus hucusque descriptis floribus apetalis, cotyledonibus omnino planis foliisque digitatim 5-foliolatis longius distans, et probabiliter novæ inter tribum *Burseracearum* sectionis typus. *Calyx* 6–8-fidus una cum staminibus 6–8 prope marginem disci insertis et inæqualibus necnon pyrenes liberi aliquam cum genere *Protium* affinitatem indigitant; petalorum defectus forsitan ex cymularum perplurium arcta condensatione florumque singulorum mutua pressione explicandus.

Dicatum est genus hocce clarissimo domino Barão do Castello de Paiva, botanices in Academia Portensi Professore, Faunæ malacologicæ Maderensis etc. fortunato exploratori.

Species unica :—

PAIVAEUSA DACTYLOPHYLLA, Welw. (Tab. VII.)

Habitat in silvis parum densis siccioribus Districtus Huilla, ad 5000 ped. circiter altitud., inprimis inter pagum Lopollo et flumen Monino, ubi specimina c. flore et alia cum fructu immaturo legi Februario 1860. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 452.

Arbuscula 8–15-pedalis, aspectu *Vitidis* speciem quodammodo referens, trunco recto $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$ ped. diametri, cortice aspero late rimoso, cinerascens vel fere nigrescens, coma laxiuscula sursum dilatata; rami patuli arcuato-ascendentes, crassi, rigidissimi, fere cinerei, undique foliorum delapsorum cicatricibus in tubercula aspera elevatis obsiti, sæpius varie curvi vel tortuosi, parce ramellosi, ramellis crassiusculis abbreviatis, novellis fulvo-sericeis vel rufo-tomentosis, apicem versus foliiferis. *Folia* patentia, alterna, longe petiolata digitato-5- rarius 3- rarissime 7-foliolata, paullo ante florescentiæ periodum decidua; petioli 2–3 pollices longi, rigidi, subteretes, molliter sericeo-tomentosi, basi tumescente cum ramulo articulati, apice subcompresso-dilatati; foliola penninervia, obovato-oblonga, nunc fere lanceolata vel lineari-oblonga, apice obtusa vel rarius breviter acuminata, basi sensim angustata, subsessilia vel breve petiolulata, cum petiolo communi articulata, supra, inprimis juniora, pube tenui adspersa pallidevirentia, juxta costam mediam densius pubescentia, adulta fere glabra et nitidula, subtus nervo mediano crasso pinnatim venuloso percurta, dense molliter tomentosa, tomento primum ex albido cinereo, demum flavo-fuscescente; foliola 3 superiora inter se subæqualia, $2\frac{1}{2}$ –5 poll. longa, $1-1\frac{2}{3}$ poll. lata, intermedium longius petiolulatum, infima duo reliquis duplo triplove breviora angustioraque et plerumque sessilia vel brevissime petiolulata. *Flores* dioici, versus apicem ramulorum axillares, nunc foliorum summorum lapsu vel abortu spurie terminales, utriusque sexus apetalæ. *Masculi* plures 30–∞ minuti ad pedunculi communis perbrevis crassiusculi cylindrici apicem carnosio-incrassatum [quasi anthodium fingentem] sessiles vel uno alterove brevissime pedicellato, subcymuloso-fasiculati, densissime in capitulum involucretum congesti; involucrum obliquum 6–8-lobum, lobis ovato-oblongis vel suborbicularibus, florum capitulo fere dimidio brevioribus ipsoque adpressis. *Calyx* viridescens, sæpius obliquus, plus minusve profunde 6–8-fidus, laciniis erectis, æstivatione imbricatis, lineari-oblongis vel spathulatis, inæquilongis, etiam latitudine inter se non raro variantibus, dorso, inprimis apicem versus, barbulatis, margine ciliolatis, intus nudis. *Stamina* 6–8 circa basim disci crenulati parum elevati, ob mutuam florum pressionem sat polymorphi inserta, calycis laciniis longiora; filamenta filiformia, compressiuscula, glabra, albida; antheræ erectæ, filamentis multo breviores, paullo supra basim insertæ, flavæ, loculis turgidis, minute glanduloso-punctatis basi subliberis, latere dehiscentibus. *Ovarii* rudimentum rarissime minimum, plerumque nullum. *Flores feminei* quam masculi multo ampliores, nunc solitarii, rarius folii unius alteriusve abortu 2–3 fasciculati, subsessiles vel breve pedunculati, rigidi. *Calyx* maris sed ipso multoties major et crassior, minus profunde et plerumque 6-partitus, dense rufo-tomentosus, intus glaber, basi tribracteolatus, bracteolis calycis laciniis similibus, pariter rufo-tomentosis sed iis multo brevioribus. Squamulæ ovarii basim cingentes sæpius in anulum disciformem confluentes, minutæ, tenuiter ciliatæ. *Ovarium* ovoideum, æque rufo-tomentosum, calycis limbum erecto-patulum parum superans; stigmata turgida fusco-purpurea. Cetera ex caractere generis.

Ordo MELIACEÆ.

Trib. MELIÆ, Hook. et Benth. gen. pl. i. 330.

NAREGAMIA ALATA, Wight et Arn. β *Africana*, Welw. Forma vel, si mavis, varietas, a specie typica in Wight Icon. Pl. Ind. Orient. i. tab. 90 depicta, et in ejusdem auctoris Prodr. Floræ Penins. Ind. Orient. i. 116, descripta, *caulibus* et *foliis calycibusque hirtulo-pubescentibus* nec non calycis lobis *latioribus* fere *deltoideo-ovatis acutiusculis* discrepans.

Habitat in arenoso-humosis subumbrosis juxta margines silvarum pro maxima parte e *Macrobii* et *Pterocarp*i speciebus consistentium Distr. Pungo-Andongo, ad 3100 ped. circiter altit. supra mare, imprimis ad sinistram rivi Lutete. Ineunte Octobr. cum fl. lecta. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1301.

Suffrutex humilis, subcæspitose crescens, totius *Meliacearum* Ordinis stirps minima, ast floribus pro more permagnis ornata, habitu quodammodo *Turrae* speciem pygmæam referens; rhizoma repens vel oblique dependens, pennæ corvinæ vel rarius anserinæ crassitudine, dure lignosum, tortuosum, fibris lateralibus tenacibus stipatum, collo pluricipite. *Cauliculi* 2–3 vel interdum plures, 1–3 pollices alti, teretes, subsimplices, basi nudiusculi, superne pubescentes, foliis alternis paucis (5–8), superioribus in eorum axillis flores gerentibus vestiti. *Foliorum* trifoliolatorum petioli 3–6 lin. longi, anguste alati pubescentes; foliola subsessilia obovata, apice rotundato integra vel obiter emarginata, rarius ovato-acuminata, omnia facie utraque pubescentia et margine dense ciliata. *Pedunculi* axillares petiolis subæquilongi, erecto-patuli, puberuli, sæpius bi- triflori, pedicellis bracteolatis inæquilongis, lateralibus abbreviatis plerumque flores abortientes gerentibus, intermedio longiore, calycem versus quidquam dilatato et flore perfecto terminato. *Calyx* vix lineam longus, pubescens hirtulusve; corolla 1–1½ poll. longa, splendide alba, parum sed suaviter odora; petala anguste spathulata longe unguiculata apice obtuso concaviuscula, sub prima anthesi conniventia, demum apice patula. *Antheræ* quidem sæpius 5, ast hinc inde etiam 6, et in uno flore imo 7 observavi, earumque appendiculæ fere semper latiores et obtusiores quam in speciminibus Indicis herbarii Kewensis, ab ipso clar. Wight collectis. Ceteroquin stirps Angolensis quoad characteres essentielles et habitum omnino cum specie Indica convenit, novumque Floræ Indiæ Orientalis cum Tropicali-Africana nexus argumentum sistit.

Ordo HAMAMELIDEÆ.

MYROTHAMNUS, Welw. gen. nov.

Flores dioici spicati; spicæ amentiformes squamis unifloris.

FLOS MASC. *Perianthium* nullum. *Stamina* 4–8, sæpius 5; filamenta brevissima in stipitem brevem basi squamæ insertum concreta; antheræ magnæ, basifixæ, oblongo-quadratae, loculis adnatis, rimis lateralibus dehiscentibus, connectivo in rostrum subulatum breviter producto. *Ovarii* rudimenta nulla.

FLOS FEMIN. *Perianthium* nullum. *Staminum* rudimenta nulla. *Ovarium* sessile, squama longius, oblongo-ovoideum, obtuse trigonum, tricarpellare, trilobulare, apice trilobum, carpellis apice in stylos breves recurvos subspathulatos intus late stigmatosos productis; ovula numerosa, angulo interiori loculorum biserialim inserta. *Capsula* coriacea, ovario similis, sed pauco turgidior, carpellorum apice divaricato intus dehiscente, polysperma. *Semina* minuta, ovoidea, oblique pendula, funiculo brevi, hilo vix conspicuo, testa tenuiter coriacea, raphe tenui; albumen copiosum carnosum. *Embryo* minutus, albumini immersus, oblongus, cotyledonibus brevissimis, radícula brevi crassa.—*Fruticulus* 1–3-pedalis, rarius frutex 6–7-pedalis, Africæ australis tropicæ et subtropicæ, balsameo-resinosus, rigidus, virgatus, glaberrimus, a basi ramosus, ramis ramulisque strictis oppositis, petiolis stipulisque persistentibus subspinulosis. *Folia* opposita brevissime petiolata, cum petiolo articulata, coriacea, flabellato-cuneiformia, subacuta, apice crenato-dentata, longitudinaliter plicato-nervosa, in petiolum brevem latiusculum subvaginantem angustata; stipulæ parvæ, subulatae, in apice vaginæ petioli sitæ. *Spicæ* strictæ, cylindraceæ, erectæ, ramulos breves crebros terminantes.

Myrothamnus flabellifolia, Welw. Apont. phytogeogr. Angol. p. 578, nota 8 (1858).

Cliffortia? *flabellifolia*, Sond. in Harvey et Sond. Fl. Cap. ii. 597 (1862).

Planta exogena anomala, &c., Thomson in Append. ad Speke, 'Journ. of the Discovery of the Source of the Nile,' p. 468 (1863). [Clar. Dr. Thomson solum pl. masc. vidit.]

Genus summopere curiosum ast quoad ordinem, cui subscribendum, quidquam dubium, secundum acutissimi Hook. fil. sententiam *Hamamelideas* inter et *Saxifragaceas* ambi-
guans. *Hamamelideis* tamen affinius videtur. Habitu hinc *Tetracarpæam Tasmanicam* Hook. fil. (*Saxifragacea*) illinc quasdam *Myricæ* vel *Cliffortiæ* species simulat, a quibus tamen florum, inprimis femineorum, et fructus forma longius distat. A *Saxifrageis*, cum quibus genus nostrum notis non paucis, et præcipue gynæcii structura trimera, ovulorum numero et situ nec non albumine copioso congruit, tamen floribus strictim dioicis, absentia omnis perianthii et disci, staminibus denique basi in stipitem concretis nec liberis et, quod forsitan non omnino prætervidendum, succo balsameo-resinoso omnium partium differre videtur. A *Rosaceis*, quas inter planta nostra *Spiræarum* tribui gynæcii fabrica aliquantulum accedit, nihilominus ob flores dioicos, calycis et corollæ defectum, staminum numero diminuto et albuminis copiosi præsentiam excludenda erit.

Juxta systematis Endlicheriani principia genus *Myrothamnus* prope *Salicineas* collocandum esse videtur, quocum ordine floribus unisexualibus, absque ullo perianthio, in amentis ramulos terminantibus dispositis, staminum numero variante et filamentis inferne coalitis, carpellorum stigmatumque dilatatorum structura, eorumque ovulis numerosis, succo denique balsameo, in quibusdam *Populi* speciebus pariter obvio, et quodammodo etiam habitu et vitæ tenacitate convenit, etiamsi imo hac in vicinitate ob ovarium trimerum, albumen copiosum et folia opposita anomalum genus remanet.

Species unica.

MYROTHAMNUS FLABELLIFOLIA, Welw. *l. c.* t. viii.

Habitat in dumetosis rupestribus editoribus Distr. Pungo Andongo, inprimis in Serra de "Pedras de Guinga" inter 3000 et 4000 ped. altit., nec non in Distr. Huilla ad 5000–5500 ped. altit. loco "Morro de Lopollo" dicto. Decembr. Jan. floret; Apr. Maio fructificat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1278 et 1279.

Stirps singularis fruticulus sistit plerumque 1–3-pedalem, sed in editis Distr. Huilla etiam humilem vidi et prostratum, *Salicum alpestrium* more Lichenum Muscorumque cæspitibus incumbens; e contrario, expositione et solo magis faventibus semper erectus crescit et altitudinem multo majorem attingit; sic in Distr. Pungo Andongo, ubi in rupibus giganteis "Pedras de Guinga" dictis circa earum summa juga ultimam et fere unicam vegetationem fruticosam offert, frequens ceu frutex 5–7-pedalis occurrit, trunco interdum prope basim circumferentia 3–5-pollicari. *Cortex* cinerascens, longitudinaliter late lamellosus, lamellis tenuibus facile secedentibus. *Lignum* album, densum, durum, grate aromaticum. *Rami* inferiores pauci, distantes, medium caulis versus frequentiores et densiores ramulisque crebre ramellosis decussatim oppositis, strictis, virgatis, novellis quadrangulis læte purpurascens, adultioribus cylindricis et cinereis, $\frac{1}{2}$ –1 pollicem inter se distantibus, ad apicem usque foliosis. *Folia* 5–7 lineas longa, 3–4 lin. lata, quoad figuram descripta apice plus minusve profunde dentata [dentibus 3–10, sæpius 6, obtusis vel acutiusculis, apice glandula terminatis], tempore humido erecto-patula, flabellatim expansa, utrinque glauco-viridia, durante autem hieme sicco arcte plicata et convoluta, brunneo-nigrescentia, et ramulis strictim adpressa; petioli semiamplectentes, longe decurrentes, superiore parte carinati, apice excepto adnati et internodium vaginantes, adultiorum foliorum lamina delapsa, a ramulis subsoluti et una cum stipulis induratis per

longius tempus persistunt, demum per lamellas secedunt ramulosque denudant. *Spicæ* utriusque sexus amentiformes, in ramellis lateralibus crebris abbreviatis foliosis terminales, strictiusculæ, graciles, $\frac{2}{3}$ –1 pollicem longæ, ad $1\frac{1}{2}$ –2 lin. latæ, cylindraceæ, obtusiusculæ, masculæ fere semper omnino rubentes, femineæ virescentes. *Squamæ* florigeræ lato-ovatae, obtusiusculæ, basi subcordatæ, rachin semiamplectentes, per paria oppositæ, concavæ, dorso obiter carinatae, herbaceo-virides vel leviter rubentes, margine subscariosæ, quoad substantiam subcoriaceæ et rigidulæ, illæ florum masculorum staminibus fere æquilongæ, dum quæ flores femineos stipant, ovario multo breviores. *Stamina* 4–8, sæpius 5, basi squamæ inserta, sub anthesi ob squamam patulam exserta; filamenta perbrevia, supra libera, basi in stipitem brevem coalita; antheræ ex aurantiaco rubentes, loculis valde turgidis, post dehisceniam late hiantibus exsiccato-induratis; pollen intense flavum. *Ovarium* herbaceo viride; stigmata atropurpurea, dense papillosa. *Ovula* in quoque carpello 12–16, quorum tamen perpauca plenam maturitatem attingunt, nam sæpius solummodo 2–5 semina in capsula dehiscenite inveniuntur. *Capsula* $1\frac{1}{2}$ lin. longa, lineam lata, stylis induratis persistentibus tricornis, trivalvis, valvis (carpellis) apice hiantibus, interne juxta suturas omnino solutis, unilocularis, pleiosperma. *Semina* etc. descripta.

Observatio.—Stirps in vivo admodum elegans et ob aroma gratissimum quod spargit, apud Nigritas Angolenses nomine “*Cachinde candange*” ceu *tonicum* validum celebrata, per Africam austro-tropicam, ut videtur, late diffusa, a celeb. peregrinatoribus Speke et Grant etiam ex Africa centrali [6° lat. austr.], sed solum floribus masculis adlata, a clar. Zeyher quoque trans Cancrum, in interioribus territorii Capensis [Magalisberg], ast solum modo sterilis, lecta.

Vis vitalis fruticis hujus ingens est; per anni dimidium enim, nempe a Maio ad Octobrem, imbribus tum omnino deficientibus solis ardore adustus, in statu quasi exsiccato perdurat, foliis nunc arcte convolutis, induratis, ramulo strictim adpressis, nigrescentibus siccisque, imo digitorum tritu facile pulverizandis, fere emortuus adparet, patriæ suæ ardentis tristis imago; ast statim primas post pluvias vernaes omnimodo reviviscit, foliorum nunc de novo viridum flabella expandit, sicque læto virore ornatus flores fructusque progignit.

Ordo COMBRETACEÆ.

Subordo I. COMBRETEÆ.

CACOUCIA, Aubl. nec Walp.* [Schousbœa, Willd. nec Schum.]

CACOUCIA PLATYPTERA, Welw. n. sp. *C.* fruticosa, scandens, hinc arbuscula stans, ramis patentibus, elongatis, arcuatis, ramulisque rigidis cylindricis juventute pubentibus; foliis oppositis v. rarius alternis, coriaceis, glabris, lucidis, breviter petiolatis, oblongis, ovatis v. ovato-lanceolatis, integerrimis apice sensim v. abrupte in cacumen obtusum productis, basi breviter attenuatis, rotundatisve v. subcordatis; racemis ad ramulos laterales et apices caulis terminalibus, amplis, elongatis, subdensis, undique sericeo-tomentosis, strictis; bracteis flore evoluto plus quam dimidio bre-

* *Cacoucia cordifolia*, Walp. Rep. ii. p. 68, certe non est *Combretacea*, sed *Euphorbiacea*, et probabiliter *Alchornea* species, a Schum. Descr. of Guin. Plant. ii. p. 223 [edit. separ.] sub nomine “*Schousbœa cordifolia*” descripta. Beat. Schumacher l.c. expressis verbis affirmat *Schousbœam* suam a genere homonymo Willdenovii *diversam* esse, et ab ipso institutam, quoniam Willdenovii *Schousbœa*, lege prioritatis, generi “*Cacousia*,” Aubl., ceu *synonymum* subscribenda.

vioribus; tubo calyceino obtuse pentagono, limbo intus ad basin disco carnosus cupuliformi margine libero 5-plicato fasciculatimque piloso vestito; fructu membranaceo late 5-alato, circumscriptione, alis inclusis, ellipsoideo-sphærico, diametro sesquipollicari, alis æqualibus, semiorbicularibus, levigatis, chartaceo-rigidulis, transverse striolatis, singulis medio 8–9 lin. latis, margine obscure denticulato-vel crenulato-ciliatis, nucleo lineari-oblongo, medio tumidulo verticaliter impositis.

Habitat in Districtus Golungo Alto dumetosis altioribus juxta margines silvarum primitivarum, imprimis in Serra de Alto Queta, ad 2000–2300 ped. alt. Floret Aprili, Maio; fructificat Aug., Sept. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1752.

Caulis primarius rectus, cylindricus, cortice e viridi cinerascens sublevigato, ad altitudinem 3–5 ped. nudus, mox inordinate elongato-ramosus, ramis plerumque sursum arcuatis, vetustioribus glabris e viridi purpurascens, ramulis oppositis, novellis pube albido-sericea obtectis. *Folia* majora una cum petiolo $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ -pollicari basi plerumque plus minusve curvato 5 pollices longa, 2–2 $\frac{1}{4}$ poll. lata, perennantia, utraque facie et inprimis supra valde nitentia, intensissime viridia, rigidula, subtus paullo pallidiora, costa valida elevatim semicylindrica percursa, penninervia, reticulatim venosa, non raro in eodem specimine opposita vel alterna, rarius ternatim verticillata. *Racemi* spicæformes, validi, substricti, elongati, robustiores pedales vel etiam sesquipedales, nunc simplices nunc basi patentim ramosi, subdensi, undique, id est inclusis bracteis, calycibus et dorso petalorum, tomento sericeo, in vivo albido, exsiccatione demum ferrugineo vel fusciscente obducti. *Bractee* florum inferiorum perfecte evolutorum calycis medium vix attingentes, lanceolatæ, acutatae, demum deciduæ. *Flores* speciosi, demtis staminibus longe exsertis pollicares vel paullo longiores, amœnissime roseo-coccinei, breve pedicellati, sub plena anthesi plus minusve patentes, subcarnoso-rigiduli, in racemos ambitu cylindrico-conicos apicem versus densiores dispositi. Tubus calycinus, ovarium obducens, obtuse pentagonus, vix 2 lin. longus, lineam latus, medio tumidulus, supra ovarium abrupte in limbum (demum caducum) tubuloso-campanulatum, modice arcuatum, intus pilosulum dilatatus, ore 5-fido, lobis deltoideis erecto-subpatulis; discus fundum limbi calycini ovario insidentem vestiens, carnosus, cupuliformis, adnatus, ore libero 5-crenato, crenis plicæformibus obtusis, læte flavis, glandulas fingentibus, apice fasciculatim barbatis. *Petala* ovata vel ovato-lanceolata, brevissime unguiculata, calycis lobis parum longiora, abrupte acuminata, intense coccinea, carnosula, dorso pube albida, in vivo vix sine lente perceptibili, demum rufescente vestita, planiuscula et recta. *Stamina* 10, calycis limbo prope medium inserta, longe adnatim decurrentia, alterna altius adnata, omnia longe exserta; filamenta filiformia juxta tubi calycini directionem curva, æstivatione inflexa; antheræ cordato-ovoideæ, dorso ad emarginaturam fixæ, intense flavæ. *Ovula* plerumque 4, ex apice pendula. Stylus filiformis, staminibus vix brevior, stigmate subtruncato vel rarius tenuissime lobulato. *Fructus* adolescentes primum lineari-oblongi, dein oblongo-ellipsoidei, una cum alis, illo tempore adhuc brevibus, flaccidis et margine subundulatis carnosuli et ex albido virentes, solummodo versus ulteriorem maturationis periodum formam in diagnosi notatam coloremque roseum et rigiditatem chartaceam acquirunt. *Fructus* maturi corpus, demtis alis, elongato-ellipsoideum, obtuse pentagonum, utrinque æqualiter attenuatum, membranaceo-fibrosus et subspongiosus. *Semen*, a me non nisi in speciminibus siccis examinatum, fructus cavitati pentagonæ conforme, aliquantulum compressum, circiter 9–10 lin. longum, testa membranacea laxiuscula fusca. *Embryonis* recti cotyledones crassiusculæ, carnosæ, convexo-planæ vel subsemicylindricæ, anguste oblongæ, obtusæ, dorso convexo longitudinaliter paucisulcatæ, interna facie plana levigatæ, apicem versus quidpiam concavæ ibidemque marginibus breviter inflexis semivaginatim conjunctæ. Radicula perbrevis obtuse conica.

Stirps perbella, sempervirens, ob fructus pro more amplos et colore roseo insignitos in statu fructifero non minus quam in florifero decora, inter Combretaceas Angolæ et forsân Africæ totius facile

formosissima, quodammodo florum *Alois arborescentis* spicas fulgidas frutici lucide frondoso impositas exhibens; nunc ad arbores vicinas altius scandens, nunc sub forma arbusculæ 6–8-pedalis laxè comosæ in dumetis silvas densas cingentibus hinc una cum *Bandeiræa speciosa* et *Dalhousiea bracteata* superbiens, illinc in *Camoënsiæ maximæ* et *Eureiandræ formosæ* societate fruticeta adornans et una cum socialibus indicatis Adonistis admodum commendanda.

Observatio.—Species typica hujus generis *Tropico-Americana*, *Cacoucia coccinea*, Aubl. Plant. Guian. i. p. 450, t. 159, habitu cum nostrate *Africana* fere omnino convenit, sed præter alias notas inprimis fructu coriaceo pentagono exalato facile a nostrate distinguenda.

Subordo II. GYROCARPÆ (Benth. & H. f. Gen. Pl. i. p. 689).

ILLIGERA PENTAPHYLLA, Welw. n. sp. *I.* caule basi lignescente, obiter angulato, sparse hirtulo, late scandente, ramis patentibus elongatis, junioribus cano tomentellis; foliis sparsis longe petiolatis, digitatim quinquefoliolatis, foliolis breve petiolulatis, ovatis, oblongo-ellipticis vel ovato-lanceolatis obtuse acuminatis, basi rotundata subemarginatis, margine integerrimis, utrinque glabris, juvenilibus crebre pellucido-punctatis, adultis coriaceis, intense viridibus, subtus pallidis, inter nervos pilis adspersos venis atropurpureis elevatim reticulatis, sub lente dense punctulatis; floribus laxè cymosis, in paniculas axillares et terminales foliis longiores dispositis, pedunculo, cymarum ramulis bracteolisque et calycis tubo dense cano tomentellis; petalis calycis lobos herbaceos subæquantibus sed iis angustioribus et flavescentibus, sub anthesi stellatim patentibus; fructu rigide chartaceo, corpore elongato-ovoideo subcompresso-4-gono, utrinque attenuato, late verticaliter bialato, alis circiter 15 lin. altis et sesquipollicem latis, rotundato-obtusis, planis et dense transversim paralleli-venosis.

Habitat in Districtus Golongo Alto editoribus de “Serra do Alto Queta” juxta oras silv. primitivarum, sed sporadica. Nov.–Decbr. florens, Martio–Maio fructificans. *Exsic.* Welw. It. Angol. no. 1753.

Frutex parum alte lignescens, sempervirens, habitu et crescendi modo varias *Cissi* vel *Vitis* species eximie æmulans. *Caulis* primarius cylindraceus, mox ad 2 vel 4 ped. altitudinis in ramos 6–15 pedes longos divisus. *Rami* paullo supra foliorum axillas oriundi, late patentibus, parum angulati, tenuiter dense sulcati, etiam adultiores hinc inde pilis raris adspersi, petiolorum reflexorum ope vel ipsorum torsione spirali per arborum vicinarum coronas scandentes vel ex iis penduli; ramuli novelli et inflorescentia tota, calycis limbo petalisque exceptis, tomento plus minusve denso, canescente, exsiccatione demum rufescente obducta. *Petiolii* circiter 2 pollices longi, rigiduli, basi gibboso-incrassati, initio recti, horizontaliter patentibus, demum deorsum flexi, medio non raro bis terve spiraliter intorti, apice paullo incrassato in petiolulos quinque circiter 3–5 lineas longos, canaliculatos, juxta excavationem hirtulos, cum petiolo articulatos, fere umbellatim dispositos divisi. *Foliola* quoad laminæ figuram inter se æqualia (terminale tamen ceteris majus, paullo longius petiolulatum, circiter 3 poll. longum, medio 2 poll. latum), penninervia (nervo mediano costisque utrinque binis tribusve arcuatis inferne prominentibus, apicem versus sensim evanescentibus), supra intensissime lucido-viridia, subtus multo pallidiora, juxta nervos pilis raris rectis rigidulis obsita, margine integerrimo obiter reflexo. *Panicula* laxæ, pyramidatim thyrsoidæ, terminales, non raro sesquipedales, axillares breviores. *Pedunculus* communis obtuse angulatus, aphyllus, ramis fere horizontaliter patentibus, ad insertionem tumidis, inferne longius nudis, a medio ad apicem usque ramulis cymuligeris, pluries dichotome partitis, extremis basi bractea elongato-ovali munitis, vestitus. *Pedicelli* brevissimi cum flore articu-

lati ibidemque bracteolis tribus ovato-lanceolatis, tubum calycis longitudine vix superantibus, patulis vel recurvatis instructi. *Florum* sub plena anthesi diameter transversalis circiter semipollicaris vel saltem 5-linearis. *Calycis* tubus oblongus, rectus, linea una vix longior, obtuse tetragonus, dense canescens, supra ovarium abrupte in limbum subcampanulatum, carnosulum, glabrescentem, herbaeco-viridem, $2\frac{1}{2}$ –3 lin. longum, fere ad basin 5-fidum (in alabastro late ovoideum) dilatatus, laciniis sub anthesi stellatim patentibus. *Petala* calycis laciniis æquilonga sed iis angustiora, acutiora, tenuiora et pallide flavescentia, basi pilosula. *Staminodia* ad externam cujusvis filamenti basim gemina, in alabastro late ovata, obtusa, filamentis paulo breviora, in flore expanso angustiora, subspathulata, dorso obiter excavata, filamentis multoties breviora, turgidula, albida. *Filamenta* filiformia, firma, pubescentia; antheræ amplæ, adnatæ, oblongo-clavatæ; loculi oppositi connectivo crassiusculo læte purpureo apice obtuso separati, valvulis modice convexis, flavis, rigidulis, oblique *extrorsum* [nec uti in Laurineis *sursum*] flexis dehiscentes; pollinis granula intense flava, pro more sat magna, sphæroidea et undique tenuissime echinulata. *Disci* pilosi glandulæ in pluribus floribus oblitteratæ, vel saltem mihi non conspicuæ. *Ovarium* generis. *Stylus* staminibus vix longior, inferne cylindricus puberulus, apicem versus infundibuliformis, hinc latere fissus, limbo reniformi-dilatato margine incrassato undulatoque stigmatoso. *Fructus* plene maturus, inclusis alis transversim $3\frac{1}{4}$ poll. latus, $1\frac{1}{2}$ poll. altus, subsiccus, rigidus, fusco-badius, corpore [drupa] spongioso-coriaceo, elongato-ovoido, compresse tetragono, angulis facierum brevissime vel vix alatis, lateralibus vero in alas amplas supra descriptas extensis. *Semen* e cylindrico subcompressum, circiter semipollicem vel 7 lineas longum, testa membranacea. *Cotyledones* rectæ, crassæ, amygdaloideo-carnosæ, fere semicylindricæ, 5 lin. longæ, interna facie concaviusculæ, *evidenter petiolatæ*, radiculam superam, retractam, acutiuscule conicam, plumula sat conspicua coronatam amplectentes.

Observatio.—Omnes sex *Illigeræ* species hucusque descriptæ aut indicatæ [De C. Prod. xvi. p. 250] vel Indiæ orientalis peninsulam, vel insulas Java, Sumatra et Timor inhabitant, omnesque a specie supra proposita Tropico-Africana foliis *tri-* nec *quinquefoliolatis* sine negotio distinguendæ. In eodem territorio distr. Golungo Alto, sed locis humidioribus magisque umbrosis varietas obvenit, a forma supra descripta foliolis duplo longioribus nec tamen latioribus sed basi evidentius emarginatis discrepans, ceteris autem characteribus omnibus optime cum forma typica conveniens.

Ord. PASSIFLOREÆ.

I. BASANANTHE (Peyr. in Schlecht. Bot. Zeit. 1859, p. 101, et in Wawra und Peyr. Sert. Benguel. p. 29.)

CHARACT. REFORMATUS.—*Flores* hermaphroditi. *Calyx* profunde 5-partitus, tubo brevi explanato, limbi laciniis lineari-oblongis, obtusiusculis, campanulatim conniventibus vel patulis. *Petala* 5, linearia, calycis laciniis subæquilonga, iisque angustiora. *Corona* membranacea simplex, filamentosa. *Gynophorum* cupulare, breviter stipitatum, stipite simplici vel annulo carnosio cincto. *Stamina* 5, basi ovarii inserta, filamentis hypogynis filiformibus; antheræ lineari-oblongæ, sagittatæ, apice obtusæ, connectivo non producto. *Ovarium* ovoideum, sessile, basi attenuatum; stylus gracilis, mox trifidus, cruribus filiformibus, stigmatibus capitellatis. *Ovula* 3 placentis totidem inserta. *Capsula* ovoidea, subcoriacea vel crustacea, 3-valvis, 3-sperma. *Semina* oblongo-subreniformia, compressa, testa scrobiculata, uno latere tenuiter marginata, arillo nullo, funiculo crasso elongato arcuato.

Herbæ perennes vel suffrutices graciles, in regni Benguellæ littore nec non interioribus editis hucusque observatæ, a basi ramosæ, caulibus ascendentibus vel decumbentibus, undique glaberrimæ. *Folia* alterna, petiolata, cordata vel lanceolata, serrata. *Stipulæ* subulatæ vel filiformes. *Cirrhi* proprii

nulli, nisi pedunculorum in caulis parte inferiore frequenter abortientium cruribus, apice obtuso glanduliferis, bracteolisque setiformibus induratis et varie incurvis instructis, repræsentati. *Flores* axillares pedunculati, in pedunculo bifurco gemini vel rarius solitarii, albidii, suberecti vel nutantes, pedicellis 3-bracteolatis. *Fructus* penduli. Genus floribus hermaphroditis et corona filamentosa *Eu-Passifloreis*, placentis autem pauciovulatis et habitu, quodammodo *Tryphostemati*, Harv., simili, *Modeccarum* Tribui accedens, inter ambos, uti optime monuit clar. generis auctor, intermedium. Duæ hucusque mihi cognitæ species: typica nempe, ob characteris specifici expositionem huc inserenda, et altera nova, mox infra exponenda.

1. *BASANANTHE LITORALIS*, Peyr. Sert. Beng. p. 30. Suffruticosa, 1–2-pedalis, a basi ramosa, ramis virgatis arcuato-ascendentibus, simplicibus vel medio patenti-ramulosis, foliis membranaceis, petiolatis, lanceolatis, basi in petiolo utrinque papillis elongatis fimbriato decurrentibus, apice mucronatis, margine acute serratis; pedunculis bi-, rarius unifloris, erecto-patulis; pedicellorum bracteolis verticillatis, calycis laciniis petalisque sub anthesi stellatim expansis. Descript. uberior apud Peyr. *l. c.*

Habitat in arenosis maritimis breve dumetosis inter urbem Benguella et flumen Catumbella, præcipue ad dextram rivi Maribondo, ubi Junio 1860 floriferam et fructiferam legi. In eodem fere loco a cl. Wawra mense Januario c. flore et fr. lecta fuit. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 872.

Observatio.—Specimen typicum hujus speciei examinare non mihi licuit, ast mea specimen cum descriptione auctoris optime congruunt, notis solummodo minoris momenti, ex. gr. petiolorum fimbriis etc. discrepantia.

2. *BASANANTHE NUMMULARIA*, Welw. n. sp. (Tab. IX.) Herbacea, basi suffruticulosa, vix palmaris, caulibus cæspitosis decumbentibus crebre ramulosis, ramulis ascendentibus foliosis, foliis chartaceo-rigidulis, breve petiolatis, cordato-suborbiculatis, basi in petiolo canaliculato breviter decurrentibus, apice rotundatis vel emarginatis, margine undique dentato-serratis, pedunculis arcuatim deflexis uni-, rarius bifloris, bracteolis pedicellorum subalternis, calycibus petalisque sub anthesi campanulatim conniventibus.

Habitat in pascuis breve herbidis, subarenosis District. Huilla, non procul a Lopollo, inter 5000 et 5500 ped. alt.; mensibus Januar. et Febr. c. flore et fructu legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 871.

Herba perennis cæspitosa, vix palmaris, glaberrima, e glauco virescens. Radix carnosio-fibrosa, digitum fere crassa, cylindrica vel subfusiformis, multiceps, plerumque oblique descendens, infra in fibras paucas elongatas, terram profunde penetrantes partita. Caules numerosi, basi nudiusculi, angulati, decumbentes, mox in ramos graciles 3–5 pollices longos, ascendentes vel erectos, subflexuosos, obiter angulatos, dense foliosos divisi, cæspites non raro semipedalis diametri et latiores formantes. *Folia* alterna, approximata, petiolis $1\frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{2}$ lin. longis suffulta, utrinque glaucescentia, carnosula, rigidescentia, cordato-orbicularia vel subreniformia; lamina semipollice paullo latior, apice plus minus emarginata vel rotundata, basi in petiolo canaliculato breviter decurrens, circumcirca inæqualiter dentato-serrata, dentibus nunc acutis nunc obtusioribus, omnibus mucronulatis, nervo medio et lateralibus divergentibus subtus magis prominulis. Stipulæ geminæ, filiformes, gracillimæ, petiolo æquilongæ vel ipso paulo breviores, erecto-patulæ, longius persistentes. *Pedunculi* axillares 2–4 lin. longi, plerumque bifurci, inferiores fere semper abortientes, cruribus tunc in apice truncato glandulifero bracteolis subuliformibus varie flexis coronatis; superiores, crure uno sæpius abortiente, plerumque uni-, rarius biflori, nutantes, pedicellis basi articulatis et tribracteolatis, bracteolis subulatis,

alternis vel sæpius approximatis, patulis. *Calycis* herbaceo-viridis tubus brevissimus ima basi gibberosus; laciniae lanceolato-oblongæ, obtusæ, sub anthesi campanulatim conniventes, 2-2½ lin. longæ, dorso nervis tenuibus parallelis percursæ, intus e viridi flavescentes. *Petala* lineari-oblonga, calycis laciniis paulo breviora iisque dimidio angustiora, albida, tenerrima, una cum calyce (in fructu) marcescenti-persistentia. Coronæ tenuiter membranaceæ tubus filis biserialibus, iis seriei internæ basi deorsum appendiculatis, dimidio brevior. Gynophori cupularis stipes brevissimus, crassiusculus et simplex. *Stamina* petalis subbreviora; antheræ lineari-oblongæ, basi sagittatæ, lobis obtusis, in filamentis subulatis erectæ, apice obtusæ vel leviter emarginatæ. *Ovarium* basi attenuata subsessile. *Ovula* 3, e funiculis longiusculis, medio placentarum trium insertis, demum ascendentibus pendula. *Stylus* staminibus altior, profunde trifidus, cruribus æquilongis erecto-patulis, apice capitellatim stigmatosis. *Capsula* ellipsoidea, basi calyce emarcido cincta, pendula, 3½-4½ lin. longa, crustacea, levigata, e badio flavesceus, 3-2-sperma. *Semina* pro more capsulæ et totius plantæ sat magna, oblongo-subreniformia, compressa, funiculo crasso arcuato suspensa, testa fusca seriatim scrobiculata, latere convexiore membranaceo-marginata.

Observatio.—*Basananthe litoralis* habitu *Sauvagesiam erectam* simulat, dum *Basananthe nummularia* habitum *Violæ* æmulat, adeoque genus hoc affinitatem inter *Passifloreas* et *Violarieas*, ab Endlichero aliisque auctoribus, inprimis ex fructus structura indicatam, etiam habitu ambarum specierum indigitat.

II. MACHADOA, Welw. gen. nov.

Flores hermaphroditi. *Calycis* tubus infundifuliformi-campanulatus, limbi 5-lobi lobis coriaceis obtusis, patentibus, imbricatis. *Petala* 5, basi calycis inserta et eo inclusa, ligulata, apice dentata. *Stamina* 5, hypogyna, filamentis filiformi-subulatis, basi breviter connatis, processibus totidem alterna; antheræ lineares, connectivo subulato breviter producto. *Ovarium* breviter stipitatum, oblongum; stylus brevis, integer, stigmatate capitato, trilobo; ovula ∞ placentis tribus biserialiter inserta. *Capsula* longius stipitata, e calyce erecto pendula, obovoideo-oblonga, obscure trisulcata, polysperma. *Semina* ovoideo-oblonga, compressa, testa scrobiculata; embryo non visus.

Herba glaberrima, radice crassa fusiformi, caule tereti, erecto, brevi, parce ramoso. *Folia* anguste lineari-lanceolata, utrinque angustata, integerrima. *Stipulæ* parvæ, subulatæ, petiolo adnatæ. *Cirrho* nulli. *Flores* inter minores, in racemos breves axillares pauciflores dispositi, pedunculis bracteatis, bracteis subulatis, pedicellis articulatis.

Genus *Modeccæ* absque dubio affine, attamen ab ipsa inprimis floribus hermaphroditis, styli indivisi stigmatate capitato, glandularum demum coronæ vices gerentium absentia et habitu alieno differt. Dicatum est memoriæ beati Joach. Januarii de Saldanha Machado, de horticultura inter Olisiponenses optime meriti.

Species unica:—

MACHADOA HUILLENSIS, Welw. (Tab. X.)

Habitat in collinis breve dumetosis atque petrosis subsiccis territorii de Huilla, ad 5000 ped. circiter altitudinis, non procul a Lopollo, ubi socialem cum variis *Daphnoideis* et *Irideis* Decbr. 1859, c. flore et fructu necdum bene maturo legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 865.

Herba perennis, erecta, omnino glabra. *Radix* crasse fusiformis, intus dense farcta, sublignosa, inferne fibris paucis simplicibus elongatis stipata, perpendiculariter terram penetrans. *Caules* e colo radice pauci, 1-3, recti, palmares vel pedales, penna corvina paulo crassiores, obiter sulcati, e livido virescentes, vix ramosi, juniores jam a basi, fructiferi solummodo apicem versus foliati. *Folia* alterna, remotiuscula, tenuiter carnosa, rigidula, e livido glaucescentia, integerrima, elongato-lineari-lanceolata, 4-5 pollices longa, medio ad duas lineas lata, apice longe acutata, basim versus in petio-

lum brevem angustata, secundum nervum medium parum prominentem longitudinaliter plicata, subtus inter nervum et marginem transverse venulosa, patula, hinc subfalcata. *Stipulae* breves subulatae, petiolo utrinque adnatae. *Flores* axillares, in racemo breviusculo depauperato erecti, $3\frac{1}{2}$ lin. longi, breviter pedunculati, pedunculis cum pedicellis vix lineam longis, articulatis. *Calycis* extus e flavo rubescentis modice carnosus et subcoriacei lobi oblongi, obtusi, margine membranaceo cincti, duo interiores magis concavi et margine crispuli, sub anthesi erecto-patuli. *Coronae* sive glandularum in fundo calycis vestigium nullum. *Petala* ligulata, apice denticulata, albida, tenerrima, calycis lobis alterna iisque multo breviora. *Stamina* petalis paulo breviora; filamenta erecta, subulata, basi in annulum brevissimum connata, cum denticulis singulis, quam filamenta ipsa dimidio brevioribus, alternantia. *Antherae* lineares, basi obiter cordatae, sinu fixae et erectae, apice connectivo subuliformi superatae. *Ovarium* et *stylus* generis. *Capsula* e calyce erecto marcescenti-permanente pendula, pro more plantae sat magna, obovato-ellipsoidea, ultra pollicem longa et plus quam semipollicem lata, coriacea, flavicans, levigata, trisulcata, sulcis cum costis tribus parum prominulis alternantibus, apice obtuso styli residuo apiculata, polysperma. *Semina* ovoideo-oblonga, modice compressa, uno latere marginata, testa fuscescente, seriatim scrobiculata, perfecte matura non visa.

Observatio.—Habitum omnino erectum plantae nostrae, inter *Passifloreas* rarius obvium, quod attinet, hoc loco observare liceat quod, saltem in Africa tropica, plures plantarum ordines, qui in regionum inferiorum silvis umbrosis humidisque e speciebus fere semper scandentibus componuntur, in regionibus elevatis et in apricis solo macro, arenoso-petroso donatis, speciebus vel harum varietatibus habitu erecto insignibus repraesentantur. Sic, exempli gratia, *Ampelideae*, quarum species numerosae in silvis primitivis Districtus Golungo Alto et vicinis omnes scandentes sunt, in regione Huillensi, ad 6000 fere ped. supra mare elevata, plures species *caule omnino erecto* vix unquam scandente offerunt. Idem inter *Cucurbitaceas* de generibus *Heterosicyos* et *Acanthosicyos*, mox infra describendis valet, nec non de *Gloriosa abyssinica*, quae, in editioribus Districtuum Pungo Andongo et Huilla non rara, tantum non *Gloriosae superbæ*, Linn., formam vel, si mavis, varietatem *erectam* sistit; *Clematides* etiam, quae in regionibus inferioribus et silvaticis humidis omnes scandunt, in Districtibus elevatis speciebus erectis repraesentantur, et pariter *Dilleniacearum* genus *Tetracera* in Angolae inferioris silvaticis species sat late scandentes, in regione autem elevata interiore, speciem humilem, caule erecto vel ascendente insignem offert.

Ord. CUCURBITACEÆ.

Subordo CUCURBITEÆ.

I. ACANTHOSICYOS, Welw. gen. nov.

Flores dioici? Masculi solitarii vel fasciculati. *Calycis* tubus turbinatus, limbi quinquefidi lobi breves, crasse coriacei, sæpe inæquales, late ovati vel suborbiculares, apice cornei vel ungue corneo terminati. *Petala* quinque, coriacea, sulcata, obtusiuscula, ima basi cohærentia. *Stamina* tria, calycis faucibus inserta; filamenta breviter libera; antherae exsertae, unica unilocularis, ceterae biloculares, connectivo dilatato, sinuato, loculis sigmoideo-flexuosis. *Ovarii* rudimentum nullum. *Flores* feminei ignoti. *Fructus* globosus, corticatus, polyspermus. *Semina* breviter oblonga, tumida, testa crustacea levi. *Frutex* Africae tropicae et subtropicae occidentalis, erectus vel ascendens, rigidus, a basi ramosissimus, foliis ad squamas reductis aphyllus, *Ulicem* vel *Salsolam* quodammodo referens, ramis ramulisque divaricatis, sulcatis, spinis geminis (? stipulis in spinas abortientibus) horridus. *Flores*

tomentosi, in axillis foliorum squamiformium inter spinas subglomerati, mediocres, inexpansi tantum visi. *Fructus* diametri Aurantii vel majores, edules.

Species unica :—

ACANTHOSICYOS HORRIDA, Welw. n. sp. Tab. XI. A et B.

Habitat in desertis sabulosis maxime aridis ad austrum territorii Mossamedensis prope Cabo negro (16° L. a.) ubi, inter “Porto Pinda” et Pagum Nigritarum “Caroca” dictum, ad 10–15 mill. distantiam ab oceano, Septembre 1859 frequentem ast parce florentem vidi. Similibus locis hæc eadem stirps in terris Numacensibus (Namaqua Land) et in interioribus de Whalfish Bay a cel. peregrinatoribus Anderson, Baines, et Chapman, observata fuit. *Exsic.* Iter Angol. no. 806.

Plantæ juvenilis, nunc in horto Kewensi cultæ, cauliculus palmaris est, simplex et rectus, sed jam hac ætate spinularum paribus, squamula parva suffultis, pollicem circiter inter se distantibus obsitus, dum basi adhuc foliis cotyledonariis spathulatis, crassiusculis, margine integerrimo leviter revolutis, pollice paulo longioribus onustus. *Planta* adulta, qualis in loco natali a me observata, plerumque 2–3-pedalis, caule erecto vel ascendente, sed hinc inde etiam 5-pedalis et altior evadit; dum nempe individua plura agmine densiore crescentia, ventorum vehementia arena volatili obteguntur, nihilominus vegetationem continuant, ramulis extimis suis stratum sabulosum perforant, statimque ramificant et cæspites plus minus densos et extensos efformant, qui demum, arenæ accumulatione sæpius repetita monticulos arenosos sistunt, 5–7 ped. altitudinis et 15–30 ped. circumferentiæ, undique ramulis spinosis matricis sepultæ horridos. Sed hoc de vivendi modo plantæ singularis dictum sit. *Caulis* patentim ramosissimus, tenacissimus, cylindricus, pennæ olorinæ crassitudine, profunde plurisulcatus, ceteroquin levigatus, pallide virescens, hinc inde flexuosus, succo viscido resinoso scatens, qui circa ramorum basin exsudans ibidemque inspissatus, gummi elastici speciem æmulat, colore tamen intense aurantiaco insignis. Rami et ramuli alterni, subvirgati, extimi pubescentes. *Folia* squamiformia, cauli adpressa, crustacea, ovata, vix lineam longa, apice cornea, plerumque cito decidua, in eorum axilla ramos emittunt, ad basim utrinque spina recta, subulata, sulcata, apice cornea, semipollicem longa, rigida et patente (stipularum vel cirrhorum vices gerente?) suffultos. *Ramuli floriferi* 2–5 pollices longi, erecto-patuli, tomento laxo undique obducti. *Flores* in axillis foliorum sæpe abortientium inter spinas geminas subsessiles, singuli vel plerumque glomerato-fasciculati, extus cano tomentosi, nobis solummodo in alabastris visi, quoad magnitudinem pro more ordinis mediocres. *Calycis* crasso-coriacei tomentosi lobi sæpius inæquales, duo vel tres eorum ovati, ceteris vel suborbiculatis apice obtuso cartilagineo-marginatis, vel obcordatis cum unguiculo corneo emarginaturæ inserto; rarius omnes 5 inter se inæquales, et tum a lata basi ovato-acuminati, vel apice obtuso corneo-unguiculati. *Corollæ* lutescentis petala basi (in alabastro saltem) subcoalita, late ovata, obtusiuscula, extus tomentella, intus levigata et obscure striata. *Staminum* filamenta carnosa, flabelliformia, ad basim internam pilis tenuibus hyalinis articulatis barbulata; antheræ descriptæ. *Fructus** (pepo) globosus, aurantiacus, quoad magnitudinem secundum soli et expositionis diversitatem inter pomi Aurantiæ et ovi Struthionis molem varians, vertice depressiusculo calycis rudimentis apiculatus, cortice crustaceo 1 lineam circiter crasso, levigato sed verrucis distantibus hemisphæricis, in centro aculeo recto breviter conico acutiusculo armatis obsito, demum irregulariter rumpente, pulpa aurantiaca grate acidula, semina numerosa involvente, farctus. *Semina* latiuscule oblonga vel subellipsoidea, 6–7 lineas longa, 4–5 lineas lata, ex albido pallide flavescentia, faciebus turgida, circiter 2½–3 lin. crassa, basi suboblique truncata, margine obtuso, solum basim versus magis prominulo cincta; testa levigata, suberose crustacea; endopleura tenuissima, albescens,

* Tab. XI. B. *Fructus* maturus exsiccatus, una cum seminibus et pulpæ fragmentis nuper ab ill. peregrinatore Alfred B. Wollaston ex Namaqua Land adlatus fuit, et a clar. Frid. Currey, F.R.S., Secr. Linn. Soc., mecum benevole communicatus.

diaphana, demum a testa solubilis. Cotyledones semini conformes, oleoso-pingues, facie externa tumidulæ levigatæ, interna subplanæ ast sulcis 3-5 latiusculis obtusis longitudinaliter percursæ; plumula parum conspicua; radicula brevis, late conica, quidpiam compressa, apice suo hilum attingens.

Observatio.—Stirps omni respectu memorabilis et habitu suo ab omnibus hucusque cognitis Cucurbitacearum speciebus omnimodo discrepans, a Nigritis per ista deserta errantibus *Nara*, *M-nara* sive *Naras* dicitur, et ab ipsis ob fructus satis ampli pulpam succoso-carnosam grate acidulam nec non propter semina edulia summo jure magni æstimatur. Ob vivendi modum in arenosis, vitæque ipsius tenacitatem, qua climatis ardentissimi efficientiæ fortiter resistit, stirpis hujusce cultura etiam colonis Europæis Africæ tropicalis maximopere commendanda, nam planta ipsa, e seminibus sat facile educanda, ad solidandas arenas volatiles inprimis idonea videtur, dum ejus fructus hominibus sub cælo fervente degentibus jusculum grate refrigerans simulque pluribus animalibus pabulum jucundum præbent. Monendum tamen est pulpam hujusce peponis, majore copia ingestam, nauseam causare nec non dolores prurientes faucium excitare, quod quidem ego non expertus sum, sed hic juxta relationem peregrinatorum supra laudatorum refero.

II. CORALLOCARPUS, Welw. gen. nov.

Flores monoici, masculi ad apicem pedunculi elongati aggregati, feminei sessiles vel breviter pedicellati, solitarii vel aggregati.

MASC. *Calycis* tubus late campanulatus; lobi 5, breves. *Corolla* 5-partita, segmentis ovato-oblongis.

Stamina 3, tubo calycis inserta, filamentis brevissimis; antheræ glabræ, integræ vel 2-partitæ, unica unilocularis, ceteræ biloculares, loculis rectis, connectivo simplici vel denticulato, ultra loculos producto. *Ovarii* rudimentum nullum vel minutum.

FEMIN. *Calyx* et corolla maris. *Staminum* rudimenta nulla vel minuta. *Ovarium* ovoideum, rostratum, 1-3-loculare; stylus rectus, disco basi nullo, stigmatibus 3-, rarius 2-4-lobato. *Ovula* in loculis pauca, horizontalia. *Bacca* carnosa, ovoidea vel ellipsoidea, obtusa vel rostrata, basi operculatim dehiscens, parte inferiore coriaceo-carnosa, oligosperma. *Semina* obovoidea, tumida basi plus minus truncata. *Herbæ* Africæ et Asiæ tropicæ, scandentes vel prostratæ, subscabrulæ v. subtomentosæ. *Folia* rotundata vel cordata, lobata vel palmata. Cirrhi simplices. *Flores* minuti. Genus, quoad florum structuram et habitum, *Rhyncho carpæ* absque dubio affine, sed fructus dehiscentia valde distinctum, duas species Africanas et tres Asiæ tropicæ includit, hic infra post speciem typicam breviter enumerandas.

CORALLOCARPUS WELWITSCHII, Hook. fil. MS. Tab. XII.

Rhyncho carpæ Welwitschii, Naud., Ann. Sc. Nat. ser. 4, xviii. p. 198, t. 10 (planta culta).

Habitat non infrequens in dumetis arenosis maritimis Districtus Loanda, circa urbem Loanda et prope Cacuaço, ad varios frutices scandens, per totum fere annum, maxime mensibus Januar. et Febr. florens et fructificans.

Herba glaucescens, radice juvenili fibrosa, mox circa ejus colum et caulis basim infimam fusiformi-vel napiformi-incrassata perennans. *Caulis* gracilis, succulentus, glaberrimus, 5-8-pedalis, inferne subangulatus, simplex, demum parce et distanter ramosus, late scandens, ramis carnosulis, rigidiusculis, fragilibus, subteretibus ramulisque flagelliformibus ad nodos geniculatis, glaucissimis, fructiferis non raro aphyllis et dependentibus. *Folia* petiolo 1-2-pollicari suffulta, lamina 2-2½ pollices longa, 1-3 poll. lata, quoad figuram et indumentum nec non respectu coloris sæpe in

uno eodemque individuo mirum in modum ludentia; nunc fere simplicia cordato-ovata, basi subinæqualia, margine repando-dentata vel breviter lobata, apice acuminata vel obtusiuscula; nunc palmato-3-5-loba, lobis lateralibus divaricatis, obtuse bilobulatis, medio magis producto et latiore breviter acuminato, vel obtuso et cuspidato; hinc inde in aliis individuis profunde quinquepartita lobis elongatis, lineari-lanceolatis, repando-dentatis, apice cuspidatis; nervo in facie superiore laminæ parum, subtus vero magis prominulo et pilis brevibus rigidis aspero; indumentum denique foliorum secundum plantæ expositionem et ætatem nunc pilis densis rigidulis scabrum vel papuloso-asperum et cinerascens, nunc (præsertim in umbrosioribus) velutino-pubescentis et coloris glaucescentis; in ramulis demum extimis, hyeme sicca fructiferis, folia fere omnia abortiunt, ramulique ipsi aphylli, solum fructibus coralliformibus onusti, solito crassiores fiunt et fragiliores, nec non ad nodos evidentius geniculati et eximie glaucescentes. *Cirrhi* simplices, elongati, demum arcte spiraliter torti. *Flores* crebri, in ordine ex minutissimis, e viridi pallide flavescentes, masculi et feminei coaxillares. *Fl. masculi* in pedunculo circiter pollicari crassiusculo, erecto-patuli, apice 3-6 cymulatum gregati, brevissime pedicellati; calycis campanulati lobi ovato-lanceolati, patuli; corollæ segmenta late ovata, obtusiuscula, margine tenuissime ciliata, erecto-patula, calycis lobis latiora et longiora; antheræ subsessiles, una connectivo simpliciter apiculato unilocularis, ceteræ connectivo apice denticulato biloculares, loculis rectis, turgentibus. *Rudimentum* germinis vix ullum. *Fl. feminei* nunc solitarii et subsessiles, nunc 2-3 gregati, uno alterove tunc quidpiam longius pedicellato, pedicello crassiusculo, firmo et erecto; calyx et corolla maris sed paullo majores. *Ovarium* oblongo-ovoideum 2-, rarius 3-, rarissime 1-loculare, loculis pauciovulatis. *Stylus* firmulus, sursum modice incrassatus, stigmati 2-3 vel imo obscure 5-lobulato, lobulis patulis obtusis, ciliolatis, intus stigmatosis. *Baccæ* elliptico-ovoideæ, $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ poll. longæ, intense rubræ vel coccineæ, molliter carnosæ, apice obtuso calycis et corollæ limbo exsiccat coronatæ, paullo supra basim a pedunculo nunc incrassato-dilatato operculatim secedentes. *Semina* in pulpa viscidula subhyalina nidulantia, obovoidea, tumida, fuscula, margine tenui, versus basim truncatam incrassato cincta, faciebus minute et seriatim transverse squamulata.

Observatio.—*Corallocarpi* generi denique ceu species subscribendæ sunt:—1, *Æchmandra epigæa* Arn.; 2, *Æchmandra conocarpa* Dalzell; 3, *Æchmandra velutina* Dalz., et probabiliter etiam planta Africæ australis subtropicæ herbarii *Burchellii* no. 2031, in herb. Kewensi deposita et foliis lanceolatis basi sagittato-lobatis insignis.

III. HETEROSICYOS, Welw. gen. nov.

Flores dioici.

FLORES MASCULI solitarii, bini vel racemosi. *Calycis* tubus cylindricus, dentibus quinque minutis. *Corolla* rotata, profunde quinquepartita, segmentis oblongo- vel lineari-lanceolatis papillois, tubum calycis subæquantibus. *Stamina* tria, tubo calycis inserta, filamentis liberis; antheræ inclusæ, lineari-elongatæ, leviter cohærentes, unica unilocularis, ceteræ biloculares, loculis longitudinaliter conduplicatis, connectivo apice villosa vel papilloso. *Ovarii* rudimentum globosum vel conicum.

FLORES FEMINEI solitarii. *Calyx* et *corolla* maris. *Staminum* rudimenta setiformia. *Ovarium* ovoideum, apice productum; stylus columnaris, apice clavatus, stigmatibus tribus subulatis incurvis; ovula ∞ , horizontalia. *Fructus* ovoideus, oblongus vel subglobosus, oligospermus. *Semina* oblonga vel obovoideo-pyriformia, lineis duabus exsculptis circumdata; testa ossea.

Herbæ Tropico-Africanæ, parvulæ, erectæ, puberulæ, radice tubera napiformia emittente, collo bi-pluricipiti, caulibus flexuosis sulcatis. *Folia* breviter petiolata vel subsessilia, integra, lobata vel 3-partita. *Cirrhi* nulli. *Flores* inter minores, breviter pedunculati, penduli vel cernui.

Genus quoad florum structuram *Trichomeriæ* Hook. fil. (Benth. et Hook. f. Genera Pl.) arcte affine, ast præter alias notas inprimis habitu omnino erecto nec non cirrhorum absentia diversum.

1. *HETEROSICYOS POLYMORPHA*, Welw. n. sp. Caule erecto subramoso flexuoso; foliis breviter petiolatis 3-7-nerviis polymorphis, lanceolatis, ovato-lanceolatis vel late ovatis aut obcuneatis, basi breviter attenuatis vel subcordatis, apice integris acutis vel plus minus profunde 3-, rarius 5-lobis, lobis sursum spectantibus, intermedio reliquis latiore et longiore; corollæ limbo fusco-purpureo; bacca obovoidea vel subglobosa, levigata, 2-8-sperma.

Habitat nequaquam frequens in collinis breve herbis petrosis apricis, Districtus Huilla circa Lopollo, socialis cum Daphnoideis, Thesiis atque Trideis pusillis; mensibus Novembri et Decembr. 1859 c. flore et fr. legi. *Essic.* It. Angol. no. 804.

Herba 4, pumila, in vivo obscure viridis. *Radix* tuberosa, globosa vel napiformis, dense farcta, fibris paucis elongatis subsimplicibus stipata, tubere non raro ad medium usque epigæo. *Caules* ex collo radices crasso sublignoso plures, 3-6 pollices alti, erecti, pennæ corvinæ vix crassiores, inter angulos obtusos sulcati, simplices vel ramo uno alterove patulo muniti, ad nodos $\frac{1}{3}$ -1 pollicem inter se distantes angulis obtusis flexuosi, juniores pubescentes, demum glabrati, mox supra basim foliis vestiti. *Folia* petiolo brevi, lineam circiter longo, latiusculo, obiter canaliculato suffulta, undique sed præcipue subtus et ad nervos pilis brevibus rigidulis adpressis pubescenti-scabulæ, quoad figuram et circumscriptionem laminæ in speciminibus utriusque sexus, imo non raro in uno eodemque caule admodum polymorpha, nec minus quoad magnitudinem variantia; nunc integra, lanceolata, ovato-lanceolata vel imo cordato-ovata, apice plus minus acuminata et mucronulata, nunc late ovata, obcuneata, vel fere lyrata, basi abrupte attenuata vel subcordata, apice 3- vel rarius 5-loba, lobis sursum spectantibus, lateralibus non raro inter se inæqualibus, hinc dentiformibus, intermedio semper longiore latioreque, plerumque ovato-triangulari, omnibus acutiusculis herbaceo-mucronulatis; lamina angustiorum 3 pollices longa, semipollicem lata, latiorum $2\frac{1}{2}$ poll. longa et sesquipollicem lata; in quibusdam individuis omnia folia integra lanceolata, in aliis omnia apice 3-5-loba, vel inferiora lobata, superiora integra et angustiora occurrunt. *Cirrhorum* vel stipularum vestigium nullum. *Inflorescentia* axillaris, tota puberula. *Flores* dioici; masculi cernui, in racemulos depauperatos 2-6 flores, basi nonnumquam bractea foliiformi, anguste lineari-lanceolata, elongata, quasi stipulam mentiente, munitos collecti, vel solitarii, pedunculo gracili foliis multo brevior, pedicellis vix lineam longis bracteolatis, bracteolis caducis. *Calycis* tubus 2-2 $\frac{1}{2}$ lineas longus, sursum parum dilatatus. *Corolla* fusco-purpurascens, limbi segmentis oblongo-lanceolatis $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longis, horizontaliter patentibus, intus dense tenuiter pilosis. *Flores* feminei masculis similes, primum erecto-patuli, post fecundationem nutantes, tubo calycino magis elongato, supra ovarium constricto. *Stamina* et *ovarium* generis. *Bacca* obovoidea, late clavata vel subglobosa, e viridi flavicans, nunc nucis avellanæ majoris mole, nunc multo minor, levigata, non raro ex seminibus maturitate valde turgescens inæqualiter plurigibbosa, septis pro parte resolutis unilocularis, pulpa viscida parca farcta, 2-7-, rarius monosperma, indehiscens. *Semina* pro more plantæ sat magna, obovoideo-pyriformia, recentia albida, mox badio-fuscula, basi obtuse conica subrostellata, circumcirca profunde bisulcata, testa dura leviuscula.

2. *HETEROSICYOS STENOLOBA*, Welw. n. sp. Caule erecto, subramoso, flexuoso, dense pubescente; foliis subsessilibus, isomorphis, omnibus profundissime tripartitis, segmentis elongatis, anguste linearibus, uninerviis, apice abrupte acutatis, intermedio lateralibus parum latiore sed multo longiore; floribus masculis nutantibus, solitariis vel rarius depauperato-racemulosis, corollæ limbo stramineo-flavescente.

Habitat in collinis parce dumetosis Distr. Huilla prope Lopollo, socialis cum priore specie, ast ea multo rarior. Cum florib. masc. Decembr. 1859 legi.

Herba gracilis, pallide virescens, radice napiformi perennans. *Caules* ex collo radices duo vel plures,

erecti, flexuosi, 5–8 pollices alti, plurisulcati, dense pubescentes, pennæ corvinæ crassitudine vel imo tenuiores. *Folia* brevissime petiolata, nunc fere sessilia, utrinque pubescentia, ad basin usque tripartita, segmentis elongatis, divaricatis, anguste linearibus, $\frac{1}{2}$ –1 lineam latis, 2–4 pollices longis, apice breviter acutatis, per totam longitudinem nervo unico subtus latiore et magis prominulo densiusque pubescente et asperulo percursis, margine pilis brevibus spinuliformibus patulis, ciliatis. *Flores* masculi axillares nutantes, plerumque solitarii, rarius racemulosi, pedicellis bracteolatis, quoad structuram et formam iis speciei præcedentis sat similes, sed corollæ stramineo-flavescentis limbi laciniis angustioribus acutioribusque. *Flores* feminei et fructus non visi.

Observatio.—Species habitu multo graciliore et præsertim foliorum isomorphorum figura ab antecedente (*H. polymorpha*) absque difficultate distinguenda, sed in paucis solummodo speciminibus masculinis a me lecta, proinde ulteriori peregrinatorum observationi commendanda.

Ordo CACTACEÆ.

Trib. OPUNTIEÆ, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. i. 846.

RHIPSALIS CASSYTA, Gärtn. Sem. i. 137 (Pfeif. Enum. p. 133).

Habitat omnino indigena in Angolæ interioris silvis primævis et rupestribus editis Distr. Golungo Alto et Pungo Andongo, inter 2400 et 3500 ped. altit., ex arborum ramis vel rupium fissuris longe pendula. Novembr.–Jan. floret, Febr.–Mart. fructus maturat. *Essic.* Welw. Iter Angol. n. 876 et 878.

Rhipsalis, spec., Welw. Apontam. p. 555 !

Caules 4–9 ped. longi, cylindrici, glauco-virides, in juventute fasciculis setularum rubrarum obsiti, adulti glaberrimi, di-, trichotome vel fasciculatim ramosi, internodiis a pollicari ad pedis usque longitudinem variantibus, hinc inde radicanibus. *Flores* crebri, laterales, horizontaliter patentes, una cum calyce 3 lin. longi, 2 circiter lin. diametri, albi vel pallidissime flavescentes. *Stigma* fere semper 4-fidum, lobulis oblongis obtusiusculis. *Bacca* plene matura albida, pisi minoris mole, ceraceo-nitens, subpellucida, pulpa aquoso-viscosa farcta. *Semina* minuta, 12–20, oblique obovata vel plerumque subreniformia, testa atra nitidula, sub lente fortiore dense striolata.—Specimina Angolensia cum stirpe Americana, ex insula Jamaica Ind. occid. oriunda, in horto Kewensi Apr. 1866 læte florente et fructifera accuratius comparavi, nullamque inter plantam Americanam et Angolensem discrepantiam notabilem observare mihi licuit.—Plantæ juveniles, e seminibus enatæ, quales ad *Colæ acuminatæ* et *Adansonie* ramos muscosos in silvis primitivis Distr. Golungo Alto mihi sæpius obviæ, a planta adulta quoad aspectum magnopere differunt; rami nempe atque ramuli stirpis junioris solito crassiores, apice clavati et undique setulis rubris 2–3 lin. longis, fasciculatim gregatis, ad apicem ramulorum novellorum in comam congestis horriduli.

Observatio.—*Cactearum* in Africæ continente præsentia indigena inter phytogeographos acriter disputata, imo a R. Brown, Endlicher* et Lindley† prorsus negata fuit. Hæc nostra quidem, *Rhipsalis Cassyta* nempe, etiamsi simul Americæ incola, certissime etiam Africæ calidioris indigena, in Caffrorum terris quoque a Drege aliisque peregrinatoribus reperta. Nec hoc unicum Floræ Africanæ cum Americana homogeneitatis exemplum, nam plures species Americanæ generum *Symphonia*, *Cacoucia*, etc. etc., et ipsa *Cyrtopera*

* “Quæ a peregrinatoribus de *Cactis* in Arabia, Madagascaria etc. crescentibus legimus, fabulis adnumeranda sunt. *Cactæ* omnes in America nascuntur.”—Endl. *Enchir.* p. 497.

† “America is the exclusive station of the Order [*Cactaceæ*], no species appearing to be native of any other part of the world.”—Lindl. *Veg. K.* p. 747.

longifolia Reichb. f. (*Orchidea* !) in eodem loco cum *Rhipsalide Cassyta* sociales a me repertæ fuerunt, et genera non pauca, typice Americana, speciebus sat affinibus in Angola interiore aliisque Africæ tropicalis territoriis repræsentata inveniuntur. Quod autem hoc respectu mihi multo majoris momenti, et omni phytogeographorum attentione dignum esse videtur, est quod major numerus illarum specierum, in Africa tropicali et America simul obvenientium, non in ora maritima continentem Americanam spectante, nec in regionis litoralis silvaticis, sed in regione interiore elevata, silvisque primitivis, longe ab ora maritima remotis occurrit. Ipsa *Brasenia peltata* Pursh, nunc etiam Floræ Africæ tropicalis vindicata, nullibi in tot et tantis regionis litoralis lacubus a me observata, sed solummodo in lacu "Ivantalla" Distr. Huilla, circiter 5000 ped. supra mare elevato et plus quam 120 millia geograph. ab oceani Atlantici litore distante reperta fuit.

Trib. GARDENIÆ, Endl. G. Pl. 557.

MUSSÆNDA (Sect. *Belilla*), De C. Prod. iv. 370.

MUSSÆNDA SPLENDIDA, Welw. n. sp. (Tab. XIII.) Fruticosa, scandens, tota molliter pubescens vel villosa; foliis modice petiolatis, ovatis acuminatis, penninerviis; stipulis subfoliaceis, ovatis, bifidis, recurvis, intus glabris; cymis subbrevisiter pedunculatis, densifloris, trichotome ramosis, dense puniceo villosis; bracteis ad axillas patentibus subfoliaceis 3-5-fidis; floribus breviter pedicellatis; calycis tubo oblongo-cylindrico, lobis nunc omnibus æqualibus, nunc quatuor æqualibus lanceolatis, quinto maximo, late ovato molliter piloso puniceo; corollæ tubo calycis lobis 2-3-plo longiore, limbo horizontali leviter obtuse 5-lobo, fauce hirsuta, extus patentim villosa; bacca ellipsoideo-oblonga, villosa, calycis limbo coronata.

Habitat freq. in montosis dumetosis humidiusculis, inprimis juxta silvarum primævarum oras Districtum Golungo Alto et Pungo Andongo, inter 2500 et 3500 ped. altit., a Januario usque ad Maium florens, Junio ad Augustum fructificans. *Exsic.* Welw. It. Angol. no. 1116.

Caules e radice lignosa plerumque plures, 5-10 pedes longi, basi ascendentes, vetustiores obtuse angulati, glabrati et purpurascens, juniores et rami vario modo curvi vel flexuosi, late scandentes, virides, teretiusculi, pilis mollibus rubescentibus patulis plus minus dense obsiti. *Folia* petiolata, membranacea, late ovata vel elliptico-ovata, 3-6 poll. longa, 1-3 poll. lata, basi nunc subcordata nunc rotundata, rarius breve attenuata, apice acuminata, margine integro ciliata, penninervia, in utraque pagina, sed subtus densius, pilis adpressis molliter pubescentia, supra læte viridia, subtus multo pallidiora, ibique nervo et costis magis prominulis venulisque crebris purpurascens picta; petioli $\frac{1}{2}$ -2 pollices longi, iis foliorum superiorum sensim brevioribus, obiter canaliculati, patentim rubro-villosi; stipulæ e lata basi ovatæ, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ pollicem longæ, plus minus profunde bifidæ, rarius subintegræ vel trifidæ, recurvo-patentes, pilis longiusculis rubris ciliatæ, intus glabræ et atropurpureæ, longius persistentes. *Inflorescentia* cymoso-paniculata, cymis densifloris, initio breviter, mox longius pedunculatis, trichotomo-ramosis, undique patentim puniceo-villosis; bractæ quoad consistentiam subfoliaceam, colorem et longitudinem stipulis subsimiles, sed 3-5-fidæ, laciniis angustioribus acutioribusque, post anthesim deciduæ. *Flores* in cymas densas congesti, alii subsessiles, alii breviter pedicellati, steriles (masculi) cum fertilibus in eadem cyma obvii. *Calycis* puniceo-villosi tubus florum centralium, sæpius sterilium, breviter obovoideus, limbi lobis omnibus inter se æqualibus; is florum exteriorum plerumque fertilium oblongo-cylindricus, limbi lobis nunc omnibus æqualibus, lanceolatis, erecto-patulis, nunc (plerumque unius floris in quaque cyma) quatuor æqualibus lanceolatis, quinto in folium maximum,

bracteiforme, petiolatum, late ovatum, nervis 5-7 percursum, molliter pilosum, intense puniceum, horizontaliter patens productum. *Corollæ* extus undique villo patente puniceo vestitæ tubus cylindricus, sursum modice ampliatus, calycis lobis duplo triplove longior, eo florum sterilium graciliore, limbi transversim vix $\frac{3}{4}$ -pollicaris lobis obtusissimis, brevissime apiculatis, intus subglabris, pallide aurantiacis, fauce pilis paleæformibus rigidulis, dense congestis, erectiusculis, sulphureis obsita. *Antheræ* generis. *Ovarium* constanter biloculare; discus modice elevatus, glaber; stylus corollæ tubo æquilongus, pariter glaber, stigmatē incrassato obiter bilobo vix exserto. *Bacca* elliptico-oblonga, $\frac{2}{3}$ - $\frac{3}{4}$ poll. longa, tenuiter coriacea, parum succosa, bilocularis, calycis limbo indurato superata, dense et patentim puniceo-villosa. *Semina* numerosissima, valde minuta, in pulpa viscida nidulantia, atra, lenticularia, testa subtiliter scrobiculata.

Observatio.—Species inter congenere facile ornatissima, *Mussændæ erythrophyllæ* Schum. et Thon. (Beschreib. p. 136) affinis videtur, quæ tamen, secundum clar. auct. descriptionem a nostrate foliis subtus albo-tomentosis, stipulis angustis, calycis lobo phyllomorpha pariter tomentoso corollæque laciniis acutis recedit.

Ordo RUBIACEÆ.

Trib. CINCHONEÆ, Subtr. EUCINCHONEÆ.

CORYNANTHE, Welw. gen. nov.

Calycis tubus ovoideus vel subglobosus, limbi 5-fidi lobis lanceolatis, apice subulatis, erectis, persistentibus. *Corollæ* infundibuliformis tubus rectus, teres, sursum ampliatus; limbi explanati 5-lobi lobis late ovatis subacutis, dorso infra apicem appendice elongato-clavata, patula, corollæ fere longitudine, instructis. *Stamina* 5, corollæ fauci inserta, exserta, patentia. *Antheræ* sessiles, lineari-oblongæ, basi profunde bilobæ. *Ovarium* biloculare, ovula in loculis ∞ , ascendencia. *Stylus* filiformis, rectus, stigmatē clavato. *Capsula* coriacea, lineari-oblonga, parum compressa, bisulca, calycis limbo indurato apiculata, bilocularis, loculicide bivalvis, polysperma. *Semina* compressa, ascendencia imbricata, nucleo minutissimo, ala lata membranacea, elongata, lineari-oblonga, basi attenuata profunde bifida cincto.

Arbor, excepto calyce hirtulo, glaberrima, in Angolæ interioribus editioribus inter 1200 et 2200 ped. elev. hinc inde silvas constituens, trunco stricto, coma ovato-pyramidata. *Folia* oblongo-lanceolata, nunc fere elliptica, modice coriacea, perennantia. *Stipulæ* solitariae, elongatæ, caduæ. *Flores* parvi, albi, in paniculam multifloram trichotome ramosam dispositi, ramis inferioribus verticillatis.

Observatio.—Genus “*Hymenodyction*” Wall. nostro hic proposito certe proximum, inflorescentia tamen racemosa bracteisque petiolatis suffulta a *Corynanthe* facili negotio discernitur. Genera “*Nauclea* et *Uncaria*,” etiam quodammodo affinia, floribus capitatis, supra receptaculum globosum aggregatis fructusque fabrica a nostro genere recedunt, quod insuper ab omnibus *Eucinchonearum* generibus hucusque descriptis “appendicibus elongato-clavatis, corollæ loborum dorso insidentibus” facile distinguitur.

Species unica :—

CORYNANTHE PANICULATA, Welw. n. sp. (Tab. XIV.)

Habitat in Angolæ interioris Districtibus elevatis, inprimis “Golungo Alto, Cazengo et Dembos,” ubi in montium declivibus borealibus non raro silvas densissimas atque umbrosissimas, ab incolis Lusitanis nomine “Matas de Mangué” jure celebratas efformat. Floret a Januario usque ad Maium, et a Martio usque ad Julium fructificat. Arbor ipsa a Lusitanis et nunc etiam a Nigritis Angolensibus “Mangué

branco" vel "Mangue do Monte" et hinc inde etiam "Paco de Golungo Alto" vocatur. *Exsic.* Welw. Iter Angol. n. 1508.

Arbor 25–40-pedalis, raro altior, corona ovato-pyramidata, dense frondosa, sempervirente, trunco recto, imo plerumque strictissimo, basi 2–5 ped. circumferentiæ; cortex pro more arboris sat tenuis, parum rimosus, griseo-fuscus, in juventute arboris et in adultæ ramis junioribus albidus, trunco tenaciter adhærens, saporis amaricantis. *Rami* vagi vel superiores oppositi, erecto-patuli, crebre ramulosi, ramulis obtusangulis ad nodos compresso-dilatatis, novellis atropurpureis. *Folia* petiolo circiter semipollicari canaliculato suffulta, $\frac{1}{2}$ ad $1\frac{1}{2}$ pollicem in ramulis distantia, oblongo- vel ovato-lanceolata, obtuse acuminata, basi breviter in petiolum attenuata, margine integerrima, tenuiter coriacea, supra lucido-viridia, subtus pallidiora, pinnatinervia, nervo medio valido, lateralibus sursum arcuatis laminæ marginem vix attingentibus, omnibus atropurpureis. *Stipulæ* intrafoliaceæ, solitariae, e lata basi ovato-lanceolatae, obtusiusculæ, cito caduæ. *Inflorescentia* terminalis. *Flores* paniculati; singuli nempe pedicellis brevissimis in cymulas sive umbellas spurias capituliformes 5–20-radiatas collecti, his demum in pedunculi communis (basi verticillatim, superne trichotome ramosi) ramulis gracilibus varie congestis, paniculam multifloram, densam, obtusiusculam efformantibus. *Calyx* ovoideus vel fere globosus, sub lente undique hirtulus, e viridi albidus; limbi 5-fidi lobi erecti, rigiduli, lanceolati, extus convexi, apice subulati, tubo ipso æquilongi, corollæ tubum longe exsertum laxè ambientes, indurescendo persistentes. *Corolla* infundibuliformis (tenuiter carnosa, alba), tubo recto, cylindrico, apicem versus quidpiam dilatato, raro semilinea longiore; limbi 5-fidi laciniae late ovatae, concaviusculæ, apice breviter acuto cucullatae, dorso infra apicem appendice claviformi, ipsa lacinia duplo longiore, patente, auctæ, intus juxta lineam mediam pilis tenuissimis crispulis adpersæ, in alabastro induplicato-valvatæ, sub anthesi patentes. *Stamina*, *antheræ* et *ovarium* descripta; stylus firmus, cylindricus, crassiusculus, totam tubi corollini cavitatem explens; stigma oblongo-clavatum, ex antherarum in alabastro pressione longitudinaliter plurisulcatum, exsertum. *Capsula* rigide coriacea, in maturitate fusco-purpurea, 3 lineas longa et linea vix latior, bisulcata, in pedicello lineam longo erecta, bilocularis, ab apice hiantè loculicide bivalvis, valvis demum juxta sulcum bipartibilibus; loculi 12–16-spermi. *Semina* descripta.

Qualitates et Usus.—Lignum nitido-albidum, densissimum, durum et sat durabile, in construendis domiciliis nec non in utensilium agrariorum fabrica tam inter colonos Lusitanos quam inter Nigritas multiplicis usus. Cortex arboris pulchræ *amaricans* et *subadstringens* est, et ob summam generis cum reliquis *Eucinchoneis* affinitatem, medicis in Angola artem suam nobilem exercentibus, inter *Cinchonæ succedanea tentanda* commendandus.

Ordo JASMINACEÆ.

Subordo OLEACEÆ.

SCHREBERA, Roxb.*

Genus "*Schrebera*" primum a Roxburghio ad arborem Indiæ orientalis conditum, fere per semiseculum in plantarum enumerationibus aut specierum catalogis *monotypicum*, et quidem inter *Bignoniacearum* gregem militans, remansit, donec Endlicher (Gen. Pl. p. 714) illud inter *Bignoniaceas dubias* collocavit, qua forsane ratione ductus, Lindley in Veg. Kingd. *Schreberam* Roxburghii penitus negligens, genus hoc ne nomine quidem

* *Schrebera* Roxburgh, Plant. Corom. ii. p. 1, tab. 101, nec al. auct. *Schrebera* Retz. est *Elæodendron glaucum* Pers. *Schrebera* Thunb. Nov. Act. Upsal. postea ab ipso auctore in Dissert. Nov. Pl. Gen. et in ejus Flora Cap. tamquam *Hartogia capensis* descripta exstat. *Schrebera* Linn., secundum De C. Prodr. viii. p. 675, est *Cuscutæ* species, in quadam *Myrica* crescens.

in *Bignoniacearum* enumeratione commemorat. Sed paullo post cl. Fenzl*, genera quædam *Bignoniacearum* dubia novo examini subjiciens, Roxburghii genus *Jasmineis* subscribendum esse, præclare docuit, quam opinionem etiam Endlicher in Gen. Pl. Suppl. ii. p. 54, nec non cl. Alph. De C. Prodr. viii. p. 674, secuti sunt. Postea vero cl. Wight (Illustr. ii. p. 185) *Schreberam* iterum, et quidem tamquam Subordinem, *Bignoniaceis* adnumeravit, simulque aliquam generis cum *Acanthaceis* affinitatem suspectans. Durante hoc inter celeberrimos botanicos de generis loco in systemate certamine, altera species *Schreberæ* a cl. Schimper in Abyssiniæ montibus detecta fuit, quæ a cl. Hochstetter† ceu novum *Oleacearum* genus sub nomine "*Nathusia alata*" descripta et in herbariis Schimperianis distributa, etiam in Endlicherii Gen. Pl. Suppl. ii. p. 55, et in De C. Prodr. viii. p. 281 recensita invenitur, et quidem ab Endlicherio *Jasmineis*, a cl. Alph. De C. autem *Oleaceis* associata. Nuper demum hæc ipsa *Nathusia alata* Hochst. quoque in Africæ australis extratropicalis ditione Natalensi a cl. Gerrard aliisque peregrinatoribus variis in locis reperta, mox ab acutissimo Harveyo tamquam vera *Schreberæ* species recognita et ab ipso sub nomine *Schrebera Saundersiæ* descripta et depicta fuit‡. Eadem hæc species, etiam mihi in Angolæ et Benguellæ interioribus montosis sæpius obvia, latissime per Africam calidiorem distributa videtur, ast præter illam in Angola australiore duæ alteræ species ejusdem generis, ambæ foliis simplicibus integris (nec pinnatis) inter congeneres valde insignes, ceteroquin omnibus notis genericis *Schreberæ* sat congruæ occurrunt, modo hic infra latius exponendæ.

Collocationem *Schreberæ* in systemate naturali quod attinet, genus hoc *Jasmineas* inter et *Oleaceas* fluctuat, vel potius ambos hos ordines arcte conjungit. Florum structura, imprimis limbi in 5–8 lobos divisio, staminum insertio, antherarum connectivum amplum, embryo demum exalbuminosus, peridermio spongioso-tumido exceptus, nec non cotyledones plano-convexæ et carnosæ *Jasminearum* characteri respondent, dum ovula pendula, capsulæ dehiscentia loculicida, semina alata et radícula supera, habitus deinde, saltem in duabus speciebus eximie *fraxineus*, evidentem cum *Oleaceis* affinitatem indignant, sicque genus, characteribus omnibus simul consideratis, amborum ordinum indicatorum limites obruit, eosque iterum, sensu Jussæi, in unum contrahendos esse suadet.

Additis duabus speciebus novis Angolensibus, jam 1858 in Apontam. pp. 549 et 579 a me commemoratis, genus *Schrebera* nunc quatuor species bene inter se distinctas amplectitur, quæ commode sequente schemate disponuntur:—

SCHREBERA, Roxb.	A. <i>Folia simplicia</i>	1. Glaberrima, calycis subhemisphærici limbo truncato vel breve denticulato, capsula verrucis orbicularibus scabra, = SCHREBERA GOLUNGENSIS.
		2. Pubescens vel hirta, calycis campanulati limbo lobato-dentato, dentibus obtusis ciliatis, capsula levigata, = SCHREBERA TRICHOCLADA.
	B. <i>Folia pinnata</i>	3. Folia 1–3-juga, petiolo alato, foliolis sessilibus, = SCHREBERA ALATA (<i>Nathusia alata</i> Hochst.).
		4. Folia 2–4-juga, petiolo exalato, foliolis petiolulatis, = SCHREBERA SWIETENIOIDES Roxb.

* Fenzl, Denkschr. Bot. Gesellschaft Regensb. iii. p. 246.

† Hochstetter (Chr. Fr.), Nova Genera Plantarum Africæ tum australis tum tropicæ borealis, p. 15; Schimper, Plant. exsiccatae Abyss. Sect. I. *Adoenses*, no. 245.

‡ Harvey (Dr. W. H.), Thesaurus Capensis, vol. ii. p. 40, tab. 163.

Schreberæ omnes hucusque cognitæ *arboreæ* sunt, etiamsi hinc inde, præcipue in silvis secundariis, post silvas primitivas igne destructas enascentibus, sub forma fruticosa occurrunt; omnium denique flores suavissime et fortiter fragrantés, inprimis nocturno tempore aroma amœnissimum, illud *Caryophyllorum* æmulans, per lata spatia spargunt.

1. SCHREBERA GOLUNGENSIS, Welw. n. sp. (Tab. XV.) *Sch.* glaberrima, foliis simplicibus oblongis, nunc ovato- vel lanceolato-oblongis, abrupte acuminatis, basi obtusis vel breviter in petiolum angustatis, supra nitenti-viridibus, subtus subglaucovirescentibus; calycibus levigatis, subhemisphæricis, ore truncatis vel minute repandodenticulatis; stylo inclusio; capsula obtusa, bisulca, verrucoso-scabra.

Habitat in silvis primævis densioribus Distr. Golungo Alto, præcipue in montibus schisto-micaceis de Serra de Alto Queta, ad 2500 ped. alt. Floret Decembr.-Jan., fructific. Maio-Jul. *Exsic.* Welw. Iter Angol. n. 933.

Arbor 20-30-pedalis et altior; truncus rectus, basi 2-3 ped. circumferentiæ, cortice albido-griseo rimis minutis crebris aspero, coma elongato-ovoidea lucide dense frondosa. *Rami* patentes, elongati, inferiores fere horizontales et tarde dejecti; ramuli oppositi, graciles, angulati, glabri, ad nodos dilatato-compressi, novelli et florigeri gracillimi, purpurascens et lenticellis albicantibus variegati, hisque asperuli. *Folia* opposita, petiolata, simplicia, penninervia, respectu circumscriptionis sat variantia, plerumque oblonga, non raro ovato-oblonga vel fere elliptica, nunc late lanceolata, ea ad basim ramulorum novellorum superioribus semper duplo triplove minora, omnia constanter glaberrima, supra intense viridia et valde nitentia, subtus pallide virescentia, halitu glaucescente suffusa, costa prominente læte flava percursa, inter venas dense reticulato-venulosa; petioli 3-4 lin. longi, canaliculati, cum ramo articulati; foliorum majorum lamina 4-4½ poll. longa, 1½-1¾ poll. lata, basi sæpius obtusa vel breviter attenuata, margine integra, apice plus minus oblique et abruptim acuminata, substantia tenuiter coriacea vel chartaceo-rigida. *Inflorescentia* terminalis, omnino glabra, cymuloso-paniculata, paniculæ depauperatæ ramis di-, trichotomis pedicellisque basi articulata minute bibracteolatis, cymulis sæpius trifloris. *Flores* circiter pollicares, omnium specierum mihi cognitarum fragrantissimi; calyx obhemisphæricus, fere cupuliformis, circiter 1½ lin. longus et latus, ore inæqualiter repando 5-6- vel rarius 7-denticulatus, nunc omnino edentulus, truncatus, corollæ basim laxè excipiens; corolla carnosula, primum viridi-flavescens, mox tota cinamomeo-fusca, limbi plerumque 6-fidi lobis ad internam faciem papillis minutis fusco-rubris dense gregatis velutino-puberulis, æstivatione quincunciali-imbricatis sed vix contortis; tubus intus ad basim pilis raris adpersus, ceterum nudus. *Stamina* 2 paullo infra faucem inserta, inclusa; filamenta brevissima, compressa; antheræ lineari-oblongæ, medio dorso fixæ, biloculares, loculis connectivum crassum marginantibus, eoque paullo brevioribus, longitudinaliter dehiscentibus. *Ovarium* ovoideum, biloculare; ovula in quoque loculo 4; stylus filiformis, rectus, inclusus, apice sensim in stigma breviter bilobum incrassatus. *Capsula* lignosa, pyriformis, 1¾ poll. longa, pollicem lata, basi teretiuscula calyce persistente arcte adpresso (vix uti in ceteris speciebus varie fisso) excepta, apice obiter convexo styli basi indurata apiculata, longitudinaliter obtuse bisulcata, fusco-badia, undique verrucis orbicularibus magnitudine variis plus minus gregatis asperulis adpersa, bilocularis, ex apice loculicide bivalvis, valvis crassis navicularibus, medio septum fere sesquilineam crassum gerentibus, intus infra verticem gibbis. *Semina* in quoque loculo 4, ex apice septi pendula, compressa, deorsum (*i. e.* in directione radiculæ opposita) in alam scariosam oblique lato-lanceolatam obtusiusculam faciebus subtrinervem prolongata, una cum ala 1-1½ poll. longa, endopleura suberoso-spongiosa. *Albumen* nullum! *Embryo* rectus, 4-4½ lin. longus, 2 lin. latus; cotyledones elongato-ovatae, obtusæ, basi emarginatæ, carnosulæ, extus leviter convexæ, facie interna plana applicatæ (nequaquam plicatæ!); radicula supera, oblonga, tumidula, obtusissima, circiter ¾ lin. longa, ad hilum spectans.

Observatio.—Semina in loculis quidem constanter quatuor inveniuntur, sed sæpius solummodo eorum duo embryone evoluti foecunda, reliqua duo vero plerumque in laminam subduram, oblongo-lanceolatam, intus suberoso-spongiosam et embryone omnino carentem, extus ad unam faciem acute carinatum, inter se concreta, vel saltem arcte conglutinata. Vid. tab. nostr. fig. 11.

2. SCHREBERA TRICHOCLADA, Welw. n. sp. *Sch.* ramulis novellis et florigeris petiolisque pubescentibus; foliis simplicibus, late ellipticis, elliptico-ovatis vel rarius obovatis, apice obtusiusculis vel breviter acutatis, basi abruptim attenuatis, supra glabris, subtus juxta costam venasque pubescentibus; calycibus campanulatis puberulis, sub pube sulcato-striatis, ore lobato-dentatis, dentibus conspicuis, inæqualibus, deltoideo-ovatis oblongisve, margine dense ciliatis; stylo plus minusve exserto; capsula elongato-pyriformi, obtuse quadrangula, quadrisulca et levigata.

Habitat in silvaticis rupestribus Distr. Ambaca et Pungo Andongo, inter 3000 et 3500 ped. altit. Ab Octobr. usque ad Decembr. floret; fructiferam Junio 1857 legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 936 et 934.

Arbor circiter 15-pedalis, patentim ramosa, coma laxa, rarius frutex 6–8-pedalis, ramis virgato-elongatis, obscure angulatis, cortice cinerascens vel fere albido; ramuli novelli et florigeri constanter plus minusve cano-pubescentes, etiam fructiferi pubem conservantes, vel patulo-villosi aut hirtuli. *Folia* circumscriptione non minus quam in specie antecedente variant, sed plerumque elliptica vel obovato-oblonga, membranacea, herbaceo-viridia absque nitore, subtus secus costam et venas prominentes pubescentes; petioli 4–7 lin. longi cum ramulis articulati, constanter, et quidem etiam in foliis adultis, ceteroquin excepta costa omnino glabris, pubescentes. *Paniculae* depauperatae 5–10-, rarissime 14-floræ, in ramulis terminales; pedunculi, rami et pedicelli pubescentes, basi articulati, bibracteolati, bracteolis puberulis vel dense villosis-barbulatis. *Calyx* tubuloso-campanulatus, quam in *Schreb. Golumbensi* duplo major, fere 3 lin. longus, dense pubescens, sub pube obscure sulcato-striatus vel omnino deglabratus et tunc evidentius plurisulcatus, ore grosse dentato, dentibus nunc deltoideo-ovatis nunc lobuliformibus oblongis, juxta margines et præcipue apice semper ciliato-barbulatis. *Corolla* ejusdem magnitudinis et structuræ ac in specie antecedente, primum albida, limbi 5–7-fidi lobis pilis clavatis crispulis roseo-purpureis, circa faucem densioribus, demum una cum tota corolla cinnamomeis, obsitis. *Antherarum* loculi connectivo crasso subcompresso æquilongi. *Ovarium* conico-ovoideum; stylus modice exsertus. *Capsula* fere bipollicaris, badio-flavicans, levigata (nec verrucoso-aspera), obtusissime quadrangula, inter angulos apicem versus magis salientes late sulcata, sulcis in vertice obtuso, obiter apiculato, cruciatim confluentibus. *Semina* quam in *Schreb. Golumbensi* quidpiam longiora, perfecte matura vero mihi non obvia. Cetera generis.

Observatio.—Species, priori omni respectu sat affinis, sed certe distincta, et ramulis petiolisque et nervo mediano subtus constanter pubescentibus, nec non calycis late dentati capsulæque levis configuratione ab illa absque difficultate distinguenda, ceteroquin ut videtur latissime per Africam austro-tropicam distributa, a clar. Kirk etiam (secundum specimen in herb. Kewensi, Zambesi Exped. 1863 Morumballa) e ditone Mossambicensi reportata.

3. SCHREBERA ALATA.

Nathusia alata, Hochst. Nov. Gen. Pl. Afr. p. 15, et in Schimper, Iter Abyss. Plant. Adoenses, no. 245; Endl. Gen. Pl. Suppl. ii. p. 55; DC. Prodr. viii. p. 281; A. Rich. Tent. Abyss. ii. p. 29; Welw. Apontam. p. 379.

Schrebera Saundersiæ, Harv. Thes. Cap. ii. p. 40, tab. 163.

Habitat arborea in silvis primitivis Distr. Pungo Andongo ad 3000 ped. circiter altit., nec non in silvis secundariis densioribus Distr. Huilla inter 4000 et 5000 ped. alt., hic sæpius tamquam frutex 8-pedalis. Decembr. c. fl., Maio c. fr. necdum maturo lecta. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 938.

Distrib. geogr.—Abyssinia, Angola, Port Natal.

Observatio.—Specimina Angolensia cum Abyssiniciis a cl. Hochst. descriptis, et simul cum Icone Harveyana supra laudata optime conveniunt, calyces in stirpe Angolensi quidpiam puberulos (nec omnino glabros) si excipias. Ceterum nec mirandum, stirpem per Africam tropicam eis- et transæquatoriam divulgatam, et imo ditionem Natalensem invadentem maximopere variare. In silvis primævis convallibusque solo humoso donatis arborea crescit, 15–30-pedalis, habitu fere omnino *Fraxini*, in silvaticis autem macrioribus solummodo frutex remanet, 5–8-pedalis, ramis elongatis tortuosis, hinc inde subscandentibus, et tunc *Jasmini* speciem non male fingens. Folia 3–5- vel, etsi rarius, 7-foliolata interdum in uno eodemque ramo obveniunt; petioli nunc latius nunc angustius alati; foliola magis minusve acuminata; calyces nunc ore truncati nunc evidenter dentati, stamina inclusa vel subexserta etc. non raro in speciminibus unius ejusdemque arboris invenienda; maxime autem species hæc respectu indumenti ramulorum, foliorum atque calycis florigeri variat, quæ organa nunc fere penitus glabra, nunc obiter puberula vel pubescentia, nunc undique sericeo-tomentella inveniuntur. Hanc ulteriorem formam, in editissimis petrosis Distr. Huilla mihi obviam, et aspectu sat singularem, hic proponere liceat tamquam

β. tomentella. Ramulis, foliis calycibusque dense sericeo-pubescentibus vel albo-tomentellis.

Habitat in Distr. Huilla montibus editis petrosis breve dumetosis inter 5000 et 5600 ped. alt. socialis cum *Protea*, *Xylopeæ*, *Dombeyæ* et *Tarchonanthes* speciebus, præcipue in summis jugis de “Morro de Lopollo.” Martio 1860 c. flore et fruct. immat. lecta. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 939.

Frutex 5-pedalis, arbusculiformis, coma densius ramosa, præter indumentum sericeum formæ typicæ omnino fidelis. Etiam hac in varietate, primum facile pro specie distincta habenda, ramuli fructiferi et folia adulta indumentum pro parte deiciunt, et calyces glabrescunt; fructus denique jam juveniles levigati sunt, quemadmodum in specie typica.

Ceteroquin folia pinnata hanc speciem strictim a duabus antecedentibus separant, petioli alati demum et foliola sessilia illam primo jam intuitu ab affini *Schrebera Swietenioide* Roxb., totius generis prototypo, distinguunt.

Ordo APOCYNACEÆ.

Trib. ECHITEÆ, DC. Prodr. viii. p. 412.

PACHYPODIUM, Lindl.

Pachypodii genus, jam olim ab acutissimo R. Br. ob *Echitis* specierum Thunbergianarum ab Americanis notabilem discrepantiam, obiter indigitatum, demum a cl. Lindley in Bot. Reg. [1830] tab. 1321 institutum, nuper a cl. A. DC. (Prodr. viii. p. 423) locupletatum, ne dicam reformatum fuit, characteri nempe generico “*glandulas 5 hypogynas*” addente, in *Pachypodio* [*Echite* Thbg.] *succulento* ab eo observatas, quas cl. Lindley in generis sui definitione expressis verbis “*absentes sive nullas*” declarat*. Tres sunt species

* Glandulæ sive squamulæ quinque hypogynæ *Echitis succulentæ* Thunb. jam in icone hujus speciei, a cl. Jacquin in Fragm. Bot. tab. 117 exhibita, pro illo tempore perfectissima, sat clare depictæ inveniuntur.

generis hujusce, hoc modo ampliati, in Prodr. *l. c.* descriptæ, quibus quarta addenda venit, quæ a clar. Harvey in Thes. Fl. Cap. tab. 117 depicta et sub nomine “*Adenium Namaquanum*” descripta, omnibus characteribus ibi, etiamsi nimis fragmentarie, exhibitis, bene cum *Pachypodii* genere convenit, et ob antherarum structuram, glandularumque hypogynarum præsentiam certe a genere “*Adenium*” excludenda. Omnes hæ quatuor species, præter essentielles notas genericas, simul etiam indumento variarum partium plus minusve pubescente vel tomentoso, nec non corollæ lobis æquilateris et planiusculis inter se congruunt atque *Pachypodii* Sectionem primam *Eupachypodium* constituentes considerari posunt, dum quinta, hic infra a me proponenda, species nova, et quidem sat formosa, “glandulis in discum cupuliformem concretis, limbi corollæ lobis valde inæquilateris crispatisque, nec non stirpis totius glabritie” insignis, alterius ejusdem generis Sectionis typum offert, nomine “*Adeniopsis*” salutandæ. Erunt itaque *Pachypodii* Sectiones duæ sequente modo limitandæ:

A. *Eupachypodium*: corollæ lobi planiusculi, *æquilateri*; glandulæ hypogynæ 5 [vel inconspicuæ?]; stirpes indumento variarum partium pubescente vel tomentoso. Cotyledones (ex A. De C.) *radicula breviores*.

B. *Adeniopsis*: corollæ lobi *inæquilateri*, hinc crispatis; discus cupuliformis 5-crenatus; stirps glabriuscula. Cotyledones *radicula duplo longiores*!

PACHYPODIUM [ADENIOPSIS] LEALII, Welw. n. sp. (Tab. XVI.) *P. trunco* succulento, erecto, elongato-conico, crebre aculeato, apice 2–3-chotome ramoso, ramis glaberrimis; aculeis validis; pedunculis firmis, terminalibus, multifloris; calycis dentibus brevibus, triangulari-ovatis, acutis, glabris; corollæ amplæ glaberrimæ lobis late oblique ovatis, apicibus obtusiusculis retortis, latere altero plano continuo, altero convexiore undulato-crispato; disco annulari obtuse quinquelobo.

Habitat non infrequens in montosis petrosis aridis Distr. Bumbo (territorii Mossamedensis interioris) præcipue inter Quitibe et Bumbo, ad 1500 ped. altit. supra mare. Octobr. 1859 et iterum Junio 1860 c. fl. et fr. matur. legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1510.

Arbuscula cactiformis, 10–15-pedalis, succo aquoso-resinoso viscido scatens, tota aculeis rigidis geminatim proximatis, fere pollicem longis, rectis, patulis, satis pungentibus horrida, ast floribus admodum speciosis grateque fragrantibus et per totum fere annum obviis inter congeneres valde insignis. *Truncus* succulentus strictus, prope basim non raro 2–3 ped. circumferentiæ, epidermide levi, tenui, plumbeo-grisea, facile secedente et corticem herbaceo-viridem denudante vestitus, inferne simplicissimus, a medio apicem versus parce patentisque dichotome ramosus; rami juniores et ramuli floriferi, uti etiam aculei, lætissime sanguineo-purpurei et nitido-levigati. *Folia* sparsa, minima, vix lineam longa, rare et nonnisi ad ramulorum novellorum apices hinc inde obvia, oblongo-lanceolata, basi articulato-sessilia, membranacea, nervo crasso in acumen subulatum excurrente percursa, quasi aculeum bialatum fingentia, caducissima, juxta basim utrinque aculeis rectis, stipularum lateralium vices gerentibus(?), post folium delapsum persistentibus munita. *Aculei* recti, in trunco et ramulisque per paria sparsi, tuberculis oblongis verniceo-nitidulis insidentes, acutissime subulati, basi sub lente puberuli, majores sesquipollicem longi, juniores erecto-patuli, vetustiores late patentis, in cujusve paris axilla aut aculeo altero brevioris aut gemmula e setis pluribus composita aucti, simulque inter eorum basim fossula circulari vel oblonga, folii delapsi cicatrice, instructi. *Inflorescentia* cymosa, in ramulis extimis terminalis, tota glaberrima; cymæ multifloræ, inordinate compositæ, amplæ, bene evolutæ non raro 6–7 pollic. diametri, pedunculo communi crasso, recto, longitudine vario,

basi aculeolis gregatis circumcirca stipato, subsimplici vel parcius dichotome ramoso, herbaceo-viridi; pedicelli crassi, longitudine inter $\frac{1}{2}$ et 4 lin. in eadem cyma variantes, superne incrassati, basi bracteolis squamiformibus, deltoideis, plus minusve acutis, caducissimis, cicatricem transversam relinquentibus semiamplexi. *Calycis* brevis, intus eglandulosi lobi subæquales, deltoideo-ovati, breviter subulato-acuminati, rigiduli, erecti. *Corollæ* tubus purpurascens, $1\frac{1}{2}$ – $1\frac{2}{3}$ poll. longus, rectus, medio circa stamina ampliatus, faucem versus angustatus, intus infra stamina pilis adpersus, superne nudiusculus, fauce omnino nuda; limbi horizontaliter patentis $2\frac{1}{2}$ –3 poll. diametri transversalis lobi $1\frac{1}{2}$ poll. longi, $\frac{3}{4}$ poll. lati, in æstivatione *sinistrorsum* contorti, externe rosei, interne splendido-albi, inæquilateri, latere in alabastro occultato convexiore denseque undulato-crispato. *Stamina* medio tubi inserta, inclusa; filamenta brevissima, basi interna pilosula; antheræ sagittatæ, sinu fixæ, $4\frac{1}{2}$ –5 lin. longæ, rigidæ, in appendicem lanceolatam polline destitutam acuminatæ, circa stigma inclusum pyramidatim conniventes, læte flavæ. *Discus* elevatus, urceolaris, ceraceo-carnosulus, obiter 5-lobus, lobis æqualibus obtusissimis. *Ovaria* duo, oblongo-ovoidea, glabra, disco longiora; ovula ∞ ; stylus filiformis, stigmate oblongo-cylindræo, vertice obtuso obscure bilobo, basi annulo prominente subcrenulato antheris adhærente cincto. *Folliculi* juniores erecto-patuli, maturi angulo recto divergentes, 3–5 poll. longi, compresso-cylindræi, medio modice ventricosi, superficie glabri purpurascens, ventre dehiscens, intus nitidulo-albidi. *Semina* numerosa, pendula, obovoidea, compressa, dense imbricata, ad umbilicum comosa, coma duplo triplove breviora; testa fusco-badia, membranacea, scabrula; albumen parcum; cotyledones late ovatæ vel suborbiculares, basi cordatæ, planiusculæ, leves, margine integerrimæ; radícula oblonga apice conoidea, cotyledonibus fere duplo brevior, ad hilum spectans.

Speciem hanc, inter congeneres longe ornatissimam, dicatam velim viro clarissimo, Fernando da Costa Leal, in exercitu Lusitano legionis præfecto strenuo, Districtus Mosamedensis et inprimis Coloniae Huillensis defensori intrepido, nec non Mappæ geographicæ Angolæ nuper in lucem editæ pro magna parte auctori.

Observatio.—Genera "*Pachypodium* Lindl." et "*Adenium* R. & Sch.," etiamsi in DC. Prodr. loc. supra cit. sub diversis *Apocynacearum* tribubus militant, arcta affinitate junguntur, simulque omnium fere specierum habitu isomorpha, eademque vivendi ratione confirmata. Principalis tamen eorum differentia ex antherarum seminumque structura pendere videtur, dum reliquæ notæ genericæ, a diversis auctoribus indicatæ, in utroque genere sat variantes sive vacillantes sese denotant. In *Adenio* stamina exserta vel saltem fauci approximata, antherarum apices longe appendiculati et plus minusve spiraliter torti; semina demum subcylindrica vel cylindrico-subangulata et utraque extremitate comosa dicuntur et talia tam in icone *Adenii multiflori* Klotsch. [Peters, Reise, Bot. i. tab. 44] quoad antheras, quam in icone eximia sed necdum edita *Adenii speciosi* Fenzl, ab amicissimo auctore benevole mecum communicata, quoad antheras et seminum comas, depicta sunt. In *Pachypodio* stamina inclusa, antherarum apices sensim in acumen subcartilagineum, rigidulum, strictum angustati, semina dein compressa, obovata et solummodo ad umbilicum comosa. Discus denique in *Adeniis* veris brevissimus, annularis, continuus et ore nudo truncatus adesse dicitur, dum *Pachypodii* species vel glandulas 5 inter se separatas, vel in discum cupuliformem ore 5-lobatum coalitas offerunt. Squamulæ faucem corollæ coronantes in *Pachypodiis* vix obviæ, in nostrate hic descripto certe absentes, levioris momenti videntur, nam in *Adeniis* nunc manifeste obviæ [*Ad. multiflorum* Kl. l. c.] nunc omnino deficientes, v. g. in *Ad. specioso* Fenzl.

Hiscæ omnibus perpensis species amborum generum hucusque cognitæ forsitan sequente

modo commode exponendæ, simulque ob antherarum et seminum structuram sedule observandam peregrinatoribus futuris commendandæ:—

ADENIUM, R. & Sch.

1. *A. obesum*, R. & Sch. [*Ad. Honghel*, Lindl.].
2. *A. Honghel*, Alph. DC. [nec Lindl.].
3. *A. multiflorum*, Klotsch.
4. *A. speciosum*, Fenzl.

PACHYPODIUM, Lindl.

1. *P. tuberosum*, Lindl.
2. *P. succulentum*, Alph. DC.
3. *P. bispinosum*, Alph. DC.
4. *P. Namaquanum*.

Adenium Namaquanum, Wyley in Harv. Thes. Cap. ii. tab. 117.

5. *P. Lealii*, Welw.

Speciebus utriusque generis in posterum exactius cognitæ, et quoad antherarum seminumque structuram accuratius investigatis, ambo genera fortasse in unum conjungenda et tum *Pachypodium* atque *Adeniopsis* generi *Adenio* antiquiori ceu Sectiones subscribenda erunt, vix unquam vero, imo si reapse inter se diversa statuuntur, in diversas ordinis sui tribus divellenda.

Ordo GENTIANACEÆ.

Trib. I. GENTIANEÆ. Subtr. 2. CHLOREÆ, DC. Prodr. ix. p. 49.

FAROA, Welw. gen. nov.*

Calyx subcampanulatus, ad medium quadrifidus, lobis erectis, obtuse carinatis. *Corolla* subhypocrateri-morpha, marcescenti-persistens, tubo sensim ampliato infra faucem obiter constricto, limbi quadrifidi lobis patentibus; faux squamulis quatuor, staminibus oppositis, semilunaribus, margine tenuissime fimbriatis clausa. *Stamina* quatuor, ad sinus loborum inserta, longe exserta, filamentis suberectis filiformibus; antheræ breves, late oblongæ, basi cordatæ, dorso ad sinum fixæ, demum incumbentes, immutatae. *Ovarium* obovoideum, basi in stipitem brevem angustatum, carpellorum marginibus introflexis subbiloculare, ovulis juxta suturas biserialibus. *Stylus* rectus, elongatus, filiformis, stigmate parvulo simplici, tenuissime papilloso vel brevissime bilobo. *Capsula* parva, oblonga, perianthio marcescente inclusa, bivalvis, septicida, semibilocularis, placentis juxta valvularum margines insertis. *Semina* numerosa, subglobosa, testa undique foveolata.

Herba parva, annua, glabra, radice pluricipite; caulibus erectis simplicibus vel apices versus trichotome ramosis, tetragonis. *Flores* parvi, gracile pedicellati, in cymas densas corymbiformes foliis 2 vel pluribus involucrentas dispositi, violaceo-cærulei.

Genus ni fallor prope *Hippion* Spgl. [*Enicostema* Blum.] collocandum, cui ob flores

* Dicatum est clarissimo Doctori T. C. P. Lapa e Faro, Medico mossamedensi experientissimo, mearumque in Districtu Mossamedes institutarum peregrinationum fautori humanissimo.

in foliorum axillis pseudo-verticillatim gregatos, corollæ faucem squamigeram, capsulæ structuram et semina foveolata aliquantulum affine videtur. A *Sebæa* generibusque huic vicinis tum habitu peculiari quum corollæ capsulæque fabrica interna longius distat.

Species unica :

FAROA SALUTARIS, Welw. n. sp. (Tab. XVII.)

Habitat frequentissima in pascuis humidiusculis arenoso-argillaceis totius fere Distr. Huilla, inter 4000 et 5500 ped. altit., præcipue circa Mumpulla et Lopollo. Ab Octobre usque ad Ianuarium floret et fructificat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1523.

Herba elegantula habitu *Globulariam* vel, si mavis, *Iasionem* fingens, pascua editiora et dumeta brevius herbida tempore vernali in *Iridearum*, *Commelynearum* et *Indigoferarum* consortio mira individuorum copia eximie decorans. *Radix* annua [vel plurennis?]*, cylindræa, firmula, in speciminibus vetustioribus sat longa, perpendicularis, fibris lateralibus subsimplicibus elongatis stipata, ad collum incrassatum multiceps, foliorumque primordialium rosula, in planta florente non raro jam emarcida, coronata. *Caules* ex eadem radice 3-5 usque 20, erecti, vel laterales basi ascendentes, 2-4 poll. alti, quadranguli, nunc simplices, nunc a medio bis terve trichotome ramosi, foliorum paribus 3-6, semipollicem ad pollicem usque inter se distantibus vestiti, e viridi purpurascens vel intensius purpurei, apice vel simul ad superiorum foliorum axillas capitulis florigeris ornati. *Folia* radicalia gregata, oblongo-lanceolata vel elongato-spathulata, trinervia, $1\frac{1}{2}$ -3 poll. longa, 3-4 lin. lata, obtusiuscula, basi sensim attenuata, caulina angustiora, lineari-lanceolata vel linearia, lata basi semiamplexicauli inter se connata, apice subobtusa, $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa, rarius linea latiora, nervis lateralibus evanescentibus subtrinervia, patula, intense viridia, carnosula, summa florum capitula involucrentia. *Flores* modice pedicellati, constanter tetrameri, in foliorum axillis superioribus et summis cymoso-fasciculati, cymis multifloris, foliorum internodiis versus apices caulium ramorumque valde abbreviatis in corymbos densissimos capituliformes congestis, capitulis 6-10 lin. diametri, nunc solitariis nunc (in speciminibus robustioribus) pluribus 2-4 in eodem caule superpositis. *Pedicelli* strictiusculi, fere setiformes, floribus (circiter duas lineas longis) paullo longiores, una cum calyce et corolla violaceo-cærulei vel roseo-violacei, rarius violaceo-albidi, exsiccatione mox pallide albescentes. *Calycis* tubus subquadrangulus; lobi ovati, inferne membranaceo-marginati, dorso obtuse carinati, apice carina excurrente obtuse apiculati, corollæ tubo paullo breviores. *Corollæ* tubus sub prima anthesi a basi faucem versus sensim sed parum ampliatus, ovario demum incremente, inter hoc et faucem squamigeram plus minusve constrictus; limbi patentis lobi ovati, concaviusculi, obtusi, rarius subacuti, tubum longitudine subæquantes. *Squamulæ* faucis versus ejus centrum conniventes. *Filamenta* compresso-filiformia, violaceo-albida, una cum antheris intense purpureo-violaceis, exsiccatione albidis, longe persistentia. *Stylus* gracilis, stamina æquans vel iisdem paullo longior, stigmate exiguo nunc simplici, dense tenuiterque papilloso, nunc brevissime bilobo terminatus. Cetera generis.

Qualitates et Usus.—Inter plures *Gentianaceas* in Distr. Huilla a me observatas et ob principium amaricanti-tonicum, quo pollent, sub forma decocti caulium et radicis ceu remedium roborans, digestionis post febres intermittentes perturbatæ vigorem restaurans, adhibitas, hanc præsentem speciem ægro-

* Plurima loco citato a me collecta specimina habitu suo plantam quidem *annuam* indicant, ast simul alia robustiora adsunt, quorum radix circa collum valde incrassata et fere lignosa vitam plurennem vel saltem biennem indigitat. Plures enim in eadem regione Huillensi plantarum tum *Monocotyledonearum* quum *Dicotyledonearum* species observavi, quæ habitu pusillo, gracili et radice tenuiter fibrillosa plantam annuam simulant, dum reapse perennantibus vel saltem per plures annos viventibus adnumerandæ sunt. Sic ex. gr. variæ species *Droseræ*, in spongiosis editis Distr. Huilla frequenter obviæ, omnino habitum plantarum annuarum fingunt, sed tamen gemmula, in radicis collo intra foliorum radicalium rosulam emarcidam abscondita et quolibet anno sequente in plantam novam evoluta, vitam perennem ducunt.

tantibus præ ceteris salutarem expertus sum, qua ratione ductus plantam nomine specifico "*salutaris*" designavi.

Observatio.—*Sebæa involucrata* Klotzsch, in Peters, Reis. Mossamb. i. p. 271, quantum e descriptione *l. c.* data concludere licet, forsitan alteram *Faroæ* speciem sistit, a nostra tamen foliis involucrantibus magnis cordato-lanceolatis scariosis et præcipue calycis laciniis obovato-spathulatis statim dignoscendam, cujus autem specimina nondum videre licuit.

BELMONTIA, E. M.

BELMONTIA GRACILIS, Welw. n. sp. *B.* caule erecto, 4-gono, filiformi, simplici vel parce ramoso; foliis anguste lineari-lanceolatis linearibusve, internodiis brevioribus, canaliculatis, basi semiamplexicaulibus; calycis profunde 5-partiti segmentis lato-lanceolatis, longe acuminatis, margine late membranaceis, dorso alato-carinatis; corollæ tubo gracili, sursum ampliato, limbi 5-fidi lobis ovatis apiculatis patulis; antheris quam filamenta brevioribus, glandula elongato-claviformi superatis; stigmatibus oblongo-clavato, stylo recto vix brevioribus, apice subbilobo.

Habitat in pratis spongiosis Districtus Huilla, ad 5000 ped. altit. socialis cum variis *Utriculariis*, *Xyrideis* et *Eriocauloneis*, imprimis inter Lopollo et Monino, ubi mense Aprili 1860 c. fl. et fr. legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1524.

Stirps annua, reliquis generis speciebus multo gracilior. *Radix* brevis, tenuiter fibrillosa. *Cauliculus* filiformis, 3–5 pollices altus, erectus, nunc simplicissimus uniflorus, nunc ramulo uno alterove laterali bi- vel triflorus, foliorum paribus 3 vel 4, pollicem vel sesquipollicem inter se distantibus vestitus. *Folia* ima superioribus duplo breviora et angustiora, illa in medio caulis sita 5–6 lin. longa, $\frac{1}{2}$ vel $\frac{2}{3}$ lin. lata, patula, herbaceo-viridia. *Flores* parvi, longe pedunculati, lutei, subnutantes; pedunculi nudi, in speciminibus unifloris 2–3 pollices longi, erecti, cauliculum terminantes, iis ramulorum lateralium vix pollicaribus et erecto-patulis. *Calycis* segmenta a basi ad medium usque late membranaceo-marginata, demum subulatim acuminata, dorso carinato breviter alata, corollæ tubo paullo breviora. *Corolla* omnino *Belmontiæ cordatæ* var. *micranthæ*, quacum etiam glandularum minutarum glomerulis inter calycem et corollam obviis convenit. *Antheræ* in tubi parte superiore dilatata inclusæ, filamentis breviores, glandula gracili cylindrico-clavata, erecta, ceraceo-aurantiaca terminatæ. *Ovarium* oblongo-ovoideum, bisulcatum, biloculare, placentis latiusculis septulo contiguis. *Stylus* rectus, firmulus; stigma pro more floris sat magnum, elongato-clavatum, apice nunc obiter bilobum nunc integrum, fere styli longitudine, stamina vix superans. *Capsula* ovoidea, corolla marcescente vestita, bivalvis, bilocularis, placentis demum liberis induratis. *Semina* numerosissima, placentis immersa, quadrangulo-prismatica, testa tenuissime dense papillosa.

EXOCHÆNIUM, Griseb.

1. **EXOCHÆNIUM PRIMULÆFLORUM**, Welw. n. sp. *E.* annuum, pumilum, erectum; caule a basi trichotome ramoso, quadrangulo, ramis fastigiatis foliosis; foliis erectis lanceolatis vel lineari-lanceolatis linearibusve, acuminatis, trinerviis, basi semiamplexicaulibus; pedunculis axillaribus rectis inæquilongis, inferioribus elongatis, superioribus sensim brevioribus; calycis lobis anguste alato-carinatis, acuminatis, corollæ tubo sursum ampliato brevioribus; corollæ flavæ lobis ovatis, basi angustatis, apice apiculatis; stylo filiformi, recto, glanduloso-puberulo, stigmatibus cylindrico-clavato, simplici vel subbilobo.

β . *nanum*. Cauliculis abbreviatis $\frac{1}{2}$ –1-pollicaribus, cæspitulosus vel fere nullis, pedunculis tunc e foliorum radicalium rosula emergentibus, floribus non raro totius cæspituli altitudine longioribus, limbi corollæ lobis rotundatis, mucronato-apiculatis.

Habitat in spongiosis editioribus Distr. Huilla, inter 5000 et 5500 ped. altit., socialis cum *Droseris*, *Xyrideis* et *Cyperaceis* pusillis, imprimis in alta planitie inter Lopollo et Humpata. Martio floret et fructif. Var. β in ejusdem Districtus declivibus uliginosis hyeme exsiccantibus juxta viam versus Gambos c. fl. Apr. 1860. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1513 et 1514.

Pulchra planta, e longinquo in pratis breve herbis visa quasi *Primulæ acaulis* corymbos aureos mentiens, hinc inde cæspites 25–30-floros obferens. *Radix* e fibris tenuibus abbreviatis dense fasciculata. *Caulis* paullo supra basim in ramos plures 3-chotomos, fastigiatos, subpatulo-erectos divisus, non raro cæspites multifloros 3–6 poll. diametri, sed solummodo 2 ad 5 pollices altos exhibens. *Folia* radicalia caulinis breviora et obtusiora, cito marcescentia, caulina 1–1½ poll. longa, 1–2 lin. lata, in aliis speciminibus angustissima vix lineam mediam lata, sensim longe acuminata. *Pedunculi* axillares vel in ramorum ramulorumque dichotomiis solitarii, erecti, basi subalato-quadranguli, inferiores 1–2 pollices longi, superiores sensim breviores, supremi brevissimi, vix lineam longi. *Flores* sulphureo-flavi vel non raro splendide aurantiaci, erecti, incluso calyce ad $\frac{3}{4}$ poll. longi; limbi 9 lin. diametri, 5-fidi (rarissime 4-fidi), tubo sursum dilatato dimidio brevioris, lobis late ovatis, nunc brevius nunc longius apiculatis. *Stamina* in parte inferiore tubi inclusa; antherarum glandula apicalis cylindræo-clavulata, fere loculis æquilonga, eæ ad basim antherarum sitæ minutæ, subglobosæ, loculis toties breviores. *Stylus* plerumque staminum longitudine, sed etiam iis brevior vel paullo longior, una cum stigmate clavulato-incrassato apice vix bilobo puberulus. *Capsula* ventricoso-ovoidea, corolla marcescente vestita, styli residuis apiculata, bivalvis, bilocularis; placenta centralis, spongioso-carnosula, quadripartibilis, demum libera. *Semina* placentæ immersa, minutissima, subquadrangulari-prismatica.

Observatio.—Characteribus genericis bene cum *Exochaenio* convenit; ab *Exochaenio grandi* Griseb. radice autonoma nec parasitica, caule a basi fastigiatim ramoso, floribus erectis nec horizontaliter nutantibus, alis calycis basim versus evanescentibus nec dilatatis, tubo corollæ calycem longius superante etc. nec non habitu discernitur.

2. *EXOCHÆNIUM DEBILE*, Welw. n. sp. *E.* annuum (?), nanum, flaccidulum, rhizomate subcarnoso, crassiusculo, albido, repente, fibrillis fragilibus stipato; cauliculis erectis, debilibus, quadrangulis, simplicibus vel parce tri-dichotome fastigiatim ramosis; foliis internodiis subbrevioribus, oblongo- vel ovato-lanceolatis plerumque acutis, summis hinc inde linearibus; pedunculis axillaribus vel terminalibus, brevibus, fructiferis subelongatis; corollæ albæ tubo calyce longiore, sursum ampliato, limbi laciniis tubo subtriplo brevioribus, obovato-oblongis, apice rotundato vix apiculatis; stigmate elongato-clavato, glanduloso-pubescente, quam stylus longiore, apice obtusiusculo bilobo.

Habitat sparsim in limosis humidis breve herbis Distr. Pungo Andongo, ad margines lacus magni dicti "Lagoa de Quibinda," ad dextram fluminis Cuije. Cum fl. et fr. Martio 1857. *Exsic.* Welw. It. Angol. no. 1511.

Herbula perparva, forsitan parasitica, habitu *Sebææ pusillæ* (*Lagenias pus.* E. M.) non absimilis, 1–2 pollices alta. *Rhizoma* carnosulum, oblique descendens, fibrillis admodum fragilibus elongatis limum humidum perrepens, e collo caules paucos debiles vix bipollicares, simplices vel fastigiatim ramosos emittens. *Folia* in uno eodemque specimine varia, plerumque lanceolata et acuminata, rarius ovata et obtusiuscula, summa hinc inde anguste lanceolata vel linearia. *Cymulæ* fastigiatae, paucifloræ, hic depauperatae bi-unifloræ. *Flores* una cum calyce 6–7 lin. longi, erecti. *Calycis* alæ breves, ejusdem

segmenta basi late membranaceo-marginata, apice subulata et divergentia. *Corolla* alba, tenera, tubo calycem constanter superante, faucem versus modice ampliato; limbi 5-fidi lobi campanulati patuli, tubo duplo subtriplo breviores, apice rotundato-obtusi, absque ullo mucrone vel apiculo. *Stamina*, antherarum fabrica et stigma nec non capsula et semina fere omnino speciei antecedentis, a qua tamen præsens rhizomatis natura, corolla *alba* duplo minore, tubo corollino elongato et limbi lobis rotundato-obtusis inapiculatis sine difficultate distinguitur.

Observatio.—Quoad herbulæ durationem incertus permaneo; habitus quidem et cauliculorum tenuitas plantam *annuam* indigitant, ast rhizoma crassiusculum et subcarnosum forsitan stirpem biennem vel imo per plures annos durantem sustentat. Conf. Observ. ad calcem *Faroæ salutaris* pag. 46.

3. EXOCHÆNIUM GRANDE, Griseb. DC. Prodr. ix. p. 55.

Habitat freq. in spongiosis pratisque silvaticis uliginosis dense herbidis totius Distr. Huilla, ad 4500–5000 ped. alt., plerumque cum *Droseris*, *Strigis* et *Scleriis* etc. socialis, inter rhizomata aliarum plantarum, imprimis *Cyperacearum*, parasiticum. A Decembri usque ad Febr. flor. et fructif. *Ezsis*. Welw. Iter Angol. no. 1516.

Observatio.—Stirps in DC. Prodr. *l. c.* a clar. Grisebach cum signo ? ceu annua enumerata certe *annua* est et quidem absque dubio parasitica, radicis pro more parvulæ fibrillis carnosulis, albidis, subsimplicibus, tortuosis, rigidulis et fragillimis aliarum plantarum, imprimis *Cyperacearum* rhizomatibus adnascens. Flores plerumque horizontaliter nutantes. Corollæ limbus subbilabiatus. Stamina et styli longitudo reciproca maximo-pere variat; in quibusdam floribus stylus antheris multo brevior et filamenta antheris longiora inveniuntur, in aliis stylus elongatus stamina longe superans simul cum filamentis abbreviatis, antheris subæquilongis, adest. Antherarum loculos in pluribus a me examinatis speciminibus inter se liberos *nec pariete interno concretos*, et quidem rimis lateraliter *nec extrorsum* dehiscentes inveni. Stylum in plerisque floribus simplicem *nec bicerurem* vidi et stigma elongato-clavatum sive oblongo-spathulatum, compressiusculum, glanduloso-pubescens, stylo ipso duplo longius. Ex hic allatis controversiæ resolvuntur, quæ in plantæ descriptione apud auctores occurrunt, neque mirandum cur cl. E. Meyer (Commentar. p. 183) *stylum antheris brevior*em dicit, dum cl. Griseb. *l. c.* ipsum *elongatum*, *corollæ tubum subexcedentem* describit.

Ceterum genera *Lagenias*, *Belmontia* et *Exochænium* nimis affinia vixque notis validis inter se differe videntur, et, ni fallor, potius ceu totidem *unius ejusdemque generis sectiones* consideranda, a genere *Sebæa*, uti hodierno die constitutum, nonnisi staminibus inclusis et antherarum glanduliferarum fabrica tute distinguenda.

Ordo BIGNONIACEÆ.

Subordo SESAMEÆ, Endl. G. Pl. 709.

SESAMOTHAMNUS, Welw. gen. nov.

Calyx parvus, obliquus, 5-dentatus, persistens. *Corolla* hypocraterimorpha; tubus elongatus, ampliatus, curvus, basi in calcar elongatum horizontale productus; limbus planiusculus, inæqualiter subbilabiatis quinquefidus, lobis rotundatis, tribus quam ceteri majoribus; faux nuda. *Stamina* 4, subdidynama,

infra faucem corollæ inserta, rudimento 5^{to} nullo; antheræ subsessiles, lineari-oblongæ, apiculatæ, basi cordatæ, loculis rimis lateralibus dehiscentibus. *Ovarium* cylindricum, oblique sessile, basi gibboso-incrassatum, quadriloculare; stylus elongatus filiformis, stigmatibus duobus obovato-ellipticis; ovula juxta loculorum angulum centralem plurima, uniseriata, horizontalia. *Capsula* ampla, lignosa, plano-compressa, obovato-oblonga, transversim septicide bivalvis, valvis planis, septis ab axi placentifera solutis incomplete quadrilocularis, loculis polyspermis. *Semina* in loculis numerosa, compressa, uniseriata, horizontalia, valvis parallela, transverse oblonga, late alata, nucleo obovoideo, alis membranaceis, planis. *Embryo* exalbuminosus, nucleo conformis. *Cotyledones* planæ, obovatæ, vertice cordato-emarginatæ, oleoso-carnosulæ; radícula recta, conica, acutiuscula, ad hilum spectans; plumula inconspicua.

Frutex Africæ trop. occidentalis, glabrescens, glaucescens, trunco brevi difformi, e basi tumida ramosissimus, ramis erectis, virgatis, spinosis. *Folia* decidua, parva, in axillis spinarum fasciculata, obovato-spathulata, petiolis basi articulatis. *Flores* in racemos breves axillares dispositi, magni, pedicellis brevibus crassis suffulti, ex albido rosei.

Observatio.—Genus *Sesamo* proximum et affine, attamen corollæ tubo gracili elongato, basi longe calcarato, ovario basi gibboso, nec non caule lignoso, spinis firmis horrido ab omnibus *Sesameis* hucusque descriptis egregie distinctum, simulque Africæ calidæ *Nandendrea* admodum singularia, et usque huc jam ex *Apocynearum*, *Asclepiadearum*, *Gnetacearum*, *Ampelidearumque* familiis cognita, novo nunc socio e nobili *Bignoniacearum* ordine illustrans.

Species unica:

SESAMOTHAMNUS BENGUELLENSIS, Welw. (Tab. XVIII.)

Habitat sporadica in montosis rupestribus parce dumetosis Districtus Mossamedes (Subdistr. Bumbo) inter Cazimba et Quitibe ad 1000 ped. circiter altitud. supra mare. Octobr. 1859 c. floribus vix bene apertis, Junio 1860 cum fructu maturo legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1509.

Stirps secundum ætatem habitu admodum varians; juvenilis frutex gracilis, strictus, caule ad basim digiti crassitudine, 4–5-pedali, subsimplici vel parce ramoso, juxta totam longitudinem spinis alteris armato, apicem versus florifero, per majorem anni partem aphylo; progrediente ætate vero caulis, basi sensim circuitu increscens, truncum efformat non raro 4–6 pedum circumferentiæ sed humilem, modo supra basim in ramos breves, brachii crassitudine, erectos vel obliquos divisum, ex quibus demum ramuli crebres, erecti, virgati, hinc inde breve ramulosi, spinulis horridi, 4–6 pedes alti, ortum ducunt; truncus basalis ramique primordiales tunc spinis omnibus dejectis, cortice albido-cinereo vel pallide fuscescente, transversim crebre et minute rugoloso sed parum aspero vestiuntur (vid. Tab. XVIII. fig. 1). *Spinæ* a basi lata, longe decurrente, anguste conicæ, $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$ pollicem longæ, apice truncatæ (!), juniores erecto-patulæ, vetustiores horizontaliter patentibus vel imo quidpiam declinatæ. *Folia* in spinarum axillis fasciculata, nonnisi post flores evoluta, integra, membranacea, rigidula, pro magnitudine stirpis parvula, majora vix pollicem longa, 4–6 lin. lata, glaucescentia, obovato-spathulata, penninervia, margine integerrima, in petiolum basi articulatum sensim angustata, jam paullo ante fructus maturitatem decidua; petiolorum autem bases infimæ post folia delapsa persistentes, sensim in tubercula parva ovato-conica apice truncata increscunt, demumque indurescunt et lanugine albida intertexta, acervulos capituliformes, axillis spinarum insidentes, efformant, in omnibus ramis ramulisque plantæ, excepto trunco basali, obvios; nec tamen omnia hæc in quolibet acervulo axillari modo hic indicato congesta tubercula (i. e. petiolorum bases transformatæ) semper eodem in statu permanent, sed eorum adultiora, circa acervulorum basim sita, progrediente ramuli ætate, sensim prolongantur et pariter in spinulas excrescunt, quarum non raro 2–4 in ipsis spinarum axillis, acer-

vulos istos quasi stipantes, inveniuntur*. *Flores* pulchri, carnosulo-rigiduli, infra ramulorum apices in racemos abbreviatis 3-7-flores, erecto-patulos, e spinarum axillis oriundos, collecti; pedunculus communis crassus, subsucculentus, cylindricus, e viridi violascens, basi cicatricibus foliorum delapsorum stipatus, hinc inde squamulis auctus, demum lignescens; pedicelli ejusdem fere ac pedunculus ipse, crassitudinis, 2-4 rarius 5 lin. longi, apice incrassati, medio opposite bibracteolati, bracteolis anguste ovatis sive lanceolatis, vix lineam longis, strictim erectis, in axilla sua gemmulam glandiformem foventibus, in fructu una cum gemmula abortiva persistentibus. *Calycis* laciniae ovato-deltoidae, breviter acutae, 4 anteriores inter se subaequales, postica reliquis paullo brevior et angustior. *Corolla* subhypocraterimorpha, calyci oblique insidens, quasi equitans; tubo $2\frac{1}{4}$ - $2\frac{1}{2}$ pollices longo, medio $1\frac{1}{2}$ -2 lin. crasso, albido-roseo, sursum arcuato, cylindrico, infra faucem dilatato, basi quidpiam ampliata et calcari elongato-conico, obtusiusculo, $1-1\frac{1}{4}$ poll. longo, horizontaliter protenso, cavo munito; limbi planiusculi, fere $2\frac{1}{4}$ poll. diametr., ex albido rosei, intus nivei nitiduli, lobi subbilabiatim dispositi†, late ovato-suborbiculares, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ poll. lati, duo (labium superius fingentes) reliquis paullo angustiores brevioresque, omnes obiter vel vix concavi, margine integerrimi. *Stamina* 4, infra faucem corollae inserta, vix apicibus exserta, subdidynama; duo, labio inferiori respondentia, ceteris paullo longiora eorumque filamenta brevissima, superiorum duorum antherae sessiles; filamentis tamen omnium quatuor longe in tubo, hic pilis minimis adperso, *adnato-decurrentibus*. *Antherae* turgidae, 3 lin. circiter longae, dorso ad emarginaturae sinum fixae, loculis appositis rima laterali dehiscentibus, connectivo ultra loculos in apiculum subuliformem producto. *Ovarium* subcompresso-cylindricum, gibbere basali calcar versus spectante, calycis fundo oblique insidens; discus vix ullus, saltem in alabastris a me examinatis inconspicuus. *Stylus* gracilis, longe exsertus; stigmatis lobi hiantes. *Capsula* rigida, nitidulo-fusca, compressa, elongato-obovata vel obovato-oblonga, uno latere plerumque paullo ventricosa, apice obtusiusculo styli basi indurata apiculata, 3- $3\frac{1}{2}$ poll. longa, $1-1\frac{1}{2}$ poll. lata, juxta facierum medium et margine circumcirca obtuse sulcata, nervis elevatis venulas laterales dichotomas emittentibus longitudinaliter percursa, transversim septicide bivalvis, elastice dehiscens, ob septa, valvis parallela, nunc ab axi centrali placentifera soluta et apice abortiva, inferne imperfecte *quadri-* superne *bilocularis*. *Semina* una cum alis $\frac{2}{3}$, majora imo $\frac{3}{4}$ poll. diam. transversali, quoad directionem in loculis horizontalia, ast quoad faciem nuclei et alae verticaliter, *i. e.* valvis septisque parallele seriata, dense imbricata; alae planae, tenuiter membranaceae, pallide fuscescentes sive badiae, pellucidae, rigidulae, levigatae, margine integerrimae; nucleus turgidulus, 3- $3\frac{1}{2}$ lin. longus, brunneus. Cetera ex caractere generis.

SÉSAMUM (EUSESAMUM) ANGOLENSE, Welw. Apont. p. 588 ‡. *S.* caule erecto, firmo, 3-5-pedali, glabriusculo, superne parce ramoso, foliis oblongo-lanceolatis vel oblongo-linearibus lingulatisve, breve petiolatis vel subsessilibus, inferioribus oppositis, superioribus et floralibus alternis, basi in petiolum angustatis, apice rotundato-obtusis vel emarginatis, margine repando undulatis, supra intense viridibus, glabriusculis, reticulato-rugulosis, subtus, nervis purpureis exceptis, albo-tomentosis; floribus brevissime pedicellatis, speciosis, violaceo-purpureis, nutantibus, 2- $2\frac{1}{2}$ -pollicaribus, fauce bilabiatim campanulata diametri ultrapollicaris; capsula lineari-oblonga, in

* Ex supra dictis colligere licet, *spinas* ipsas *primordiales* plantae nostrae nequaquam pro *ramulis abortivis* habendas, sed potius ceu *petiolorum transformationes* considerandas esse; cui metamorphosi, uti observationes repetitae in loco natali institutae me edocuerunt, etiam *spinæ* (et *rectæ* et *uncinatae*) variarum specierum scandentium ex generibus *Oleodendron*, *Combretum* etc. etc. originem suam debent.

† Limbi dispositio bilabiata minus in flore expanso sed evidentius in alabastris aestivatione observanda, ubi lobi tres majores *interiores*, infimo *intimo*, et duo minores *extimi* inveniuntur, uti in *Labiatis*.

‡ Nomen et habitus plantae atque locus natalis.

rostrum breve demum bifidum acuminata, undique pilis raris albis adspersa; seminibus planiusculis, rugulosis, sulco utrinque acute marginato cinctis.

Habitat in dumetosis silvaticis arenosis Distr. Pungo Andongo, juxta ripas rivorum Lutete et Luxillo, nec non prope Lombe, inter 3000 et 3500 ped. altit. Ab Octobr. ad Decembr. florentem et partim fructif. vidi. Loca humidiuscula amat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1645.

Caulis strictim erectus, penna olorina crassior, in solo pinguiore hinc inde usque 6-pedalis, obtuse quadrangulus, inter angulos sulcatus, junior pubescens, demum glabratus, plerumque obscure purpurascens, a basi foliosus, apicem versus in ramos paucos $\frac{1}{2}$ –1-pedales, erectos, oppositos vel sæpius alternos divisus; internodia inferiora 2-pollicaria, superiora circiter pollicaria. *Folia* quoad indumentum sat constantia, subtus semper tomento laxiusculo albedo, demum exsiccatione griseo obducta, nervo mediano latiusculo venisque saturate purpureis obiter pubescentibus percursa, inferiora 4–3 poll. longa, $1\frac{1}{4}$ –1 poll. lata, superiora sensim minora, præcipue angustiora, floralia sæpius $1\frac{1}{2}$ –1-pollicaria, lingulato-spathulata et apice obtuso vel emarginato mucronata. *Flores* inter congenes maximi, secundi, in racemos laxos elongatos, caulem et ramos terminantes, dispositi, magnitudine in eadem stirpe versus racemi apicem sensim decrescentes, majores $2\frac{1}{2}$ vel imo 3 pollices longi; bracteis inferioribus foliis caulinis homomorphis, iis florum superiorum fere linearibus et apice longius mucronato-recurvis; calyx brevis, persistens, laciniis ovato-acuminatis, piloso-pubescentibus, 3 lin. longis, inter se subæqualibus; corolla lætissime violaceo-purpurea, tubo basi curvato, in alabastro densius, sub anthesi tenuiter pubescens, limbi bilabiati latissime hiantis lobis obtusis, ciliatis, intermedio labii inferioris magis producto. *Ovarium* dense piloso-hispidum. *Capsula* quoad magnitudinem, configurationem et rostri longitudinem iis *Sesami indici* satis similes, sed maturitate fere glabrata vel pilis albis distantibus obsita. *Semina* nigricantia, breviter obovata, 1 lin. longa, plano-compressa, utraque facie rugulosa, totoque ambitu sulco latiusculo pariter ruguloso et utrinque acute marginato notata.

Species florum amplitudine nec non foliis subtus albo-tomentosis ab omnibus hucusque descriptis sat distincta, simulque planta pulcherrima, *Digitalem* luxuriantem æmulans, cultura in hortis dignissima.

Observatio.—Species altera, ut videtur etiam indescripta, quam nomine *Sesami calycini* in herb. Angol. designavi, huic supra descriptæ proxima et habitu valde affinis, sed omni respectu duplo vel imo triplo minor, 2– $2\frac{1}{2}$ -pedalis, foliis angustioribus, apice subacutis vel acutatis, corollis roseis 10–15 lin. longis (nec 2–3-pollicaribus) etc. discrepans, præcipue autem foliis subtus non incano-tomentosis, sed glabriusculis, lepidoto-glauciscentibus et calycis laciniis lanceolato-linearibus, longe acuminatis, 4 lin. longis glandulisque petiolaribus evidenter stipitatis differt. Crescit hæc species in arenosis parce et breve dumosis inter Præsidium Pungo-Andongo et Sansamanda, mense Januarii 1859 c. fl. et fr. lecta.

Exsic. Welw. Iter Angol. no. 1644.

Caules fere teretes, atque etiam fructiferi undique pilis albis adpersi. *Folia* quam in *Ses. Angolensi* duplo breviora et angustiora, floralia acuminata, omnia supra glabrescentia, intense viridia, subtus nervo mediano venisque atque venulis transverse anastomosantibus elevatim prominulis et intense purpureis percursa, ceteroquin lepidibus argenteis dense gregatis glaucescentia. Lepides hæc iis quæ in caulibus, foliis atque floribus variarum specierum *Pedalinearum* occurrunt, exacte similes itidemque, sed minus copiose muciparæ. Conf. *Linariopsidem prostratam*, hic infra descriptam.

Subordo PEDALINEÆ.

PTERODISCUS AURANTIACUS, Welw. n. sp. *Pt.* subsucculentus, foliis oblongo-lanceolatis vel obovato-spathulatis, obtusis, margine repando-sinuatis dentatisve, in petiolum longiusculum, circiter pollicarem, basi utrinque glandula ampla auctum angustatis, supra glabriusculis, subtus lepidoto-glauculentibus; corollis vix pollicem longis, aurantiacis, tubo cylindrico, limbi subbilabiatim patentis lobo infimo majore, omnibus intus pilis crispulis adspersis, extus, uti tubus, lepidotis; fructus compresses tetragono-ovoidei alis semiorbiculatis, transverse plicato-radiatis, basi rotundata liberis, apice inter se confluentibus.

Habitat rarior in sabulosis maritimis Distr. Mossamedes, ad ripas fluminis Bero, ubi Julio 1859 c. fl. et fr. legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1658.

Herba radice crassa fusiformi perennans, tota carnosula. *Caulis* decumbens, sesquipedalis, inferne glaber, epidermide crassiuscula albida, facile secedente, obtectus, superne et ad ramos oppositos vel rarissime alternos dense sed minute albido-lepidotus. *Folia* opposita, patula, fragilia, majora, petiolo 1-1½ poll. longo excepto, 2-2½ pollicaria, ¾ vel 1 poll. lata, margine obiter repanda vel remote dentata aut inæqualiter crenulata, apicem caulis ramorumque versus sensim minora; glandulæ* ad petiolorum basim pro more magnæ, depresso-globosæ, atropurpureæ, e nucleo compactiore et excipulo crenato arcte adpresso, sive squamulis in excipulum connatis consistentes. *Pedicelli* circiter 3 lin. longi, densissime lepidoti. *Flores* una cum calyce profunde 5-partito 10-14 lin. longi, rigiduli, intense aurantiaci, extus undique lepidibus minutis argenteis (iis quæ ad folia et ramos novos occurrunt, similibus sed rarioribus) obsiti; tubus circiter ½-pollicaris, faucem versus parum ampliatus, mox in limbum subbilabiatim ¾-lobum, patentem abiens, lobis rotundatis 3-4 lin. longis, intus crispulopilosis, tribus (labium inferius fingentibus) paullo longioribus, eorumque medio lateralibus ampliore. *Filamenta* basi compresso-dilatata; antheræ circumscriptione late cordiformes, connectivo apiculatæ, loculis subreniformibus, connectivo infra apiculum insertis, inferne liberis, rimula dorsali apertis. *Stigma* bilobum, lobis ovatis (nec subulatis!), superiore erecto, parce vel vix stigmatoso, inferiore reflexo et ad totam superficiem internam dense stigmatoso. *Fructus*, qui obiter aspectus *Combretacearum* quarundam fructos alatos valde simulat, in pedicello parum accreto nutans, siccus, lignosus durus, badio-fuscus, compresses ovoideus, obscure quadrangulus, late quadrialatus, faciebus elevatim laxe reticulatis, alis scariosis, semiorbicularibus vel reniformibus, 5 lin. latis, basi protracta liberis, apice cruciatim connatis. Cetera generis.

Species a *Pterodisco specioso* Hook. et *Pt. Gayi* Decne.† (unicis hucusque descriptis) foliis longe petiolatis et floribus aurantiacis, quam in *Pt. specioso* triplo minoribus, vix pollicaribus facili negotio distinguenda, in territorio Mossamedensi admodum rara, sed probabiliter in terris ad austrum confinibus frequentius invenienda.

LINARIOPSIS, Welw. gen. nov.

Calyx quinquepartitus, lacinia superiore reliquis inter se æqualibus brevior et angustior. *Corolla* tubulosa, tubo vix vel parum incurvo, intus ad staminum insertionem annulo piloso vestito, sensim in faucem subcampanulatam ampliato, limbi bilabiatim quinquelobi lobis rotundatis, infimo protracto.

* Glandulæ, lente fortiore scrutatæ, e nucleo dense carnosus, vertice non raro areola notato, ambitu squamulis pluribus brevibus, obtusis, inter se connatis vel arcte adpressis involucreto, constant, et absque fere dubio flores abortivos indignant.

† Decaisne, Revue du groupe des Pédalincées, Ann. Sc. Nat. 3^me Série, Botanique, t. iii. p. 321.

Stamina quatuor, didynama, fertilia; rudimentum quinti vix ullum; antheræ oblongæ, basi cordatæ, dorso supra sinum fixæ, introrsæ, longitudinaliter dehiscentes. *Ovarium* conico-ovoideum, in disco parum concavo sessile; stylus filiformis, stigmatē parvo bifido, lobis angustis subacutis. *Fructus* calyce persistente parum aucto, laxo patulo stipatus, nucamentaceus, siccus, indehiscens vel tarde apice hians, oblongus vel subobovoideus, quadricostatus, inter costas seriatim tuberculosus, apice obtuso breviter alato-rostratus, absque omni spina, *unilocularis, dispermus*. *Semina erecta*, obovata, compressiuscula, a medio ad basim truncatam usque alato-marginata, testa membranacea, laxiuscula, *levigata*, endopleura tenui; embryo semini conformis; cotyledones planoconvexæ, obovatæ, apice emarginatæ, carnosæ.

Herba montium Benguellæ interioris juga altiora incolens, mucilagine copiosa scatens, radice crassa perennans, caulibus prostratis, a basi ramosis, villosa-pubescentibus; foliis oppositis breve petiolatis, ovatis, subtus glauco-pruinosis et dense lepidotis; floribus axillaribus solitariis, breve pedicellatis, pedicellis *bibracteolatis* glanduliferis; calyce laxo, pilosulo; corolla violacea intus purpureo-striata, extus pubescente; fructu parvulo, erecto, tuberculis longitudinaliter seriatis depressis obsito, ceteroquin omnino inermi.

Genus *Pedalio* quidpiam affine, sed fructu uniloculari et seminibus erectis ab ipso et simul ab omnibus *Pedalinearum* generibus hucusque descriptis satis distinctum.

Species unica:

LINARIOPSIS PROSTRATA, Welw. n. sp.

Habitat in collinis arenoso-humosis, breve herbidis, juxta rivos Distr. Huilla, præsertim inter Mumpulla et Humpata, ad 4000–5000 ped. altit. Octobr. 1859 cum fl. et fr. legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1659.

Herba socialis, habitu quibusdam *Linariæ* speciebus e sectione *Elatinoides* non absimilis, undique plus minusve pubescens vel villosa, ast nequaquam succulenta. *Radix* fere digitum crassa, cylindracea vel fusiformis, fibroso-carnosa, pluriceps. *Caules* prostrati, circiter semipedales, teretiusculi vel obscure quadranguli ramisque oppositis elongatis parce ramellosis dense pubescenti-canescens vel breviter patentim pilosi, apice adscendentes, undique distiche foliosi, internodiis 3–5 lin. inter se distantibus. *Folia* omnia opposita, penninervia, majora 5–7 lin. longa, 3–4 lin. lata, inferiora breve petiolata, ovata, basi rotundata, apice obtusiuscula, margine ciliato repanda vel remote dentata; superiora subsessilia, angustiora magisque approximata; omnia supra pallide viridia, pilis raris, lepidibus intermixtis aspersa, tactu asperula, subtus lepidibus densissime gregatis argenteis* glauco-pruinosa sive albicantia, plus minusve, præcipue juxta nervos venasque pubescentia. *Flores* semipollicares, foliis floralibus, caulinis homomorphis, vix vel parum longiores; pedicelli circiter lineam longi, in fructu incrassati, infra medium bibracteolati, bracteolis minimis, subfiliformibus, in axilla glandulam breve stipitatum gerentibus. *Calycis* profunde 5-partiti laciniae lineari-lanceolatæ, obtusiusculæ, 1½ lin. longæ, pilosulæ, ciliatæ, subpatulæ, in fructu demum paullo auctæ eumque laxo involucentes. *Corolla* vix semipollicaris, in alabastro dense cano-pubescent, demum puberula et lepidibus raris adspersa, sordide violacea, intus, excepto annulo piloso staminum basim ambiente, glabra, purpurascens, striis longitudinalibus intensius purpureis et circa faucis os punctis atropurpureis picta. *Filamenta* basi dilatata, purpureo-punctata; antherarum loculi glanduloso-punctati, basi liberi. *Discus* ovarii basim cingens concaviusculus, luteus, margine tumidulo, in fructu persistens. *Stylus* staminibus longior, incurvus, inclusus, deciduus; stigma pro more parvulum, lobis brevibus angustis. *Nur*

* Lepides hæ, lente fortiore examinatæ, frustula sistent obtuse quadrangula, e 4 vesiculis argenteo micantibus, depresso hemisphæricis, inter se connatis, composita. Lepides in quibusdam *Sesami* speciebus (v. g. in *Ses. calycino* supra commemorato) observata, exacte ejusdem ac in *Pedalineis* structuræ sunt, ast mucilagine minus spissa farctæ.

$2\frac{1}{2}$ –3 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. diametri transversalis, oblongo-subcylindrica vel obovoidea, glabriuscula, dura et tenax, costulis quatuor cruciatim oppositis hinc inde interruptis percursa, inter costulas tuberculis depressis, magnitudine et circumferentia inæqualibus, plerumque longitudinaliter seriatis obsita, apice obtuso costulis duabus oppositis magis prominulis et confluentibus breviter alato-rostrata, carpellorum marginibus introflexis, solummodo basi prominentibus, unilocularis. *Semina* duo, e fundo loculi erecta, $1\frac{1}{2}$ vel vix 2 lin. longa, vertice rotundato-obtusa, basi latiuscule truncata, ibidemque ala brevi, sursum versus evanescente, marginata. *Testa* badia, omnino levigata, embryonem laxè vestiens. *Radicula* cotyledonibus multo brevior, crassiuscula, obtuse conica. Cetera generis.

Qualitates et Usus.—Herba omnibus in partibus mucilagine limpidissima simulque insipida dives, et (etiam per annos jam exsiccata et conservata) aquæ frigidæ vel tepidæ immersa, hanc mucilaginosam reddit limpidamque conservat, qua ratione herbæ hujusce infusum, aut simplex aut succo *Citri* mixtum vel *Saccharo* dulcificatum, in *Tussi*, *Gonorrhœa*, *Dysenteria* etc. potum admodum salubrem, nunc lenientem vel emollientem, nunc refrigerantem ægrotantibus præbet, sæpius decocto *Malvæ* vel *Althææ* et similibus præferendum.

Ordo LABIATÆ.

Trib. OCIMEÆ, Subtr. PLECTRANTHEÆ.

ALVESIA, Welw. gen. nov.

Calyx per anthesim brevissimus, subcupularis, bilabiatus, labiis rotundatis, inferiore latiore emarginato; tubus post anthesim valde auctus, membranaceus, ovoideus, inflatus, ore clauso. *Corolla* tubo brevi cylindrico, incluso, abrupte in faucem oblique subcampanulatam, sensu verticali compressiusculam ampliata; limbi bilabiati labio superiore trilobo, lobo superiore reflexo, lateralibus brevissimis, latioribus, rotundato-obtusissimis, antrorsum spectantibus vel breviter reflexis, labio inferiore porrecto, concavo, obtuso, integerrimo. *Stamina* 4, exserta, declinata, filamentis apice adscendentibus; antheræ biloculares, loculis divaricatis. *Ovarium* gynophoro subbrevis cylindrico impositum, quadrilobum; stylus filiformis, declinatus, stigmate minuto bidentato. *Nucula* perfectæ subsolitariae, lato-obovoideæ, granulatae, basi calycis vesiculoso-ampliati absconditæ.

Suffrutex 3–5-pedalis, *Rosmarini* facie, pubescenti-tomentosus, caule ramisque obtuse 4-gonis, sulcatis, ramulis strictis foliosis. *Folia* parva, oblongo-lanceolata, acuta, integerrima, supra glabriuscula, subtus tomentosa, penninervia. *Verticillastri* in racemos densos ramosos dispositi, laxè tomentosi, pedicellis brevibus. *Flores* rosei. *Calyces* fructiferi in pedicellis apice deflexis penduli.

Genus ob corollæ labii superioris configurationem et calycem fructiferum admodum ampliatus, vesiculoso-inflatum, inter *Plectrantheas* valde distinctum, dicatum velim clarissimo Bento Antonio Alves, viro humanissimo, inter horticultores Lusitanos eminenti, etiam Floræ Lusitanæ studioso, mihiq; olim in variis per agrum Olissiponensem peregrinationibus botanicis amœnissimo socio, amico constanti et fidelissimo.

Species unica:

ALVESIA ROSMARINIFOLIA, Welw. n. sp. (Tab. XIX.)

Habitat in collinis dumetosis silvisque parum densis arenoso-humosis Distr. Huilla, inter 4000 et 5000 ped. altit., prope Mumpulla et Lopollo, fere semper in *Protearum*, *Daphnoidearum* atque *Thesiorum* consortio. Febr.–Apr. florentem, Junio adhuc parce fructificantem legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1636.

Suffrutex pulcher, hinc inde, solo et expositione faventibus, frutescens, caule eodem per plures annos

virente et florente. *Caules* plerumque plures ex eadem radice, basi lignosi, erecti, 3-4-, rarius 5-pedales, obtusanguli, obscure rubentes, pube brevi densa tomentelli, jam a basi ramulis creberrimis abbreviatis, dense foliosis, strictiusculis, sterilibus obsiti, superne parcius ramosi; rami oppositi elongati, æque ac caules inferne ramulis brevibus foliosis abortientibus onusti et apice florigeri. *Folia* opposita, pro magnitudine stirpis parvula, majora 1-1½ poll. longa, 2-3 lin. lata, lanceolata vel oblongo-lanceolata, rarius hinc inde fere linearia, breviter acuta, margine reflexo integerrima, supra læte viridia nitidula, subtus canescenti-tomentosa, penninervia, nervo medio et secundariis angulo acutissimo ab ipso egredientibus subparallelis, supra impressis, subtus prominulis. *Verticillastri* sæpius 6-flori, bracteis ovatis, obtusiusculis, quam pedicelli subbrevioribus, deciduis stipati, in racemos densos, ovato-pyramidatos, demum elongato-cylindricos, plerumque ramosos dispositi. *Inflorescentiæ* partes omnes plus minusve dense tomentosæ et rubore amœnissime roseo suffusæ. *Pedicelli* florigeri 2-3 lin. longi, fructiferi parum longiores, apice deflexi. *Calyx* sub anthesi 2 vel vix 3 lin. longus, externe dense tomentosus, interne nudus, labiis margine densissime ciliato-fimbriatis. *Corolla* 9-11 lin. longa, extus, tubo incluso excepto, laxè tomentosa vel lanuginosa, intus nuda. *Filamenta* juxta basim adnatam tenuiter pilosa, ceterum, uti antheræ, ovarium et stylus totus, glabra. *Calycis* fructiferi tubus admodum ampliatus, vesiculoso-inflatus, 1½ pollicem longus vel paullo longior, diametro pollicari, elliptico-ovoideus, deglabratus vel tenuiter puberulus, e viridi purpurascens venulisque obscurioribus laxè reticulatis percursus, labiis parum vel vix auctis sed nunc arete clausis obtuse apiculatus. *Nucula* perfectæ, reliquarum abortu solitariae, rarissime duæ, late obovatæ vel omnino globosæ, undique glandulis minutis punctiformibus, parum prominentibus obsitæ, in gynophoro parum vel vix aucto, fundo calycis insidente, sessiles. Cetera generis.

Qualitates.—Stirps quidem fere inodora, sed ob frondem gracilem discolorem florumque racemos amplos colore læte roseo superbientes *Adonistis*, imprimis Europæ australioris, ubi probabiliter sub divo prosperabit, magnopere commendanda.

Trib. STACHYDEÆ, Subtr. BALLOTEÆ.

ACHYROSPERMUM ÆTHIOPICUM, Welw. n. sp. *A.* caule herbaceo, erecto, elato, 4-6-pedali, obtuse tetragono, pubescente, parce ramoso; foliis petiolatis, late ovatis vel ovato-ellipticis, basi cuneata et apice longe acuminato integris, margine grosse dentato-serratis, utrinque glabriusculis vel præcipue juxta nervos venulasque hirtulo-pubescentibus; verticillastris sub 6-floris, in spicam densam subtetragono-cylindricam, 2-4 pollices longam approximatis; bracteis late ovatis, abrupte acuminatis, ciliatis, calyce subbrevioribus; calycis tubulosi pubescentis fauce intus puberula, dentibus 2 inferioribus reliquis paullo brevioribus; corollæ albæ, excepto limbo extus pubescente glaberrimæ, labio superiore emarginato-subbilobo, inferioris lobo medio lateralibus duplo latiore, rotundato-obtusum, concavo; styli breviter bilobi lobis æqualibus acutiusculis; nucularum paleis anguste spathulatis, apice obtuso ciliato-barbulatis.

Habitat in silvaticis umbrosis humidis Distr. Pungo Andongo ad 3200 ped. circiter altit., præ ceteris circa cataractas loco dicto Calundo, ubi Maio 1857 c. fl. et fructu necdum bene maturo legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1633.

Herba procera, *Stachydis* speciem luxuriantem simulans, plerumque 4-5-pedalis, hinc inde imo 7-pedalis. *Caulis* rectus, basi penna olorina crassior, obtuse 4-gonus, puberulus, superne teretiusculus ramisque abbreviatis densius pubescens vel pilis patentibus hirtus. *Internodia* inferiora 4-5 pollices inter se distantia, superiora sensim breviora. *Folia* membranacea, petiolis debilibus patula, majora una cum petiolo 1-1½-pollicari ad 9 pollices longa, 3½ poll. lata, basi cuneata sensim in petiolum angustata

ibidemque integra, margine dentibus deltoideis acutatis sursum spectantibus serrata, apice longe acuminata, acumine ipso edentulo, in utraque facie, exceptis nervis venisque puberulis, glabriuscula vel, inprimis superiora et summa ad petiolum nervosque et venas pilis rigidulis crebrioribus, nunc adpressis nunc patulis, adpersa. *Verticillastri* circiter 6-flori, dense spicati; spicae in caulis ramulorumque apice terminales, solitariae, juveniles obtuse 4-goni, florigerae cylindraceae, bene evolutae ad 3–4 pollices longae, apicem versus quidpiam attenuatae, obtusiusculae. *Folia* floralia bractaeformia, subscarioso-membranacea, sessilia, late vel hinc inde fere orbiculato-ovata, apice abrupte acuminata vel cuspidata, extus puberula, margine ciliata, versus apicem spicae angustiora et sensim acuminata, quam calyces paullo breviora, vel ipsos aequantes. *Flores* cujusvis verticillastri plerique sessiles, vel eorum unus aut duo brevissime pedicellati; pedicelli inaequilongi, basi bracteolis ovatis vel lanceolatis longe ciliatis stipati. *Calyx* membranaceus (albidus!) tubulosus pubescens, intus pube rara adpersus, limbum versus modice ampliatus, subbilabiatis $\frac{3}{2}$ -dentatus, dentibus ovatis, acutis, ciliatis, patulis, inferioribus duobus quam superiores paullo brevioribus. *Corollae* albæ tubus vix incurvus, inclusus, glaber; limbi extus pubescentis labium superius obcordato-emarginatum vel obiter bilobum, inferius 3-lobum, lobis lateralibus brevibus rotundatis, intermedio iis duplo majore, rotundato-obtuso et concavo. *Stamina* ascendentia, exserta; filamenta medio tubi inserta sed ad faucem usque adnata, nuda, ima basi in appendiculas membranaceas, tenuissime barbيلاتas, squamulas mentientes producta; antherae loculis confluentibus uniloculares. *Stylus* staminibus fere æquilongus, apice paullo dilatato breviter bilobus, lobis æqualibus, patulis, acutiusculis. *Gynophorum* subquadridentatum. *Nuculae* (solum immaturæ visæ) dorso et vertice paleis membranaceis crebris, imbricatim congestis, spatulatis, apice rotundato ciliato-barbatis, ipsis nuculis sesqui- vel duplo longioribus, comosæ. *Aroma* plantæ vix ullum.

Observatio.—Generis ob nuculas paleis sat conspicuis coronatas in ordine valde singularis, tres species hucusque descriptas invenio, silvas humidæ insularum Java, Luzon et Madagascaria incolentes; nostra hæc, silvarum primævarum Africæ æquinoctialis civis, ab *Achyropermo densifloro* Bl., cui ex descriptione cl. auctoris (Bijdrag. 840) affinis videtur, caule elato 3–6-pedali (nec 6–8-pollicari), spicis cylindraceis 2–4-pollicaribus (nec ovatis sesquipollicaribus), calycis fauce intus pubente (nec nuda) aliisque notis distinguitur; ab *Ach. phlomoide*, Bl. cui *spica laxa* et *bractee unifloræ* adscribuntur, nec non ab *Ach. fruticoso* Benth., *foliis obtusis crenatis* et *spica laxa* insigni, longius distat.

Trib. SCUTELLARINÆ.

TINNEA, Kotschy et Peyr. in Kotschy, Plant. Tin. p. 25*.

Generis distinctissimi character, a clar. auctoribus *l. c.* egregie quidem sed secundum unicam speciem iis cognitam expositus, nunc, speciebus pluribus ex itinere Angolensi reportatis et cum typica comparatis, commode notis sequentibus ampliandus vel modificandus erit:

Calyx tubuloso-campanulatus vel globosus, bilabiatus, labiis integris, fructifer inflato-ampliatus, ventricosus-ovoideus, labiis ad basim usque fissis bivalvis, valvis singulis scaphiformibus. *Corollae* bilabiatae transversim modice compressæ labium superius inferiore duplo brevius, subintegrum vel sinu acuto bilobum, lobis obtusis, rectiusculis vel parum recurvis. *Ovarium* subsessile vel breviter stipitatum, plus minusve profunde quadrilobum. *Stylus* inter ovarii lobos centralis, stamina subæquans, apice subbilobus, lobo superiore brevissimo sterili vel obsoleto, inferiore majore acutiusculo dense stigma-

* Kotschy (Dr. Theod.), Plantæ Tinneanæ, Vindob. 1865, apud Gerold, fil. gr. Fol. pp. 54 cum tabb. xxv.

tosio. *Nucula* clavato-obovoideæ, stipitatae, basi intus areola oblonga concaviuscula notatae, facie interna levigata gibbæ, dorso ala lata, elliptica vel orbiculari, e spinulis aridis radiantibus, pilorum arachnoideorum ope inter se dense contextis formata, scutellata. Cetera omnia conformia.

Herbæ elatae vel suffrutices, Africam æquinoctialem cis et trans æquatorem incolentes, caulibus erectis, parce vel densius ramosis, pubescentibus vel incanis; foliis breve petiolatis, oppositis vel ternis, vel non raro alternis in eadem stirpe simul obviis, ovalibus, integerrimis, membranaceis, glanduloso-punctatis; bracteis latiusculis, herbaceis vel coloratis; floribus axillaribus solitariis, in pedunculis bibracteolatis subsecundis, juxta caulis ramorumque extremitates nunc laxiuscule dispositis vel dense approximatis, fusco- vel violaceo-purpureis, grate fragrantibus.

Genus ab auctoribus in opere citato *Verbenaceis* adscriptum, sed ob calycem fructiferum (in una specie imo jam sub anthesi) ad basim partitum, omnino bivalvem, ovarium evidenter et, saltem in speciebus Angolensibus, sat profunde quadrilobum, nec non propter nuculas sat longe stipitatas dorsoque alato-scutellatas, inter calycem inflatum perfecte liberas et iis generis *Perilomia* H. B. K. omnimode analogas, ne dicam similes, potius inter *Labiatas* collocandum, quibus etiam a cl. Dr^e Thomson* et nuper a cl. Dr^e Hooker† associatum fuit. Unam insuper specierum Angolensium jam anno 1862 loco infra citato inter *Labiatas Scutellarineas* enumeravi, simulque herbæ floriferæ et fructiferæ manipulum in Expositione internationali Londinensi una cum aliis plantis medicinalibus Angolæ exhibui. Tribui *Scutellarinearum* genus hoc subscribendum esse mihi videtur, quoniam calyx bilabiatus labiis integris demum ad basim fissis, simul cum nuculis dorso alatis nonnisi hac in *Labiatarum* tribu occurrit.

Species tres: una (*Tinnea æthiopica* Kotschy et Peyr. l. c.) Africam cisæquatorialem incolens; et duæ novæ Angolenses, nunc exponendæ.

1. *TINNEA ANTISCORBUTICA*, Welw. n. sp. *T.* caulibus herbaceis 3-5-pedalibus, strictim erectis, obtuse tetragonis, inter angulos sulcatis, dense pubescentibus, apicem versus ramosis, a basi foliosis; foliis oppositis aut ternatis vel rarius alternis; bracteis dense imbricatis, late ovatis, apiculatis, roseo-purpureis, calyces florigeros tubuloso-campanulatos sericeo-puberulos excedentibus; calycis fructiferi glabriusculi vel sparse pubescentis valvis antice alato-marginatis.

Catete bulla [nomen vernaculum Nigrit.]. "Planta herbacea vivaz da familia das *Labiadas*, do grupo das *Scutellarineas* etc.," Welw. Synopse explicat. 1862, p. 28.

Habitat non infrequens in silvarum primævarum subumbrosis editioribus Districtuum Golungo Alto et Pungo Andongo, inter 2000 et 3000 ped. altitud., imprimis copiose in declivibus de Serra de Alto Queta prope Sange, ubi ab autochthonibus, qui foliorum pulverem vel infusum tamquam remedium antiscorbuticum adhibent, "*Catete bulla*" nuncupatur. A Novemb. ad Maium flor., Febr. ad Jun. fructificat.

Ersic. Welw. Iter Angol. no. 1632.

Herba perennis, radice lignescente multicipite. *Caules* gregarii, 5-15 ex eadem radice, stricti, plerumque 4-5-pedales, evidenter quadranguli et inter angulos obtusos late sulcati, basi simplices, apice in ramos subbreves erecto-patulos floriferos divisi, plus minusve cano-pubescentes, per totam longitudi-

* "*Labiatarum novum genus*; the four seeds are protected by an enveloping calyx, and feathered white in a beautiful manner; on the grassy banks of Madi, 3° 15' N. Frequent in forests, No. 705." (Dr. Thomson in Appendix G to Speke's 'Journal of the Discovery of the Source of the Nile,' London, 1863, p. 645.)

† Botanical Magazine, tab. 5637.

nem foliis, superioribus sensim minoribus, vestiti. *Internodia* inferiora circiter bi-, superiora 1-pollicaria, ea axis florigeri valde contracta. *Folia* opposita vel ternata, vel rarius et inprimis in superiore caulis parte alterna, petiolo brevi vix $2\frac{1}{2}$ lin. longo suffulta, majora, demto petiolo, $2-2\frac{1}{2}$ poll. longa, $1-1\frac{1}{2}$ poll. lata, penninervia, latiuscule ovata, basi rotundato-obtusa, vel breviter in petiolum canaliculatum angustata, apice obtusiusculo abruptim in apiculam acutata, margine integro ciliolata, superne obscure viridia, glabriuscula vel rugulis minutis asperula, subtus paullo pallidiora, secus nervos venasque pubescentia, inter venas dense glanduloso-punctata, versus apicem caulis sensim minora, brevissime petiolata, obtusiora longiusque apiculata. *Bractea* membranacea, roseo-purpurea, foliis multo tenuiores, sub anthesi dense imbricata, subsessiles, late ovatae vel suborbiculares, 6-8 lin. longae, 4-7 lin. latae, basi subtruncato-rotundatae, apice obtuso apiculatae, utrinque mollissime pubescentes, margine dense ciliatae, calyces ipsis breviores occultantes. *Pedunculi* patentes, vix lineam longi, pubescentes, bracteolis duabus oppositis filiformibus pilosulis stipati. *Calyx* sub anthesi tubuloso-campanulatus, transversim compressus, 4-5 lin. longus, extus dense pubescens, intus tenuiter puberulus, utrinque roseo-purpurascens. *Corolla* 10-12 lin. longa, obscure purpurea, in alabastro pilis albidis adpersa, demum glabrata, resinoso-punctata, fauce et limbo transversim subcompressa, labio superiore obtuse bilobo quam inferius trilobum duplo brevior. *Stamina* labio superiore parum longiora, antheris solis exsertis; filamenta compressa, basi et ad latus internum albido-pilosa, sursum versus sensim dilatata, apice carnosio-incrassato obtuso recurva, laetissime flava; antherae biloculares, loculis ovoideo-globosis subdisjunctis, polline albido turgidis, longitudinaliter apertis. *Ovarium* in gynophoro turgido obscure crenato substipitatum, fere ad medium usque quadrilobum, lobis clavatis, erectis, levibus. *Stylus* staminibus paullo brevior, medio quidpiam dilatatus, apice brevissime bilobus, lobo uno minuto perbrevis, altero crassiore, longiore, intus stigmatoso. *Calyx* fructifer valde auctus, scariosus, ventricosus-inflatus, ovoideo-oblongus, nutans vel pendulus, 8 lin. circiter longus, 5 lin. latus, extus pube tenui hinc evanescente vestitus, intus glabriusculus, et longitudinaliter nervis pluribus crebre venulosus et prominulis percursus, valvis singulis antice in marginem semilunarem, lineam latum, planiusculum, mox leviter revolutum extensis. *Nucula* (*Schizocarpia* Kotschy, l. c.) abortu saepius tres, scutellis dorsalibus oblongo-suborbicularibus, albidis, quoad structuram supra descriptis, 3-4 lin. longis, juxta margines laxè inter se cohærentibus absconditæ, quoad fabricam internam iis speciei sequentis omnino similes, et descriptioni atque iconi speciei typicae conformes.

2. *TINNEA ERIOCALYX*, Welw. n. sp. *T.* caulibus suffruticosis, 1-2-pedalibus, erectiusculis, *teretibus*, inferne cano-puberulis, superne albido-tomentellis, simplicibus vel parce ramosis, a basi foliosis; foliis oppositis vel alternis, rarius subverticillatim ternis; bracteis laxè imbricatis vel remotiusculis, cordato-ovatis vel saepius cordato-suborbicularibus, apiculatis, subcrassis, rigidis, herbaceo-viridibus, calyces florigeros globosos, densissime lanuginosos vel albo-tomentosos æquantibus; calycis fructiferi ovoideo-globosi et dense lanuginosi valvis antice retusis, brevissime vel vix alato-marginatis.

Habitat in collinis breve dumosis, siccioribus et petrosis, juxta silvarum margines Distr. Huilla, frequens circa Lopollo ad 5000 ped. altit. Jan. 1860 c. flore, Martio c. fr. lecta. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1635.

Suffrutex, basi ad altitudinem 3-4 poll. lignescens. *Caules* ex eadem radice plures, saepius sesquipedales, erecti vel basi ascendentes, teretes vel rarius obscure angulati, absque omni sulco, molliter cano-pubescentes, apicem versus nunc albo-tomentosi nunc lanugine nivea obtecti, simplices vel parcius ramosi, ramis suboppositis vel saepius alternis erecto-patulis. *Folia* internodiis $\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}$ -pollicaribus dissita, alterna semper magis approximata, petiolo 1-2-lineari suffulta, majora $1\frac{1}{2}$ poll. longa, 6-11

lin. lata, ovata, basi rotundata vel breviter cuneata in petiolum angustata, margine integra, apice obtusiusculo vel obtuso apiculata, vel rarius sensim in apiculam brevem acutata, utrinque glanduloso-punctata, supra læte viridia levigata vel minutissime rugulosa aut pube rara adspersa, subtus flavovirentia, puberula, vel densius pubescentia, nunc, inprimis locis siccioribus, cano-tomentosa, nervo costisque supra parum, subtus evidentius prominulis, superiora brevius petiolata et obtusiora, sensim in bracteas abeuntia. *Bracteæ* brevissime petiolatæ, basi plus minusve emarginatæ vel cordatæ, apice rotundato apiculatæ, herbaceo-virides, utrinque laxè vel densius tomentosæ, circiter 6 lin. longæ, 5–6 lin. latæ, quam folia quidpiam crassiores et rigidiores, in fructu persistentes. *Flores* subsecundi. *Pedicelli* circiter lineam longi, villosi, infra medium bracteolis 2 oppositis, ipsis duplo longioribus, linearilanceolatis, laxè villosis stipati, in fructu vix accreti. *Calyces*, in alabastro perfecte globosi, dense floccoso-tomentosi, sub anthesi ad 5 lin. longi, labiis truncatis transversim hiantes, jam hac periodo ad basim usque bipartibiles. *Corolla* violaceo-purpurea, ejusdem ac in specie antecedente magnitudinis, limbi labio superiore æque ac in illa, obtuse bilobo. *Ovarium* fere ad medium usque quadri-lobum, glabrum; styli lobulus superior hac in specie non raro obsoletus. *Calyx* fructifer duplo subtriplove auctus, inflatus, clausus, nutans vel pendulus, ovoideo- vel ellipsoideo-globosus, extus dense lanuginoso-tomentosus, ad basim usque bivalvis; valvæ subcoriaceo-rigidæ, subæquales, intus glaberrimæ, nervis pluribus prominentibus percursæ, inter nervos elevatim venulosæ, superior primum decidua. *Nuculæ* abortu non raro tres, elongato-clavatæ, 3–4 lin. longæ, interna facie gibbæ et levigatæ, nonnisi stipitum basi excavata inter se laxè cohærentes, dorso ala arachnoidea, albicante, elliptica, 4–5 lin. longa, 3–4 lin. lata scutellatæ, bilocellatæ, locello altero minore vacuo. *Semen* obovatum, compressum, locelli angulo paullo infra apicem appensum; testa membranacea, badio-flavescens, laxa, infra radiculam in filum tenue, spiraliter tortum, stipitem penetrans, prolongata. *Embryo* rectus, semine dimidio brevior sed parum angustior; cotyledones obovatæ, carnosulæ, leviter convexæ, applicatæ; radícula infra, brevis, obtuse conica.

Ordo POLYGONACEÆ.

Subordo I. POLYONEÆ.

Trib. PTERYGOCARPEÆ, Meisn., DC. Prodr. xiv. p. 3.

OXYGONUM ACETOSELLA, Welw. n. sp. *O. annuum*, glabrum, glaucissimum, carnosulum; caule a basi ramoso, ramis decumbenti-ascendentibus, inferne parce ramulosis, semicylindricis vel subcompressis angulatis; foliis lanceolatis vel lanceolato-oblongis, abrupte acuminatis, basi in petiolum longiusculum alatum sensim angustatis, margine repando- vel sinuato-dentatis; ochreis tenuiter membranaceis, truncatis, ore integerrimis vel minute remoteque denticulatis; racemis terminalibus, virgato-elongatis, gracilibus, interruptis; pedicellis fasciculatis glabriusculis, fructiferis bracteam superantibus; acheniis oblongis, trigonis, juxta angulos subacutos membranaceo-alatis, alis margine obiter repando-denticulatis vel subintegris.

Habitat frequens in collinis arenosis maritimis ex Mossamedes versus Cabo negro, inprimis loco dicto "Praia da Amelia." Junio 1859 cum flore, insequente Julio c. fructu legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1757.

Herba prostrata, caule abbreviato, jam a basi in ramos plures 2–5 poll. longos, hinc inde ramulosos, demum oblique ascendentes diviso. *Folia* majora ad sesquipollicem longa, medio semipollicem lata, margine nunc simpliciter repanda, nunc repando-dentata vel rarius obiter sinuata aut inciso-dentata, exsiccatione utraque facie minutim verruculosa. *Ochreæ* in vivo pallidissime virentes, in sicco albidæ, horizontaliter truncatæ, ore integerrimæ vel rarius denticulis tenuibus remotis obsitæ, nunquam

setoso-ciliatæ. *Racemi* terminales, vel tardius ob rami prolongationem axillares, rectiusculi, semipedales usque pedales, rarius paullo longiores, rachi triquetra. *Bracteæ* 3–5-floræ (floribus pluribus masculis, paucis vel unico hermaphroditis) in racemis novellis continuæ, imbricatæ, demum ad $\frac{1}{3}$ vel $\frac{2}{3}$ pollicis inter se distantes, ore nudæ vel sparsim et minute denticulatæ. *Calycis* limbus tenuiter membranaceus, lacteus, profunde 5-fidus, segmentis patulis obovatis, rotundato-obtusis, concaviusculis, marcescenti- longe persistentibus. *Stamina* 8; filamenta subulata; antheræ didymæ pallide cyaneæ. *Stylus* profunde trifidus; stigmata capitellata. *Achenium* (solummodo submaturum a me visum) vix 4 lin. longum, anguste ovoideum, triquetrum, angulorum alis inter se æqualibus, in vivo ex albido virentibus, margine subintegris vel tenuiter remote crenulatis sive repando-denticulatis, faciebus inter angulos longitudinaliter trinerviis.

Qualitates et Usus.—Stirpis omnes partes, sed præcipue folia tenuiter succulenta, sapore grate acidulo præditæ sunt, et a colonis Mossamedensibus hinc inde foliis *Rumicis acetosæ* substituuntur, quapropter planta ipsa ab illis “*Azedas bravas*” i. e. “*Rumex acetosa sylvestris*” nuncupatur.

Species *Oxygono Dregei* Meisn., DC. Prodr. xiv. p. 38, affinis videtur, quæ tamen a nostrate inprimis foliis *integerrimis* et ochreis ore setoso-ciliatis distinguenda.

Subordo II. BRUNNICHIEÆ, DC. Prodr. l. c. p. 183.

BRUNNICHIA AFRICANA, Welw. n. sp. *Br.* caule frutescente, late scandente, patentim ramoso, ramis elongatis angulatis, inter angulos plurisulcatis, ramulisque horizontalibus virgatis glanduloso-pubescentibus, remote foliatis; foliis membranaceis, breve petiolatis, oblongo-ovatis vel ovato-ellipticis, basi cuneatim attenuatis rariusve subrotundatis, apice oblique acuminatis vel cuspidatis, margine integerrimis, utrinque glabris; ochreis manifestis, brevibus, truncatis, ore scarioso-membranaceis, tenuiter crispatis, demum laxiusculis; cirrhis apice bifidis, cruribus uncinatis vel demum spiraliter intortis; racemis ad ramulos laterales et apicales terminalibus, aphyllis, interruptis, bracteis 2–5-floris; pedicellis plano-compressis, fructiferis accretis, subsecundis, nutantibus, calyce nunc semipollicari 5–7tuplo longioribus, secundum totam articuli superioris longitudinem utrinque ala membranacea, sesquilineam lata, ex apice tubi calycini decurrente, sanguineo-purpurea, in articulo inferiore sensim angustata marginatis.

Habitat in Distr. Golungo Alto editioribus (2000–2400 ped. alt.) ad oras silvarum primitivarum, præcipue juxta cataractam “de Capopa” prope “Sange,” ubi stirpem, in statu fructifero ob fructos pendulos læte sanguineos sat ornatum, una cum *Leea sambucina*, *Bombace Buonopozensi* et specie indescrita generis tropico-americanæ “*Trymatococcus*” sociatam Septembri 1835 c. fl. et fr. legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1754.

Frutex gracilis, caule 10–15 pedes longo, remote ramoso, ramulis patentissimis, debilibus, cirrhorum ope sese firmantibus, late, sed vix alte scandens. *Petiolis* 3–6 lin. longi, canaliculati, basi plerumque decurvi, eadem ac caulis et rami pubescentia, e papulis cylindraceis, brevibus, patulis, rubentibus, subviscosis, dense gregatis constante, obducti. *Foliorum* adultorum lamina $1\frac{1}{2}$ –2 poll. lata, $2\frac{1}{2}$ – $3\frac{1}{2}$ poll. longa, supra læte viridis et lucidula, subtus pallide virescens, exsiccatione nitenti-rufescens et, excepto nervo mediano subtus modice prominente puberulo, utrinque glabra. *Cirrhi* graciles, supraaxillares [pedunculi abortientes?], foliis duplo triplove longiores, cruribus arcuato-divaricatis, excepta basi puberula levigati. *Racemi* floriferi 3–6 poll. longi, fructiferi pedales et longiores, rectiusculi vel ascendentes, rachi compressa, minutim glanduloso-pubescente. *Florum* fasciculi circiter semipollicem inter se distantes, bracteis ovato-acuminatis, carnosulis, membranaceo-marginatis, plerumque 3-floris.

Calyx sub anthesi obfusiformis, herbaceo-viridis, lobis crassiusculis, rigidulis, interna facie amœne roseis, tribus externis quam duo interiores latioribus, omnibus æquilongis et acute acuminatis, erecto-patulis. *Calyx* fructifer trigono-ovoideus, inter angulos longitudinaliter pluricostulatus, fusco-purpureus, inclusis lobis nunc induratis et erectis semipollicem longus, coriaceus, *achenium* maturum arcte includens, demum una cum pedicelli articulo superiore tunc fere 3 pollices longo et modo supra indicato ala splendide sanguinea alato deciduus. *Stamina*, *ovarium* etc. generis.

Observatio.—Unica *Brunnichia* species hucusque descripta, et proinde generis typus, est *Brunnichia cirrhosa* Banks (DC. Prodr. l. c. p. 185), Americam borealem incolens, a qua stirps præsens Africana pubescentia glandulosa, in ramis, petiolis et racemorum rachi manifesta et constante, foliis demum basi cuneatis vel rotundatis (*nunquam cordatis*) et non minus pedicellis fructiferis calyce 5–7tuplo (nec *duplo*) longioribus aliisque notis distinguenda.

Ordo PROTEACEÆ.

Trib. PROTEEÆ.

FAUREA, Harvey.

Generi “*Faurea*” a beato Harvey jam 1847 in memoriam G. Faure, botanophili Capensis instituto, nuper a clar. Meisner in DC. Prodr. xxiv. p. 344 quidpiam locupletato, sed ad unicam tunc solum cognitam speciem circumscripto, nunc, specie altera vel duabus aucto, notulæ sequentes commode addendæ erunt :

Antheræ nunc sessiles, nunc, imo in ipsa specie typica, filamentis brevissimis, compressis, latiusculis, apice plus minus manifeste biauriculatis insertæ, glandula parvula obtuse conica *apiculatæ*, vix unquam omnino muticæ. *Squamulæ hypogynæ* non semper acutæ, sed non raro rotundato-obtusæ, vel truncatæ aut emarginatæ vel demum apice breviter bilobæ. *Ovulum* prope loculi medium suturæ affixum.

Locum *Faurea* systematicum inter *Proteacearum* tribus quod attinet, genus hoc contra cl. Endlicheri et Meisneri opinionem, qui illud *Persooniearum* tribui subscribunt, potius *Proteeis* associandum et quidem pone *Protea* ipsam collocandum esse videtur. A *Persoonieis* calyce *labiatim* fisso nec 4-*sepalo*, antheris calycis *laciniis concavis* nec *sepalorum medio* vel *basi* insertis, stigmate *verticali* demum et ovario constanter *uniloculari* discrepat, dum omnibus hisce notis optime cum *Proteeis* concordat et ipso generi *Protea* adeo affine invenitur, ut ab eo, si inflorescentiam spicatam excipias, non nisi calyce *unilabiatim* reflexo nec *bilabiatim* fisso discerni queat.

Habitu suo *Faurea* quasdam *Helicia* species in Asia tropica occurrentes, etsi ob florum structuram et fructum follicularem ad tribum longe diversam spectantes, non male fingunt.

Ceteroquin *Faurea* inter *Proteaceas* Africanas facile genus unicum *reapse tropicum* habendum ; nam genera *Protea* et *Leucospermum*, quæ itidem singulis speciebus laudati continentis circulos tropicos, et quidem ad Abyssiniam usque invadunt, in ditione Capensi magno specierum numero prædominant, dum *Faurea*, in Africa austro-tropica tam occidentali quam orientali pluribus speciebus earumque formis sive varietatibus numerosis representata, in territorio Capensi, *proprie sic dicendo*, deest ; nam Flora terræ Natalensis, ubi species *Faurea* typica (*F. saligna*) primum detecta fuit, pro magna parte caractere omnino tropico eminet, et ipsa hæc *Faurea saligna* intra circulos tropicos ab Angola ad Zambesiam usque late diffusa reperitur.

Inter generis quoad foliorum figuram et inprimis eorum indumentum sat polymorphi formas varias, quæ Angolæ australis atque Benguellæ interioris montosa, ultra 4000 ped. elevata inter 13° et 16° lat. austr. inhabitant, præcipue sequentes duæ notis constantioribus distinguì possunt, hinc infra, etiamsi non sine aliqua hesitatione, ceu species novæ

propositæ, quibus dein *Faurea saligna* Harv., in eodem territorio cum antecedentibus non infrequenter obvia, caractere specifico quidpiam ampliato vel modificato, comparationis gratia addere liceat.

1. FAUREA SPECIOSA, Welw. n. sp. (Tab. XX.) *F.* ramulis floriferis villosa-tomentosis; foliis molliter coriaceis breve petiolatis, oblongis vel ovato-oblongis, basi breviter attenuatis, apice obtusis rariusve acutiusculis, margine integerrimo planis, utrinque, nec non rhachi et bracteis plus minusve dense villosa- vel lanuginosa-tomentosis vel supra demum subglabratibus; spicis robustis, foliis longioribus vel saltem æquilongis; calycis 9–12 lin. longi dense tomentosi lobis dorso vix sulcatis; squamulis hypogynis late abbreviato-ovalibus, apice rotundato-obtusis truncatisve vel subdenticulatis; ovario undique pilis elongatis, sericeis, penicillatim dispositis, dense barbato.

Habitat in Districtus Huilla silvestribus petrosis vel arenosis editioribus, inter 4000 et 5000 ped. alt., imprimis circa Lopollo et Humpata. Ab Aprili usque Junium florens, Maio ad Julium fructificat. Species uti videtur per Africam austro-tropicam late diffusa, etiam a cl. Kirk et Meller in Distr. Mossambicensis interioribus, inter 2000 et 3000 ped. elevatis, reperta ibidemque (secundum specimina in herb. Kewensi) non minus quam in territorio Huillensi quoad foliorum indumentum varians, propter eorum circumscriptionem vero nec non ob spicas robustas florumque magnitudinem etc. absque dubio præsentis speciei subscribenda. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1622 et 1622b.

Frutex firmus, 6–8-pedalis, nunc arbor parva 10–15-pedalis; trunco ad basim $\frac{1}{3}$ – $\frac{2}{3}$ ped. diametro, cortice profunde rimuloso, aspero, e fusco cinerascens tecto, laxè ramoso, ramis vagis, erecto-patulis, arcuatis, ramulis curvatis vel varie tortis, rigidis, pro more robustis, foliorum delapsorum cicatricibus latis, protuberantibus exasperatis, primum tomento laxo, villis longioribus patulis intermixto obtectis, demum villo sensim delabente, plus minusve pubescentibus. *Folia* bene evoluta una cum petiolo 2–3 lin. longo 4–6 poll. longa, 2–3 poll. lata, plerumque ad utramque faciem tomento plus minusve denso, e villis longiusculis ruditer contexto, in facie superiore demum rarescente, sed saltem juxta nervos remanente obtecta, utrinque pallide viridia, pinnatim nervosa, nervo mediano subtus valde prominente, lateralibus crebris, obliquis, tenuibus, mox paullo supra ortum bifurcatione repetita in venulas anastomosantes sed marginem laminæ nunquam attingentes divisas. *Spicæ* florigeræ ad ramulorum apices in axillis foliorum summorum singulæ, vel internodiis ultimis valde abbreviatis binæ, rarius plures, simplices, strictiusculæ, 5–9 pollices longæ, cylindraceæ, sub plena anthesi transversim sesquipollicem crassæ, obtusiusculæ. *Rhachis* sulcata, firma, circiter $1\frac{1}{2}$ lin. crassa, villosa-tomentosa, infra flores ad altitudinem semipollicis usque squamis scariosis ovato-lanceolatis, acuminatis, sursum versus sensim remotioribus et angustioribus vestita. *Flores* e flavo aurantiaci, dense congesti, sub anthesi horizontaliter patentes, singuli bractea squamiformi ex ovato acuminata, concava, subpatula, extus dense villosa, apice pilorum fasciculo superata, tarde decidua suffulti. *Calyx* fere pollicem longus, rectiusculus vel modice sursum arcuatus, dense cano-tomentosus, tubo cylindraceo medium versus parum angustato, intus nudo, lætius aurantiaco et ob filamenta adnatim decurrentia pluristriato, lobis cochleariformibus 2–2½ lin. longis in alabastro clavatim coherentibus, crassiusculis, rigidis, demum una cum tubo, styli erumpentis ope longitudinaliter fissis atque reflexis, deciduis. *Antheræ* oblongæ, sessiles vel subsessiles, calycis lobis paullo breviores iisque impressæ, basi obiter bilobæ, apice manifeste apiculatæ. *Squamulæ hypogynæ* e lata basi abbreviatim ovals, vel imo semiorbiculares, apice obtuso nunc integræ, nunc subtruncatæ aut emarginatæ vel uno alterove denticulo munitæ et non raro in eodem flore inter se heteromorphæ, in vivo flavæ, carnosulæ, exsiccantes subinduratæ et longius persistentes. *Ovarium* ovoideum, sessile, undique pilis elongatis, rigidulis, albidis, sericeo-nitentibus, primum in comam rectiusculam collectis, mox penicillatim dispositis dense obsi-

tum. *Stylus* filiformis, calyce vix brevior, in alabastro juxta medium curvatus, post anthesim leviter sursum arcuatus, rigescens; stigma subcylindrico-prismaticum, obsolete 4-sulcatum, ad 2 lin. longum, stylo paullo crassior, a medio apicem versus modice clavulato-incrassatum, basi obiter strumulosum, apice obtusiusculum. *Nux* subglobosa, omnino sessilis, pisi minoris magnitudine, undique pilis sericeis ipsa multo longioribus, et inter pilos tomento brevi fulvo oblecta, ad plenam fere maturitatem stylo, tunc delabente, caudata, pericarpio crassiusculo tenuiter suberoso intus levigato. *Semen* subglobosum, seminum *Cannabis sativæ* circiter magnitudine, plane maturum tamen non mihi obvium.

Observatio.—Species hic proposita ad numerosam speciminum seriem in diversis locis lectorum examinata, quoad spicarum magnitudinem et formam, nec non respectu floris partium inter se proportionem sat constans videtur, quoad foliorum indumentum vero admodum ludit, ita ut varietates, notis constantioribus satis distinctæ, vix et ne vix quidem statui possint. Ast ipsum hoc foliorum indumentum magis quantitate quam qualitate variat, nam semper e villis longiusculis crispatis, plus minusve rigidulis, nunc laxius nunc densius intertextis constat, et in ipsis foliis, quæ primo aspectu penitus glabra vel imo in facie superiore nitidula apparent, accuratiore examine saltem juxta nervum medianum vel ad costarum axillas invenitur. Colorem foliorum fere constanter pallide viridem vidi, nisi in stirpibus in locis valde umbrosis obviis, quorum folia, uti hoc in pari casu generatim occurrit, virore magis saturato tinguntur, simulque magis glabrescunt, circumscriptione vero etiam hac in varietate semper ad formam ovalem tendunt.

2. FAUREA DISCOLOR, Welw. n. sp. *F.* ramulis floriferis cano-pubescentibus; foliis tenuiter coriaceis, breve petiolatis, lanceolatis vel lanceolato-oblongis, basi sensim attenuatis, apice acuminatis vel rarius obtusiusculis, margine recurvis, supra pruinoso-canescens, mox deglabratis, lucenti-viridibus, subtus per omnem ætatem dense cano-tomentellis; spicis folia superantibus; rhachi bracteisque et calyce 5–7 lin. longo sericeo-canescens, hujusce lobis dorso obiter sulcatis; squamulis hypogynis deltoideis vel semiorbicularibus; ovario undique et dense pilis sericeis ipso triplo longioribus barbato.

Habitat in Distr. Huilla silvis claris mixtis ad 4500–5000 ped. altit. una cum *Acaciis*, *Proteis*, *Parinariis* variisque *Combretaceis* socialis sed parcius obvia. Aprili et Maio florentem vidi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1594 et 1595.

Frutex plerumque humanæ altitudinis, rarius arbuscula 8-pedalis, laxè comosa. *Ramuli* juniores et floriferi dense cano-pubescentes, adultiores glabri, longitudinaliter rugulosi. *Folia* adulta discoloria, supra nempe, pubescentia juvenili nunc deglabrata lucidulo-viridia, subtus autem ob tomentum breve sed densum, subvelutinum et persistens incana, $2\frac{1}{2}$ – $3\frac{1}{2}$ poll. longa, $\frac{2}{3}$ –1 poll. lata, margine integra et obiter recurva, breviter calloso-apiculata. *Spicæ* in ramulis extimis terminales, circiter 4– $4\frac{1}{2}$ poll. longæ, iis speciei antecedentis graciliores et angustiores. *Rhachis* (pedunculus) infra flores squamis paucis distantibus vel sæpe nullis obsita. *Bracteæ* abbreviatæ, a basi dilatata breviter acuminatæ, patulæ. *Calycis* 4–5 lin. longi modice arcuati plus minusve canescentis lobi $1\frac{1}{2}$ lin. longi, dorsi sulcis pubescentia nunc copiosiore nunc sparsiore oblectis, ast saltem in calyce deflorato semper observandis. *Antheræ* apiculatæ. *Squamulæ hypogynæ* in individuis acutifoliis deltoideæ apice indivisæ, in speciminibus foliis obtusiusculis donatis autem breviores, subsemiorbiculares. *Ovarii* barba ipso triplo vel rarius quadruplo longior, sericeo-splendens, strictiuscula. *Stylus* pro more generis calycis longitudine, barbam longe superans, juxta medium arcuatus, tarde deciduus, stigmate tenuiter clavulato, obscure prismatico, obtusiusculo, basi nunc parum nunc evidentius strumulato. *Fructus* non visus.

Species, vel saltem varietas insignis, quoad spicarum formam et partium floris inter se proportiones antecedenti, quoad foliorum figuram autem sequenti magis affinis, ab utraque tamen foliis ad faciem inferiorem constanter pube brevi, densa, ex albo-cinerascente cano-tomentellis* distinguenda, nihilominus posteriori peregrinatorum observationi denuo commendanda.

3. FAUREA SALIGNA, Harvey, in Hook. Lond. Journ. 1847, p. 373, tab. xv. *F.* ramulis floriferis glabriusculis; foliis lanceolatis, longe acuminatis, in petiolum alatum sensim attenuatis, utraque facie glabris, supra nitidulis; rhachi, bracteis et calyce 4–5 lin. longo sericeo-pubescentibus vel rarius deglabratis; lobis calycinis profunde bisulcatis; squamulis hypogynis lanceolatis, acuminatis vel apice obiter bilobis; ovario pilis sericeis longiusculis, in fructu rarescentibus barbato.

Habitat in Distr. Huilla silvaticis ad 5000 ped. alt., imprimis inter Lopollo et Menino juxta rivorum ripas, vel hinc inde in ipsis torrentium alveis una cum *Salicibus* socialis. Novembri usque ad Januarium et iterum Aprili florentem vidi, Maio c. fr. legi. Primum a cl. Sanderson et Burke in territorii Natalensis interioribus lecta, demum ex iisdem terris a cl. Zeyher et Drege in eorum herbariis divulgata, nuper etiam a cl. Dr^o Kirk e territorio Mossambicensi (fid. herb. Kew.) reportata. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1592 et 1593.

Frutex elongato-ramosus 5–8-pedalis, hinc inde arbor gracilis 12–20-pedalis, trunco vix unquam diametro 4 poll. excedente, inferne tum longe ramis denudato, his atque ramulis erecto-patulis, plus minusve intense purpurascens. *Folia* 3–5, rarius 6 vel 7 pollices longa, plerumque 6–9 lin. lata, vix unquam sesquipollice latiora, recta vel obiter falcata, callo parvulo vel fere lineam longo, atropubente apiculata, margine integro plana vel obsolete repanda, laxeve undulata, jam prima ætate, excluso petiolo hinc inde sparsim puberulo, ad utramque faciem omnino glabra, levigata, læte viridia et utrinque vel saltem supra lucidula. *Inflorescentia* omnis quoad pubescentiæ densitatem valde varians, sed non nisi rarius penitus deglabrata. *Spicæ* graciles, 3–4½ poll. longæ, rectiusculæ, foliis summis fere semper paullo breviores, ad ramulorum apices singulæ vel internodiis contractis in eodem ramulo 2 pluresve gregatæ. *Rhachis* infra flores squamis paucis, remotiusculis, acuminatis, erecto-patulis, non raro jam sub anthesi deciduis munita. *Bractea* rigidulæ, patulæ, concavæ, eæ florum inferiorum late ovatæ, abrupte acuminatæ, superiorum abbreviatæ, apice obtuso cuspidatæ vel fere truncatæ. *Calyx* (saltem in speciminibus Angolensibus) circiter 4 lineas longus, vix unquam lineis 5 longior, lobis lineam longis, dorso longitudinaliter sulcis duobus latiusculis, pro more profundis sed obtusis percursis. *Squamulæ hypogynæ* quam in speciebus antecedentibus angustiores magisque acutatæ, longiores quam latæ, quondam in uno eodemque flore heteromorphæ, una vel duabus apice acuto integris, reliquis tenuiter bilobis. *Antheræ* rarius omnino sessiles sed plerumque filamentis brevissimis sed distinctis insertæ et manifeste apiculatæ. *Nux* ovoidea, 2 lin. longa, 1½ lin. prope medium lata, obtusa, barbæ pilis nunc sparsioribus et plerumque rufescentibus hirta, stylo indurato-rigescente prope medium arcuato, ad plenam fere fructus maturationem persistente caudata, vel demum ejusdem basi remanente apiculata, epicarpio crassiusculo suberoso. *Semen* ad cavitatis latus prope medium fixum, obovoideum, testa membranacea subscariosa brunnea, laxissima vel pro parte omnino soluta.

Ceterum etiam hæc species, quemadmodum duæ præcedentes, nunc foliis longius

* "The existence or absence of pubescence in the adult leaves cannot always be depended upon in distinguishing species; but the short tomentum, especially of their under surface, is of greater consequence than the spreading hairs."—R. BR., "On *Proteaceæ*" etc. in *Transact. of the Linn. Soc.* vol. x. p. 25.

(4–7 lin.) petiolatis simulque angustioribus [qualis forma typica], nunc breviter vel brevissime petiolatis (petiolis vix 1–1½ lin. longis) et tum latioribus variat, quæ ulterior forma præsertim in individuis arborescentibus solo siccioris enatis observatur.

Ordo RAFFLESACEÆ.

Subordo I. HYDNORÆ.

HYDNORA AFRICANA, var. *longicollis*, Welw. (Tab. XXI.) *H. perigonii* tubo ultra ovarium longe producto, limbi tri-rarius quadrifidi laciniis tubo brevioribus, ramentis heteromorphis, extimis densa serie approximatis, elongatis, liberis, compresso-planis, apice longe acuminatis bi-trilobisve, reliquis absque ordine sparsis, discum versus sensim brevioribus, semiadnatis, apice libero subulatis vel omnino papillæformibus; disci pulvinulis ovato-oblongis, obtusiusculis, basi dilatata submarginatis, pulvere griseo farinaceo, mox in mucum deliquescente, obductis; annuli staminigeri medio tubi adnati lobis ovoideis erectis, ad utramque faciem antheris elongatis, varie curvatis, inæquilongis, arcte adnatis dense obtectis.

Habitat in District. Mossamedes sabulosis maritimis, ex Giraúl usque ad Cabo Negro, ad radices *Euphorbiarum* frutescentium nec non *Zygophylli orbiculati* (supra descripti) parasitica. Per totum fere annum, imprimis autem mensibus Martii ad Julium usque floret et fructificat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. n. 530.

Caulis succulentus, perennis vel saltem per plures annos durans, plerumque omnino aut pro majore parte in arena volatili, basim trunci matricis ambiente, sepultus, vetustior circiter pedalis, inferne ad ¾ poll. crassus, decumbens vel ascendens, sparse remoteque ramosus, extus obscure fusco-rubens, intus carne densa pallide latericia faretus, 5–7-angulatus, secundum omnes angulos tuberculis uniseriatis, plus minusve approximatis, subglobosis, apice obtuso minus magisve evidenter concentricè rimulosis obsitus, quorum nonnulla sensim intumescencia simulque elongata formam obconicam induunt et demum in perigonia sese evolvunt, dum reliqua per totam caulis durationem fere immutata permanent, vel parum elongata in ramenta subcompressa, rigida, obtusiuscula collabuntur. *Perigonium* carnosum, rigidum, non raro ad limbum usque in arena absconditum, longitudine varium, 3–7-, imo 8-pollicare, basi rotundato-angustata vel paullo constricta, sessile vel brevissime pedunculatum, extus undique leproso-asperulum, cinnamomeo-brunneum, rugis transversalibus, ad tubi partem cum ovario connatam crassioribus, dense approximatis, notatum. *Tubus* circiter ¾ poll. diametro, infra annuli staminigeri insertionem modice attenuatus, intus levigatus vel obiter striis longitudinalibus parallelis percursus et plus minusve læte rubescens. *Limbi* laciniae (plerumque tres, sed hinc inde quatuor, vid. tab. fig. 3) tubo semper et plerumque multo breviores, crasso-triquetræ, arcuatæ, apicibus brevissime et obtuse acuminatis convergenti-patulæ, intus ex aurantiaco rubræ, et juxta marginis late induplicati faciem totam ramentis supra descriptis, omnibus introrsum directis, echinulatæ, earum discus glaber, sed pro majore parte pulvinulo jam supra notato obtectus, cujus superficies initio albido-pulverulenta mox post anthesim in mucum viscidulum, odore vehementer stercorario ingratum, strato mucoso *Phallorum* sporidia involventi adeo similem, deliquescit. *Annulus* staminiger tubo ad semipollicis vel imo pollicis distantiam supra stigma insertus. *Antheræ* lætissime flavæ et admodum turgidæ, spurie biloculares. *Stigma* in vivo sordide albidum, in flore 3-fido tri-, in 4-fido quadrilobum, lobis abbreviatis, horizontalibus, creniformibus, rotundato-obtusis, tenuissime denseque striolatis, striis nunc obliquis, nunc, uti in stigmate quadrilobo observavi, loborum peripheriæ subparallelis, concentricè curvatis. *Pericarpium* globosum, diametro circiter bipollicari, dure corticatum, extus undique areolis irregulariter pentagonis, parum distantibus, exasperatum, interna facie levigatum, et sulcis te-

nubibus verticalibus, æqualiter distantibus, plus minus manifestis [placentarum in prima juventute forsau parietalium, uti vidisse contendit cl. Endlicher*, vestigiis?], notatum. *Semina* numerosissima, ad placentas deliquescentes densissime gregata, globosa sive obovoidea, seminum *Papaveris somniferi* magnitudine vel recentiora ipsis majora, epidermide crassiuscula, carnosopulposa, minutim scrobiculata, demum collabente involuta, testa brunnea tenuiter membranacea, albumini duro arcte adhærente, primum in pulpa viscidula semitransparente, pericarpium cavitatem omnino replente, nidulantia, post pulpæ exsiccationem quoad volumen diminuta, in globum subcompactum, cavitatem paullo minorem, undique liberum inter se conglutinata.

Observatio.—Formam hic descriptam primum ab *Hydnora capensi* Thunb. specificè diversam credidi, maxime quoniam apud varios auctores plantæ Capensis tubus limbo multo brevior et parum supra ovarium protractus simulque annulus staminiger stigmati valde approximatus dicuntur vel sic picti exhibentur; postea tamen, speciminibus pluribus in diversis locis lectis inter se comparatis, proportionibus allatas plus minusve variabiles et probabiliter ex majore vel minore soli, in quo plantæ crescunt, profunditate ac densitate derivandas agnovi et plantam Angolensem *Hydnoræ capensi* qua varietatem subjungere malui.

Qualitates et Usus.—Omnes plantæ partes, sed imprimis caules [ab aliis “rhizomata” dicti] succo rubente, admodum adstringente scatent, qua ratione a Nigritis et colonis Mossamedensibus ad retia piscatoria variasque telas tingendas adhibentur. Ceterum *Hydnoræ* qualitates eminenter stypticæ, in sanandis ulceribus nec non in corrigendis membranæ mucosæ affectionibus morborum probabiliter satis proficientes, medicorum Angolensium futuræ experientiæ atque observationi admodum commendandæ.

Subordo II. APODANTHÆ.

PILOSTYLES ÆTHIOPICA, Welw. n. sp. (Tab. XXII.) *P.* floribus in involucri erumpentis primum globosi demum irregulariter rupti fundo sessilibus, singulis vel binis, basi decussatim paucibracteatis; sepalis petalisque 5–6–meris, obovato-oblongis vel suborbicularibus, margine eroso-denticulatis; petalis sub disco crasso 5–6–angulato insertis, basi tuberculato-callosis, puberulis; stylo late conico, basi disco cincto, stigmate hemisphærico, minutim ruguloso-striolato, integro vel brevissime 2–3–lobo.

Habitat parasitica ad ramulos *Berliniæ paniculatæ* Benth.†, arboris e *Cæsalpiniearum* tribu, in Districtus Huilla montosis editis de Morro de Monino, intra 5000 et 5500 ped. altit., Aprili–Maio florens. Flores masculi frequentius quam feminei occurrunt, sed nunquam in eadem arbore simul cum femineis a me visi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 529 (masc.) et 529b (fem.).

Arboris ramuli bi- vel triennes, quibus planta nostra innascitur, primum paullo intumescunt simulque circumcirca rimulis longitudinalibus, sæpius interruptis, in fundo materia latericia, tenuissime granulosa repletis, exasperantur. Ex his rimulis paullo post tubercula plus minusve gregata vel plerumque seriata, initio hemisphærica, mox globosa, 2–2½ lin. diametri, dure corticata, undique sulcis minutis concentricis vel squamulis tenerrimis pallide latericiis asperula, intus cava et levigata prorumpunt, quæ demum, jove pluvio stimulata, e vertice dimidiatim vel irregulariter dehiscentia, florem unum [vel rarius duos] in eorum cujusque fundo sessilem et quidem jamjam omnino evolutum denudant‡.

* Conf. Endl. Gen. Plant. p. 75, Observ.

† Transact. Linn. Soc. vol. xxv. p. 311.

‡ Tubercula hæc, quæ florum cunabula sive involucria sistunt, et utero *Angiogasterum*, simulque *spathæ Balanophorearum* analogæ videntur, post eorum dehiscentiam nunc bilabiatis hiantia, nunc, parietis lateribus dejectis, sub forma patellæ, in centro suo florem vel fructum gerentis, persistunt, et ramulo matricali imo post florem vel fructum

Flores dioici, roseo-sanguinei, carnosuli, excepta nimia exiguitate, *Rafflesias* habitu omnino æmulantes, primum globosi $1\frac{1}{2}$ –2 lin. diametro, sub plena anthesi parum latiores et vertice depressi, ope calli brevissimi carnosus intus albidus centro fundi involucri rupto affixi, e perigonii verticillis duobus biseriatim arcte imbricatis columnam stamineam vel pistillum ambientibus et basi bracteis paucis amplexis constantes. *Bractea* 3–5, orbiculata vel late obovata, basi quidpiam incrassata, sessiles, decussatim imbricatae, concavae, margine toto eroso-denticulatae, perigonii verticillo inferiore arcte adpressae eoque breviores et eodem ac flos ipse colore sanguineo ornatae, in fructu persistentes.

MASC. *Sepala* [vel si mavis bractea superiores, reapse juxta spiram ascendentem insertae, sed ob hujus axim adeo abbreviatum in verticillum, calycem simulantem, approximatae] petalis semper isomera, plerumque 6, sed non raro, et quidem in floribus eundem ramum obsidentibus, 5, rarissime 4, e lata basi obovato-oblonga vel suborbicularia, margine pariter ac bractea tenuiter denticulata, petalis æquilonga vel iis paullo breviora, bracteas superantia. *Petala* sub disco crassiusculo angulato inserta, sepalis alterna, hisque quoad circumscriptionem et marginis denticulos similia, sed basim versus magis angustata et intus paullo supra basim callo tuberculiformi subspungioso, tenuissime puberulo [pulvinulis in disco laciniarum *Hydnora* obviis analogo?] obsita, ceterum ut flos omnis glaberrima, sub anthesi erecto-patula, pressione quidem facile secedentia, sed plerumque non nisi cum flore toto decidua. *Discus*, coronam faucis æmulans, carnosus, latiusculus, viscosus, angulis obtuse triquetris, prominenti-subascendentibus, petalis isomeris et cum iis alternis, sinibus petala recipientibus rotundato-obtusis. *Columna* staminea inclusa, cylindracea, ima basi disco cincta, sub apice quidpiam dilatata, composita est e stylo centrali [abortivo] firmo, carnosofarcto, centro pervio, apice, stigmatis loco, pileo fungiformi, depresso hemisphaerico, margine fimbriato, et e tubo staminigero, stylum totum, excluso pileo, arcte vaginante sed ab eo libero, juxta faucem truncatam pileo proximam antheras ferente, infra antheras ad discum usque longitudinaliter et minute costulato-sulcato. *Antherae* numerosae, circa tubi oram simplici serie adnatæ, contiguæ, uniloculares, poro apicali mox extrorsum versus dilatato dehiscentes, effætæ demum et collapsæ tubi oram sub forma membranæ annularis breviter reflexæ cingunt. *Pollen* globosum, glabrum, albidum, levissimum et admodum viscosum, imo post antheras effætæ harum plagis externis et adhuc majore copia fimbriis pilei, tubum antheriferum supereminens, adhærens atque hocce modo obiter aspicienti alterum, *i. e.* secundum antherarum verticillum sive anulum fingens. *Ovarii* vestigium vix ullum, styli axis vero non raro perforatus.

FEM. *Calyx* et *corolla* maris, flos totus tamen sub anthesi quidpiam magis elongatus. *Ovarium* inferum, uniloculare, placentis parietalibus quatuor, multiovulatis, nonnunquam fere omnino inter se confluentibus; ovula oblongo-ovoidea, funiculo brevi, latiusculo, laterali, placentis affixo. *Stylus* amplus, brevis, late conicus, basi disco obtusangulo cinctus (intus tenuissime lamellosus?); stigma hemisphaericum, lata basi styli truncati apici insidens, ab ipso etiam colore obscuriore distinctum, undique rugulis striisque minutis notatum, plerumque simplex, rarius bi- vel trilobulatum, lobulis tum erectis mamillæformibus. *Fructus* baccatus, globosus, perigonii phyllis nunc subscariosis arctiusque imbricatis omnino obtectus. *Pericarpium* carnosum, crassiusculum, uniloculare, indehiscens. *Semina* plurima, minima, sphaeroidea vel subovoidea, in pulpa mucosa viscida transparente laxè nidulantia; testa tenuiter crustacea, reticulata, pallide rubra; nucleo cellulis minimis subglobosis (homogeneis) lætius rubentibus dense repleto. *Flores* et *fructus* recentes sub pressione fortiori succum roseo-sanguineum, chartam eodem colore sat persistente tingentem exsudant.

Observatio.—Uti ex supra expositis patet, character genericus *Pilostylis* in posterum

delapsum arctissime adhærent, ast nequaquam ab ipsius matricis cortice, sed pro majore parte, nisi omnino, e membrana colorata, matricis ramulum sub epidermide, mycelii *fungorum cladophilorum* ad instar, obducente demumque obdurante formata inveniuntur.

valde modificandus et ampliandus erit, quod autem non nisi specierum omnium a variis auctoribus hucusque propositarum reiterato examine fieri potest. Omnes species cognitæ, (forsitan solummodo paucarum vel imo unius ejusdemque speciei varietates?) in *Leguminosarum* ramulis parasitantur, omnesque crescendi modo, habitu, florum magnitudine et colore plus minusve rubescente aliisque notis satis inter se congruunt, dum characteres specifici, ab auctoribus indicati, et inprimis a stigmatis figura desumpti, parum constantes videntur. Discus (sive corona faucis) in utroque sexu speciei nostræ parî modo manifestus, sed in reliquarum specierum descriptione non indicatus, neque in generis characterem commemoratus, forsitan in omnibus speciebus accuratius examinatis inveniendus. Genus "*Sarna*" Karst. (Linnæa, xxviii. 725. 1) absque dubio *Apodantheis* nec *Balanophoreis* adsociandum, et ab ipsa *Pilostyle* nullo characterem differre videtur. Generis "*Apodanthes*" Poit. dignitas et a *Pilostyle* differentia fere solum ex pericarpîi cavitate tetragona, characterem forsitan non satis constante, pendent, et insuper ob flores masculos necdum cognitos dubiosæ remanent.

Ordo MOREÆ.

MORUS EXCELSA, Welw. n. sp. (Tab. XXIII.) *M. dioica*, trunco robusto elato, ramis patentibus, ramulis petiolis nervisque foliorum subtus glabris puberulisve; foliis sublonge petiolatis, oblongis vel ovato-ellipticis, acuminatis apiculatisve, basi rotundatis, margine subundulatis integerrimis vel obiter repandis et apicem versus obscure dentatis, glabris, subtus pallidioribus, subtilissime pubentibus glabratissive (iis arboris juvenilis basi subcordatis, margine toto serrato-dentatis, supra setuloso-asperis, subtus laxè velutino-tomentosis) nervis utrinque costæ ad 15; stipulis lanceolatis subulato-acuminatis puberulis; amentis pedunculatis cylindricis, masculis 5–8 poll. longis, femineis 1–2-pollicaribus; perianthio masculo turbinato-campanulato, sericeo, quadridentato vel quadrilobo; perigonii feminei foliolis lineari-oblongis pubescentibus, apice rotundato cucullato-inflexo barbulatis; stylo excentrico, filiformi, simplici, undique supra medium stigmatoso.

Habitat frequens in silvis primævis elatioribus minus densis Distr. Golungo Alto, Dembos, Cazengo etc. ad 1300–2800 ped. altit., præsertim in declivibus humidioribus de Serra de Alto Queta circa Sange. Octobr.–Nov. floret, Dec.–Februar. fruct. maturat. A Nigritis dicitur "*Mucamba-camba*." *Exsic.* Welw. It. Angol. no. 1559.

Mucamba-camba, *especie de Morus*, Welw. Synopse, p. 8.

Arbor speciosa, excelsa, copiose lactescens, inter silvarum primævarum Angolæ gigantes laudanda, bene adulta 100–120-, imo hinc inde 130-pedalis et altior. *Truncus* rectus, cylindricus, circumferentiam 20–30-pedalem attingens, cortice pro amplitudine arboris haud profunde rimoso, griseo, in individuis vetustioribus ad 40–60 ped. ejus altitudinis ramis denudatus, apice coma late extensa, depresso-hemisphærica coronatus. *Rami* vagi, horizontaliter expansi, aliquanto tortuosi, griseo-fuscescentes; ramuli varie curvi, glabrati, stipularum cicatricibus semicircularibus exasperati, novelli purpurascens, lenticellis elongatulis albidis obsiti et plus minusve puberuli vel hinc densius pubescentes. *Folia* annua, sed tarde decidua, penninervia, quoad circumscriptionem semper integra (i. e. nunquam lobata), respectu indumenti vero secundum arboris ætatem maxime varia; ea stirpis juvenilis quam in adulta multo majora quidem, et inprimis longiora sed brevius petiolata, petiolis circiter semipollicaribus, villosopubescentibus, lamina 6–7 poll. longa, 3–5 poll. lata, basi obiter vel profundius cordata, margine

circumcirca dense serrato-dentata, apice abrupte in acumen fere semipollicare terminata, supra setulis sparsis aspera, subtus plus minusve dense velutino-tomentosa: in arbore adulta florigera foliorum petioli 1-1½ poll. longi, glabriusculi; lamina 4-5 poll. longa, 2-3 poll. lata, basi rotundata, apice brevius acuminata vel cuspidata, margine obiter repando solum a medio apicem versus breve denticulata, supra intense viridis et glaberrima, subtus pallide virens, omnino glabra vel, inprimis juxta nervos, tenuiter puberula, rarius pube densiore, non nisi sub lente fortiore conspicua, subvelutina; costa sive nervus medius supra vix, subtus valide et obtuse prominens; nervi laterales utrinque 13 usque 17, sæpissime 15, alterni, sub angulo acuto divergentes, recti, inter se strictim paralleli, quam costa multo tenuiores, simplices, paullo ante marginem in venulas soluti, una cum costa nunc flavicantes, nunc e flavo purpurascens. *Stipulae* circiter 8-10 lin. longæ, caducissimæ. *Flores*, a me quidem semper dioici observati, non nisi in arboribus vetustioribus (saltem 15-20 annorum) obvii, ad ramulorum novellorum basin prorumpentes. *Amenta* mascula et feminea cylindrica atque pendula; *mascula* graciliora, elongata, non raro ad 7 vel 8 pollices longa, densiflora, 3-4 lin. diametro, pedunculo 3-5 lin. longo, cylindrico et pubescente; perigonium flaccide membranaceum, albidum, campanulatum patulum, nunc 4-dentatum dentibus deltoideo-ovatis, nunc profundius 4-lobum, lobis ovatis obtusiusculis; filamenta longe exserta, una cum antheris alba; rudimentum ovarii constanter obvium, squamuliforme, oblongum, compressum, e centro floris erectum. *Amenta feminea*, non nisi in statu maturescente (syncarpia) observata, masculinis 3-4-plo breviora, sed iis crassiora, 7-8 lin. diametro, densa, carnosio-turgidula sed parum succosa, e viridi flavicantia, stylis longius exsertis nunc jam exsiccatis rigidulis undique horridula; perigonii, basi pilorum circulo stipati, foliola carnosio-tumida, vix inter se coherentia, apice obtuso, incrassato pilisque brevibus barbato, cucullatim inflexa; achenium breve stipitatum, compresso-obovoideum; stylus lateralis, achenio saltem 3-plo longior, filiformis, subflexuosus, a medio ad apicem breviter acutatum stigmatosus. *Semen* obovato-oblongum, linea 1 parum longius, lenticulari-compressum, umbilico prope verticem laterali, testa badia, crustacea, fragili; embryo generi conformis; albumen respectu embryonis voluminis parum.

Qualitates et Usus.—Lignum recens albidum vel ex albido leviter flavescens, demum badio-fuscescens, venis latiusculis varie curvatis et undulatis obscurioribus variegatum, ob tenacitatem longamque durationem inter Angolæ autochthones et colonos Lusitanos multiplicis usus. Syncarpia numerosos passerum greges lauto pabulo sustentant; amenta mascula exsiccando chartam colore læte sulphureo tingunt.

DORSTENIA (KOSARIA) VIVIPARA, Welw. n. sp. *D.* radice globoso-tuberosa, carnosio-farcta; caule simplici, spithameo, gracili, erectiusculo vel ascendente, cylindrico, obiter pubescente, ad nodos inferiores viviparo; foliis longiuscule petiolatis, ovatis, margine ciliolatis, basi breviter angustata integris, a medio ad apicem obtusiusculum usque obtuse dentatis, glabriusculis vel sæpius, inprimis subtus juxta nervos, puberulis; receptaculis in foliorum superiorum axillis solitariis, longe et gracillime pedunculatis, 6-9-radiatis, radiis patulis, rectis, lanceolatis, margine ciliatis.

Habitat gregaria sed paucis locis in umbrosis humosis juxta rivulorum ripas Distr. Pungo Andongo, frequens juxta rivum Candange-camatuta, ad 3200-3500 ped. alt. supra mare. A Decembr. usque ad Febr. floret et fructificat. *Exsic.* Welw. It. Angol. no. 1565.

Herba tenera, debilis, flaccidula, pallide virens. *Tuber* globosum, pisi majoris vel nucis avellanæ minoris mole, dense farctum et, uti omnis planta, copiose lactescens, quolibet anno perit, stirps autem ope tuberculorum in axillis foliorum infimorum sese evolventium demumque radicanum perennat. *Caulis* carnosulus, fragilis, subflexuosus, primum erectiusculus, mox decumbens vel ascendens, ad nodos inferiores tuberculiferos radicans. *Folia* penninervia, tenuiter membranacea, ovato-acuminata, basi breviter angustata, dempto petiolo gracili subpollicari 1½-2 poll. longa, ⅔-1 poll. lata; dentes ad

utrumque laminae latus pauci, distantes et obtusi, sed constanter obvii. *Stipulae* obsoletae. *Pedunculi* patentes, gracillimi, leviter pubescentes, florigeri petiolis breviores, fructiferi iis semper longiores. *Receptacula* parva, parum succulenta, deorsum convexa, fere campaniformia, in juventute pubescentia, fructifera glabrata, herbaceo-viridia, demptis radiis 3 vel vix 4 lin. diametro, radiis singulis ad 2 vel 3 lin. longis, puberulis vel glabris, margine semper breviter ciliatis, a lata basi scusim acuminatis, sinibus obtusis et integris separatis. *Semina* globoso-triquetra (vix ac ne vix quidem uncinata), testa tenuiter crustacea albida, papillis minimis undique exasperata.

Species, ut videtur, distinctissima, nulli cognitarum arctius affinis, inter Africanas etiam caule viviparo et totius plantae teneritate insignis.

DORSTENIA (KOSARIA) BENGUELLENSIS, Welw. n. sp. *D.* radice tubere depresso globoso vel placentiformi; caule centrali, firmulo, erecto, simplici, spithameo sive pedali, cylindrico, succulento, dense pubescente, inferne aphylo; foliis a medio caulis apicem versus sparsis, sensim majoribus magisque approximatis, subsessilibus vel brevissime petiolatis, penninerviis, lanceolatis, oblongo-lanceolatis ellipticisve, basi parum angustatis, margine toto dentatis, apice obtusiusculis, utrinque pubescenti-hirtulis scabrilisve; stipulis lineari-lanceolatis, brevibus, fugacibus; receptaculis in foliorum superiorum axillis solitariis, breve pedunculatis, erectis, concaviusculis, deorsum convexis, sordide flavicantibus, subglabris, ore orbiculato truncato 7–11-radiatis, radiis patentibus, lineari-spathulatis, apice puberulo obtusis.

Habitat rarior et sporadica in pascuis parce dumetosis, arenoso-humosis, breve herbis Distr. Huilla circa Lopollo, inter 4500 et 5200 ped. altit. Legi Decbr. 1859 c. fl. et fr. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1566.

Tuber plerumque placentiforme, 1–1½ poll. diametri, carnosio-farctum, copiose lactescens, basi circumcirca fibris elongatis, tenuibus, breve fibrillosis stipatum. *Caulis* (plerumque unicus, raro duo) e tuberis centro erectus, ½–1-pedalis, pennae anserinae circ. crassitudine, succulentus (exsiccatione valde contractus), cylindraceus, e viridi purpurascens vel omnino purpureus, undique dense pubescens, ad ½ ejus altitudinem aphyllus vel squamulis paucis distantibus obsitus. *Folia* medii caulis ¼–1-pollicem inter se distantia, summa latiora et fere fasciculatim approximata, subcarnosa et rigidula, erectopatula; petioli ½–1 lin. longi compressi; lamina foliorum majorum 10–14 lin. longa, 3–5 lin. lata. *Receptacula* pauca (1–4 in quoque caule), pedunculis 2–3 lineas longis, crassiusculis, firmis suffulta, ore, demptis radiis 3–4 lin. diametro; radii singuli 3 lin. longi, medio vix semilineam lati, denticulo uno alterove interjecto separati, fere ligulaeformes, apicem versus modice dilatati, rotundato-obtusi et puberuli, stellatim expansi, ceterum, uti receptaculum, sordide flavicantes et carnosuli. *Pericarpia* apice breviter bivalvia, post seminis ejaculationem valvas arete claudunt, parietum succulentorum incremento adhuc per aliquot tempus continuante crassiora fiunt et elongantur demumque flosculorum masculorum planum perforant et longe super illud, stylis suis adhuc apiculata, eminent. *Semina* iis speciei antecedentis omni sub respectu valde similia.

Observatio.—Caulis in omnibus speciminibus loco citato a me lectis simplex est, sed in eorum paucis folia medii caulis foliorum parvulorum fasciculum in axillis gerunt, qui forsitan tardius in ramulum evoluturus.

DORSTENIA (SYCHINIUM) PSILURUS, Welw. n. sp. *D.* rhizomate cylindraceo, repente, nodoso, carnosio-farcto, ad nodos fibris longis gracilibus et hinc inde tuberculis clavatis stipato; caule erecto, simplici, 1–2½-pedali, teretiusculo, subsucculento, inferne glabriusculo et laxius, apicem versus densius foliato et pubescente; foliis longiuscule petio-

latis, membranaceis, penninerviis, glabriusculis vel præcipue subtus juxta nervos hirtulis, in petiolum attenuatis, sæpius in eodem specimine polymorphis, basi semper cuneatis, integris, nunc ovato-ellipticis, acuminatis, margine dentatis, nunc obovatis vel obcuneatis, apicem versus plus minus profunde inciso-dentatis vel 3- plurilobatis, lobis inæqualibus, erectis vel patulis, elongato-triangularibus, acuminatis; petiolis angustis, inferioribus elongatis stipulisque parvis lineari-lanceolatis pubescentibus; receptaculis axillaribus, subsolitariis, longe graciliterque pedunculatis, verticalibus, lineari-lanceolatis, brieruribus, crure uno brevior deflexo, abrupte appendiculato, altero erecto longiore, apice simplici vel rarius bifurco, sensim in appendicem ipso crure duplo triplove longiorem, subulatam, rectam prolongato.

Habitat in convallibus umbrosis ad rupium latera Distr. Pungo Andongo ad 3200 ped. circiter altitudinis, præcipue in silva primæva dicta "Mata de Pungo" prope vicum Pungo Andongo. Floret Nov.-Jan., Decbr. ad Mart. fructificat. *Essic.* Welw. Iter Angol. no. 1564.

Rhizoma horizontaliter repens vel oblique descendens, circiter pennæ anserinæ crassitudine, quidpiam flexuosum et hinc inde nodoso-tumidum, ad nodos præter fibras longas tenues unum vel plura tubercula elongato-claviformia, duriuscula sed succulenta, 1-2-pollices longa, deorsum emittens. *Caules* e rhizomatis collo, plerumque solitarii, rarius 2-3, erecti, teretes, parum succulenti, basi glabriusculi, a medio apicem versus sensim densius pubescentes, pube pilis brevibus patulis hyalinis intermixta, subviscida. *Folia* inferiora 2-3 pollices a se invicem distantia, petiolis bipollicaribus, canaliculatis, pubescentibus, versus caulis apicem sensim brevioribus, summis vix lineam longis, patulis suffulta, tenuiter membranacea, demto petiolo 4-6 pollices longa, 2-3 poll. lata, supra læte viridia, glabriuscula vel pilis brevibus raris adpersa, subtus juxta nervos hirtula multoque pallidiora, quoad figuram in eodem specimine maxime variantia, plerumque obovato-acuminata vel obcuneata, basim versus in petiolum attenuata ibidemque integra, a medio laminæ versus apicem dentata, incisa vel lobata, dentibus lobisve terminalibus tum erectis, quam laterales divergentes longioribus, omnibus plus minusve acuminatis vel acutatis sæpiusque apiculo parvo obtuso terminatis; non raro simul cum hisce formis in eodem caule etiam folia elliptico-lanceolata vel ovato-elliptica, margine remote grosse dentata, apice in acumen longiusculum elongato-triangulare producta inveniuntur. *Stipule* anguste lanceolatae vel lineares, longe acuminatae, petiolis multoties breviores, dense pubescentes, hinc margine ciliatae. *Pedunculi* erecti, graciles, eorum longiores bipollicares; receptacula herbaceo-viridia, parum carnosae, in pedunculo verticalia, una cum appendice terminali 3-5 poll. longa, subsemicylindrica, sub prima anthesi latere quidpiam compressa, formam lanceolato-linearem fingentia, fructifera demum [ob ovaria turgida] longitudinaliter torulosa. *Flores masculi* semper monandri a me visi; perigonii tenuissimi limbus breve et irregulariter 3-4-dentatus vel fere obsoletus; filamentum e fundo tubi erectum, liberum, latiusculum, subcompressum; anthera exserta, didyma, rubro-purpurea. *Ovaria* quam flores masculi multo pauciora, ad utrumque latus costæ receptaculi stipiti brevi seriatim inserta, stylis solis supra florum masculorum planum breviter porrectis; stylus plerumque bicurvis, cruribus tum intus stigmatis, rarius indivisus et apice subdilatato fimbriato-papillosus. *Pericarpia* globosa, in receptaculi contextu arachnoideo-celluloso nidulantia, etiam maturitate vix supra planum antheriferum eminentia. *Embryonis* uncinati radícula abbreviato-conica, quam cotyledones obovatae, plicato-venosae, inæquales, in stipitem angustatae, multoties brevior.

Qualitates.—Rhizoma omne et præcipue tubercula oleo æthereo suavissime aromatico pollent et etiam exsiccata aroma per plures annos fere immutatum conservant. Stirps proinde verisimiliter eadem ac plures *Dorstenie* Brasilienses virtute diaphoretica et roborante, vel forsán adhuc efficacior gaudet, sicque medicis Angolensibus, in dysenteria morbisque affinis sanandis, ceu remedium indigenum magnopere commendanda.

Ordo GNETACEÆ.

GNETUM AFRICANUM, Welw. n. sp. *G. fruticosum*, dioicum; caule cylindraceo, gracili, volubili, alte lateque scandente, remote ramoso, ramis ramulisque patentissimis vel retroflexis pendulisve, herbaceo-viridibus, levigatis, valde tenacibus, ad nodos parum incrassatis; foliis breve petiolatis, chartaceo-rigidulis, penninerviis, ovali-vel elliptico-oblongis, rarius lanceolatis, basi sensim vel abruptius attenuatis, nunc subrotundatis, apice abruptim sensimve in acumen 3–5 lin. longum, lanceolatum vel lineare, plerumque obtusum, hinc inde acutiusculum protractis, margine integris vel remote subcrenatis, utrinque levigatis, sub lente fortiore dense pellucido-punctatis, supra læte viridibus nitidulis, subtus pallide virentibus; amentis masculis ad ramulos abbreviatis laterales et apicales terminalibus, solitariis, longius pedunculatis, simplicibus, rhachide compressiuscula, apice conico-subulata, verticillis remotis, globoso-capitatis, involucris cupuliformibus ore truncato subnudis; amentis femineis drupisque non visis.

Gnetum, spec. Welw., Apontam. (1858), p. 545, cum observ.

Habitat in Districtus “Golungo Alto” editioribus (2200–2400 ped.) umbrosis silvarum primitivarum de Serra do Alto Queta, ubi Januar. et Martio florentem vidi, sed stirpem femineam observare non licuit. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1224 & 1225.

Trunculus in speciminibus a me observatis circiter digitum crassus, cylindraceus, subflexuosus, inferne cortice tenui cincrascens hinc inde rimulis angustissimis distantibus notato, tectus, mox ad duos vel tres pedes supra basim trichotome divisus, ramis lateralibus oppositis et intermedio caulem prolongante iterum repetito-trichotomis. *Internodia* inferiora vix bipollicaria, demum sursum versus sensim longiora, in caulis parte superiore ad 6–8 pollices longa, ad nodos modice tumida. *Rami* inferiores circiter pennæ corvinæ crassitudine, superiores et ramuli vix fili emporitici crassitudine, omnes angulo recto patentes vel retrofracti, hinc inde volubiles, extimi flagelliformes, sicque stirpem inter arborum vicinarum frondes late scandentem suspendentes vel ex altiorum arborum coronis longe penduli, pallide herbaceo-virides, rigiduli et tenacissimi, ad imam basim non raro corniculis duobus oppositis, brevibus, rigidis, patentibus, stipulas aculeiformes fingentibus sed reapse ex petiolorum basi remanente et indurata foliorum delapsorum oriundis, muniti. *Folia* perennia, sicque eorum vetustiora non raro ad faciem superiorem variorum Lichenum epiphyllorum orbiculis varie coloratis ornata, etiamsi vix coriacea; petioli 3–4, rarius 5 lin. longi, canaliculati, plus minusve acute carinati, basi vaginante carnosulo-tumidi, hinc exsiccatione plerumque transversim rugulosi, post laminæ lapsum in cornicula supra notata indurati, longe persistentes, et una cum eorum vaginæ caulis ramorumque nodos stipantes; lamina foliorum plene evolutorum 4–5 poll. longa, 2 poll. lata, nervis supra vix, sed mediano subtus ad laminæ medium usque manifeste prominente, costis utrinque 5 vel 6, arcuato-patentibus, sursum et marginem versus sensim evanidis, in vivo e viridi flavescentibus. *Amenta* mascula terminalia, solitaria, gracilia, rectiuscula vel obiter arcuata, pedunculo subcompresso circiter semipollicem longo, ima basi pilorum rufescentium circulo, supra medium bracteis 2 oppositis, ovalibus, acutis, erectis, basi vaginantibus munito, suffulta, excluso pedunculo 2–2½ pollices longa, verticillis 8–10, rarissime pluribus, singulis inter se 1½ lin. distantibus, densifloris onusta; involucra breviter cyathiformia, ore truncato plerumque omnino nuda vel hinc inde tenuiter crispula, staminibus pro more sat longe exsertis coronata. *Filamenta* simplicia, involucella longe superantia, antheris biporosis flavicantibus terminata. *Rhachis* amenti ultra verticillum summum in acumen elongato-conicum, plus minusve acute subulatum, 1½–2 lin. longum strictumque protracta. Cetera generis.

Observatio.—Stirps ab autochthonibus passim “*N-Coco*” nuncupatur et rami ob eorum longitudinem et tenacitatem chordarum ad instar utuntur; folia recentiora autem cocta atque oleo palmarum condita sapidum ipsis cibum offerunt, etiam mihi in istis solitudinibus non raro graviter esurienti nequaquam ingratum. Fructus maturi, qui ex Nigritarum descriptione oblongo-ovoidei et læte rubentes, nucleum pro more sat amplum includunt, ob avium simiarumque voracitatem non nisi rarius inveniendi.

Ordo CYPERACEÆ.

Trib. HYPOLYTREÆ, Nees, Endl. Gen. Pl. 216*.

ASCOLEPIS, Nees.

Genus reformatum et ampliatur :

Spiculæ numerosissimæ in capitula densa hemisphærica vel subglobosa, longe bracteato-involucrata, dispositæ, receptaculo depresso globoso vel hemisphærico, distincte alveolato, insertæ, bisquamosæ. *Squama* exterior plana, angusta, acuminata, vacua, floriferam stipans eaque brevior; squama interior spongioso-turgida, basi interna in rimula hiant florifera, hermaphrodita, sursum in appendicem subulatam vel compresse subprismaticam, longitudine variam angustata. *Stamina* 3 vel 2, rarius 1; filamentis filiformibus, antheris linearibus obtusis. *Setæ hypogynæ* nullæ; discus nullus vel rudimentarius. *Ovarium* anguste ovoideum, obtuse vel acutius trigonum; stylus brevis, basi æqualis, stigmatibus 3, rarius 2, filiformibus, obtusiusculis. *Caryopsis* libera, anguste latiusve obovoidea, plus minus evidenter trigona vel tricostata, glabra†, vertice nuda vel brevissime apiculata aut truncata, lateribus subtilissime impresso-punctulata, quam squama fructifera multoties brevior.

Herbæ elegantulæ, perennes, erectæ, in Africa tropica cis- et transæquatoriali observatæ, cæspitosæ, glabræ, basi foliosæ. *Folia* filiformia vel anguste linearia. *Culmi* stricti, graciles, obscure angulati, rarius firmiores et sulculati, basi succulento-tumescens, foliis laxè vaginantibus vestiti, superne longe nudi, monocephali, infra capitula modice incrassati. *Capitula* globosa, discoidea vel pseudo-radiata, involuero polyphyllo, e foliolis inæquilongis basi dilatata membranaceo-marginatis composito, suffulta, nunc *Kyllingiarum* vel *Eriocaulonearum*, nunc quarundam *Compositarum* capitula radiata mire æmulantia. *Spiculæ* basi arcte imbricatæ, apice liberæ, erectæ vel patentes, coloratæ, niveæ, lacteæ, flavæ vel aureæ, nunquam omnino viridescens, collapsæ demum varie costulatæ vel angulatæ ac plus minus rigidescentes.

Ascolepis, Nees in Plant. Schimp. Abyss. sect. iii. no. 1664.

Kyllingie spec., Steud. in Flora [B. Z.], 1842, p. 597.

Isolepidis spec., A. Rich. Tent. Flor. Abyss. ii. p. 501.

Antrolepis, Welw. Apont. p. 578.

Antrolepis, Thomson in Speke's 'Journ. of the Disc. of the Source of the Nile,' p. 654.

Genus *Platylepidi* Kunth affine et proximum, sed, ni fallor, bene distinctum, hucusque monotypicum, ab acutissimo Neesio ad specimina a cl. Schimper in Abyssinia lecta recognitum, ne dicam divinatum, sed vix ullibi verbis definitum. Differt autem *Asco-*

* Tribus *Hypolytrearum* a C. Neesio olim introducta, nec tamen bene limitata, postea ab Endlicherio l. c. quidpiam reformatam, nunc generis præsentis speciebus pluribus quodammodo illustrata, in posterum, characteribus *Ascolepidis* additis, accuratius circumscribenda.

† *Caryopsis* plene matura sæpius membranula tenuissima, hyalina, arcte adglutinata, sub tritu frustulatim secedente, sed in ovario sub anthesi vix perceptibili obducta invenitur, sicque, obiter aspecta, grisea et omnino levigata, vix punctulata, apparet.

lepis a *Platylepide* receptaculo hemisphærico (nec elongato-conico), squamis floriferis subcylindræco-turgidis (nec plano-compressis), genitalibus in eorum rima basali sitis et liberis (nec intra squamæ utriculo inclusis), stylo typice trifido (nec constanter bifido), caryopsi demum trigona libera (nec biconvexa et in ipso squamæ fructiferæ utriculo inclusa).

A *Kyllingia*, quacum species typica [i. e. *Ascolepis eriocauloides* Nees] a cl. Steudel in plantis Schimperianis Abyss. Sect. II. no. 1195 et postea in Flora (Bot. Zeit.) loco supra citato conjungitur, nec non ab *Isolepide*, cui eadem species ab A. Rich. in Flor. Abyss. subscripta fuit, *Ascolepis* non solummodo genere, sed imo, uti ex supra allatis patet, tribu differt; non enim *Scirpeis* neque *Cypereis*, sed tribui *Hypolytrearum* prope *Platylepidem* adjungenda.

Vegetationis modum quod attinet, species omnes densius laxiusve cæspitosæ crescunt, earumque individua, eximie socialia, capitulis innumeris hinc vere et æstate prata paludosa, illinc autumnali tempore pascua montana humidiora denso agmine decorant, hocque modo, dum vix non semper cum *Xyrideis*, *Eriocauloneis*, *Commelynaceis* atque *Irideis* pumilis, colore et elegantia æque insignibus sociatæ, pascuis illis characterem peculiarem admodum variegatum imprimunt. Species singulæ autem vix unquam in eodem loco promiscue inter se crescentes observantur, et simul etiam rhizomatis indole atque perennandi modo inter se diversæ, unde commode in duas sectiones divelluntur. Species nempe tenuiores rhizoma offerunt e culmorum basi carnos-incrassata et bulbulis gemmæformibus, intra bulbi matricialis vaginas exteriores nascentibus fibrisque crebris gracilibus stipitatis laxè conflatum, dum contra species robustiores rhizomate gaudent lignescente, horizontali vel oblique descendente, ex quo culmi floriferi, basi itidem carnos-tumidi, seriatim vel fasciculatim gregati assurgunt. Species rhizomate bulbulifero donatæ plerumque præcociores sunt, sed individuorum vegetatio, etiamsi jam ineunte vere incipiens, ob bulbulorum in culmos florentes evolutionem successivam, pluviarum copia vel paritate moderatam, in variis locis non raro ad æstatis finem usque extenditur, sicque crebris temperaturæ et humiditatis vicissitudinibus exposita, unde, saltem pro parte, facies polymorpha capitulorum speciei maxime vulgaris, in diversis soli elevationibus æque frequenter occurrentis (*Ascolep. proteæ* nostræ) explicatur; species robustiores autem, rhizomate repente vel nodoso simulque profundius penetrante perennantes, tardius sese evolvunt, non nisi versus æstatis finem vel ineunte autumno florescere solent, sicque imbribus copiosioribus et longius persistentibus irrigatæ, nec non temperaturæ vicissitudini minus subjectæ, etiam quoad capitulorum magnitudinem spicularumque formam et colorem magis constantes inveniuntur.

§ 1. *Rhizoma tenuiter fibrosum, bulbuliferum; caryopsis* $\frac{1}{5}$ – $\frac{1}{2}$ lin. longa, vertice dilatato rotundato-obtusa*.

1. ASCOLEPIS PROTEA, Welw. Culmis (floriferis) 3–10 poll. altis; foliis basilaribus [i. e. e bulbulis non nisi sequente anno culmiferis enatis] fasciculatis, angustissime linea-

* Huic sectioni etiam species typica, nempe *Ascolepis eriocauloides* Nees, l. c. (*Isolepis Ascolepis* A. Rich. l. c.), in Abyssiniæ montosis primum a cl. Schimper, demum a C. Quartin Dillon lecta, inserenda. Specimina sicca hujus speciei Schimperiana, quæ in Herb. Kew. et in Museo Brit. prostant, sat bene cum descriptione Richardii conveniunt, excepta spicularum squama dorsali vacua, a Richardio prætervisa, sed certe obvia. Quoad habitum et capitulorum molem hæc species formis microcephalis *Ascolepidis proteæ* β *bellidifloræ* nostræ satis similis, sed floribus

ribus vel fere capillaribus, erectis, culmo duplo triplove brevioribus, caulinis duobus vel sæpius solitario, culmi basim laxè alteque vaginante, quam basilaria duplo latiore et plerumque arcuatim patulo; capitulis nunc globosis $2\frac{1}{2}$ –4 lin. crassis, nunc plus minusve hemisphæricis, transversim 3–8 lin. latis; spiculis albis vel flavis; squamis floriferis ovalibus, lanceolatis vel lineari-lanceolatis, a medio apicem versus subulatis vel compresso-cylindricis, obtusis vel acutiusculis, singulis e capituli centro peripheriam versus sensim longioribus; staminibus 3 vel rarius 2, stylo tri- vel bifido; caryopsi minima, $\frac{1}{5}$ – $\frac{1}{4}$ lin. longa, obovoidea vel pyriformi, obscure trigona, vertice rotundato-obtuso vix apiculata, ad basim conico-attenuatam oblique truncata.

Habitat in Distr. Pungo Andongo et Huilla montosis breve herbidis subspongiosis a 3200 ad 5000 ped. altit., in demissioribus locis a Novembri ad Martii initium, in editioribus a Januario usque ad Maium florens. Etiam in Africa centrali observata.

Stirps quoad capitulorum figuram et magnitudinem squamarumque florigerarum configurationem et colorem maxime polymorpha, formis numerosis, primo aspectu inter se, uti dicere solent, toto cælo diversis ludens, quæ tamen accuratius examinatæ et comparatæ sensim atque sensim inter se confluunt, ita ut imo varietates, characteribus aliquomodo constantioribus circumscriptæ, non nisi difficiliter et vix bene limitatæ statui queant. Sunt tamen formæ distinctiores sequentes:

α. kyllingioides: capitula virescenti-albida vel sordide lactea, sphærica vel depresso globosa, 2– $3\frac{1}{2}$ lin. crassa; squamæ floriferæ abbreviatæ, ovals vel lato-lanceolatæ, compressiusculæ (in sicco subplanæ), apice obtusæ vel parum acutatae; stamina et stigmata 3; caryopsis vix unquam $\frac{1}{4}$ lin. longior, angulo uno alterove magis prominente.

Habitat in decliviis brevissime herbidis sed humidiusculis inter rupes editiores [3400 ped.] ipsius Præsidi Pungo Andongo loco dicto Tunda Quilombo, nec alibi in omni Angola a me observata. Floret Nov. Decbr. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1667.

Forma omnium præcocior, capitulis plus minusve globosis, compactis, sordide albentibus, *Kyllingias microcephalas* æmulans. Squamæ floriferæ quidem, uti in omnibus sequentibus, turgidæ, sed latiores et breviores simulque quidpiam compressæ, in sicco demum fere planæ apparent et extus 1–3-nerves.

Huc forsitan: *Isolepis Kyllingioides* Rich. Tent. Abyss. ii. 502 trahenda?, sed auctor caryopsim apice acutam dicit, qualem in nulla *Ascolepidis proteæ* varietate observavi.

β. bellidiflora: capitula splendide nivea vel lactea, depresso hemisphærica, transversim 5–8, rarius 3–4 lin. lata, centro plerumque excavata, *Bellidem perennem flore pleno* mire fingentia. Squamæ floriferæ graciles, elongatulæ, lanceolatæ vel lineari-lanceolatæ, apicem versus subulatæ vel compresso-cylindricæ, in sicco demum angulatæ, plerumque laxius quam in *α* et *γ* imbricatæ. Caryopsis in speciminibus robustioribus $\frac{1}{2}$ lin. longa, omnino sessilis.

Habitat in Distr. Pungo Andongo ad 3000 ped. alt., Januario et Febr. florens, nec non in Distr. Huilla pascuis editis ad 5000 ped. alt., ibidemque a Febr. usque ad Maium floret. In Africa centrali durante

constanter monandris et squamis floriferis a basi latiore apicem versus longissime acuminato-subulatis differt. Specimina tamen solummodo pauca, et quidem non nisi e culmis singulis a cæspite solutis constantia, necdum fructifera, examinare licuit.

expeditione Spekeana (fid. Herb. Kew.) a cl. Capt. T. A. Grant in 5° 26' lat. austr. ad 3900 ped. altit. lecta. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1668 & 1672 (formæ platycephalæ), dein 1671 & 1667 *b* (formæ microcephalæ).

Antrolepis leucantha, Welw. Apont. p. 578 (nomen cum observ.).

Antrolepis, sp. n., Thomson, *l. c.* p. 654*.

Capitulorum magnitudo hujus varietatis admodum variat, sed eorum figura (etiam in formis microcephalis, locis macrioribus enatis, et iis varietatis α vix majoribus) semper plus minusve depresso hemisphaerica, disco ad centrum subexcavato. *Squamæ* floriferae in formis microcephalis acutius subulatæ, rectiusculæ, in platycephalis obtusiores et frequenter sursum arcuatæ. *Stamina* in hac varietate non raro 2; stylus nunc elongatulus 3- vel 2-fidus, nunc brevissimus vel fere nullus; *i. e.* stigmata 3 vel 2, ovarii apici insidentia, elongata.

γ . *santolinoides*: capitula sulphurea aut lutea vel intense aurea, ea *Santolarum* vel *Anacycli aurei* quodammodo simulantia, plerumque quam in varietate præcedente robustiora et magnitudine minus variantia. *Squamæ* floriferae paullo turgidiores et obtusiores, excepta forma maxime serotina (*exsic.* no. 1673) in qua sensim longe acuminatæ occurrunt. *Caryopsis* circiter $\frac{1}{2}$ lin. longa.

Habitat in Distr. Pungo Andongo socialis cum var. β , paullo serius florens, et in Distr. Huilla spongiosis de Morro de Lopollo, ad 5200 ped. una cum *Droseræ*, *Utriculariæ*, et *Disæ* speciebus. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1664, 1666, et 1673.

Antrolepis sulphurea et *A. Santolina*, Welw. Apont. *l. c.* (nomina c. notula).

Observ.—Cæspites omnium varietatum laxiusculi. *Culmi* in α et β tenuiores et breviores, sed in omnibus varietatibus quoad longitudinem valde variantes, vix unquam tamen quam 10 vel 12 poll. longiores, basi constanter bulboso-tumidi, disco parvulo, carnosio, fibrillifero suffulti, vaginis emarcidis, basi bulbolum 1 vel plures foveatibus, vestiti; bulbuli minuti, *Cannabis* seminibus vix majores, durante anthesi culmi matricalis folium unum vel plura fasciculata emittunt, quæ cæspitis folia basilaria sistunt, caulinis et involucralibus semper angustiora, sed longiora. *Involucrum* capituli basim arcte amplexens, 7–10-phyllum; foliola a basi latissima, extus profunde plurisulcata, sensim vel abruptius in laminam lineari-lanceolatam acuminata, exteriora 2–4 reflexa, infimo longiore 1–2-pollicari; interiora sensim breviora, squamæformia, spiculis adpressa, iisque æquilonga vel paullo breviora. *Spicularum* longitudo secundum capitulorum diametrum varians, in formis microcephalis lineam vel sesquilineam, in platycephalis, imprimis exteriores, ad $2\frac{1}{2}$ –3 lineas longæ; squamæ vacuæ tenues, lineari-lanceolatæ, planæ, basi hyalino-membranaceæ, floriferis breviores et multo angustiores, earumque dorso arcte adpressæ vel fere adglutinatæ, sicque, præcipue in exsiccatis, facile prætervisæ. *Caryopsis* cinereo-fuscescens vel nigricans, angulis, imprimis vertice et prope basim, non raro obscuris vel omnino evanidis.

2. *ASCOLEPIS ANTHEMIFLORA*, Welw. n. sp. (Tab. XXIV. fig. 9–13.) *A.* culmis 1–1 $\frac{1}{2}$ -pedalibus, gracillimis; foliis basilaribus anguste linearibus, culmo multo brevioribus, abrupte acutatis, caulibus paucis parum latioribus, erectiusculis; capitulis depresso hemisphaericis, radiatis, transversim (inclusis radiis) $\frac{2}{3}$ –1 $\frac{1}{4}$ poll. latis; spiculis aureo-flavis; squamis floriferis centralibus (discum formantibus) abbreviatis, densissime congestis, erectiusculis, cylindraceis; periphericis elongatis, ligulæformibus, stellatim

* “Four to nine inches high; growing like *white daisies*, in rather moist places. Alt. 3900 ft., 5° 26' S. Uncommon.” (Capt. Grant, apud Speke, *l. c.*) Eodem modo et ego formam hanc elegantissimam jam 1858 in Apont. *l. c.* cum *Bellide perenni* comparavi.

patentibus, compressis, subtus obtuse carinatis, supra secundum medium elevatim costatis, illas disci duplo triplove excedentibus, omnibus nitidulis apiceque obtusiusculis vel abrupte subulatis; staminibus 3; stylo trifido; caryopsi $\frac{1}{2}$ lin. longa, elongato-obovoidea vel claviformi, obtuse trigona, minutim apiculata, basi, angulis evanidis, in stipitem brevissimum cylindricum attenuata.

Habitat in Distr. Pungo Andongo interioribus pratis palustribus juxta ripas fluminis Cuije, inter Quibinda et Quitage, una cum *Strigæ*, *Scleriæ*, atque *Commelynearum* speciebus socialis; ad fin. Martii c. fl. et fr. lecta. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1669.

Antrolepis anthemiflora, Welw. l. c.

Cæspites angusti, laxè cohærentes. *Culmi* pro ipsorum longitudine admodum graciles, obsolete angulati, tenuissime striati, infra capitulum parum vel vix incrassati, sat debiles sed constanter erecti. *Folia* basilaria fere capillaria, 4-7 poll. longa, sed in planta florente non raro jam emarcida; caulina paullo supra basim culmi 2-3, inferiora brevivaginata, superius culmum ad 2-2½ poll. altitudinem laxiuscule vaginans, vagina striato-sulcata, sensim in laminam linearem angustata. *Involucri* foliola circiter 10; exteriora basi dilatata, margine lato-membranaceo undulata, laminis inferiorum 2 vel 3 sub plena anthesi reflexis, anguste lineari-lanceolatis, apice obtusiusculis; infimo 2-3 poll. longo. *Capitula* constanter aureo-flava, disco valde depresso, circumcirca longe denseque radiata, *Anthemidum* quarundam calathia eximie simulantia. *Squamæ* floriferæ centrales 1-2 lin. longæ, densissime in discum leviter convexum vel subtruncatum congestæ; periphericæ, i. e. capituli discum circumcurrentes, 4-6 lin. longæ, horizontaliter expansæ, rigidulæ, turgidulæ sed compressæ, semilineam latæ, mox post anthesin (ob carinam et costam nunc magis prominentes) tetragono-prismaticæ, fructiferæ fuscescentes; squamæ vacuæ lineari-lanceolatæ vel lineares, sensim longe acuminatæ, floriferis tamen semper breviores. *Caryopsis* quam in *Ascol. protea* parum crassior sed longior, angulis apicem et basim versus evanidis vel obscuris, ima basi cylindricao-attenuata transverse truncata, quasi substipitata.

Species, primo aspectu, capitulorum figura admodum singularis nec non caryopsis configuratione ab *Ascolepide protea* discrepans, ceteris autem characteribus hujusce varietati γ satis affinis et forsitan non nisi ejusdem forma serotina, in solo ditiori et humidiori exorta. Anne *Ascolepidi proteæ* qua varietas δ . *anthemiflora* subscribenda?

§ 2. *Rhizoma repens, indurescens; caryopsis $\frac{3}{4}$ -1 lineam longa, vertice angustato truncata.*

3. *ASCOLEPIS SPECIOSA*, Welw. n. sp. (Tab. XXIV. fig. 1-8.) *A.* culmis subpedalibus, firmis, lineam crassis, basi elongato-conicis, vaginis foliorum emortuorum dense vestitis; foliis ad basim culmi pluribus, erecto-vel arcuato-patulis, linearibus, culmo vix angustioribus, apice planis, obtusiusculis, minutim denticulatis, rigidulis; capitulis depresso globosis, densissimis, transversim $\frac{3}{4}$ -1 poll. latis; spiculis intense sulphureis, verniceo-nitentibus; squamis floriferis lanceolatis, a medio apicem versus cylindræis vel subulato-attenuatis, obtusis rariusve acutiusculis, singulis a capituli peripheria centrum versus sensim brevioribus; staminibus 3; stylo trifido; caryopsi lineam longa, elongato-obovoidea, manifeste trigona, vertice angustato transversim truncata.

Habitat in Distr. Huilla pascuis breve herbis humidiusculis prope Lopollo ad 5000 ped. altit., in *Lythracearum*, *Daphnoidearum* humilium et *Cyper*i plurium specierum fideli societate. A fine Januarii usque ad Martium florens mox demum fructificat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1674.

Cæspites lati, densissimi. *Culmi* sub plena anthesi plerumque pedales vel paullo altiores, basi succulenta conico-tumida vaginis foliorum tam vigentium quam emarcidorum et externe insuper squamis elongatis, profunde plurisulcatis, fusco-purpurascentibus vestiti, arete inter se coherentes, fibris tenacibus stipati, rhizomati oblique descendenti demum indurescenti fasciculatim insidentes, quam in ceteris speciebus multo crassiores et rigidiores, evidenter plurisulcati, infra capitula parum vel vix incrassati. *Folia* culmorum steriliū fertiliumque plura, 3–7, gregata, inæquilonga, e viridi glaucescentia, fere carnosula, juniora erecta, adultiora modice arcuato-patula; vaginæ parum supra terram exsertæ, ad oram membranaceam plus minusve undulatæ, longitudinaliter sulcatæ, sensim in laminam linearem culmo vix angustiore sed plicatam, obtuse carinatam, obiter striatam, superne explanatam, margine et (inprimis prope apicem obtusiusculum vel abrupte acutatum) anguste hyalinam et remote spinuloso-denticulatam abientes. *Involucri* foliola 12–15, foliis vix latiora sed acutiora, longitudine inter se admodum varia, exteriora 4–7 reflexa, infimum ad 2–3 poll. longum; interiora sensim breviora et basi angustiora vel omnino ad vaginam reducta, squamiformia. *Capitula* pro more generis sat ampla, bene evoluta pollice paullo latiora et fere semipollicem alta, primum omnino læte sulphurea, demum ob spiculas exteriores præcocius fructificantes tumque fulvescentes bicoloria, centro nempe nunc dilutius flava, margine lato aureo-fulvo cincta, pro stirpe *Cyperacea* reapse speciosa. *Squamæ* vacuæ lineares vel lineari-lanceolatæ, nervo crassiusculo, dorso obiter prominente, percursæ, inferne hyalino-membranaceæ, apicem versus longe acuminatæ vel subulatæ, ibidemque coloratæ, fertilibus fere dimidio breviores; squamæ floriferæ verniceo-nitidulæ, circumscriptione lanceolatæ, exteriores 4–4½ lin. longæ, fere usque ad medium rimula hiant apertæ, dorso, inprimis prope basim, nervis pluribus tenuibus percursæ, supra rimulam in appendicem cylindraceam obtusam vel acutius subulatam protractæ. *Ovarii* quam squama florifera multo brevioris anguli superne acutiores; stylus basi æqualis, longitudine varians; stigmata obtusa. *Caryopsis* fusco-atra, circiter 1 lin. longa, angulis omnibus a basi ad apicem usque manifestis, subcostatis, vertice horizontaliter, basi attenuata oblique truncata, lateribus densissime seriatim foveolata.

Species omnium cognitarum robustissima, in *Cyperacearum* cohorte facile elegantissima, habitu quasi *Armeriam* capitulis sulphureis ornatam repræsentans, sicque una cum præcedente futura Adonistarum attentione non omnino indigna, a reliquis speciebus præter notas allatas simul majore rigiditate partium omnium discrepans, territorio Huillensi peculiaris videtur, nec ibidem infra 5000 ped. altit. a me visa.

4. *ASCOLEPIS ELATA*, Welw. n. sp. *A.* culmis subbipedalibus, vix $\frac{3}{4}$ lin. crassis, basi parum tumida vaginis crebris foliorum emarcidorum laxè vestitis; foliis propriis et iis turionum fasciculatis, circa caulium basim congestis, erectis, 6–9 poll. longis, subfiliformibus, culmo duplo triplove angustioribus, apice planiusculo subacutis tenuiterque denticulatis, supremo patulo ceteris latiore; capitulis hemisphæricis, subdensis, transversim 8–10 lin. latis; spiculis sordide albidis, vix nitidulis; squamis floriferis lanceolatis, a medio apicem versus longe sensimque attenuatis, compresse tetragonis, longitudine, centralibus exceptis, inter se subæqualibus, acutiusculis; staminibus 3; stylo trifido; caryopsi $\frac{3}{4}$ lin. longa, elongato-obovoidea, manifeste trigona, vertice parum angustato truncata.

Habitat in Distr. Pungo Andongo pratis paludosis juxta dextram ripam fluminis Cuanza, inter Condo et Quisonde ad 3600 ped. circiter altit., in *Xyridearum*, *Droseræ indicæ* et *Eriospermi* specierum consortio. Ad finem Martii c. fl. et fr. lecta, sed rarius obvia.

Antrolepis elata, Welw. l. c.

Rhizoma omnino antecedentis speciei; *culmi* autem fere duplo altiores, nec non angustiores, obtusanguli,

tenuiter sulcati, basi vix succulenti, sed vaginis emarcidis numerosis, profunde sulcatis, exterioribus in fibras setiformes solutis, vestiti. *Folia* pallide viridia, culmo multo tenuiora, angustissime linearia, concava vel plicata, dorso sulculata sed vix carinata, apicem versus plana, hyalino-marginata et denticulata. *Involucris* foliola foliis saltem duplo latiora, reflexorum infimum ad 3 poll. longum. *Capitula* quam in ceteris speciebus evidenter laxiora; spiculæ quoad longitudinem inter se parum variantes, 3–4 lin. longæ, maxime centrales tamen semper breviores. *Squamæ* fertiles ad rimulæ florigeræ altitudinem usque biconvexæ, supra rimulam plus minusve evidenter tetragonæ, angulis lateralibus acutioribus, omnibus in squama fructifera vel collapsa magis prominentibus; squamæ vacuæ uninerves, nervo excurrente acute subulatae. *Caryopsis* griseo-fuscescens, lateribus sub lente forti densissime foveolata.

Species foliis filiformibus capitulorumque figura et colore ad *Ascolepidem proteam* β . *bellidifloram* accedens, rhizomatis indole autem nec non caryopsis configuratione *Asc. speciosæ* magis affinis sed a me non nisi in paucis speciminibus iisque jam fere defloratis observata et proinde in posterum secundum specimina numerosiora in diversis habitationibus et evolutionis periodis lecta accuratius definienda.

Species inquirendæ vel recognoscendæ.

1. KYLLINGIA MICROCEPHALA, Steud. in Plant. Schimp. Exsicc. Abyss. ii. no. 650 (nec Liebm.), sive *Isolepis Kyllingioides*, A. Rich. Tent. Abyss. i. pag. 502. Secundum cl. Rich. l. c. *Ascolepidi eriocauloidi* affinis, ast cl. auctor squamas floriferas *planas*, stamina *tria*, caryopsim apice *acutam* et folia culmum æquantia vel superantia describit. Anne *Ascolepidis* species distincta vel forsitan *Ascolepidis proteæ* supra descriptæ varietas?
2. ISOLEPIS POLYPHYLLA, A. Rich. l. c. p. 503. Species una cum priore in Abyssiniæ provincia Chiré lecta, a cl. auctore non nisi in statu fructifero visa et breviter descripta et quidem *Ascolepidi eriocauloidi* proxima habitæ, sed ex diagnosi nimis brevi vix rite eruenda. Etiam hujus speciei squamam fertilem *planam* et caryopsim obovatam, non angulatam sed *acuminatam* dicit cl. auctor.

Ambarum stirpium specimina sicca videre nondum licuit.

Ordo GRAMINEÆ.

Trib. IV. STIPACEÆ, Kunth, Gram. 57.

1. ARISTIDA PRODIGIOSA, Welw. n. sp. (Tab. XXV.) Cæspitosa, plurennis, gracilis; culmo glabro 1–3-pedali, nodis coloratis imberbibus; foliis radicalibus angustissimis, sub-4-pollicaribus, glaucis, sub lente scabrido-puberulis, ligulis brevissimis ciliatis; panicula lineari-oblonga, multiflora, $\frac{1}{2}$ –1-pedali, ramis 2–5 fasciculatis fere a basi floriferis, spiculas plures, sub 3, lineares, pedicellatas gerentibus; glumæ subæquales acutæ, hirsutæ vel glabratae, basi violaceo-coloratæ, ad infimam basim trinerves; flosculus, dempta arista, glumarum dimidium vix æquans, glaber; arista circumscisse decidua, stipite $1\frac{1}{2}$ lin. longo, vix torto, glabro, conico, intus cavo, setis lateralibus nudis, intermedia basi nuda, a medio ad apicem usque plumoso-pennata, laterales duplo et ultra superante.

Habitat frequens in collinis arenosis siccissimis Distr. Mossamedes, ex Giraûl usque ad Cabo negro, inprimis

locis sabulosis oceano proximis, v. gr. ad "Praia da Amelia," denso agmine crescens, per totum fere annum florens et fructificans (Junio, Julio et Septb. 1859 legi). *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 2000.

Rhizoma abbreviatum, mox in fibras descendentes solutum; fibræ perplures, elongatæ, cylindraceæ, simplices, pennæ corvinæ crassiores, villo albido, velutino, viscido undique obtectæ et subsucculentæ. Cæspites pro soli et expositionis ratione nunc angusti et depressi, pauciculmes, nunc ampliores et altiores, culmos 8–10 et plures emittentes. *Folia* radicalia dense congesta, in macrioribus arcuato-ascendentia, 1–2-pollicaria, in robustioribus erectiuscula, 3–5 pollices longa, angustissima, arcte plicata sive convoluta, subulatim acuminata, rigidula, cinereo-glauescentia, sub lente sulcato-striata et subtiliter scabrido-puberula, successive evoluta atque longe perennantia. *Culmi* simplices, a basi ascendenter erecti, inferne nodosi, nunc 1–1½-pedales, gracillimi et debiles, nunc (in solo humidiusculo vel minus sterili) 2–3-pedales, pennæ corvinæ fere crassitudine et firmiores, parce foliosi; nodi 2–4, constricti, glabri, fusco-purpurascens, 1–3 pollices inter se distantes; folia culmi radicalibus quoad figuram et indumentum similia, sed longe vaginata; vaginæ glaucescentes, tenuiter puberulæ, ad oram pilis albidis fasciculatis prompte deciduis barbulatæ, medio parum tumentes, inferiores nodos denudantes, suprema longissima, lamina abbreviata, culmum non raro ad paniculæ basim usque vestiens. *Panicula* erecta, nunc vix 4-pollicaris, laxior et rariflora, sed plerumque elongata, 6–12-pollicaris, densior et multiflora, rachi compresso-angulata glabra, ramis 2–5 fasciculatis levigatis, erecto-patulis, parce ramulosis. *Spiculæ* graciles, absque arista 3–4 lin. longæ, pedicellis gracillimis, ipsis æquilongis vel longioribus, apice incrassatis suffultæ. *Glumæ* fere æquales, concavæ, carinatæ, constanter acutæ, basi semper, rarius omnino violaceæ, dorso undique vel solum juxta carinam hirsutæ (nunc penitus glabræ), basi prominenter trinerves. *Palea inferior* coriacea, glaberrima, trinervis; aristæ seta intermedia 1–1½ poll. longa, a medio ad apicem pilis hyalinis, tenuissimis, eleganter plumosa, laterales ea dimidio saltem breviores, nudæ, divergentes, tenuissime capillares; *palea superior* abbreviata, obtusa, membranacea; *squamulæ* integræ, acutiusculæ, in diversis ejusdem paniculæ flosculis diversæ magnitudinis, quondam parum evolutæ. *Ovarium* oblongo-ovoideum, stipitatum, glabrum, stigmatibus intense flavis, pilis simplicibus hyalinis plumosis, muco copioso involutis. *Caryopsis* cylindracea, vertice obtuso stylorum rudimentis biapiculata, basin versus obconico-attenuata, longitudine lineam parum excedens, glaberrima, longitudinaliter unisulcata.

Observatio.—Gramen elegans sed sat polymorphum, uti in stirpe sub variis solis et expositionis conditionibus vigente expectandum. Formæ hyemales, *i. e.* a Junio ad Septembris initium florentes, uti et illæ in macrioribus et siccioribus obviæ, foliis angustioribus et brevioribus nec non varie curvis vel arcuatis, panicula laxiore glumisque basi intensius violaceis et *dorso hirsutis* gaudent, dum individua mensibus vernis vel in solo minus arido aut juxta rivorum ripas crescentia foliis longioribus, erectiusculis vel leviter arcuatis, paniculis densioribus ac glumis pallidioribus et non raro *omnino* glabris sese distinguunt; ast glumarum magnitudinem et figuram, earumque inter se et cum flosculo relationem nec non aristæ fabricam, in omnibus et quidem numerosis a me examinatis speciminibus semper easdem et constantes observavi. Proxima quidem et affinis hæc præsens species videtur *Aristidæ ciliatæ* Desf., a qua tamen ex auctoritate acutissimi Agrostologi clar. Guill. Munro, cujus benevolum consilium in stabilienda et definienda hac specie secutus sum, imprimis *glumis acutis* differt; ab *Aristida plumosa* Lin., etiam quodammodo affini, præcipue *aristæ basi conica intus cava* distinguitur.

Prodigiosam hanc *Aristidæ* speciem vocavi, quoniam illa, etiamsi ob totius plantæ gracilitatem et foliorum culmorumque indumentum cinereo-glauescens, solo arenoso quasi concolor, peregrinatoris oculis facile fugit, nihilo minus multitudini Zebrarum,

Antilopum atque Leporum, in istis desertis ab omni reliqua vegetatione fere penitus denu-
datis vagantium, et imo pecorum domesticorum gregibus, optimum lætumque, et quidem
durante hyemis siccissimo tempore unicum pabulum offert, et ita non minus ac *Acan-*
thosicyos supra descripta desertorum Africæ calidæ prodigiis adnumerari meretur.

EXPLICATIO TABULARUM.

TABULA I.

Monodora Angolensis.

Fig. 1. Ramulus florifer; magn. nat.	Fig. 5. Ovarium.
2. Flos, demtis petalis exterioribus; paullo
auct.	6. Idem transverse sectum; auct.
3. Stamen a latere, et	7. Fructus; magn. nat.
4. a fronte visum; auct.	8. Semen; magn. nat.
	9. Idem verticaliter sectum; paullo auctum.

TABULA II.

Alsodeia (Ceranthera) ilicifolia.

Fig. 1. Ramulus florifer; magn. nat.	Fig. 9. Semina; magn. nat.
2. Flos; auct.	10. Semen testæ parte demta, albumen exhi-
bens; auct.
3. Idem, demto calyce, a latere visus; auct.	11. Albuminis pars, embryonem in situ exhi-
bens; auct.
4. Flos vi apertus a fronte visus; auct.	12. Embryo a fronte, et
5. Stamina duo a fronte, et	13. a latere visus; auct.
6. a dorso visa; auct.	
7. Ovarii pars cum stylo; auct.	
8. Ramulus fructifer; magn. nat.	

TABULA III.

Oncoba Welwitschii.

Fig. 1. Ramus florifer; magn. nat.	Fig. 5. Semina; magn. nat.
2. Pistillum; paul. auct.	6. Semen; auct.
3. Ovarium transverse sectum; auct.	7. Idem verticaliter sectum, embryonem ex-
hibens; auct.
4. Ramulus fructifer, magn. nat., fructum
unum (inferiorem) ante, et alterum
(superiorem) post dehiscentiam repræ-
sentans.	8. Embryo, a latere visus; valde auct.

TABULA IV.

Polygala Gomesiana. Caulis pars inferior et ejusdem apex florifer, magn. nat.

Fig. 1. Flos c. bracteolis; auct.	Fig. 7. Stamen; auct.
2. Flos a fronte visus.	8. Pistillum; auct.
3. Flos sepalis demptis; auct.	9. Capsula; magn. nat.
4. Idem sepalis et carina demptis; magis
auct.	10. Eadem; auct.
5. Carina; auct.	11. Semen; magn. nat.
6. Petalum laterale; auct.	12. Idem; auct.
	13. Idem a latere visum; auct.

TABULA V.

Vatica africana.

Fig. 1. Ramulus florifer; magn. nat.
2. Alabastrum; auct.
3. Flos expansus; auct.
4. Stamen a fronte, et
5. a dorso visum; auct.
6. Calyx cum pistillo; auct.
7. Pistillum dempto calyce; magis auct. | Fig. 8. Ovarium transverse sectum; magis auct.
9. Idem verticaliter sectum; auct.
10. Calyx fructifer; magn. nat.
11. Fructus verticaliter sectus; auct.
12. <i>Vatica africana</i> β . <i>hypoleuca</i> , ramulus
florifer; magn. nat. |
|---|--|

TABULA VI.

Octolobus spectabilis. Ramus florifer, magn. nat.

Fig. 1. Flos masc. vi apertus; magn. nat.
2. Flos fem. vi apertus; magn. nat.
3. Gynæcium verticaliter sectum; auct.
4. Gynæcii stamen imperfectum, a latere, et
5. a fronte visum; auct.
6. Carpellum; auct.
7. Idem verticaliter sectum.
8. Carpellum maturum; magn. nat. | Fig. 9. Idem apertum.
10. Semen; magn. nat.
11. Idem vertical. sectum, cotyledones exhi-
bens.
12. Idem cotyledone una dempta, plumulam
exhibens.
13. Plumula cum radícula; auct. |
|--|---|

TABULA VII.

Paivaea dactylophylla.

Fig. 1. Ramul. florib. masc.; magn. nat.
2. Capitulum florum masc., et
3. Idem verticaliter sectum; auct.
4. Flos masc. singulus; valde auct.
5. Stamen; auct.
6. Ramulus florib. fem.; magn. nat.
7. Flos fem.; auct. | Fig. 8. Idem calyce demto.
9. Ovarium transverse sectum; auct.
10. Ramus fructifer; magn. nat.
11. Fructus, necdum bene maturus, vertica-
liter sectus; paullo auct.
12. Ejusdem pyrenæ, altera abortiente; magis
auct. |
|--|---|

TABULA VIII.

Myrothamnus flabellifolia.

Fig. 1. Ramus florib. masc.; magn. nat.
2. et 3. Folia a facie et a dorso visa; auct.
4. Flos. masc.; auct.
5. Stamen; auct.
6. Ramulus florib. fem.; magn. nat.
7. Flores femin.; auct.
8. Ovarium transverse sectum; auct. | 9. Ramulus fructifer; magn. nat.
10. Capsula matura; auct.
11. Carpellum singulum seminiferum; auct.
12. Semen; auct.
13. Semen verticaliter sectum, albumen et
embryonem exhibens; valde auct. |
|--|--|

TABULA IX.

Basananthe nummularia. Planta integra c. flore et fr., magn. nat.

Fig. 1. Folium; paullo auct.
2. Flos habitu naturali; auct.
3. Idem arte expansus; auct.
4. Idem verticaliter sectus; magis auctus.
5. Coronæ pars, fila seriei internæ appendiculata exhibens; auct.
6. Eadem pars a facie externa visa. | Fig. 7. Stamen a fronte, et
8. a dorso visum; auct.
9. Gynophorum cum pistillo; auct.
10. Capsula matura; modice auct.
11. Eadem verticaliter secta; auct.
12. Semen cum funiculo; pariter auct. |
|--|---|

TABULA X.

Machadoa Huillensis. Planta integra c. flor. et fr., magn. nat.

Fig. 1. Flos; parum auct.
2. Idem vi aperta; magis auct.
3. Idem dissectus et adhuc magis auct.
4. Petalum; auct.
5. Pars annuli staminiferi cum stamine; auct. | Fig. 6. Stamen a dorso visum; auct.
7. Pistillum; auct.
8. Ovarium transverse sectum; auct.
9. Semina a facie et a latere visa; magn. nat.
10. Semen; auct.
11. Idem transverse sectum. |
|---|--|

TABULA XI.

Acanthosicyos horrida.

Fig. 1. Plantæ modum crescendi exhibens; dimin.
2. Ramus sterilis, et
3. Ram. florifer masc.; magn. nat.
4. Flos masc.; auct.
5. Idem apertus; auct.
6. Calyx cum staminibus ab interna facie visis; auct. | Fig. 7. Pars calycis verticaliter dissecti, staminis insertionem illustrans; auct.
8. Pilus singulus barbæ filamentorum; valde auct.
9. Planta juvenilis; magn. nat.
Obs. Hæc ultima figura perperam no.8. designata. |
|---|--|

TABULA XI. A.

Acanthosicyos horrida.

Fig. 1. Ramus fructifer; magn. nat.
2. Corticis fructus fragmentum; auct.
3. et 4. Semina; magn. nat.
5. Semen auctum, a facie, et
6. a latere visum. | Fig. 7. Semen verticaliter dissectum; auct.
8. Embryo a facie, et
9. a latere visus; paullo auct.
10. Cotyledon a facie interna visa cum pluma et radícula in situ; auct. |
|---|--|

TABULA XII.

Corallocarpus Welwitschii.

Fig. 1. Ramus florifer et simul fructifer; magn. nat.
2. Flos masc.; auct.
3. Idem expansus; auct.
4. Idem arte apertus.
5. Flos fem.; auct.
6. Idem apertus. | Fig. 7. Ovarium transv. sectum.
8. Fructus maturus; magn. nat.
9. Idem transverse sectus; paullo auct.
10. Semen; magn. nat.
11. Idem; auct.
12. Folium alterius speciminis ejusdem speciei, lobis lineari-angustatis. |
|--|---|

TABULA XIII.

Mussænda splendida. Ramus florifer, magn. nat.

Fig. 1. Floris alabastrum; auct.
2. Corolla arte aperta; auct.
3. Ovarium demptis calycis lobis; auct. | Fig. 4. Idem transverse sectum; magis auct.
5. Fructus maturus; magn. nat. |
|--|---|

TABULA XIV.

Corynanthe paniculata. Ramus florifer, magn. nat.

Fig. 1. Flos nondum apertus, et
2. Idem expansus; auct.
3. Anthera a facie, et
4. a dorso visa; auct.
5. Ovarium, et
6. Idem transverse sectum; auct.
6a. Pars paniculæ fructiferæ; magn. nat.
(N.B. Lit. a in icone omissa.) | Fig. 7. Capsula matura dehiscens; auct.
8. Ejusdem valvarum una, internam faciem
seminumque situm exhibens; auct.
9. Capsula paullo ante dehiscenciam trans-
verse secta; auct.
10. Semen; magn. nat.
11. Idem valde auctum. |
|--|--|

TABULA XV.

Schrebera Golungensis. Ramus florifer, magn. nat.

Fig. 1. Alabastrum; auct.
2. Corolla arte aperta; auct.
3. Stamen a latere, et
4. a facie visum; auct.
5. Pistillum; auct.
6. Ovarium verticaliter sectum; mag. auct.
7. Idem transverse sectum.
8. Capsula matura dehiscens; magnit. nat.
9. Ejusdem valvularum una, seminum situm
exhibens; magn. nat. | Fig. 10. Semen perfectum; magn. nat.
11. Semen abortivum; magn. nat.
12. Seminis pars basilaris, tegmine dempto,
embryonis situm exhibens; magn.
nat.
13. et 14. Embryo a facie et a latere visus;
magn. nat.
15. Ejusdem pars basilaris cum radícula;
auct. |
|---|--|

TABULA XVI.

Pachypodium Lealii.

Fig. 1. Stirpes duæ integræ, speciei habitum
exhibentes; diminut.
2. Ramus florifer; magnit. nat.
3. Pars rami junioris, superne folium inter
spinas sessile, inferne ejusdem delapsi
cicatricem exhibens; parum auct.
4. Corollæ tubus arte apertus; auct. | Fig. 5. Stamen; auct.
6. Calyx cum pistillo; auct.
7. Ramuli fructif. apex, fructus juveniles et
maturos exhibens; magn. nat.
8. Semen; magnit. nat.
9. Embryo a facie et a latere visus; parum
auct. |
|---|---|

TABULA XVII.

Faroa salutaris.

Figs. 1. et 2. Plantæ integræ florentes diversæ
ætatis; magn. nat.
3. Alabastr. ; auct.
4. Flos expansus; auct.
5. Idem arte apertus; magis auct. | Fig. 6. Ovarium transverse sectum; auct.
7. Ramus fructifer; magn. nat.
8. Capsula matura dehiscens; auct.
9. Eadem transverse secta; auct.
10. Semen; valde auct. |
|---|--|

TABULA XVIII.

Sesamothamnus Benguellensis.

Fig. 1. Imago diminuta speciminis vetustioris
floriferi, fruticis habitum illustrans.
2. Apex ramuli foliiferi; magn. nat.
3. Ramulus florifer; magn. nat.
4. Corollæ pars arte aperta, staminum situm
exhibens; auct. | Fig. 5. Anthera a latere et a facie visa; auct.
6. Calyx cum pistillo; auct.
7. Ovarium; auct.
8. Ramulus fructifer; magn. nat.
9. Semen; magn. nat. |
|---|--|

TABULA XIX.

Alvesia rosmarinifolia. A. Caulis pars cum ramo laterali florifero; magn. nat. B. Ejusdem caulis apex florifer et fructifer; magn. nat.

Fig. 1. Flos; auct.
2. Idem verticaliter sectus; magis auct.
3. Pars superior filamenti cum anthera; auct.
4. Calyx verticaliter sectus, gynophorum et
pistillum exhibens. | Fig. 5. Calyx fructifer, arte dimidiatus, nucula
lam perfectam et abortientes exhi-
bens; magn. naturali.
6. Nucula singula; magis auct. |
|--|---|

TABULA XX.

Faurea speciosa. Ramus floriger, spicam unam (ad dextram) florentem, alteram (ad sinistram) jam basi fructificantem exhibens; magn. nat.

Fig. 1. Alabastrum et flos apertus; auct.
2. Pistillum cum squamulis; auct. | Fig. 3. Ovarium; magis auct.
4. Idem verticaliter sectum; itidem auct. |
|--|---|

TABULA XXI.

Hydnora longicollis.

Fig. 1. Pars caulis subterranei cum alabastris di-
versæ ætatis et flore uno aperto;
magn. nat.
2. Flos verticaliter sectus, ovarii et stami-
num situm exhibens.
3. Pericarpium submaturum, adhuc peri- | anthio (hoc quidem limbo 4-fido) mu-
nitum; magn. nat.
Fig. 4. Pericarpium maturum; parum auct.
5. Idem transverse sectum, seminum con-
glutinatorum globulum exhibens. |
|---|---|

TABULA XXII.

Pilostyles æthiopica.

Fig. 1. Ramulus arboris e Cæsalpinearum tribu
(<i>Berlinia paniculata</i> , Benth.), quæ pa-
rasitæ matrix, floribus <i>Pilostylis</i> femi-
neis onustus; magn. nat.
2. Sectio transversa ejusdem ramuli, para-
sitæ insertionem et evolutionem suc-
cessivam illustrans; auct.
3. Flos singulus [vel magis proprie specimen
singulum] adhuc involucrio hiantem mu-
nitus; auct. | Fig. 4. Idem magis evolutus, et
5. Idem plene evolutus; magis auct.
6. Flos bracteis sepalis petalisque demtis,
ovarium exhibens; auct.
7. Ovarium verticaliter, et
8. transverse sectum; auct.
9. Ovulum singulum; magis auct. |
|---|---|

TABULA XXII. (*continuatio*).

Fig. 10. Ramus alterius arboris ejusdem <i>Berliniae paniculatae</i>, floribus <i>Pilostylis</i> masculis onustus; magn. nat. 11. Flos masc. verticaliter sectus, columnam stamineam exhibens; auct. 12. Columnae stamincae apex floris juvenilis, antheris necdum effctis; auct.	Fig. 13. Flos masculus centro verticaliter sectus, sepalis petalisque demptis; valde auct. 14. Columna staminea verticaliter secta; adhuc magis auct. <i>Obs.</i> Petalorum etc. denticuli, nec non tubi staminei costulae a pictore praetervisa.

TABULA XXIII.

Morus excelsa.

Fig. 1. Pars ramuli amenta masc. gerentis; magn. nat. 2. Flos masc. singulus; auct. 3. Ramus amenta feminea submatura gerens; magn. nat. 4. Flos femin.; auct.	Fig. 5. Ovarium adolescens; auct. 6. Achenium c. stylo exsiccato; auct. 7. Idem apertum, semen exhibens; auct. 8. Semen verticaliter sectum, embryonem et albumen parcum illustrans; auct. 9. Embryo; magis auct.

TABULA XXIV.

Ascolepis speciosa.

Fig. 1. Planta integra florens; magn. nat. 2. Involucrum cum receptaculo spiculis denudato; quidpiam auct. 3. Spicula squamam florigeram et vacuam exhibens; auct.	Fig. 4. Squama florig. a fronte visa; auct. 5. Pistillum et stamina; magis auct. 6. Caryopses; magn. nat. 7. Caryopsis singula; valde auct. 8. Eadem transverse secta; mag. auct.

Ascolepis anthemiflora.

Fig. 9. Capitulum florig.; magn. nat. 10. Spicula singula peripheriae; auct. 11. Spicula singula disci; auct.	Fig. 12. Caryopses; magnit. nat. 13. Caryopsis singula; valde auct.

TABULA XXV.

Aristida prodigiosa.

Fig. 1. Plantae pars inferior, et 2. Culmi pars florifera; magn. nat. 3. Spicula singula juvenilis; auct. 4. Eadem evoluta; magis aucta. 5. Eadem demptis glumis; iterum auct. 5a. [numerus in icone omissus] Pistillum stamina et squamulae; valde auct.	Fig. 6. Pistillum cum squamulis et palea superiore; valde auct. 7. Squamula singula; v. auct. 8. Palea superior; v. auct. 9. Caryopsis matura; auct.

INDEX SYSTEMATICUS.

	Pag.	Tab.		Pag.	Tab.
ANONACEÆ	10		CACTACEÆ	35	
<i>Monodora Angolensis</i> , <i>Welw.</i>	10	I.	<i>Rhipsalis Cassyta</i> , <i>Gärtn.</i>	35	
<i>Xylopia odoratissima</i> , <i>Welw.</i>	12		RUBIACEÆ	36	
VIOLARIEÆ	12		<i>Mussaenda splendida</i> , <i>Welw.</i>	36	XIII.
<i>Alsodeia ilicifolia</i> , <i>Welw.</i>	12	II.	<i>Corynanthe paniculata</i> , <i>Welw.</i>	37	XIV.
BIXACEÆ	13		JASMINACEÆ	38	
<i>Oncoba Welwitschii</i> , <i>Oliv.</i>	13	III.	<i>Schrebera Golungensis</i> , <i>Welw.</i>	40	XV.
POLYGALEÆ	14		— <i>trichoclada</i> , <i>Welw.</i>	41	
<i>Polygala Gomesiana</i> , <i>Welw.</i>	14	IV.	— <i>alata</i> , <i>Welw.</i>	41	
DIPTEROCARPEÆ	15		— —, <i>β. tomentella</i>	42	
<i>Vatica africana</i> , <i>Welw.</i>	15	V.	APOCYNACEÆ	42	
— —, <i>α. denudans</i>	16	V.	<i>Pachypodium Lealii</i> , <i>Welw.</i>	43	XVI.
— —, <i>β. hypoleuca</i>	17	V. (fig. 12.)	GENTIANACEÆ	45	
STERCULIACEÆ	17		<i>Faroa salutaris</i> , <i>Welw.</i>	46	XVII.
<i>Octolobus spectabilis</i> , <i>Welw.</i>	18	VI.	<i>Belmontia gracilis</i> , <i>Welw.</i>	47	
ZYGOPHYLLEÆ	19		<i>Exochænum primulæflorum</i> , <i>Welw.</i>	47	
<i>Zygophyllum orbiculatum</i> , <i>Welw.</i>	19		— —, <i>β. nanum</i>	47	
BURSERACEÆ	20		— <i>debile</i> , <i>Welw.</i>	48	
<i>Paivaeusa dactylophylla</i> , <i>Welw.</i>	21	VII.	— <i>grande</i> , <i>Griseb.</i>	49	
MELIACEÆ	21		BIGNONIACEÆ	49	
<i>Naregamia alata</i> , <i>Wight & Arn.</i> ,			<i>Sesamothamnus Benguellen-</i> <i>sis</i> , <i>Welw.</i>	50	XVIII.
<i>β. africana</i> , <i>Welw.</i>	21		<i>Sesamum Angolense</i> , <i>Welw.</i>	51	
HAMAMELIDEÆ	22		— <i>calycinum</i> , <i>Welw.</i>	52	
<i>Myrothamnus flabellifolia</i> , <i>Welw.</i>	23	VIII.	<i>Pterodiscus aurantiacus</i> , <i>Welw.</i>	53	
COMBRETACEÆ	24		<i>Linariopsis prostrata</i> , <i>Welw.</i>	54	
<i>Cacoucia platyptera</i> , <i>Welw.</i>	24		LABIATÆ	55	
<i>Illigera pentaphylla</i> , <i>Welw.</i>	26		<i>Alvesia rosmarinifolia</i> , <i>Welw.</i>	55	XIX.
PASSIFLOREÆ	27		<i>Achyrosperrum æthiopicum</i> , <i>Welw.</i>	56	
<i>Basananthe litoralis</i> , <i>Peyr.</i>	28		<i>Tinnea antiscorbutica</i> , <i>Welw.</i>	58	
— <i>nummularia</i> , <i>Welw.</i>	28	IX.	— <i>ericalyx</i> , <i>Welw.</i>	59	
<i>Machadoa Huillensis</i> , <i>Welw.</i>	29	X.	POLYGONACEÆ	60	
CUCURBITACEÆ	30		<i>Oxygonum Acetosella</i> , <i>Welw.</i>	60	
<i>Acanthosicyos horrida</i> , <i>Welw.</i>	31	XI. & XI. A.	<i>Brunnichia africana</i> , <i>Welw.</i>	61	
<i>Corallocarpus Welwitschii</i> , <i>Hook. f.</i>	32	XII.	PROTEACEÆ	62	
<i>Heterosicyos polymorpha</i> , <i>Welw.</i>	34		<i>Faurea speciosa</i> , <i>Welw.</i>	63	XX.
— <i>stenoloba</i> , <i>Welw.</i>	34		— <i>discolor</i> , <i>Welw.</i>	64	
			— <i>saligna</i> , <i>Harv.</i>	65	

INDEX SYSTEMATICUS (*contin.*).

	Pag.	Tab.		Pag.	Tab.
RAFFLESIACEÆ	66		CYPERACEÆ (<i>continued</i>).		
Hydnora africana, <i>β. longi-</i>			Asclepis protea, <i>β. bellidi-</i>		
collis, <i>Welw.</i>	66	XXI.	flora	76	
Pilostyles æthiopica, <i>Welw.</i> .	67	XXII.	— —, <i>γ. santolinoides</i> .	77	
MOREÆ	69		— — anthemiflora, <i>Welw.</i> . .	77	XXIV.
Morus excelsa, <i>Welw.</i>	69	XXIII.	— — speciosa, <i>Welw.</i>	78	(fig. 9-13.)
Dorstenia vivipara, <i>Welw.</i> .	70		— — elata, <i>Welw.</i>	79	XXIV.
— — Benguellensis, <i>Welw.</i> .	71		Asclepidis, spec.? (<i>Kyllingia</i>		(fig. 1-8.)
— — psilurus, <i>Welw.</i>	71		microcephala, <i>Steud.</i>) . . .	80	
GNETACEÆ	73		— — spec.? (<i>Isolepis poly-</i>		
Gnetum africanum, <i>Welw.</i> .	73		phylla, <i>A. Rich.</i>)	80	
CYPERACEÆ	74		GRAMINEÆ.		
Asclepis protea, <i>Welw.</i> . . .	75		Aristida prodigiosa, <i>Welw.</i> .	80	XXV.
— —, <i>α. kyllingioides</i> .	76				

INDEX ALPHABETICUS.

Obs.—Nomina stirpium descriptarum litteris romanis (ordinalia majoribus), synonyma et nomina stirpium in observationibus commemoratarum litteris italicis traduntur.

A.	Pag.		Pag.
Acanthosicyos, <i>Welw.</i>	30	Alsodeiæ	12
— horrida, <i>Welw.</i>	31	Alvardiæ spec.	8
Achyrosermum æthiopicum, <i>Welw.</i>	56	Alvesia, <i>Welw.</i>	55
— densiflorum, <i>Bl.</i>	57	— rosmarinifolia, <i>Welw.</i>	55
— frutescens, <i>Benth.</i>	57	Ampelideæ	30
— phlomoides, <i>Bl.</i>	57	ANONACEÆ	10
Adansonia, <i>L.</i>	35	Anonæ spec.	17
Adeniopsis, <i>Welw.</i>	43, 45	Antrolepis anthemiflora, <i>Welw.</i>	78
Adenium, <i>R. et Sch.</i>	44, 45	— elata, <i>Welw.</i>	79
— Honghel, <i>Alph. DC.</i>	45	— leucantha, <i>Welw.</i>	77
— —, <i>Lindl.</i>	45	—, <i>nov. spec.</i> , <i>Thomson</i>	77
— multiflorum, <i>Klotsch.</i>	44, 45	— santolina, <i>Welw.</i>	77
— Namaquanum, <i>Wyley</i>	43, 45	— sulphurea, <i>Welw.</i>	77
— speciosum, <i>Fenzl</i>	44, 45	Apodanthæ	67
Æchmandra conocarpa, <i>Dalz.</i>	33	Apodanthes, <i>Poit.</i>	69
— epigæa, <i>Arn.</i>	33	APOCYNACEÆ	42, 44
— velutina, <i>Dalz.</i>	33	Aristida ciliata, <i>Desf.</i>	81
Alchorneæ spec.	24	— plumosa, <i>L.</i>	81
Aloë arborescens, <i>Mill.</i>	26	— prodigiosa, <i>Welw.</i>	80, 81
Alsodeia ilicifolia, <i>Welw.</i>	12	Arachis hypogæa, <i>L.</i>	6
		Asclepis, <i>Nees</i>	74, 75

INDEX ALPHABETICUS (contin.).

	Pag.		Pag.
<i>Ascolepis anthemiflora</i> , Welw.	77	COMBRETACEÆ	24
— <i>elata</i> , Welw.	79	Combreteæ	24
— <i>eriocauloides</i> , Nees	75, 80	<i>Commelynaceæ</i>	75, 78
— <i>protea</i> , Welw.	75, 78	<i>Corallocarpus</i> , Welw.	32
— —, α . <i>Kyllingioides</i>	76	— <i>Welwitschii</i> , Hook. f.	32
— —, β . <i>bellidiflora</i>	76, 80	<i>Corynanthe</i> , Welw.	37
— —, γ . <i>santolinoides</i>	77	— <i>paniculata</i> , Welw.	37
— <i>speciosa</i> , Welw.	78	<i>Cressa</i> , L.	9
<i>Azedas brava</i> s	61	CUCURBITACEÆ	6, 30
B.		Cucurbiteæ	30
<i>Balanophoreæ</i>	69	<i>Cuscutæ</i> spec.	38
<i>Baloteæ</i>	55	CYPERACEÆ	48, 49, 74
<i>Bandeiræa speciosa</i> , Welw.	26	<i>Cyperus Papyrus</i> , L.	6
<i>Basananthe</i> , Peyr.	27	<i>Cyrtandrea</i>	7
— <i>litoralis</i> , Peyr.	28, 29	<i>Cyrtopera longifolia</i> , Reichb. f.	35
— <i>nummularia</i> , Welw.	28, 29	D.	
<i>Belmontia</i> , E. M.	47, 49	<i>Dalhousiea bracteata</i> , Wall.	26
— <i>gracilis</i> , Welw.	47	<i>Daphnoideæ</i>	7, 78
<i>Berlinia paniculata</i> , Benth.	67	<i>Dileniaceæ</i>	30
BIGNONIACEÆ	38, 39, 49	<i>Disæ</i> spec.	77
<i>Bombax Buonopozense</i> , P. de B.	61	<i>Dombeyæ</i> spec.	42
<i>Brasenia peltata</i> , Pursh	36	<i>Dorstenia Benguellensis</i> , Welw.	71
<i>Brunnichia africana</i> , Welw.	61	— <i>Psilurus</i> , Welw.	71
— <i>cirrhusa</i> , Banks	62	— <i>vivipara</i> , Welw.	70
<i>Brunnichieæ</i>	61	<i>Drosera indica</i> , L.	79
BURSERACEÆ	20	<i>Droseræ</i> spec.	46, 48
<i>Bursereæ</i>	20	E.	
C.		<i>Echiteæ</i>	42
<i>Cachinde candange</i>	24	<i>Echites succulenta</i> , Thunb.	42
<i>Cacoucia</i> , Aubl. (nec Walp.)	24	<i>Elæodendron glaucum</i> , Pres.	38
— <i>coccinea</i> , Aubl.	26	<i>Elais guineensis</i> , L.	7
— <i>cordifolia</i> , Walp.	24	<i>Enicostema</i> , Bl.	45
— <i>platyptera</i> , Welw.	24	<i>Ericaceæ</i>	7
— <i>species</i>	35	<i>Eriocauloneæ</i>	47, 75
CACTACEÆ	35	<i>Eriospermi</i> spec.	79
<i>Camoënsia maxima</i> , Welw.	26	<i>Eucinchoneæ</i>	37, 38
<i>Catete Bulla</i>	58	<i>Euclea</i> , L.	9
<i>Ceratogonum</i> , Meisn.	9	<i>Eupachypodium</i> , Welw.	43
<i>Ceranthra ilicifolia</i> , Welw. (conf. corrig.)	19	<i>Eupassifloreæ</i>	28
<i>Chloreæ</i>	45	<i>Eureiandra formosa</i> , Hook. f.	26
<i>Cinchoneæ</i>	37	<i>Eusesamum</i>	51
<i>Clematidis</i> spec.	30	<i>Exochæmium</i> , Griseb.	47, 48, 49
<i>Cliffortia? flabellifolia</i> , Sond.	22	— <i>debile</i> , Welw.	48
<i>Cola acuminata</i>	35	— <i>grande</i> , Griseb.	48, 49

INDEX ALPHABETICUS (contin.).

Exochænum primulæflorum, <i>Welw.</i>	Pag. 47		
— —, β . nanum	48		
F.		J.	Pag.
Fabago (Sect. Zygophylli)	19	JASMINACEÆ	38
Faroa, <i>Welw.</i>	45	Jasmineæ	39
— salutaris, <i>Welw.</i>	46, 47	Jobo	11
<i>Fici</i> spec.	17	<i>Juncus</i> , L.	9
Faurea, <i>Harv.</i>	62	K.	
— discolor, <i>Welw.</i>	64	Kosaria, <i>Hochst.</i>	70, 71
— saligna, <i>Harv.</i>	62, 63, 65	<i>Kyllingia microcephala</i> , Steud.	80
— speciosa, <i>Welw.</i>	63	<i>Kyllingia</i> spec.	74
G.		L.	
GENTIANACEÆ	45	LABIATÆ	55
Gentianeæ	45	<i>Labiatarum</i> spec.	7
<i>Gipepe</i>	11	<i>Lagenias</i> , E. M.	49
<i>Gloriosa abyssinica</i> , A. Rich.	30	<i>Leea sambucina</i> , Willd.	61
— <i>superba</i> , L.	30	<i>Leucospermum</i> , R. Br.	62
GNETACEÆ	73	<i>Liliacearum</i> spec.	7
Gnetum africanum, <i>Welw.</i>	73	Linariopsis, <i>Welw.</i>	53
GRAMINEÆ	80	— prostrata, <i>Welw.</i>	54
Gyrocarpeæ	26	<i>Lythracearum</i> spec.	78
H.		M.	
HAMAMELIDEÆ	22	Machadoa, <i>Welw.</i>	29
<i>Hartogia capensis</i> , Thunb.	38	— Huillensis, <i>Welw.</i>	29
Heterosicyos, <i>Welw.</i>	30, 33	<i>Macrolobii</i> spec.	22
— polymorpha, <i>Welw.</i>	34, 35	MELIACEÆ	21
— stenoloba, <i>Welw.</i>	34	<i>Meliacearum</i> spec.	7
<i>Hippion</i> , Spgl.	45	Meliæ	21
Hydnora africana, Thunbg. [conf. corrigenda]	67	<i>Mesembryanthemum</i> , L.	9
— —, β . longicollis, <i>Welw.</i>	66	<i>Mimosearum</i> spec.	7
— <i>capensis</i> [conf. corrig.]	67	Mitrephoræ	10
Hydnoreæ	66	<i>M-nara</i>	32
<i>Hymenodyction</i> , Wall.	37	<i>Modecca</i> , Lam.	29
Hypolytreæ	74, 75	<i>Modeccæ</i>	28
I.		Monodora Angolensis, <i>Welw.</i>	10, 11
<i>Illigera pentaphylla</i> , <i>Welw.</i>	26	— <i>Myristica</i> , Dun.	10, 11
<i>Illigera</i> spec.	27	MOREÆ	69
<i>Iridearum</i> spec.	7, 34	Morus excelsa, <i>Welw.</i>	69
<i>Isolepis Ascolepis</i> , A. Rich.	75	<i>Mucamba-camba</i>	69
— <i>Kyllingioides</i> , A. Rich.	76, 80	Mussænda (Sect. Belilla)	36
— <i>polyphylla</i> , A. Rich.	80	— <i>erythrophylla</i> , Schum.	37
		— splendida, <i>Welw.</i>	36
		<i>Myrica</i> spec.	23, 38
		<i>Myristica moschata</i> , L.	11
		<i>Myristicearum</i> spec.	7

INDEX ALPHABETICUS (contin.).

	Pag.		Pag.
<i>Myrothamnus, Welw.</i>	22	<i>Pistia</i> spec.	6
— <i>flabellifolia, Welw.</i>	22, 23	<i>Platylepis, Kunth</i>	74, 75
<i>Myrtacearum</i> spec.	7	<i>Plectrantheæ</i>	55
N.		<i>Polygala Gomesiana, Welw.</i>	14
<i>Nathusia alata, Hochst.</i>	39, 41	POLYGALEÆ	14
<i>Nara</i>	32	POLYGONACEÆ	60
<i>Naras</i>	32	<i>Populi</i> spec.	23
<i>Naregamia alata, W. et Arn., β. africana, Welw.</i>	21	<i>Protea, L.</i>	63
<i>Nauclea, L.</i>	37	PROTEACEÆ	7, 62
<i>N-coco</i>	74	<i>Protea</i> spec.	42
<i>N-pepe</i>	11	Proteeæ	62
<i>Nymphæacearum</i> spec.	6	<i>Protium, Burm.</i>	20
O.		<i>Pterocarp</i> i spec.	22
<i>Ocimeæ</i>	55	<i>Pterodiscus aurantiacus, Welw.</i>	53
<i>Octolobus, Welw.</i>	17	— <i>Gayi, Desm.</i>	53
— <i>spectabilis, Welw.</i>	18	— <i>speciosus, Hook.</i>	53
<i>Oleaceæ</i>	38, 40	R.	
<i>Oncoba Welwitschii, Oliv.</i>	13	RAFFLESIIACEÆ	66
<i>Oncobeæ</i>	13	<i>Raphia</i> spec.	7
<i>Opuntieæ</i>	35	<i>Rhipsalis Cassyta, Gärtn.</i>	35
<i>Orchideæ terrestres</i>	7	<i>Rhynchocharpa, Schrad.</i>	32
<i>Oxygonum Acetosella, Welw.</i>	60	— <i>Welwitschii, Naud.</i>	32
— <i>Dregei, Meisn.</i>	61	<i>Rosaceæ</i>	23
P.		RUBIACEÆ	37
<i>Pachypodium, Lindl.</i>	42, 44, 45	<i>Rubiacearum</i> spec.	7
— <i>bispinosum, Lindl.</i>	45	S.	
— <i>Lealii, Welw.</i>	5, 43, 45	<i>Salicineæ</i>	23
— <i>Namaquanum, Welw.</i>	45	<i>Salicis</i> spec.	65
— <i>succulentum, Alph. DC.</i>	45	<i>Santalaceæ</i>	7
— <i>tuberosum, Lindl.</i>	45	<i>Sarna, Karst.</i>	69
<i>Paivæusa, Welw.</i>	20	<i>Sauvagesia erecta, L.</i>	29
— <i>dactylophylla, Welw.</i>	21	<i>Saxifragaceæ</i>	23
<i>Palmæ</i>	7	<i>Schousbæa, Schum.</i>	24
<i>Parinariæ</i> spec.	17	— <i>cordifolia, Schum.</i>	24
PASSIFLOREÆ	27, 28, 30	—, Willd.	24
<i>Pedalineæ</i>	53	<i>Schrebera, L.</i>	38
<i>Pedaliun, L.</i>	54	—, Retz.	38
<i>Periloma, H. B. K.</i>	58	<i>Schrebera, Roxb.</i>	38
<i>Persoonieæ</i>	62	— <i>alata, Welw.</i>	39, 41
<i>Phaseoli</i> spec.	6	— —, <i>β. tomentella</i>	42
<i>Phœnix spinosa, Schum.</i>	8	— <i>Golungensis, Welw.</i>	39, 40
<i>Pilostyles æthiopica, Welw.</i>	67	— <i>Saundersiæ, Harv.</i>	39, 41
<i>Piper</i>	11	— <i>Swieteniodes, Roxb.</i>	39, 42
		— <i>trichoclada, Welw.</i>	39, 41

INDEX ALPHABETICUS (contin.).

	Pag.		Pag.
<i>Schrebera</i> , Thunbg.	38	<i>Trymatococci</i> spec.	61
<i>Scirpeæ</i>	75	<i>Tryphostemma</i> , Harv.	28
<i>Scleriæ</i> spec.	49		
<i>Scutellarineæ</i>	57, 58	U.	
<i>Sebæa</i> , Soland. (R. Br.)	46, 49	<i>Uncaria</i> , Schreb.	37
— <i>involucrata</i> , Klotsch	47	<i>Utriculariæ</i> spec.	47
— <i>pusilla</i> , Eckl.	48		
<i>Selagineæ</i>	7	V.	
<i>Sesameæ</i>	49	<i>Vatica africana</i> , Welw.	15
<i>Sesamothamnus</i> , Welw.	49	— —, α . <i>denudans</i>	16
— <i>Benguellensis</i> , Welw.	5, 50	— —, β . <i>hypoleuca</i>	17
<i>Sesamum Angolense</i> , Welw.	51	<i>Viola</i> , L.	29
— <i>calycinum</i> , Welw.	52, 54	VIOLARIÆ	12, 29
<i>Sesuviorum</i> spec.	19	<i>Vitis Bainesii</i> , Hook.	5
<i>Spirææ</i>	23	— <i>macropus</i> , Welw.	5
<i>Stachydeæ</i>	56	— <i>vinifera</i> , L.	9
STERCULIACÆ	17	<i>Vogelia africana</i> , Lam.	9, 19
<i>Sterculiæ</i>	17		
<i>Stipaceæ</i>	80	W.	
<i>Strigæ</i> spec.	49	<i>Welwitschia mirabilis</i> , Hook. f.	5
<i>Sychinium</i> , Desv.	71		
<i>Symphoniæ</i> spec.	17	X.	
<i>Syzygii</i> spec.	35	<i>Xipepe</i>	11
		<i>Xylopiæ odoratissima</i> , Welw.	12
T.		<i>Xylopiæ</i> spec.	42
<i>Tarchonanthes</i> spec.	8	<i>Xylopiæ</i>	12
<i>Tetracarpæa Tasmanica</i> , Hook. f.	23	<i>Xyridearum</i> spec.	47, 79
<i>Tetracera</i> , L.	30		
<i>Tinneæ</i> , Kotschy et Peyr.	57	Z.	
— <i>æthiopica</i> , Kotschy et Peyr.	58	<i>Zea Mays</i> , L.	6
— <i>antiscorbutica</i> , Welw.	58	ZYGOPHYLLACÆ	19
— <i>ericalyx</i> , Welw.	59	<i>Zygophyllum orbiculatum</i> , Welw.	19, 66
<i>Trichomeria</i> , Hook. f.	33	— <i>simplex</i> , L.	19
<i>Triglochin</i> , L.	8

W. H. Fitch, del. et lith.

J. N. Fitch, imp.

Monodora Angolensis. Welw.

W.H. Fitch, del. et lith.

J.N. Fitch, imp.

Ceranthera ilicifolia, Welw.

W.H. Fitch, del. et lith.

J. N. Fitch, imp.

Oncoba Welwitschii, Oliv.

W. H. Fitch, del. et. lith.

J. N. Eitch, imp.

Polygala Gomesiana, Welw.

W.H. Fitch, del. et lith.

J.N. Fitch, imp.

Vatica africana, Welw.

W.H. Fitch, del. et lith.

J. N. Fitch, imp.

Octolobus spectabilis, Welw.

W.H. Fitch, del. et. lith.

J.N. Fitch, imp.

Paivæusa dactylophylla, Welw.

W. H. Fitch, del. et lith.

J. N. Fitch, imp.

Myrothamnus flabellifolia, Welw.

W.H. Fitch, del. et lith.

J. N. Fitch, imp.

Basananthe nummularia, Welw.

W.H. Fitch, del. et lith.

J.N. Fitch, imp.

Machadocia Huillensis, Welw.

W.H. Fitch, del. et lith.

J. N. Fitch, imp.

Acanthosicyos horrida, Welw.

W.H. Fitch, del. et lith.

J.N. Fitch, imp.

Corallocarpus Welwitschii, Hook. f.

W.H. Fitch, del. et. lith.

J.N. Fitch, imp.

Mussaenda splendida, Welw.

W.H. Fitch, del. et lith.

J.N. Fitch, imp.

Corynanthe paniculata, Welw.

Scale of 3 Feet.

W. H. Fitch, del. et lith.

J. N. Fitch, imp.

Pachypodium Lealii, Welw.

Scale 2 Feet.

W. H. Fitch, del. et lith.

J. N. Fitch, imp.

Sesamothamnus Benguellensis, Welw.

W.H. Fitch, del et. lith.

J.N. Fitch, imp.

Alvesia rosmarinifolia, Welw.

W.H. Fitch, del. et. lith.

J. N. Fitch, imp.

Faurea speciosa. Welw.

W. H. Fitch, del. et lith.

Vincent Brooks, Day & Son, Imp.

Hydnora longicollis Welw.

del. et lith.

Vincent Brooks Day & Son, Imp.

Pilostyles aethiopica. Welw.

W. H. Fitch, del et lith.

Morus excelsa, Welw.

J. N. Fitch, imp.

W. H. Fitch, del. et. lith.

J. N. Fitch, imp.

Asclepis speciosa, Welw. (f. 1-8.) | *Asclepis anthemiflora*, Welw. (f. 9-13.)

W. H. Fitch, del. et lith.

J. N. Eitch, imp.

Aristida prodigiosa, Welw.

ADDENDA VEL CORRIGENDA.

- Pag. 6, lin. 11, *loco quos lege quas*
 8, 16, *loco sylvatica lege silvatica*
 8, 30, *loco hibernum lege hiemem*
 9, post lin. 33, *adde*: Quoad generalia de conformatione geognostica terrarum Angolensium conf.
" Voyage du Dr. Fr. Welwitsch dans les Royaumes d'Angola et de Benguella. (Mol-
lusques par A. Morelet.) Paris, 1868," pag. 5 et 6.
 9, 34, *loco vetegabilium lege vegetabilium*
 13, ultima, *loco postero lege posterum*
 14, 10, *loco infra lege inferne*
 14, 13, *loco quidquam lege quidpiam*
 15, 4, *loco tri- lege tri-*
 20, 37, *loco Burseracearum lege Burserearum*
 23, 3, *loco quidquam lege quidpiam*
 23, 12, *loco Spiræarum lege Spiræearum*
 23, 23, *loco l. c. t. viii. lege Apontam. l. c. (Tab. VIII.)*
 24, 40, *loco Descr. lege Beskr.*
 28, 5, *loco Tryphostemati lege Tryphostemmati.*
 28, 6, *loco Modeccarum lege Modeccearum.*
 31, 4, *loco Tab. XI. A et B lege (Tab. XI. et XI. A.)*
 31, 44, *loco Tab. XI. B. lege Tab. XI. A.*
 34, 8, *loco Trideis lege Irideis*
 39, 24, *loco peridermio lege spermodermio*
 42, 23, *loco Xylopeæ lege Xylopiæ*
 63, 11, *adde (Trichostachys speciosa, Welw. Synopse explic. pag. 19.)*
 67, 9, *loco ab Hydnora capensi Thunb. lege a stirpe capensi (Hydnora africana Thunb.)*
 67, 15, *loco capensi lege africanæ*
 Tab. 2, *loco Ceranthera ilicifolia lege Alsodeia (Ceranthera) ilicifolia*
 14, *loco 6 (fig. paniculæ fructiferæ adnexo) lege 6a*
 21, *loco Hydnora longicollis Welw. lege: Hydnora africana Thunb. β. longicollis Welw.*

Observ. De generibus speciebusve paucis, nostris supra descriptis valde affinibus vel omnino synonymis, opusculo hocce jam prelo subjecto a variis phytographis in lucem editis, mox alio loco tracturus sum.