auf Seide zu erzielen, wie sie eben von der NiO-Lösung beschrieben wurde. Für die Färbung, das Aufquellen und die Lösung der Seide durch letztere ist es im Wesentlichen gleichgültig, ob Rohseide oder solche Seide angewandt ist, die durch Auskochen entgommt worden. (*Journ. für prakt. Pharm.* Bd. 73.) B.

Methode zur Bestimmung mit fetten Körpern verbundener Quecksilbermengen.

Man wägt nach Nicklès genau z. B. 5 Grm. der zu prüfenden grauen Quecksilbersalbe, bringt sie in einen kleinen Kolben mit flachem Boden, setzt eine hinreichende Menge Schwefelkohlenstoff hinzu, um das Fett zu lösen, was man durch Schütteln erleichtert, und fügt hierauf eine Chlorcalciumlösung von 40° B. hinzu. (Eine Lösung von dieser Stärke krystallisirt gewöhnlich im Winter aus, ein gelindes Erwärmen derselben vor dem Gebrauche setzt sie indessen wieder in den gehörigen Zustand.) Man mischt das Ganze durch Schütteln und überlässt es der Ruhe. Nach 10 Minuten haben sich die Flüssigkeiten vollständig getrennt, die Salzlösung befindet sich auf dem Boden des Kolben, etwa vorhandene fremde Beimengungen, wenn sie schwer sind, auf dem Grunde dieser Lösung, gemischt mit dem fein zertheilten Quecksilber; der das Fett gelöst haltende Schwefelkohlenstoff bildet die obere Schicht. Sind die etwaigen Beimengungen von geringerer Dichtigkeit, so finden sie sich suspendirt entweder im Schwefelkohlenstoff, oder in der Salzlösung. Nachdem man den Schwefelkohlenstoff abgegossen, fügt man eine kleine frische Quantität desselben hinzu, um die an den Gefässwänden noch haftenden Fetttheilchen zu entfernen, und giesst ab. Um nun die Menge des Quecksilbers zu bestimmen, bringt man eine gewogene Menge eines leicht schmelzbaren Amalgams hinzu und erhitzt. Sobald das Amalgam geschmolzen ist, bewegt man den Kolben leicht, damit das Quecksilber aufgenommen werde, giesst das Ganze in eine Kapsel, wäscht den Metallklumpen gut mit Wasser ab und trocknet ihn zwischen Fliesspapier. Die Zunahme am Gewichte des Amalgams zeigt nun einfach das in der Salbe enthaltene Quecksilber an. Von dem Amalgam setzt man ungefähr das 6—8fache des in der Salbe muthmaasslich enthaltenen Quecksilbers hinzu. (*Journ. de Pharm. et de Chim.* Mai 1858. pag. 321 etc.) Hendess.