Besprechungen.

Les Maternités, leur organisation et administration, illustrées par la statistique de 25 ans de la maternité de Copenhague par A. Stadfeldt, M. D. Chirurgien en Chef de la maternité, Professeur à l'université de Copenhague. 1876.

In dieser dem internationalen Gesundheitscongresse zu Brüssel vorgelegten Schrift unternimmt es Verf., die Nothwendigkeit und Berechtigung der Entbindungsanstalten nachzuweisen, gegenüber den Vorwürfen, die wegen der hohen Sterblichkeitsziffer ihrer Insassen an Puerperalfieber in den letzten Jahren gegen sie erhoben wurden.

Verf. betont die Unmöglichkeit, ohne Anstalt einen zweckentsprechenden Unterricht zu erteilen, würde ihren Wegfall jedoch mehr für die Hebammen als die Studirenden bedauern; womit Ref. nicht einverstanden sein kann, insofern als ein gründlich ausgebildeter Schlag von Geburtshelfern die erste Bedingung für richtige Belehrung und Ueberwachung der Hebamme ist, und ein solcher kann nur in einer Anstalt erzielt werden. Verf. verwirft den einfachen Vergleich der Zahl der Todesfälle in und ausserhalb einer Anstalt, als falsche Statistik. Die Pfleglinge einer Entbindungsanstalt setzen sich überwiegend aus Erstgebärenden und dem niedersten Proletariat zusammen, dadurch grössere Sterblichkeit, denn heruntergekommene Individuen besitzen grössere Empfänglichkeit für Puerperalfieber und geringere Widerstandskraft gegen dasselbe. Er stellt daher die Frage, wie hoch ist die Sterblichkeit der Stadt Kopenhagen an Puerperalfieber. Antwort: in den letzten 25 Jahren bei 108732 Geburten 1 : 123 mit Schwankungen von 1 : 73 bis 1 : 284; eine jedenfalls zu niedrige Zahl, da viele Todesfälle von den praktischen Aerzten unter anderen Rubriken angemeldet werden.

Die zweite Frage lautet: wie weit kann es in dieser Hinsicht eine Entbindungsanstalt bringen. In den Jahren 1822—1843 herrschte in der Kopenhagener Anstalt allerdings eine Sterblichkeit 1 : 19. Durch Räumung und Umbau der Anstalt, besonders durch Einrichtung von Hilfsräumen bei Hebammen oder Familien der Stadt, wurde Sorge für Verbesserung des Gesundheitszustandes getragen.

In diese Hilfswohnungen werden Gebärende, bei denen ein normaler Verlauf zu erwarten ist, zu Wagen von der Anstalt aus gebracht. Nach dieser Auswahl beläuft sich die Operationsfrequenz in der Anstalt auf 1 : 11, die in den Hilfsräumen auf 1 : 49, entsprechend natürlich die Morbilität und Mortalität. Die Todesfälle berechnet jedoch Stadfeldt für beide Theile zusammen, und erhält dabei von 1850—1864 auf 15864 Geburten 1 : 24. Mit dem Jahre 1865, dem Beginne der Thätigkeit des Verf. als Director der Anstalt, beginnt eine noch grössere Abnahme der Sterblichkeit, die — mit Schwankungen von 1 : 28 bis

1 : 178 — auf 1 : 51 sinkt. Im Jahre 1872 sinkt die Anstaltssterblichkeit unter die der Stadt Kopenhagen.

Verf. kennzeichnet nun seinen Standpunkt, sowie die Mittel und Wege, mit denen gegen das Puerperalfieber vorzugehen ist. Das Puerperalfieber ist eine reine Septicämie, einen Zusammenhang mit Scarlatina stellt er, wie Duncan jüngst, durch Vergleich der Frequenz beider entschieden in Abrede. Betont die genaue Trennung der Gebärenden und Wöchnerinnen nach Raum, Wartepersonal, Wäsche u. s. w.

Zweckmässig ist die Eintheilung des Wartepersonales in solches für Geburten, Wöchnerinnen und eine dritte Gruppe, die nach Beschäftigung mit Wöchnerinnen einige Tage desinficirt wird. Die weiteren Angaben über Desinfection der Hände, Instrumente u. s. w. während der Geburt und des Wochenbettes enthalten so ziemlich dasselbe, wie seiner Zeit aus den Kliniken von Basel und Leipzig bekannt gemacht wurde.

Die Hauptsache ist grösste Peinlichkeit in der Desinfection, der Vorstand muss mit dem besten Beispiele vorangehen, das Material darf nicht so gross sein, dass er es nicht mehr übersehen kann.

Eine dritte Gruppe von Gebärenden endlich empfängt während des 6—8wöchentlichen Schlusses der Anstalt im Sommer nur Geld von derselben, um am Orte der eigenen Wahl niederzukommen. Diese Gruppe zeigt nach Verf. die ungünstigsten Sterblichkeitsverhältnisse. Nach den beigegebenen Curven ist in den letzten 10 Jahren die Sterblichkeit fünf Mal grösser, fünf Mal niedriger als die der Stadt. Danach sollen diese viel schlechter daran sein, als die in der Anstalt Entbundenen.

Dazu möchte Referent bemerken, dass die Sterblichkeit 1 : 51 doch nicht rein die der Anstalt giebt, sondern zusammen mit den Hülfswohnungen.

Aus den Zahlen ist nicht ersichtlich, wie hoch sich die Sterblichkeit der Anstalt allein belaufen würde, wahrscheinlich doch höher, als die der am Orte ihrer Wahl niederkommenden Frauen, die durchschnittlich mit 1 % angegeben ist. Es ist daher anzuerkennen, dass durch zweckmässige Einrichtungen, scrupulöses Verfahren im Lister'schen Sinne die Anstaltssterblichkeit sehr verringert werden kann. Der Beweis einer geringeren Sterblichkeit in der Anstalt gegenüber der ärmsten Klasse ausserhalb scheint Ref. nicht geliefert. Es möchte sich fragen, ob nicht durch Beaufsichtigung auch der am Orte ihrer Wahl niederkommenden Frauen, durch Hülsärzte nach Art einer Poliklinik, auch deren Sterblichkeitsziffer erniedrigt werden könnte.

Fehling.

B e r i c h t i g u n g.

Irrthümlich hat Hecker in Bd. X, S. 542 dieses Archivs einen von Osterloh während der Abwesenheit Winckel's in der Dresdner Entbindungsanstalt beobachteten und von Osterloh auch in „Winckel's Berichten und Studien aus dem K. S. Entbindungsinstitute in Dresden, 2. Theil, 1876“, S. 86 beschriebenen „Fall von Kaiserschnitt nach dem Tode einer Eclamptischen“ als von Winckel selbst beobachtet und behandelt, angeführt.

Die Redaction.