Erfahrungen über die Trübung des atmosphärischen Wassers durch salpetersaures Silber in Verbindung *). Ich habe auch einige hieher gehörige Versuche in Arbeit. Vielleicht findet hier eine Bildung von salzigter Säure statt.

IX.

Ein nächtliches Hagelwetter im verfloffenen Sommer,
ein Schreiben des G.St.Arztes Dr. Raschig;
und zwei problematische Fälle außerordentlichen Hagels.

1.

Die Versuche der Utrechter Physiker über das Magnetisiren des Stahls durch electriche Entladungsschläge, in Stück 8 Ihrer Annalen, sind mir nicht ganz geglückt. Denn wie ich es auch anfangen mochte, um Stahlcylinder und kreisförmige durchbohrte Stahl - Platten durch electriche Funken und Schläge zu magnetisiren, so äußerte sich allemal nach den Funken oder Schlägen bestimmte Polarität an dem Stahle, ohne daß sie von einander geschnitten wurden. Ich will nun mit meinem Barlow'schen Apparate den Versuch nach meiner Art wiederholen, und wenn es da nicht gelingt, magnetische Indifferenz oder völliges Binden beider Pole in einem Stahlringe hervorzubringen; so verzweifle ich an der Möglichkeit, einen Rotations-Apparat durch bloßen Magnetismus darzustellen.

Haben Sie denn nicht Nachrichten von dem merkwürdigen *Hagelwetter* des letzten Sommers in der *Nacht* vom 25 zum 26 Julius? Die Erscheinung desselben mitten in der Nacht ist Volta's Hagel - Theorie, die Sonnenschein voraussetzt, ganz entgegen. So viel ich gehört, hat es sich aus der Gegend von *Lommatzsch* (westlich von der Elbe) an, bis in die *Niederlausitz* erstreckt und scheint an allen Orten gleichzeitig und sehr heftig gewesen zu seyn. In *Meissen* war es um 12 Uhr

*) Diese Annal. B. 58 S. 440. Das vorige Stück mit den interess. Untersuchungen Dr. Vogel's in München war noch nicht ausgegeben, als dieses geschrieben wurde. *Gülb.*

und in der Gegend des Ritterguts *Umholz* in der Lauftitz ebenfalls um diese Stunde, wie ich von Augenzeugen weiß. An vielen Orten seines Striches von *Lommatsch* über *Cönnern*, *Königswarthe* nach *Muskau* zu, war es so heftig, daß man nicht gesehen, was vorher auf den Feldern gestanden, und Staare zu Hunderten todt gefunden hat. Hier blitzte es sehr viel um diese Zeit, mit äußerst heftigem Platzregen, aber mäßigem Donner und bei ziemlicher Windstille. Nach ohngefähr $\frac{3}{4}$ Stunden war hier alles vorbei. Das Barometer stand am 25 Juli 27" 10,5""; das Thermometer Nachmittags 25° R. im Schatten. Der Himmel war früh heiter, nachher Cumuli; Nachmittags um 3 Uhr Gewitter von kurzer Dauer, nachher gemischt, doch mehr heiter. SSW-Wind gelind. Den 26 Juli war es Morgens 6 Uhr sehr heiter, das Barom. stand auf 27" 10"", das Therm. auf 15°. Nach 9 Uhr Trübung in Westen, nach 10 Uhr sehr starkes Gewitter aus Westen heraufziehend, welches hier in einen Baum im italienischen Dörfchen mitten unter Hühnern, Gänsen und nicht viel über hundert Schritt von einem mit vielen und hohen Ableitern versehenen Schlosse einschlug. Diesen und die folgenden Tage blieb es gemischt, mit mäßigen Gewittern in den Nachmittagsstunden.

2.

In dem zu Wien erscheinenden Conversations-Blatte Jahrg. 1821 Nr. 59 S. 704 wird unter andern Arten außerordentlicher Regen folgendes angeführt, worüber ich von Historikern nähern Aufschluß zu haben wünschte: „*Eisregen*. Kurze Zeit bevor die Sarazenen Italien verheerten, fiel in Frankreich ein *Eisregen* von so ungeheuren Schollen, daß eine derselben 12 Fuß in die Länge, 6 in die Breite und 2 in die Dicke maß. *Sub. l. 9 En. 8.* — Ein noch stärkerer *Eisregen* soll im Jahre 825 in Burgund gewesen seyn, und Klumpen von 15 Fuß Länge, 12 Fuß Breite und 2 Fuß Höhe herabgeregnet haben. *Avent. l. 4. A. D. Sigon. an. 824.*“

Vom 2ten Juli 1821 Ab. bis 5ten und 4ten sah man auf dem großen St. Bernhardberge Donner und Blitze, Platzregen und gewaltige Schloßen sich alle Augenblicke wiederholen.

3. Hagel mit metallischem Kern, angeblich gefallen in Irland
im Juni 1821.

Folgender Brief aus Irland, geschrieben am 12 Juni 1821, wurde Hrn Prof. Pictet in Genf mitgetheilt, und er hat ihn in seiner Zeitschrift, Sept. 1821, eingerückt: „Neulich ist in der Grafschaft *Majo* Hagel gefallen, von dem jedes Korn eine unbekannte Substanz als Kern enthielt. Die Leute sind dort theils so einfältig, theils so ungläubig, daß es sehr schwer hielt, einige Umstände darüber auszumitteln. Ein Kind soll ein Hagelkorn in den Mund genommen und beim Schmelzen desselben einen harten Kern gefunden haben, und dieses durch die Eltern so schnell bekannt geworden seyn, daß man eine Menge Hagelkörner untersuchen konnte, in deren mehrsten man einen solchen Kern gefunden haben soll, wovon ich Ihnen hier einen überschiere. Der Hagel verbreitete sich über einen Raum von ungefähr 4 engl. Quadratmeilen. Dr. Wollaston soll einen dieser Kerne, der nach London geschickt worden untersucht, und wie man sagt darin kein Eisen gefunden haben.“

Hr. Pictet fügt diesem bei, der gelehrte Chemiker, der ihm dieses Schreiben mitgetheilt, habe ihm zugleich ein Stückchen des beigelegten Kerns überschickt, und so klein dieses auch sey, so erkenne man darin doch mit voller Gewissheit dodecaedrischen Schwefelkies mit fünfseitigen Seitenflächen. Der Bruch ist gelblich-grau und hat Metallglanz, und der ganze Kern war leicht zerprengbar. Die Stückchen braunten an der Flamme des Löthrohrs mit einem Schwefelgeruch. Salzsäure löste sie leicht auf, und gab dann mit blausaurem Kali einen blauen Niederschlag, daher sie gewiss Eisen enthielten.

„Wenn die Sache wahr ist, und es kann blos das Sonderbare derselben uns berechtigen, an ihr zu zweifeln (?), so...“ Ich gestehe, daß ich hier einen Grad Unglauben mehr habe, und daß die ganze Art der Erzählung mir wenig Vertrauen zu ihr erweckt.

Gilbert.

BE MER K U N G E N

nach Howard's System der Hellen.

Vom 1 bis 5 August. Am 1. früh bed., halb 8 etws Reg., Mitts rings hohe Cum. in S mit dort bedeckenden Cirr. Str. gemengt, sonst heiter; Abds einige Cum. und viel Cirr. Str., später letzterer in N gruppiert. Am 2. stets stark bed. von $\frac{1}{2}$ 6 bis $\frac{1}{2}$ 8 Abds und um 10 stark Reg., dazwischen in Schauern, um 6 Abds einige starke Blitze und schwach Donner in W. Am 3. der gestrige Regen bis 2 heute Morg. jetzt, gleich bed. Um 1 U. 9' Morg. trat der Voll-Mond ein und die mit ihm vergeleichenste partielle Mondfinsternis konnte daher nicht beobachtet werden. Morg. der Horiz. bel. mit Cum., darauf in N heiter, Mitts bedecken Cum. und Cirr. Str. oft und Abds gleiche, später wolk. Bedckg, um 4 Abds etws Reg.

Vom 4 bis 10. Am 4. ziehende Cirr. Str. oben, Cum. unten Vormitts, Nachmitts letzterer nur noch in N sonst häufig Cirr. Str., Abds und später Schleier dazu und selten einige Sterne. Am 5. kleine Cirr. Str. die früh häufig, vermehren sich Tags und unten treten Cum. auf; um 2 in S düstere Gewitformat., von Abds ab bed. und selten ein Stern, um 10 einz. Regsprf. Am 6. Morg. und Spät-Abds wolk. bed., Nachts 10 gel. Regsch., Tags unten bed., oben Cirr. Str. und am Horiz. bisweil. Cum. Am 7. wie gestern, doch in O oft heiter; um 2 U. etws großtropfger Reg. Am 8. früh halten rundl. und klein gefond. Cirr. Str. den Horiz. bed., haben Tage Cirri über sich und wechseln Spät-Abds mit heit. Stellen, Cum., die besond. in N und S sich bildeten, ziehen Nachmitts über heit. Grund. Am 9. getrennte Cirr. Str. die Morg. sich zeigen, gestalten Mitts sich in große Massen; um $\frac{1}{2}$ 1 und gegen 2 etws Reg.; aus SW zieht ein Gewitter $\frac{1}{2}$ 2 mit schwachem Donner am südl. Horiz. nach SO hin; Abds vielfaltig Gewitformat., sehr düster in O, es donnert dort schwach und von 6 bis 7 U. etws Reg., später ist es fast heiter. Am 10. Bedckg und ziehende Cirr. Str. wechseln, Mitts in N Gewitformat.; um 12 und 2 wenig, um 4 schärfer Reg. Heute, Morg. 5 U. 14' das letzte Mond-Viertel.

Vom 11 bis 17. Am 11. Morg. bei lichtem Horiz., wolk. bed., Mitts Cirr. Str., rings Cum. und in N hoch herauf düstere Gewitformat., um 4 ein scharfer Regsch., Abds sieht die Gewitform. in NW bis SW, nach 6 zieht das Gew. bei $\frac{1}{2}$ 1 Sinds lang stark Reg. nördl. des Zeniths nach NO, der Donner nur einige Male mächtig und zwar $\frac{1}{2}$ 7. Später nach oben verwisch. Contin. am Horiz. und oben viel Sterne. Es sieht heute der Mond in seiner Erd-Nähe. Am 12. Cirrus und Cirr. Str. früh sind Mitts in W in wolk. Bedckg modifiz., sonst Cirri auf heit. Grunde; Nachmitts rings Cum., Abds gleich bed., $\frac{1}{2}$ 8 etws Reg. Am 13. Nachts vorher etws Reg., Tags wolk. Bedckg, bisweil. einige Cum., Abds große Cirr. Str. und Nachts sternreiche Stellen zwischen diesen. Am 14. früh auf heit. Grunde Cirr. Str., in W Cum., Mitts diese bei fast bed. N, über heit Grund, Abds fast, später ganz heiter. Am 15. früh heiter, Mitts einige Cirr. Str., viel Cum. in W; Nachmitts entwickelt sich Gewitform. in NW und zieht herüber, Abds 8 bis $\frac{1}{2}$ 9 ziehen 2 Gewitter herüber mit Regsch., nördl. und südl. des Zeniths gehen sie nach NO u. so, beider Donner mächtig doch oft zugleich; bis Nachts

2 U. andauernd zieht das Gew. unterm S Horiz. bis SW bei sehr starken Blitzen dort und fernem Donner. Am 16. früh gleiche Decke mit tiefen Cirr. Str., Mitts in O heiter, sonst Cum., Abds Cirr. Str. und später diese haug, doch wechselnd mit heit. Stellen. Am 17. wolk. Bed. Vormitts theilt sich Nachmitt. und Cum. wollen auftreten, Abds nur noch licht am Horiz. in NO; um 1, 6 u. 8 etws Reg. Um 10 U. 10' Morg. trat der Neu-Mond ein, der eine, doch hier nicht sichtbare, Sonnenfinsternis hat.

Vom 18 bis 24. Am 18. Morg. von unten herauf bed. Cirr. Str. und geben dann in wolk. Bedckg über durch die Spät-Abds nur selten ein Stern; um 12 eine halbe Stunde fein, und um 2 scharf, Reg. Am 19. wolk. Bedckg wird Mitts licht und dann ziehen Cum., oben Cirr. Str. über heit. Grund, Nachmitts sind Cirr. Cum. überall verbreitet und Abds wie später heiter. Am 20. Morg. und Spät-Abds heiter, Mitts klein gefond. Cum. rings, die auf Cirr. Str. stehen, Nachmitts nehmen sie zu und sind Abds groß und häufig. Am 21. auf verschl. Grunde früh viel Cirr. Str., Tags viel Cum. unten, dichte Cirr. Str. oben, Spät-Abds meist wieder heiter. Am 22. Cirr. und dünne Cirr. Str. bedecken meist, bis Mitts, dann wenig noch, in Streifen von O nach NW und Abds heiter. Am 23. Cirr. Str. bei bed. Horiz. oben über heit. Grund, Mitts mit Cum. gemengt, dann, bis Abds starke wolk. Bedckg. Am 24. stets bed., feiner Reg. in unterbroch. Schauern in starken Tropfen um 12 u. 2. Um 4 U. 49' Abds fällt das erste Viertel des Mondes, auch sieht heute der Mond zugleich in seiner Erdferne.

Vom 25 bis 31. Am 25. fast stets gleiche Decke, Mitts in W Gewitform. die sich nach S verbreitet; halb 2 zieht das Gew. nordwestl. vom Zenith nach NO und lässt um 2 sich nur schwach dort noch hören; von $\frac{1}{2}$ 2 bis 3 stark Reg., dann Cirr. Str. auf heit. Grunde und später bilden diese wolk. Bedckg. Am 26. wolk. Bedckg, vor 12 bis $\frac{1}{2}$ 2 und Nachmitts Regensch., in S Gewitform. und dort öfter schwacher Donner. Am 27. wolk. Bedckg lässt nach etws Reg. um 12 U. wieder Cum. die rings am Horiz. stehen heiter, während sie am Zenith weit verbreitet bleibt, später jedoch alles heiter. Am 28. Morg. und Abds heiter, Vormitts bildet sich wolk. Bedckg die Nachmitts in Cum. und Cirr. Str. sich modifiz.; Abds wellig gefonderte Decke, durch deren Zwischenfugen oben Sterne blinken, der N u. O Horiz. bleibt frei. Am 29. früh und von 11 U. Abds ab Reg., Tags wolk. Bedckg die selten getrennt ist, Mitts in N u. O Cum. Am 30. früh trennt sich gleiche weiße Decke in Cirr. Str. und diese ziehen Tags über heit. Grund während unten Cum. stehen, Abds und später heiter. Am 31. wolk. Decke löst sich wechselnd in Cirr. Str. auf, Mitts unten Cum.

Charakteristik des Monats: sehr wechselnde Witterung, mehr doch trübe mit häufigen, wiewohl meist geringen Regenschauern; westliche, selten sehr lebhaft Winde wehen und bringen, wenn sie, wie öfter geschah, nach N und NW abspringen, kalte Nächte.

FÜR DEN MONAT AUGUST 1822; GEFÜHRT VOM OBSERVATOR DR. WINCKLER.

Tägliche Veränderung				Einfluss der Winde auf den Stand des Barometers		Thermomet.		Hygrometer		Berechnung der absoluten Höhe von Halle über dem Meere, aus den Mittags-Beobachtungen des Monats August:			
Zeit	des Barometers	des Thermometers	des Hygrometers	Mittel des Monats =	37 ^{mm} , 358	+ 15 ^o , 27	86 ^o , 10	37 Beob. im ganzen Mon.			Baromet.	Thermomet.	Höhe
1	+ 0 ^{mm} , 111	- 5 ^o , 35 Zunahme	+ 2 ^o , 89 Abnahme	Mittel { 18 theils leb. nordl. Winden	+ 1 ^o , 068	+ 0, 03	+ 3, 83	gr. d. Mittel =			37 ^{mm} , 373	+ 16 ^o , 03	303 Ft., 815
2	- 0, 053	- 0 ^o , 37	+ 1 ^o , 93	bei { 13 gelinde östlichen	- 1 ^o , 357	+ 0, 05	- 3, 88	dav. sind 9 bei nordl. Wd.			- 0, 368	+ 1 ^o , 13	+ 43, 48
3	- 0, 053	- 0 ^o , 37	+ 1 ^o , 93	beob. { 57 theils lebhaft. südl.	- 0, 646	+ 0, 84	+ 1, 44	3 bei östlich.			+ 2, 108	+ 2, 83	- 189, 667
4	- 0, 053	- 0 ^o , 37	+ 1 ^o , 93	ach- { 67 theils starken westl.	+ 0, 001	+ 1, 13	+ 1, 48	17 bei südl.			- 0, 536	+ 1, 88	+ 53, 099
5	- 0, 053	- 0 ^o , 37	+ 1 ^o , 93	ten { Windstillen	-	-	-	1 bei westl.			+ 0, 366	- 1, 85	- 31, 695
6	- 0, 053	- 0 ^o , 37	+ 1 ^o , 93	Max. am 21. 8 U. (15. 10 U.) 16. 8 U. =	+ 3, 543	+ 9, 40	+ 13, 90						
7	- 0, 053	- 0 ^o , 37	+ 1 ^o , 93	Min. am 21. 10 U. (9. 10 U.) 20. 10 U. =	- 3, 030	- 6, 51	- 26, 46						
8	- 0, 053	- 0 ^o , 37	+ 1 ^o , 93	grösste Veränderung	6, 573	16, 00	40, 36						
9	- 0, 053	- 0 ^o , 37	+ 1 ^o , 93	Nach d. Thermograph winkl. Max. = + 25, 5; Min. = - 7, 7; gr. Ver. ad. = 17, 3 ^u									

Erklärung der Abkürzungen in der Witterungs-Spalte. bl. heiter, sch. schön, vr. vermischt, tr. trüb, Nb. Nebel, Th. Thau, Dt. Duft, Rg. Regen, Gw. Gewitter, Bl. Blize, und. oder Wd. windig oder Wind, strg. stürmisch, Hbh. Hoch, Nbh. Niedrig, Sbh. Schnee, Rnd. Schneeflocken, Rf. Reif, Nhl. Nebeln, Rgb. Regenbogen, und Mg. Morgens, Ab. Abends.