bei Kasein. Die beiden Globuline des Serums und das Eier-Pseudoglobulin sind auch durch Äther fällbar. Die Annahme, dass die Kolloide um so leichter fällbar sind, je höher ihr Molekulargewicht ist, fand sich nicht nur bei den Eiweissstoffen, sondern auch bei den Kohlenhydraten bestätigt.

Wie Max Schultze vor Jahren berichtet hat, entsteht beim Erwärmen von Eiweissstoffen mit Rohrzucker und Schwefelsäure eine purpurrote Färbung, was bekanntlich bei Anstellung der Pettenkofer'schen Reaktion auf Gallensäuren berücksichtigt werden muss. Sydney W. Cole¹⁾ zeigt nun, dass diese Farbenreaktion des Eiweisses auf der Gegenwart von abgespaltenem Tryptophan beruht; er stellt die Probe in der Art an, dass er zum Beispiel 1 cc einer 10-prozentigen Lösung von Wittepepton mit 2 Tropfen 5-prozentiger Rohrzuckerlösung versetzt und etwa eine Minute mit 5 cc rauchender Salzsäure erhitzt. Die rote Flüssigkeit enthält einen Absorptionsstreifen im blauwärts gelegenen Teile des Grüns etwa von λ 490 bis λ 560. Der Rohrzucker kann natürlich auch durch Furfurol ersetzt werden. Da nun einzelne Eiweissstoffe selbst neben Tryptophan direkt Furfurol liefern, erklärt es sich ohne weiteres, dass sie auch für sich schon beim Erwärmen mit Salzsäure eine schwache Reaktion geben. So findet auch die Reaktion von Liebermann²⁾ (1887) eine Erklärung, nach der mit Äther gewaschenes Eiweiss beim Erhitzen mit konzentrierter Salzsäure eine violettblaue Färbung gibt. Die Reaktion tritt nämlich nur ein, wenn der Äther Glyoxylsäure enthält, die ja ihrerseits mit Tryptophan reagiert. Auch die Färbung, die nach Reichl (1889) Aldehyde bei Gegenwart eines Oxydationsmittels mit Eiweiss geben, beruht nach Cole auf dem Gehalt an Tryptophan.

Für den Nachweis der Borsäure im allgemeinen und in den Nahrungsmitteln im besonderen benutzt L. Robin³⁾ als neuen Indikator den Farbstoff der Mimosenblüten. Dieser zeigt bei alkalischer Reaktion eine intensiv strohgelbe Farbe, während seine neutralen Lösungen farblos sind. Man erhitzt 110 g Blüten mit 200 cc Wasser bis zum beginnenden Sieden und gibt nach dem Erkalten 50 cc neutralen Alkohol zu; die nach einer Stunde filtrierte Flüssigkeit ist in einer braunen

¹⁾ Journal of Physiol. **30**, 311—318.

²⁾ Vergl. diese Zeitschrift **26**, 673.

³⁾ Comptes rendus **138**, 1046.

Flasche aufzubewahren. In einer Salzmischung wird Borsäure nachgewiesen, indem man die Lösung mit Natriumkarbonat schwach alkalisch macht, aufkocht, filtriert, mit Mimosentinktur versetzt, dann Salzsäure bis zum Verschwinden der gelben Färbung zufügt und auf dem Wasserbad zur Trockne verdampft. Ein gelber Rückstand, der auf Zusatz von Natriumkarbonat rötliche Färbung annimmt, zeigt Borsäure an. Ähnlich verfährt man bei Untersuchung alkoholischer Getränke. Milch (20 cc) wird durch einige Tropfen Essigsäure koaguliert, filtriert, neutralisiert, aufgekocht, filtriert und verascht, der Rückstand in kochendem Wasser aufgenommen, das Filtrat mit Salzsäure leicht angesäuert und mit einem mit der Tinktur bereiteten Papier geprüft.

V. Atomgewichte der Elemente.

Von

A. Czapski.

Das Atomgewicht des Lanthans. Über das Atomgewicht des Lanthans sind vor einiger Zeit fast gleichzeitig zwei Arbeiten erschienen, und zwar von B. Brauner und Fr. Pavlíček¹⁾ und von H. C. Jones²⁾. In beiden Abhandlungen werden zunächst die früheren, diesen Gegenstand betreffenden Untersuchungen besprochen. Dann gehen die Verfasser zur Beschreibung der von ihnen angewandten Methoden über.

Brauner und Pavlíček gewannen ihr Ausgangsmaterial, indem sie eine Lösung von sorgfältigst gereinigtem, namentlich von jeder Spur der anderen seltenen Erden befreitem Lanthan wiederholt mit Natronlauge fraktioniert ausfällten. Da sie nun die erhaltenen Niederschläge getrennt für ihre Bestimmungen benutzten, glaubten sie auch die Frage, ob Lanthan ein einheitliches Element sei, zur Entscheidung bringen zu können.

Das Atomgewicht selbst wurde auf drei verschiedene Arten bestimmt. Als erste Methode verwandten die Verfasser die Umwandlung

1) Transact. of the chem. Soc. 1902, Band 81; von den Verf. eingesandt.

2) American chemical Journal 28, No. 1; von dem Verf. eingesandt.