formula haec a $t, t' = 0$ usque ad T, T' integrata, aequationem

$$T' = T - \frac{1}{b} \left\{ \frac{1}{32} a^2 - \frac{11}{12288} a^4 + \frac{173}{2^{15} \cdot 135} a^6 - \frac{22931}{2^{15} \cdot 315} a^8 + \dots \right\} \\ + \frac{1}{b} \left\{ \frac{1}{32} a^2 + \frac{11}{12288} a^4 + \frac{173}{2^{15} \cdot 135} a^6 + \frac{22931}{2^{15} \cdot 315} a^8 + \dots \right\}$$

suppeditat.

Supponamus e pro $t = 0$ esse $e^{(0)}$

pro $t = T$ $e^{(1)}$; erit

$$b = \frac{1}{T} (\log. \text{hyp. } e^{(0)} - \log. \text{hyp. } e^{(1)})$$

et denotemus per $\varphi \cdot x$ functionem ipsius x sequentem

$$\lambda \cdot \left(\frac{1}{32} x^2 + \frac{11}{12288} x^4 + \frac{173}{2^{15} \cdot 135} x^6 + \frac{22931}{2^{15} \cdot 315} x^8 + \text{etc.} \right)$$

ubi λ pro Modulo $\log.$ briggicorum scripta est; tunc denique habetur:

$$T' = T \left\{ 1 + \frac{\varphi \cdot e^{(0)} - \varphi \cdot e^{(1)}}{\log. \text{br. } e^{(0)} - \log. \text{br. } e^{(1)}} \right\}$$

Valores ipsius $\varphi \cdot e$ singulis gradibus ipsius e usque ad 45° respondentes tabula sequens exhibet:

e	$\varphi \cdot e$	e	$\varphi \cdot e$	e	$\varphi \cdot e$
0°	0,0000000	10°	0,0004138	20°	0,0016595
1	0041	11	5008	21	18302
2	0165	12	5961	22	20094
3	0372	13	6997	23	21971
4	0661	14	8117	24	23933
5	1034	15	9320	25	25981
6	1489	16	10607	26	28114
7	2027	17	11978	27	30332
8	2647	18	13433	28	32636
9	3351	19	14972	29	35026
10	4138	20	16595	30	37503

e	$\varphi \cdot e$	e	$\varphi \cdot e$	e	$\varphi \cdot e$
30°	0,0037503	35°	0,0051194	40°	0,0067091
31	40067	36	54196	41	70538
32	42717	37	57286	42	74077
33	45455	38	60465	43	77706
34	48281	39	63733	44	81426
35	51194	40	67091	45	85238

Posito $\varphi \cdot e^{(0)} - \varphi \cdot e^{(1)} = B$; $\log e^{(0)} - \log e^{(1)} = A$, habetur

$$T' = T + T \frac{B}{A} = T \cdot \frac{A+B}{A}$$

$$T = T' \frac{A}{A+B} = T' - T' \frac{B}{A+B}$$

Est itaque $T' \frac{B}{A+B}$ correctio ad Tempus T' quo numerus oscillationum ab amplitudine $e^{(0)}$ incipientium atque in $e^{(1)}$ desinentium absolvitur, applicanda, ut habeatur tempus, quo idem numerus oscillationum amplitudinis infinite parvae perficitur.

Celeb. *Hansteen* in opere „Magazin for Naturvidenskabernes“ intitulato Vol. 4. p. 309 exemplum sequens calculi dedit:

$$e^{(0)} = 25^\circ; e^{(1)} = 3^\circ, 5, T = 280$$

Est itaque hic: $\log e^{(0)} \dots 1,397940$ porro $\varphi \cdot e^{(0)} \dots 0,002598$

$$\log e^{(1)} \dots 0,544068 \quad \varphi \cdot e^{(1)} \dots 0,000051$$

$$A \dots 0,853872 \quad B \dots 0,002547$$

$$\log T \dots 2,44716$$

$$\log B \dots 7,40603$$

$$\text{Compl. Log } A \dots 0,06861$$

$$\log. 0,8352 = 9,92180$$

Pro hoc valore cel. *Hansteen* 0,8409 l. c. invenit.

T. h. Clausen.

De resistentia aëris, quomodo in motibus lentis a celeritate pendet.

Observationes circa diminutionem oscillationum penduli liberi maxime videntur idoneae, ut ab iis lex resistentiae aëris in celeritatibus corporum exiguis derivetur. Quem ad finem suppono, resistentiam per formulam $m (\alpha^{(1)} v + \alpha^{(2)} v^2 + \alpha^{(3)} v^3 + \dots)$ exprimi, denotantibus v celeritatem corporis, m quantitatem a forma magnitudine et densitate corporis atque a densitate aëris pendentem; $\alpha^{(1)}, \alpha^{(2)}$ etc. vero quantitates constantes. Diminutionem amplitudinis huic resistentiae legi respondentem derivare conabor, ut comparatione legis diminutionis experientia datae, lex resistentiae inveniri possit.

Sit $a \dots$ long. pend. simplicis, pendulo composito respondentis

$\theta \dots$ inclinatio penduli ad lineam verticalem tempore t .

$-e \dots$ inclinatio initio motus.

$g \dots$ vis gravitatis.

tunc habetur

$$0 = \frac{a d^2 \theta}{dt^2} + g \sin \theta + m \left[\alpha^{(1)} a \frac{d\theta}{dt} + \alpha^{(2)} a^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \alpha^{(3)} a^3 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^3 + \text{etc.} \right] \\ = \frac{2d\theta d^2 \theta}{dt^2} + \frac{2g}{a} \sin \theta d\theta + \frac{2m}{a} d\theta \left\{ \alpha^{(1)} a \frac{d\theta}{dt} + \alpha^{(2)} a^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \alpha^{(3)} a^3 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^3 + \text{etc.} \right\}$$

integrando fit

$$0 = \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 - \frac{2g}{a} \cos \theta + C + \frac{2m}{a} \int d\theta \left\{ \alpha^{(1)} a \frac{d\theta}{dt} + \alpha^{(2)} a^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \dots \right\} \quad (1)$$

Sit $\frac{d\theta}{dt} = 0$ pro $\theta = -e$, et ex altera parte pro $\theta = e + \delta e$;

atque valor integralis $\int d\theta \left(\alpha^{(1)} a \frac{d\theta}{dt} + \alpha^{(2)} a^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \text{etc.} \right)$

inter hos limites $= f \cdot e$; erit

$$0 = -\frac{2g}{a} \cos e + C$$

$$0 = -\frac{2g}{a} \cos (e + \delta e) + C + \frac{2m}{a} f \cdot e$$

$$\text{ideoque } 0 = +\frac{2g}{a} \sin e \delta e + \frac{2m}{a} f \cdot e \text{ vel}$$

$$\delta e = -\frac{m \cdot f \cdot e}{g \sin e} \dots \dots \dots (2)$$

Amplitudo ita post unam oscillationem quantitate $\frac{m \cdot f \cdot e}{g \sin e}$ diminuta est.

Habetur in eo casu, quo $m = 0$

$$\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\left(\frac{2g}{a}\right)} \sqrt{(\cos\theta - \cos e)} \\ = 2 \sqrt{\left(\frac{g}{a}\right)} \sqrt{(\sin\frac{1}{2}e^2 - \sin\frac{1}{2}\theta^2)}$$

Valor hic posito $\sin\frac{1}{2}\theta = \sin\frac{1}{2}e \sin x$ abit in

$$\frac{d\theta}{dt} = 2 \sin\frac{1}{2}e \sqrt{\left(\frac{g}{a}\right)} \cos x; \text{ fit desuper differentiando}$$

$$\frac{1}{2} \cos\frac{1}{2}\theta d\theta = \sin\frac{1}{2}e \cos x dx$$

$$d\theta = \frac{2 \sin\frac{1}{2}e \cos x dx}{\sqrt{(1 - \sin\frac{1}{2}e^2 \sin^2 x)}} = \frac{2 \sin\frac{1}{2}e \cos x dx}{\sqrt{(1 + \sin\frac{1}{2}e^2 \cos^2 x)}}$$

Hi valores in integrale $f.e$ substitui possunt, si quadrata ul-

$$\int \frac{d\theta}{dt} d\theta = 4 \sqrt{\left(\frac{g}{a}\right)} \sin\frac{1}{2}e \sin\frac{1}{2}e \pi \left\{ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1.3}{2.4} \sin\frac{1}{2}e^2 + \frac{1.3.5}{2.4.6} \sin\frac{1}{2}e^4 - \text{etc.} \right\}$$

$$\text{fit porro } \int \frac{d\theta^2}{dt^2} d\theta = \frac{2g}{a} \int (\cos\theta d\theta - \cos e d\theta) \text{ a } \theta = -e \text{ usque ad } \theta = +e$$

$$= \frac{4g}{a} (\sin e - e \cos e)$$

$$\int \frac{d\theta^2}{dt^2} d\theta = 2^4 \sin\frac{1}{2}e^3 \sin\frac{1}{2}e \left(\frac{g}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \int \frac{\cos x^4 dx}{\sqrt{(1 + \sin\frac{1}{2}e^2 \cos^2 x)}}$$

$$= 16 \sin\frac{1}{2}e^3 \sin\frac{1}{2}e \left(\frac{g}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \pi \left(\frac{1.3}{2.4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1.3.5}{2.4.6} \sin\frac{1}{2}e^2 + \frac{1.3}{2.4} \cdot \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8} \sin\frac{1}{2}e^4 \right)$$

Habemus itaque

$$f.e = 4 \pi \sqrt{(ag)} \alpha \cdot \sin\frac{1}{2}e \left(\frac{1}{2} \sin\frac{1}{2}e - \frac{1}{2} \cdot \frac{1.3}{2.4} \sin\frac{1}{2}e^3 + \text{etc.} \right)$$

$$+ 4 ag \alpha^{(2)} (\sin e - e \cos e)$$

$$+ 16 \pi (ag)^{\frac{3}{2}} \alpha \cdot \sin\frac{1}{2}e^3 \left(\frac{1.3}{2.4} \sin\frac{1}{2}e - \frac{1}{2} \cdot \frac{1.3.5}{2.4.6} \sin\frac{1}{2}e^3 + \text{etc.} \right)$$

$$\frac{de}{dt} = - \frac{m \cdot f.e}{g \sin e}$$

$$dt = - \frac{g \sin e de}{m \cdot f.e}$$

$$= - \frac{g}{m} \cdot \frac{\sin e de}{\frac{1}{2} \alpha^{(1)} \pi \sqrt{(ag)} e^2 + \frac{4}{3} \alpha^{(2)} ag e^3 - \left(\frac{5}{192} \alpha^{(1)} \sqrt{(ag)} - \frac{3}{8} \alpha^{(3)} (ag)^{\frac{3}{2}} \right) \pi e^4 \dots \dots \dots (3)}$$

Haec formula integrata relationem inter e et t suppeditabit. Consideremus casus quosdam particulares.

Sit resistentia ipsi celeritati proportionalis, erit quarta

$$\text{ipsius } e \text{ potestate neglecta } dt = - \frac{2g}{m} \cdot \frac{de}{\alpha^{(1)} \pi \sqrt{(ag)} e}$$

$$t + C = - 2 \sqrt{\left(\frac{g}{a}\right)} \frac{\log h.e}{\alpha^{(1)} m \cdot \pi}$$

quod cum experientia proxime convenit.

Sit resistentia quadrato celeritatis proportionalis, erit

$$dt = - \frac{3}{4} \frac{de}{\alpha^{(2)} a m e^2}$$

$$t + C = \frac{3}{4 \alpha^{(2)} a m e}$$

$$e = \frac{3}{4 \cdot \alpha^{(2)} a m (t + C)}$$

terioresque ipsius m potestates rejiciuntur, salisque etiam in hoc casu erit, hoc integrale a $\theta = -e$ usque ad $\theta = +e$, vel a $x = -\frac{1}{2}\pi$ usque ad $x = +\frac{1}{2}\pi$ sumere. Fit itaque

$$\int \frac{d\theta}{dt} d\theta = 4 \sqrt{\left(\frac{g}{a}\right)} \sin\frac{1}{2}e \sin\frac{1}{2}e \int \frac{\cos x^2 dx}{\sqrt{(1 + \sin\frac{1}{2}e^2 \cos^2 x)}}$$

$$= 4 \sqrt{\left(\frac{g}{a}\right)} \sin\frac{1}{2}e \sin\frac{1}{2}e \int dx (\cos x^2 - \frac{1}{2} \sin\frac{1}{2}e^2 \cos x^4 + \frac{1.3}{2.4} \sin\frac{1}{2}e^4 \cos x^6 \dots)$$

generaliter autem habetur, designante m numerum quemcumque parem positivum

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{+\frac{1}{2}\pi} \cos x^m dx = \frac{m-1}{m} \cdot \frac{m-3}{m-2} \dots \frac{1}{2} \pi \text{ ideoque}$$

$$\int \frac{d\theta}{dt} d\theta = 4 \sqrt{\left(\frac{g}{a}\right)} \sin\frac{1}{2}e \sin\frac{1}{2}e \pi \left\{ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1.3}{2.4} \sin\frac{1}{2}e^2 + \frac{1.3.5}{2.4.6} \sin\frac{1}{2}e^4 - \text{etc.} \right\}$$

$$\text{fit porro } \int \frac{d\theta^2}{dt^2} d\theta = \frac{2g}{a} \int (\cos\theta d\theta - \cos e d\theta) \text{ a } \theta = -e \text{ usque ad } \theta = +e$$

$$= \frac{4g}{a} (\sin e - e \cos e)$$

$$\int \frac{d\theta^2}{dt^2} d\theta = 2^4 \sin\frac{1}{2}e^3 \sin\frac{1}{2}e \left(\frac{g}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \int \frac{\cos x^4 dx}{\sqrt{(1 + \sin\frac{1}{2}e^2 \cos^2 x)}}$$

$$= 16 \sin\frac{1}{2}e^3 \sin\frac{1}{2}e \left(\frac{g}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \pi \left(\frac{1.3}{2.4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1.3.5}{2.4.6} \sin\frac{1}{2}e^2 + \frac{1.3}{2.4} \cdot \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8} \sin\frac{1}{2}e^4 \right)$$

vel in seriem secundum potestates ipsius e progredientem resoluta

$$f.e = \left(\frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{192} e^4 \right) \alpha \pi \cdot \sqrt{(ag)}$$

$$+ \frac{4}{3} e^3 \alpha^{(2)} ag$$

$$+ \frac{16}{3} e^4 \pi \alpha^{(3)} (ag)^{\frac{3}{2}} + \text{etc.}$$

Sit tempus unius oscillationis $= u dt$ atque de $= \frac{\delta e}{u}$, erit:

$$\frac{de}{dt} = - \frac{m \cdot f.e}{g \sin e}$$

Relatio inter t et e quae locum habere vulgo supponitur, omni rigore, siquidem diminutio oscillationum a resistentia tantum aëris provenit, subsistere nequit. Haberi enim debuisset.

$$dt = \frac{de}{Me} = \frac{\sin e de}{Me \sin e} = \frac{\sin e de}{Me^2 - \frac{1}{2} Me^4}$$

quod cum formula (3) non convenit. Est enim

$$M = \frac{1}{2} \alpha^{(1)} \pi \sqrt{(ag)}$$

$$\frac{1}{6} M = \frac{5}{192} \alpha^{(1)} \pi \sqrt{(ag)} - \frac{3}{8} \alpha^{(3)} (ag)^{\frac{3}{2}} \pi$$

unde $\alpha = - \frac{11}{72} \frac{\alpha^{(1)}}{ag}$ sequitur; aequatio, suppositioni α et α

ab a non pendere repugnans.

Th. Clausen.

Vermischte Nachrichten.

Hr. Geheimerrath v. Utzschneider hat mir eine von ihm verfasste Lebensbeschreibung des unvergeßlichen *Fraunhofers* gesandt, aus der ich im nächsten Stücke die Hauptpunkte ausziehen werde. Zugleich hat er mir angezeigt, daß er das optische Institut fortsetzen werde. S.

Altona im August 1826.