stanzen zu enthalten scheint, und zwar die Frauenmilch und die der Hündin rechts drehende, die der Eselin und der Stute links drehende. Durch Hydrolyse werden diese Körper optisch unwirksam. Auf Fehling'sche Lösung wirken sie überhaupt nicht ein, so dass der Milchzuckergehalt jeder Milchgattung ohne weiteres nach dem Kupferreduktionsverfahren bestimmt werden kann. Zu diesem Zwecke bringt man 10 cc Milch in ein 100 cc-Kölbchen, fügt 2,5 cc einer 5procentigen Natriummetaphosphatlösung hinzu, verdünnt mit 70 cc Wasser, schüttelt um, versetzt sodann mit 5 cc Salzsäure, füllt zur Marke auf, filtrirt nach abermaligem Umschütteln und verwendet das Filtrat zur Zuckerbestimmung.

Ein charakteristischer Unterschied zwischen Kuhmilch und Ziegenmilch ist, wie Kirchner¹⁾ hervorhebt, die Farbe, welche bei ersterer gelblich, bei letzterer rein weiss ist. Diesem Unterschied entspricht eine verschiedene Farbe des Fettes beider Milcharten. Schäffer¹⁾ weist darauf hin, dass die ätherische Lösung des Fettes bei Kuhmilch, namentlich im Sommer, tief gelb, bei Ziegenmilch farblos ist. Nach des Verfassers Angaben soll es unter Berücksichtigung dieses Unterschieds gelingen, noch 20 % Ziegenmilch in der Kuhmilch nachzuweisen.

Zum Nachweis des Dulcins in Getränken dampft G. Morpurgo²⁾ die betreffenden Flüssigkeiten mit $\frac{1}{20}$ ihres Gewichtes an Bleicarbonat zum dicken Brei ein und zieht denselben mehrmals mit Alkohol aus. Aus dem Trockenrückstand dieser vereinigten alkoholischen Auszüge lässt sich mit Aether gegebenen Falls fast reines Dulcin extrahiren, das man nach Verdampfung des Aethers an seinem süssen Geschmack und an folgender Reaction erkennen kann: Man erwärmt es mit 2 Tropfen Phenol und 2 Tropfen concentrirter Schwefelsäure kurze Zeit, verdünnt den entstehenden bräunlichrothen Syrup mit einigen Cubikcentimetern Wasser und überschichtet die Lösung in einem Reagensglase mit ein wenig Ammoniak oder lässt vorsichtig etwas Natronlauge hinzufließen. Bei Gegenwart von Dulcin färbt sich die Berührungszone beider Flüssigkeiten blau oder veilchenblau.

Der Zinkgehalt amerikanischer Ringäpfel ist nach R. Hefelmann³⁾ höchst wahrscheinlich auf einen absichtlichen Zusatz von Zink-

1) Zeitschrift f. Fleisch- u. Milchhygiene; durch Pharm. Centralhalle **35**, 179.

2) Pharm. Centralhalle **34**, 466. Vergl. diese Zeitschrift **33**, 469.

3) Pharm. Centralhalle **35**, 77.

salzen bei der Herstellung zurückzuführen und wird am besten in der nachbeschriebenen Weise quantitativ bestimmt. 200 g Ringäpfel werden in einem weithalsigen Kolben mit so viel Salzsäure von 1,12 specifischem Gewicht übergossen, dass sie vollständig davon bedeckt sind und unter öfterem Umschütteln 3 Stunden bei 40—60° digerirt. Dann versetzt man mit dem doppelten bis dreifachen Gewicht der angewandten Salzsäure an Wasser, lässt 24 Stunden an einem warmen Orte stehen, filtrirt mittelst der Saugpumpe über eine Witt'sche Filterplatte ab und wäscht anfangs mit heisser 1procentiger Salzsäure, zuletzt mit siedendem Wasser aus, bis das Waschwasser nur noch schwach gelb gefärbt ist. Der Filterrückstand bildet — sobald man häufig und kräftig genug umgeschüttelt hatte — eine breiartige Masse. Das 1—1½ l betragende Filtrat wird bis auf den dritten Theil eingengt und entweder einen halben Tag lang nach und nach mit kleinen Mengen Kaliumchlorat oxydirt oder dreimal mit Salzsäure auf dem Wasserbad bis fast zur Trockne gebracht. Im ersteren Falle filtrirt man nach dem Verjagen des Chlors durch ein gewöhnliches Filter, im letzteren zieht man den kohligen Rückstand mit heissem Wasser aus und filtrirt mit Hülfe der Saugpumpe. Im einen wie im anderen Falle resultirt ein schwach röthliches Filtrat, das mit Ammoniak übersättigt und in der üblichen Weise warm mit farblosem oder schwach gelbem Schwefelammonium gefällt wird. Der aus Schwefeleisen und Schwefelzink bestehende Niederschlag wird sammt dem Filter in einem Kolben mit Königswasser gekocht bis zum Verschwinden des Chlorgeruchs, mit Ammoniak übersättigt, filtrirt und dann mit Essigsäure angesäuert, worauf man das Zink mit Schwefelwasserstoff ausfällt. Zur besseren Abscheidung des Niederschlags setzt man nach vollendeter Fällung für je 100 cc Flüssigkeit 10 g Ammonnitrat zu, filtrirt nach 12—24 Stunden ab und wäscht mit ammonnitrat- und schwefelwasserstoffhaltigem Wasser aus. Das Sulfid wird nach Tränken des Filters mit Ammonnitrat durch Rösten im offenen Tiegel in Zinkoxyd übergeführt und als solches gewogen.

Als Conservierungsmittel von Hackfleisch dienen vielfach Salzmischungen, die Natriumsulfit oder Natriumbisulfit als Hauptbestandtheil enthalten. Zum qualitativen Nachweis dieser Verbindungen bringt H. Kämmerer¹⁾ die Fleischprobe auf einen auf einer Glasplatte liegenden, befeuchteten Streifen Kaliumjodatapapier und benetzt sie

¹⁾ Forschungsberichte über Lebensmittel etc. 2, 257.