in vollem Maasse zulässt. Aus demselben Grunde ist auch die Anwendung des Celloidinzwirns trotz einiger Anhänger nicht zu befürworten. Die Oberfläche dieses Zwirns wird allerdings steril werden, nicht aber das Centrum, sodass bei der Resorption des Celloidins den innen eingeschlossenen Infektionskeimen Thür und Thor geöffnet wird. Ich habe jedenfalls in allen Fällen, wo ich Celloidinzwirn anwandte, trotz Anfangs fieberfreiem Verlauf, nach 4—5 Tagen eine solche Eiterung der Fäden erlebt, wie ich sie bei der Seide in meinem Leben nicht beobachtet habe.

Was nun die Methoden der Seidensterilisation anlangt, so giebt es solcher eine Menge, doch gerade die Mannigfaltigkeit derselben spricht dafür, dass der erzielte Erfolg mehr oder weniger den Erwartungen nicht entspricht. Auf die Vortheile oder Nachtheile der einzelnen Methoden näher einzugehen würde mich zu weit führen. Hervorheben will ich nur, dass durch Kochen oder Liegenlassen in antiseptischen Flüssigkeiten die Zugfestigkeit des Nahtmaterials leidet, und dass bei jeder der bisherigen Methoden der Sterilisation die versenkten Nähte häufig ausgestossen werden. Letzteren unerwünschten Vorgang ausschliesslich einer Infektion durch die Hände des Assistenten oder Operateurs zuzuschreiben, ist man nicht berechtigt, da die Resultate ganz ähnlich auch in den Fällen sind, wo die Naht mit sterilisirten Handschuhen, die kurz vor Anlegung der Naht angezogen werden, ausgeführt wird, wo also eine Infektion auf diesem Wege wohl als ausgeschlossen betrachtet werden darf. Es ist vielmehr anzunehmen, dass der Misserfolg an der ungenügenden primären Sterilisation liegt, resp. dass die Seide als Fremdkörper, weil sie mit reizenden Antiseptics imprägnirt ist, ausgestossen wird. Weitere Stützen für diese Ansicht ergeben sich aus den Erfolgen meiner gleich zu erörternden Sterilisationsmethode.

Unser Bestreben sollte daher darauf hinausgehen, die Seide als das beste Naht- und Unterbindungsmaterial beizubehalten, sie aber ohne weitere Mitgift von reizenden Antiseptics und ohne Beeinträchtigung ihrer Zugfestigkeit, trotzdem aber steril, ins Gewebe zu bringen. Solches erreichen wir, wie ich aus meinen Operationsresultaten im letzten Jahre schliessen darf, indem wir bei der Sterilisation Diffusionsströme auf die Seide einwirken lassen. Die Diffusionsströme entstehen bekanntlich durch Mischung und gegenseitige Durchdringung verschiedener Flüssigkeiten und Gase und sind um so energischer, je höher die Affinität der einzelnen chemischen Ingredienzien zu einander ist. Da nun Wasser und Alkohol Mittel sind, die die Seide wenig angreifen und eine sehr hohe chemische Affinität zu einander besitzen, so liegt es nahe, ihre Diffusionsströme für Sterilisationszwecke als besonders geeignet zu betrachten.

Warum wirken nun gerade die Diffusionsströme von Wasser und Alkohol bakterientödtend und nicht schon die einzelnen Bestandtheile für sich allein? Es ist Ahlfeld's und Vahle's¹⁾ Verdienst, bei der Erforschung der Frage, ob Alkohol bakterientödtend wirkt, zuerst constatirt zu haben, dass trockenes Staphylococcenmaterial durch absoluten Alkohol nicht geschädigt wurde, selbst wenn der Alkohol auf dasselbe 60 Minuten einwirkte. Ein ganz anderes Resultat dagegen erzielten dieselben Autoren, als sie dasselbe Staphylococcenmaterial erst auf einige Minuten ins Wasser brachten und hernach den Alkohol auf dasselbe einwirken liessen. Da gingen die Staphylococci schon nach 2 Minuten zu Grunde. Eine Erklärung dieser Thatsachen findet Prof. C. Günther²⁾ in dem Umstande, dass sich bei der Einwirkung des Alkohols auf das mit Wasser durchtränkte Bakterienmaterial energische Diffusionsströme in und an den Bakterienzellen etabliren müssen.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend habe ich bereits ein Jahr die Sterilisation der Seide auf folgende Weise ausgeführt: Nachdem die Seide in lose Strähne abgewickelt ist, wird sie in einem Glaskochbecher in 95% Alkohol 20—30 Minuten gekocht, um sie von zufälligen Verunreinigungen, Fett etc. zu reinigen. Darauf wickelt man sie auf Glasspulen und bewahrt sie in einem Glasgefäss auf, das mit sterilen leeren Marlylagen zugedeckt wird, damit die Seide austrocknen kann und zugleich vor Staub geschützt wird. Kurz vor jeder Operation 20 Minuten lang in destillirtem Wasser gekocht, dann 5 Minuten in Alkohol, wieder 5 Minuten in Wasser und zum Schluss 20 Minuten in Alkohol weiter gekocht. Zum Kochen in Alkohol benutzt man zweckmässig eine Abdampfschale, aus welcher die Seide noch warm gereicht wird. Nach jeder Operation wird die übriggebliebene Seide wieder trocken aufbewahrt bis zur folgenden Operation, wo sie derselben Prozedur, wie beim vergangenen Mal, unterzogen wird. Diese Prozedur kann mindestens sechsmal wiederholt werden, ohne dass die Zugfestigkeit beeinträchtigt würde.

Hervorgehoben sei, dass die Seide deswegen direkt aus dem Alkohol gereicht wird, um eine eventuelle sekundäre Infektion durch die Hände des Operateurs oder Assistenten durch Diffusionsströme, welche sich bei der Vereinigung des von der Seide imbibirten Alkohols mit den Gewebssäften bilden, zu zerstören.

¹⁾ Ahlfeld und Vahle, Deutsche medizinische Wochenschrift 1896, No. 6. ²⁾ Einführung in das Studium der Bakteriologie, von Prof. Carl Günther. Leipzig, Georg Thieme, 1898. S. 38.

Therapeutische Neuigkeiten.

Sterilisation chirurgischer Seide durch Diffusionsströme.

Von Dr. J. Ausin in Ervahlen (Kurland).

Die Seide nimmt im allgemeinen noch immer die erste Stelle unter den Naht- und Unterbindungsmaterialien ein. Sie verdankt diesen Vorzug ihren besonders zweckdienlichen Eigenschaften, die sich in genügender Zugfestigkeit und Geschmeidigkeit und daraus resultirender Leichtigkeit der Knotung, sowie Sicherheit des Knotens dokumentiren. Letztere Eigenschaften besitzt freilich auch der Zwirn, kann aber insofern nicht mit der Seide konkurriren, als er hauptsächlich wegen seines Fettgehaltes¹⁾ nicht wie diese die Fähigkeit besitzt, indifferente und antiseptische Flüssigkeiten bis zur Sättigung zu imbibiren und Antiseptica zu fixiren. Dies erklärt, warum die Sterilisation der Seide leicht von Statten geht, der Zwirn dagegen dieselbe nicht

¹⁾ Die Entfettung des Zwirns führt bis jetzt nicht zum gewünschten Ziel. Wählt man dazu Mittel, die den Zwirn nicht angreifen, z. B. den Aether, so ist die Entfettung eine unvollständige. Gelangen dagegen Soda und dergl. Mittel zur Anwendung, so ist die Entfettung wohl ziemlich vollständig, die Zugfestigkeit leidet aber dadurch dermaassen, dass der Zwirn zu chirurgischen Zwecken nicht mehr tauglich ist.

Seitdem ich die auf solche Weise sterilisirte Seide, die in mehr als 100 Fällen zur Anwendung kam, benutzte, habe ich die denkbar günstigsten Erfolge zu verzeichnen. Unter anderem wurden 2 Gelenkkapselnähte, 20 Laparotomien — darunter 6 Darmoperationen gemacht und 14 Mal Abdominaltumoren entfernt — und 11 Radikaloperationen an Hernien nach Bassini ausgeführt.

Es scheint mir hier nicht überflüssig, dessen Erwähnung zu thun, dass bei Fascien- und Gelenkkapselnähten möglichst dünne Seide (geflochtene Seide No. 1) zur Anwendung kam, weil schlecht ernährtes Gewebe dickeres Nahtmaterial erfahrungsgemäss nicht gut verträgt und dasselbe, wenn es auch noch so reizlos und steril ist, als Fremdkörper ausgestossen wird. Ich muss auch ausdrücklich betonen, dass ich, da ich die Operationen meist mit einem Assistenten ausführte, selbst das Blut tupfen und die Seide oft mit blutigen Händen vom nebenan stehenden Instrumententisch mir nehmen musste. Trotz alledem verliefen die operirten Fälle fieberfrei, die Nähte heilten per primam und die versenkten Fäden wurden nicht ausgestossen, während früher, wo ich die Seide anders, nach den sonst üblichen Methoden sterilisirte, Nahtabszesse, hervorgerufen durch tiefe Fadeneiterung, abendliche Temperatursteigerung bis 38° und mehr in den ersten Tagen nach der Operation nicht selten auftraten. Kurzum, der Unterschied im Wundverlauf zwischen ehemals und jetzt ist ein so augenfälliger, dass ich nicht umhin kann, meine Erfahrungen den Kollegen zur Nachprüfung zu empfehlen.

Soxhlet's Nährzucker, der Mitte 1901 durch die Nahrungsmittelfabrik München, G. m. b. H., in den Handel kam, hat eine sehr grosse Verbreitung gefunden. Es berichteten über seine Anwendung Klautsch (Centralblatt für Kinderheilkunde 1902, No. 7), Frucht (Münchener medizinische Wochenschrift 1902, No. 2), Moro (Klinisch-therapeutische Wochenschrift 1903, No. 5), Rommel (Münchener medizinische Wochenschrift 1903, No. 6), Finkelstein (Therapie der Gegenwart 1903, No. 5) und in dieser Wochenschrift Weissbein (1902, No. 30).

Nachdem Ref. auch seinerseits in mehrjähriger Anwendung den Nährzucker erprobt hat, will er nicht verfehlen, an dieser Stelle die Bedeutung des Präparates zu beleuchten. Mit verschwindend seltenen Ausnahmen, in denen der Nährzucker Aufstossen und sonstige Magenbeschwerden macht, wird er sehr gut in jedem Lebensalter vertragen. Selbst die Gegner einer frühzeitigen stärkehaltigen Kost können den Nährzucker schon Neugeborenen geben, da er keine Stärke mehr, sondern Maltose und Dextrin zu gleichen Theilen enthält. In der Regel wird man der Verdünnungsflüssigkeit 10% Nährzucker zusetzen, der Nahrung Neugeborener etwas weniger. Ref. geht nicht über die Menge von 60 g Nährzucker auf den Liter Milchemulsion hinaus. In diesem Falle darf man hoffen, dass der Zusatz auf die Dauer gut vertragen wird, während bei dauernder Verwendung sehr grosser Mengen sich Störungen zeigen können. Ref. verwendet den Nährzucker bei gesunden Kindern anstatt gewöhnlichen Zuckers wesentlich dann, wenn Neigung zu häufigeren Entleerungen besteht; tritt unter seiner Verwendung Neigung zu Verstopfung ein, so regulirt er dadurch, dass er einen gewissen Theil des Nährzuckers durch Rohrzucker ersetzt.

Bei Verdauungsstörungen akuter Art wird jetzt wohl allgemein für ein- bis zweimal 24 Stunden Hungerkost in Form von Thee, Eiweisswasser u. dergl. verordnet. In diesem Stadium dürfte man am besten zunächst von dem Nährzucker absehen; sobald aber die häufigen spritzenden Stühle spärlicheren schleimigen Entleerungen Platz machen, setzt Ref. den Schleimsuppen, die er jetzt zunächst anordnet, unbedenklich Nährzucker zu (1 gehäuften Esslöffel = 25 g auf $\frac{1}{2}$ l Schleim) und behält ihn auch bei, wenn er weiterhin zu Milchemulsionen übergeht. Für die Verwendung bei akuten Darmstörungen dürfte es sich empfehlen, den Nährzucker ohne die später zu erwähnenden Zusätze zu verwenden. Ref. giebt nicht selten, um einen Rückfall durch Ernährung mit ungeeigneter Milch hintanzuhalten, zunächst Biedert's Ramogen, mit starken Verdünnungen beginnend und bis zu einer 10%igen Lösung fortschreitend; da selbst letzteres nur $3\frac{1}{2}\%$ Zucker enthält, so verstärkt er auch bei der Verwendung des Ramogens dauernd den Nährwerth durch Nährzucker. Auch bei chronischen Ernährungsstörungen, nach Rommel besonders solchen, die bei milch- und fettreicher Nahrung aufgetreten sind, bewährt sich der Nährzucker; übrigens kommt hier Soxhlet's verbesserte Liebig-Suppe, auf die wir bei späterer Gelegenheit zurückkommen werden, mindestens in gleichem Maasse in Betracht.

Soxhlet macht den Nährzucker schwach sauer und setzt ihm etwas Kochsalz zu; ob hierdurch die Verdaulichkeit erleichtert und der Rachitis entgegengearbeitet wird, wissen wir nicht. Die reichliche Verwendung im Haushalt wird jedenfalls durch den salzigen Geschmack erschwert. Es ist daher angenehm, dass jetzt ein Nährzuckerkakao in den Handel gebracht ist, der aus einer Mischung von Kakao mit reinem Nährzucker hergestellt ist und ungemein nahrhaft und bekömmlich ist. Wenn man nach Vorschrift zwei gehäuften Esslöffel auf eine grosse Tasse nimmt, wird man übrigens zur Süssung zweckmässig noch etwas Rohrzucker zusetzen. Ref. verordnete dieses Präparat z. B. bei einem Mädchen mit Darmtuberkulose und Darmanabelfistel mit gutem Erfolg, ebenso bei einem grösseren Säuglinge, bei dem er die stark stopfende Wirkung durch Compot etc. aufhob und auf diese Weise be-

quem zur gemischten Ernährung gelangte. Es erscheint der Nährzuckerkakao bei der Mästung von Personen, die zum Durchfall neigen, durchaus zweckmässig. H. Neumann (Berlin).