Schwefelsäure gesättigt. Man zieht diese Schwefelsäure von derjenigen ab, welche 5 Grm. NaO , CO^2 zur Sättigung gefordert hätten, die Differenz giebt die Schwefelsäure, welche der Kies geliefert hat. Aus dieser SO^3 berechnet man den S des Kiesel.

30 bis 40 Minuten reichen hin, um eine solche Analyse zu beenden. (*Compt. rend.* 21. Octbr. 1861. pag. 685.)
H. Ludwig.

Schwefligsaures Natron

empfeht Polli in Krankheiten, deren Ursache in einer Verderbniss des Bluts durch faulige oder contagiöse Substanzen liegt. (*Journ. de Pharm. et de Chim. Decbr. 1861. pag. 459 — 462.*)
H. Reich.

Selenverbindungen.

H. Uelsmann hat einige den Sulfiden und Schwefelbasen analoge Selenverbindungen beschrieben.

Selenarsenik, AsSe^3 , scheidet sich beim Einleiten von Selenwasserstoffgas in eine mit Salzsäure schwach sauer gemachte Lösung von arseniger Säure mit dunkelbrauner Farbe ab und wird nach dem Auswaschen und Trocknen rothbraun. Den Selenwasserstoff hierzu stellt man sich durch Erhitzen von Selen in einem langsamen Strom von getrocknetem und luftfreiem Wasserstoffgas dar. Das Selenantimon, SbSe^3 , durch Fällung einer Brechweinsteinlösung mit Selenwasserstoffgas als ein schwarzer Niederschlag erhalten, erscheint getrocknet als sammetschwarzes Pulver. Das Einfach-Selenzinn, SnSe , ist, wenn es auf nassem Wege durch Fällung von Zinnchlorürlösung mit Selenwasserstoff gebildet wird, nach dem Trocknen ein fast schwarzes, zartes Pulver, wird es aber durch Erhitzen von Zinnfolie mit Selen im Kohlensäurestrom bereitet, so ist es hellgrau, metallglänzend, von krystallinischem Bruch. Zweifach-Selenzinn, SnSe^2 , wird in einer wässerigen Lösung von wasserfreiem Zinnchlorid durch Selenwasserstoffgas orange-farben niedergeschlagen und ist nach dem Trocknen hellrothbraun. Aus einer mit Selenwasserstoffgas gesättigten Lösung von zweifach-wolframsaurem Natron fällt verdünnte Schwefelsäure schwarzes Wolframsele-nid, WSe^3 .

Das braune Molybdänselenid, MoSe^3 , wird