Quecksilber enthaltende Glaswolle wurde in die Mitte des Glasrohres zusammengeschoben, die beiden Röhrenenden wurden mit Fliesspapier gereinigt und ausgezogen.

Während die Stelle, wo die Glaswolle sich befand, erhitzt wurde, liess man aus einem Gasometer einen langsamen Luftstrom durch die Röhre streichen; anfangs condensirten sich im vorderen Röhrentheile Wasser und Ammonsalz, welche durch Erwärmen fortgeschafft wurden, bei stärkerem Erhitzen entwickelten sich rothbraune Dämpfe und nahe an der erhitzten Stelle setzte sich gelbes Quecksilberoxyd an. Der Theil des Rohres, welcher das Quecksilberoxyd enthielt, wurde nun abgesprengt, und, nachdem die rothbraunen Dämpfe abgesaugt waren, stellte man durch Erhitzen mit einem Körnchen Jod das charakteristische Jodquecksilber dar. Der Ueberschuss des Jods wurde entfernt, indem man bei gewöhnlicher Temperatur Luft durch die Röhre saugte.

Das beschriebene Verfahren wird durch die Gegenwart von Jodkalium im Harne in seiner Brauchbarkeit nicht beeinträchtigt; bei Versuchen, in denen dem Harne je 1 g Jodkalium zugesetzt war, konnten 0,05 mg Quecksilber nach 3-stündigem Kochen und 0,2 mg Quecksilber nach 2-stündigem Kochen deutlich nachgewiesen werden.

Verf. hat endlich auch den Harn von einem Individuum untersucht, welches die Inunctionscur gebrauchte, und nach dem beschriebenen Verfahren eine sehr intensive Jodquecksilberreaction erhalten.

3. Auf gerichtliche Chemie bezügliche Methoden

von

C. Neubauer.

Die Anwendung optischer Hilfsmittel bei der gerichtlich-chemischen Ermittlung der Pflanzengifte. Diese sehr ausführliche Arbeit von A. Poehl*) erlaubt keinen Auszug und muss ich mich dieserhalb damit begnügen auf das Original zu verweisen.

*) Pharm. Zeitschrift für Russland 15, 353.

Berichtigungen.

In Bd. 16 p. 416 dieser Zeitschrift Zeile 13 v. o. lies „von den Gesetzen jenes Zerfalls“ statt von dem Zersetzen jenes Zerfalls.

In Bd. 17 p. 148 in der Anmerkung lies „Lingke“ statt Liepke.