Die in der Rubrik * stehende Zahl bezieht sich auf die Nummern des vorangehenden Verzeichnisses, die übrigen Sterne wurden für den Anfang des Beobachtungsjahres folgendermassen angenommen:

- a) 22^h22^m52^s.96 + 33° 5' 23"0 Leidner Annalen, 4. Band.
 b) 23.33.24.17 — 14.54. 6.5 w' Aquarii, Sev. y. C. 1977 New Sev. y. C. 2707.
 c) 23.16.30.68 — 20.46.17.8 b' Aquarii, New Sev. y. C. 2677 Sev. y. C. 1957 Yarn. 10305.
 d) 1.35.41.50 + 10.43.35.8 Rümck. II 839. Astr. N. 32, 217. Lam. 232.
 e) 1.13.11.33 + 10.18.40.4 Sjell. 415.
 f) 2.26.10.05 + 14.29.19.3 29 Arietis.
 g) 8.40.53.64 + 18.30. 9.0 Astr. N. 29, 341.
 h) 9.59. 6.64 + 11.29.30.2 Weisse 1244.
 i) 10.22.56.94 + 12.48.38.2 Mittel aus Sj. 3841, Yarnall u. 63 des vorrang. Verz.
 k) 10. 0. 2.74 + 15. 2.14.8 B.D., + 15° 2165, Astr. N. 58, 234.
 l) 9.56. 6.63 + 15.23.54.5 Astr. N. 88, 245.
 m) 11. 8.22.59 + 7.32.59.3 Lam. 532, Astr. N. 43, 233; 44, 327.
 Pola, April 1878.

J. Palisa.

Berechnung der Elemente des Cometen III 1877.

Der Comet wurde unabhängig entdeckt am 11. April 1877 von Herrn Lewis Swift in Rochester U. S. New-York, am 14. April von Herrn Borrelly in Marseille, endlich am 16. April von Herrn Block in Odessa.

Aus den drei folgenden vollständigen Beobachtungen, welche auf der Sternwarte zu Leipzig angestellt waren, wurde von mir zuerst eine parabolische Bahn gerechnet.

Mittl. Zeit Leipzig	α app.	δ app.
April 15 11 ^h 48 ^m 8 ^s	1 ^h 14 ^m 52 ^s .47	+ 55°51' 13".3
April 26 9.23. 9	3.13.25.21	+ 61.21.55.6
Mai 7 10.43.20	5.36.45.67	+ 58.23.19.7

Die Elemente sind:

T 1877 April 26.858155 Berlin M. Z

π 102°51' 25".6

Ω 346. 4.12.9

i 77.10. 8.81

$\log q$ 0.004008

Mit einer aus diesen Elementen gerechneten Ephemeride ergaben sich unter Berücksichtigung der Aberration und Parallaxe die folgenden Differenzen, als Resultat der Vergleichung der Beobachtungen mit der Ephemeride und im Sinne B.—R.:

	$d\alpha$	$d\delta$
1 Marseille April 14	+ 0 ^s 07	+ 38"95 *)
2 Berlin " 15	+ 0.48	— 1.90
3 Wien " "	+ 1.78	— 6.19
4 Mailand " "	+ 1.18	— 4.80

*) Die Beobachtung in δ zu Marseille wurde als fehlerhaft ausgeschlossen und die Beobachtung Nr. 46 wurde in α um 30^s corrigirt.

	$d\alpha$	$d\delta$
5 Strassburg April 15	+ 1 ^s 22	— 1'53
6 Leipzig " "	+ 0.13	— 0.60
7 Leipzig " "	+ 0.57	+ 7.69
8 Wien " "	+ 0.09	— 7.92
9 Kiel " "		+ 0.11
10 Hamburg " "	+ 0.64	— 3.66
11 Kiel " "	+ 2.29	
12 Wien " 16	+ 0.58	— 0.15
13 Hamburg " "	— 1.04	— 3.34
14 Mannheim " "	+ 0.64	— 0.27
15 Kiel " "		+ 13.31
16 Odessa " "	+ 2.10	+ 6.97
17 Leipzig " "	+ 0.94	— 1.11
18 Kiel " "	+ 0.64	
19 Leipzig " "	+ 0.48	+ 1.15
20 Kiel " "	— 3.25	+ 3.81
21 Odessa " "	+ 2.58	+ 4.11
22 Odessa " 17	+ 2.47	+ 2.58
23 Leipzig " "	— 0.19	— 2.80
24 Hamburg " "	+ 0.05	— 1.16
25 Kiel " 18	— 1.38	— 8.77
26 Kiel " "	+ 1.61	+ 2.56
27 Odessa " 19	+ 2.50	— 14.94
28 Mailand " "	— 0.02	+ 2.84
29 Christiania " 20	+ 0.16	— 4.11
30 Hamburg " "	— 1.51	— 5.67
31 Hamburg " 21	— 0.38	+ 5.31
32 Hamburg " 22	— 0.22	— 1.93

			$d\alpha$	$d\delta$	
33 Mailand	April 24	+	1 ^s 18	— 4'' 22	
34 Christiania	" "	+	0.19	— 2.17	
35 Leipzig	" "	+	1.90	— 5.52	
36 Leipzig	" 26	—	0.94	— 1.81	
37 Christiania	" 29	+	0.30	+	3.04
38 Kiel	" "	+	1.37	— 6.53	
39 Kiel	Mai 1	—	3.89	+	5.26
40 Christiania	" 2	—	0.74	+	3.42
41 Kiel	" 3	+	2.41	— 2.11	
42 Leipzig	" "	—	0.12	— 5.76	
43 Kiel	" 4	+	1.27	+	13.79
44 Christiania	" "	—	1.34	— 3.58	
45 Athen	" 6	+	2.13	+	12.09
46 Kiel	" "	+	32.46*)	— 5.70	
47 Leipzig	" "	—	0.83	— 2.08	
48 Christiania	" "	—	0.13	+	3.60
49 Kiel	" 7	+	1.72	+	6.10
50 Leipzig	" "	—	0.01	— 0.24	
51 Leipzig	" 8	—	1.26	— 4.66	
52 Kiel	" "	+	1.68	+	10.54
53 Kiel	" 9	+	1.37	— 1.41	
54 Leipzig	" 10	—	0.96	+	0.78
55 Leipzig	" 11	—	0.78	— 4.16	
56 Athen	" 12	—	0.33	— 6.15	

			$d\alpha$	$d\delta$
57 Athen	Mai 12	+	0 ^s 32	+ 15'' 24
58 Leipzig	" 13	—	0 49	— 1.91
59 Athen	" 29	—	0.11	— 13.92
60 Athen	" 31	+	0.47	+ 5.97

Aus den obigen Differenzen ergaben sich die folgenden Correctionen der Ephemeride für 5 Normalörter:

			$\cos \delta \, d\alpha$	Zahl d. Beob.	$d\delta$	Zahl d.
			B.—R.		B.—R.	Beob.
I	April	16.5	+ 4''764	26	— 0''926	25
II	"	22.5	+ 0.637	8	— 2.600	8
III	Mai	2.5	— 1.598	8	+ 0.415	8
IV	"	8.5	— 0.032	14	+ 0.660	14
V	"	30.5	+ 2.171	2	— 4.040	2

Nach Anbringung von $d\alpha$ und $d\delta$ an die Ephemeride, erhält man als Normalörter, bezogen auf mittl. Aequat. 1877:

I	20 ^h 53' 16'' 26	+	56 ^h 34' 39'' 40
II	36.14.37.15	+	60. 7.17.11
III	68.53.12.52	+	60.55.40.20
IV	87. 7. 8.18	+	57.37.53.81
V	123. 6.37.27	+	35.54.39.83

Für diese fünf Normalörter wurden darauf die folgenden Bedingungsgleichungen berechnet.

in α			Bedingungsgleichungen.										n			
[0.97248n]	(10 ³ dT)	+	[0.35194]	(10 ⁵ dq)	+	[0.28515]	d π	+	[0.31694n]	d Ω	+	[0.41786n]	di	+	[1.33909n]	= 0
[0.89791n]	"	+	[0.32865]	"	+	[0.20896]	"	+	[0.23546n]	"	+	[0.09506n]	"	+	[0.25608n]	= 0
[0.92700n]	"	+	[0.39751]	"	+	[0.22135]	"	+	[0.15420n]	"	+	[9.29184n]	"	+	[0.59279]	= 0
[1.01169n]	"	+	[0.51919]	"	+	[0.28763]	"	+	[0.07784n]	"	+	[9.54200]	"	+	[9.01737]	= 0
[0.11099n]	"	+	[9.96143]	"	+	[9.17082]	"	+	[9.58364]	"	+	[9.29605]	"	+	[0.33657n]	= 0
in δ																
[0.90931n]	"	+	[1.14169]	"	+	[0.29581]	"	+	[0.10588n]	"	+	[0.07520]	"	+	[0.62249]	= 0
[0.54699n]	"	+	[0.89394]	"	+	[9.90116]	"	+	[9.31218n]	"	+	[0.04856]	"	+	[0.86652]	= 0
[0.18922]	"	+	[0.75857]	"	+	[9.59279n]	"	+	[0.04550]	"	+	[0.07979]	"	+	[0.00712n]	= 0
[0.75443]	"	+	[0.87964]	"	+	[0.12971n]	"	+	[0.35237]	"	+	[0.13120]	"	+	[0.33014n]	= 0
[0.44152]	"	+	[0.50699]	"	+	[9.86710n]	"	+	[9.87506]	"	+	[8.84504]	"	+	[0.60638]	= 0

Die eingeklammerten Zahlen sind die Logarithmen der Coefficienten für die beigesetzten Elementenänderungen. Unter n sind die übrigbleibenden Fehler der Ephemeride aufgeführt, selbstverständlich die $d\alpha$ mit $\cos \delta$ multiplicirt. Den einzelnen Bedingungsgleichungen sind auch schon der Reihe nach die Gewichte 21, 8, 6, 10^{1/2}, 1; 20^{1/2}, 8, 6, 10^{1/2}, 1, gegeben, d. h. sie sind mit den Quadratwurzeln aus den Gewichten multiplicirt. Es ergaben sich, nachdem diese Bedingungsgleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate aufgelöst waren, als Endgleichungen:

$$\begin{aligned}
 &+ 449.8155 (10^3 dT) - 173.4538 (10^3 dq) - 94.2172 d\pi + 84.5741 d\Omega + 28.3731 di + 125.3123 = 0 \\
 &\quad + 314.7775 \quad \quad \quad + 0.9465 \quad \quad + 23.6663 \quad \quad + 45.8528 \quad \quad + 110.1692 = 0 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad + 0.2057 \quad \quad + 0.4839 \quad \quad + 0.0182 \quad \quad + 1.7460 = 0 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad + 0.5876 \quad \quad + 1.4546 \quad \quad + 4.3442 = 0 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad + 2.4700 \quad \quad + 32.7430 = 0
 \end{aligned}$$

Die daraus gefundenen Elementencorrectionen sind:

$$dT = + 0.006584$$

$$d\pi = + 52''.491$$

$$d\Omega = + 25.423$$

$$di = - 13.256$$

$$d(\log q) = - 0.0000049$$

nach deren Anbringung an die vorhergehenden Elemente man als wahrscheinlichstes Elementensystem erhält:

$$T = 1877 \text{ April } 26.864739 \text{ M. B. Z.}$$

$$\pi = 102^\circ 52' 18''.09$$

$$\Omega = 346 \quad 4.38.32$$

$$i = 77. \quad 9.55.55$$

$$\log q = 0.0040631$$

Die Substitution der gefundenen Correctionen in die Bedingungs-Gleichungen, sowie die Vergleichung der Normalörter mit einer aus den wahrscheinlichsten Elementen berechneten Ephemeride, ergab folgende übrig bleibende Fehler der Normalörter:

Bedingungs-Gleichungen

Directe Rechnung

$d\alpha \cos \delta$	$d\delta$	$d\alpha \cos \delta$	$d\delta$
+ 0''.34	+ 0''.11	+ 0.33	+ 0.08
- 1''.00	- 0''.74	- 1.00	- 0.78
- 0.31	+ 0.77	- 0.35	+ 0.78
+ 0.74	- 0.03	+ 0.76	- 0.05
- 3.79	- 0.11	- 3.85	- 0.06

Obwohl die übrig bleibenden Fehler sehr gering sind, also die Parabel den Beobachtungen sehr nahe genügt, habe ich doch noch versucht eine Aenderung der Excentricität der Bahn einzuführen und zu den vorhergehenden Bedingungs-gleichungen kommen noch die folgenden Glieder für 10^{de} hinzu.

in α	in δ
[0.66555n]	[0.59777n]
[0.20038n]	[9.84551n]
[0.32050]	[9.56264n]
[0.71061]	[0.43461n]
[0.28533]	[0.51558n]

Löset man die Bedingungs-gleichungen von neuem nach der Methode der kleinsten Quadrate auf, so finden sich die folgenden Elementencorrectionen:

$$dT = + 0.0101408$$

$$de = + 0.0003446$$

$$d\pi = + 53.6291$$

$$d\Omega = + 16.9212$$

$$di = - 22.0932$$

$$d(\log q) = + 0.0000238$$

und damit die Elemente:

$$T = 1877 \text{ April } 26.868296$$

$$e = 1.0003446$$

$$\pi = 102^\circ 52' 19''.23$$

$$\Omega = 346. \quad 4.29.82$$

$$i = 77 \quad 9.46.72$$

$$\log q = 0.004032.$$

Die übrigbleibenden Fehler in diesem Falle sind:

$d\alpha \cos \delta$	$d\delta$
+ 0''.32	+ 0.15
- 0.99	- 0.84
- 0.33	+ 0.70
+ 0.76	- 0.01
- 3.62	- 0.03

Während bei der Parabel $[n. n. 5] = 39''.07$ war, ist bei dieser hyperbolischen Bahn $[n. n. 6] = 38''.99$, also so wenig geringer, dass die Parabel den Normalörtern fast ebenso genau genügt, als die hyperbolische Bahn. Um schliesslich noch die unsicherheit der Elemente zu finden, berechnete ich die Gewichte der einzelnen Elemente, und finde als wahrscheinliche Fehler der Elemente:

$$\text{Wahrscheinlicher Fehler von } dT = \pm 0.003534$$

$$de = \pm 0.000353$$

$$d(\log q) = \pm 0.000028$$

$$d\pi = \pm 2.0$$

$$d\Omega = \pm 8.8$$

$$di = \pm 8.8$$

Leipzig d. 30. Mai 1878.

J. Walter Nichol.

Beobachtungen der Sternwarte Kremsmünster im Jahre 1877.

(Fortsetzung) Meridiankreis.

Uranus 77.

			Eph. — α		Eph. — δ	
11 März	10 ^h 17 ^m 59 ^s .74	$\alpha = 9^h 36^m 32^s.06$	$d\alpha = 0.11$	$\delta = + 15^\circ 4' 7''.1$	$d\delta = - 0.8$	$\pi = 0.3$
12 "	10.13.55.42	" 9.36.23.62	" - 0.12	" + 15. 4.47.1	" - 0.3	" 0.3