ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

Band 159.

N^o 3808.

16.

Resultate des internationalen Breitendienstes in der Zeit von 1899.9 — 1902.0.

Von Prof. Th. Albrecht.

In Nr. 3734 der Astr. Nachr. habe ich über die Resultate des internationalen Breitendienstes bis zum Beginn des Jahres 1901 berichtet und zugleich mitgeteilt, dass das Centralbureau die Absicht habe, zunächst noch ein umfassenderes Beobachtungsmaterial zu sammeln und erst im Jahre 1902 eine definitive Bearbeitung der bis dahin vorliegenden Resultate der Breitenvariation vorzunehmen. Diesem Vorhaben entsprechend ist im vergangenen Frühjahr eine Bearbeitung der gesamten Beobachtungsreihen vom November 1899 bis zum Beginn des Jahres 1902 in Angriff genommen worden, welche gegenwärtig so weit gefördert ist, dass die Hauptergebnisse dieser Bearbeitung schon jetzt auszugsweise mitgeteilt werden können.

Durch die Untersuchungen von Professor Kimura in Nr. 3783 der A. N. war es wahrscheinlich gemacht, dass der Ausdruck $\varphi - \varphi_0$ auch ein von den Componenten der Polbewegung unabhängiges jährliches Glied enthalte. Diese Vermuthung, die sich zunächst nur auf das Material bis zum Schlusse des Jahres 1900 stützte, hat durch die Beobachtungen im Jahre 1901 eine so wesentliche Bestätigung erhalten, dass an der Existenz eines solchen Gliedes gegenwärtig nicht mehr gezweifelt werden kann. Wenn aber ein derartiges Glied besteht, so kann die Bestimmung des numerischen Werthes desselben nur durch die Methode des cyklischen Anschlusses der Sterngruppen erfolgen. Denn diese Methode ermöglicht es, die Verbesserungen der mittleren Declinationen der Sternpaare unabhängig von einem solchen Gliede abzuleiten, während die Methode der Ableitung der Polbewegung auf dem Wege der directen Elimination der Declinationen keine Trennung der Verbesserungen der angenommenen Declinationen von jenem, von der Polbewegung unabhängigen jährlichen Gliede zulässt. Ueber die Entstehungsursache dieses Gliedes lässt sich gegenwärtig auch nicht einmal eine Vermuthung aussprechen. Möglicherweise sind systematische Refraktionsanomalien für dasselbe verantwortlich zu machen. Aber gerade weil eine solche Ungewissheit besteht, wird man die Bestimmung des numerischen Werthes dieses Gliedes nur auf der Basis eines völlig homogenen Beobachtungsmateriales vornehmen dürfen. Ein solches liegt aber gegenwärtig im internationalen Breitendienst vor und es wird daher angezeigt erscheinen, nur die Beobachtungsergebnisse der sechs internationalen Stationen auf dem Parallel von $+39^{\circ}8'$ zur Bestimmung dieses Gliedes heranzuziehen.

Demgemäss ist zunächst die Bearbeitung ganz analog dem in Nr. 3734 der A. N. erläuterten Verfahren vorgenommen worden.

Nachdem die eigentliche Reduction der Beobachtungen — im wesentlichen unter der Leitung des Assistenten am Centralbureau Herrn B. Wanach — ausgeführt worden war, wurden von mir und Herrn Wanach aus allen vollständig erlangten Beobachtungsreihen die Reductionen jedes einzelnen Sternpaares auf das arithmetische Mittel der sechs Polhöhenpaare der betreffenden Gruppe abgeleitet und alsdann die Reductionsbeträge der einzelnen Sterngruppen auf einander ermittelt. Da es sich bei Mizusawa um ein 25 monatliches und bei den anderen fünf Stationen um ein 26 monatliches Zeitintervall handelte, wurden im ersteren Falle 25 und im letzteren 26 Gruppenanschlüsse erhalten, welche, da das Beobachtungsprogramm identisch war, für alle Stationen zu gemeinsamen Mittelwerthen vereinigt werden konnten. In Folge der grossen Reichhaltigkeit des Beobachtungsmaterials — in Mizusawa sind 2771, in Tschardjui 2720, in Carloforte 5213, in Gaithersburg 3654, in Cincinnati 2641 und in Ukiah 3303 Polhöhenpaare beobachtet worden — wurde die aus den Beobachtungsfehlern hervorgehende Unsicherheit der Gruppenanschlüsse zu einer so minimalen, dass der verbleibende Schlussfehler von $-0''.141$ nur einer unrichtigen Annahme der Aberrationsconstanten ($20''.470$) zur Last gelegt zu werden brauchte. Diesem Schlussfehler entspricht eine Verbesserung der Aberrationsconstante von $+0''.042 \pm 0''.015$, so dass also diese Constante für die vorliegenden Beobachtungsreihen zu $20''.512$ anzunehmen ist, um den Schlussfehler zum Verschwinden zu bringen.

Nachdem das Beobachtungsmaterial auf diesen Werth der Aberrationsconstanten reducirt worden war, wurden auf dem Wege successiver Annäherungen Mittelwerthe für die Polhöhen aller sechs Stationen abgeleitet. Durch Subtraction derselben von den Endresultaten einer jeden Gruppencombination wurden die Abweichungen der Momentan-Polhöhen von den mittleren Polhöhen gebildet und dann für jede Station auf dem Wege graphischer Ausgleichung die nachstehenden, den einzelnen Zehnteljahren entsprechenden Werthe von $\Delta\varphi$ erhalten, welche der weiteren Rechnung zu Grunde gelegt worden sind.

$\varphi - \varphi_0$

	Mizusawa	Tschardjui	Carloforte	Gaithersburg I	Gaithersburg II	Cincinnati	Ukiah
1899.9	-0.07	-0.06	+0.08	+0.06	+0.11	+0.11	+0.13
1900.0	-0.06	-0.01	+0.09	+0.02	+0.07	+0.08	+0.08
.1	-0.04	+0.03	+0.08	-0.02	+0.03	+0.05	+0.02
.2	-0.02	+0.05	+0.06	-0.06	-0.01	0.00	-0.03
.3	0.00	+0.05	0.00	-0.09	-0.04	-0.06	-0.07
.4	+0.02	+0.04	-0.06	-0.11	-0.06	-0.08	-0.09
.5	+0.02	+0.03	-0.08	-0.11	-0.06	-0.08	-0.08
.6	+0.02	+0.02	-0.09	-0.10	-0.05	-0.05	-0.03
.7	+0.02	0.00	-0.08	-0.06	-0.01	+0.01	+0.02
.8	+0.03	-0.01	-0.06	0.00	+0.05	+0.08	+0.07
.9	+0.04	0.00	-0.01	+0.08	+0.09	+0.13	+0.09
1901.0	+0.03	+0.01	+0.05	+0.12	+0.10	+0.15	+0.10
.1	+0.01	0.00	+0.08	+0.14	+0.09	+0.14	+0.07
.2	-0.06	0.00	+0.09	+0.12	+0.07	+0.09	+0.02
.3	-0.09	+0.01	+0.09	+0.09	+0.04	+0.02	-0.04
.4	-0.10	+0.05	+0.10	+0.04	-0.01	-0.07	-0.11
.5	-0.07	+0.10	+0.09	-0.03	-0.08	-0.15	-0.16
.6	-0.02	+0.12	+0.08	-0.10	-0.15	-0.17	-0.17
.7	+0.05	+0.09	+0.06	-0.11	-0.16	-0.16	-0.14
.8	+0.11	+0.06	+0.03	-0.07	-0.12	-0.12	-0.09
.9	+0.15	+0.02	-0.01	-0.01	-0.06	-0.08	-0.02
1902.0	+0.18	-0.03	-0.05	+0.05	0.00	-0.02	+0.06

Den Zahlenwerthen auf Station Tschardjui ist gleichwie bei der Ableitung der Polbewegung in Nr. 3734 der A. N. nur halbes Gewicht beigelegt worden, weil die Beobachtungen auf dieser Station grössere zufällige Fehler als auf den anderen Stationen aufweisen. Eine eingehende Untersuchung des Instrumentes im August 1901 hat ergeben, dass diese Störung aller Wahrscheinlichkeit nach auf ein ungenügendes Functioniren der Niveaus in Folge innerer Ausscheidungen, sowie auf einen ungünstigen Einfluss der während eines grossen Theiles der Beobachtungszeit angewandten Oellampenbeleuchtung zurückzuführen sei. Der letztere Umstand ist vermuthlich auch die Ursache, dass auf dieser Station trotz der 1 Meter breiten Klappen Temperaturdifferenzen zwischen innen und aussen bis zum Betrage von 4.7 vorgekommen waren. Indess ist durch Ersatz der schadhafte Niveaus und ausschliessliche Anwendung elektrischer Lampenbeleuchtung Vorsorge getroffen worden, dass in Zukunft nicht mehr wie bisher eine ungünstige Beeinflussung des Genauigkeitsgrades der Beobachtungen zu befürchten ist und es steht daher zu erwarten, dass sich für die Folgezeit die Beobachtungen auf dieser Station als völlig gleichwerthig mit denen auf den anderen Stationen erweisen werden.

Dagegen sind die Beobachtungen in Mizusawa, von denen bei der Bearbeitung in Nr. 3734 der A. N. nur die in der Kreislagenfolge O/W beobachteten Paare berücksichtigt worden waren, diesmal in vollem Umfange und daher auch mit vollem Gewicht hinzugezogen worden, da die Untersuchungen von Kimura in Nr. 3783 der A. N. ergeben hatten, dass durch Einführung eines von den Componenten der Polbewegung unabhängigen jährlichen Gliedes die auffallenden Abweichungen im Gange der Polhöhe am Schlusse des Jahres 1900 zum Verschwinden gebracht worden waren. Es sind allerdings im Laufe des Jahres 1900 einige kleinere

Mängel am Instrument aufgefunden worden, und es musste besonders das Auftreten einer grösseren Differenz O/W — W/O in den Monaten November und December 1900 Bedenken erregen, indess scheinen alle diese Vorkommnisse den Genauigkeitsgrad der Beobachtungen nach Ausweis der nachfolgenden Darlegungen nicht in nennenswerther Weise beeinflusst zu haben. Man wird um so mehr davon absehen können, aus diesem Anlass eine Verminderung des Gewichtes der Resultate auf dieser Station vorzunehmen, weil sich gerade in Mizusawa der berechnete Gang der Polhöhe so vollständig an den beobachteten Verlauf anschliesst, dass das Resultat nur in sehr geringem Grade von der Gewichtsannahme der Beobachtungen auf dieser Station abhängig erscheint.

Auf der Basis der obigen Werthe von $\Delta\varphi$ (für Gaithersburg wurde zunächst von den mit I überschriebenen Werthen Gebrauch gemacht) wurden unter Anwendung der bekannten Formeln die Coordinaten x und y der Polcurve abgeleitet, die diesen Coordinaten entsprechenden Werthe $\varphi - \varphi_0$ berechnet und die Differenzen v der beobachteten und der berechneten Werthe von $\Delta\varphi$ gebildet. Die Summe der Producte $p v v$ enthält die erste Zahlencolumne der ersten Tabelle auf Seite 250. Nach diesen Zahlenwerthen ist der Anschluss der beobachteten an die berechneten Werthe auf nahezu allen Stationen, besonders aber für Mizusawa und Gaithersburg, kein befriedigender.

Führt man aber nach dem Vorgange von Kimura ein von der Curve der Polbewegung unabhängiges Glied ein, indem man als Form der Fehlergleichungen:

$$x \cos \lambda + y \sin \lambda + z = \Delta\varphi + v$$

annimmt, so erhält man für die Grössen $[p v v]$ die Werthe in der zweiten Zahlencolumne. Für Mizusawa ist ein ausser-

ordentlicher Zuwachs an Genauigkeit der Darstellung erreicht, dagegen für Gaithersburg nur eine ganz unwesentliche Besserung herbeigeführt worden und es gewinnt den Anschein, dass die Beobachtungen auf der letztgenannten Station noch durch eine Fehlerursache entstellt sein müssen. Der Grund dieser Missstimmigkeit ist denn auch unschwer in dem Wechsel der Beobachter auf dieser Station am Schlusse des Jahres 1900 zu suchen. Denn vergleicht man im Einzelnen die Differenzen zwischen den beobachteten und den berechneten $\Delta\varphi$:

Gaithersburg $\Delta\varphi$ (Beob. — Rechn.).

Beobachter Smith		Beobachter Davis	
1899.9	—0"06	1901.0	0"00
1900.0	—0.06	.1	+0.01
.1	—0.05	.2	+0.02
.2	—0.04	.3	+0.04
.3	—0.02	.4	+0.05
.4	—0.01	.5	+0.05
.5	—0.01	.6	+0.03
.6	—0.02	.7	+0.02
.7	—0.03	.8	+0.03
.8	—0.03	.9	+0.05
.9	—0.01	1902.0	+0.05

so zeigt sich, dass dieses auffallende Verhalten der Differenzen in Gaithersburg seine völlig zwanglose Erklärung in dem Vorhandensein einer persönlichen Gleichung zwischen beiden Beobachtern findet. Wenn man den Unterschied φ (Davis) — φ (Smith) zu +0"10 annimmt, verschwindet die Differenz zwischen den Resulten der beiden Beobachtungsreihen in Gaithersburg vollständig und es findet auch eine bedeutend bessere Darstellung der beobachteten Werthe besonders für Cincinnati statt. Man kann zwar die persönliche Gleichung zwischen zwei Beobachtern durch ein Uebergreifen der beiderseitigen Beobachtungen bestimmen (und dies hat auch im vorliegenden Falle stattgefunden), aber es hat sich herausgestellt, dass im Allgemeinen die kurze Zeit der gemeinsamen Beobachtung nicht ausreicht, um die Beziehungen der Beobachter auf einander mit der erforderlichen Schärfe ableiten zu können. Dagegen geht aus dem Obigen hervor, dass der Betrag der persönlichen Gleichung mit hinreichender Sicherheit aus dem Zusammenwirken aller sechs Stationen zu bestimmen ist. Damit ist der Nachweis erbracht, dass ein Wechsel der Beobachter bei Anwendung der visuellen Beobachtungsmethode nicht nothwendig eine Einbusse an Genauigkeit herbeizuführen braucht. Zudem ist keineswegs ausgeschlossen, dass persönliche Gleichungen dieser Art nicht nur physiologischen Einflüssen, sondern zum Theil auch einer verschiedenen Behandlung des Instrumentes zur Last zu legen sind, so dass auch die Anwendung der Photographie keine sichere Gewähr für vollständige Elimination dieser Fehlerquelle bieten wird.

Hält man an dem oben ermittelten Betrage der persönlichen Gleichung fest, so hat man als Ausgangswerthe von $\Delta\varphi$ für Gaithersburg die mit II überschriebenen Werthe der Tabelle auf Seite 258 anzunehmen.

Mit diesen verbesserten Werthen sind beide Ausgleichen wiederholt worden. Dieselben haben die unter

Lösung II in der dritten und vierten Zahlencolumne der folgenden Tabelle eingetragenen Summen der Fehlerquadrate ergeben.

	[p v v]			
	Lösung I		Lösung II	
	x, y	x, y, z	x, y	x, y, z
Mizusawa:	0.0511	0.0031	0.0437	0.0015
Tschardjui:	0.0148	0.0075	0.0173	0.0085
Carloforte:	0.0298	0.0043	0.0308	0.0055
Gaithersburg:	0.0325	0.0285	0.0047	0.0062
Cincinnati:	0.0250	0.0152	0.0185	0.0065
Ukiah:	0.0145	0.0083	0.0137	0.0058
Summe:	0.1677	0.0669	0.1287	0.0340

Der Lösung II mit drei Unbekannten entsprechen die nachstehenden Werthe von x, y und z:

	x	y	z
1899.9	+0"039	+0"097	+0"031
1900.0	+0.052	+0.058	+0.028
.1	+0.055	+0.018	+0.021
.2	+0.047	—0.019	+0.008
.3	+0.018	—0.045	—0.014
.4	—0.016	—0.055	—0.029
.5	—0.029	—0.048	—0.033
.6	—0.047	—0.027	—0.025
.7	—0.052	+0.009	—0.008
.8	—0.052	+0.044	+0.019
.9	—0.033	+0.055	+0.047
1901.0	—0.001	+0.058	+0.062
.1	+0.027	+0.052	+0.055
.2	+0.071	+0.048	+0.022
.3	+0.095	+0.021	—0.005
.4	+0.119	—0.030	—0.026
.5	+0.112	—0.092	—0.036
.6	+0.084	—0.133	—0.032
.7	+0.033	—0.141	—0.016
.8	—0.016	—0.122	+0.007
.9	—0.067	—0.086	+0.025
1902.0	—0.117	—0.038	+0.044

Der mittlere Fehler eines Einzelwerthes von $\Delta\varphi$ ergibt sich aus dieser Ausgleichung zu $\pm 0"024$ und der dem früheren mittleren Koordinatenfehler eines Punktes der Curve entsprechende Werth zu $\pm 0"015$, gegenüber einem Betrage der ersteren Grösse von $\pm 0"054$ und der letzteren von $\pm 0"027$ bis $\pm 0"033$ in meiner Ableitung der Polbewegung am Schlusse des Jahres 1899. Die Erwartungen, welche an die Begründung des internationalen Breitendienstes hinsichtlich des Genauigkeitsgrades der Resultate geknüpft worden waren, sind demnach in vollem Umfange in Erfüllung gegangen.

Den obigen Coordinaten x und y entspricht der nachstehend in graphischer Aufzeichnung dargestellte Verlauf der Polbewegung.

Die für die Grösse z erhaltenen Zahlenwerthe deuten darauf hin, dass dieselbe in den verschiedenen Jahren zwar einen gleichartigen Verlauf zeigt, im Uebrigen aber mehr oder minder grossen Veränderungen ausgesetzt ist. Dies eröffnet

in betreff der weiteren Erforschung der Breitenvariation eine neue Perspective. Denn die für z erhaltenen Werthe gelten zunächst nur für den Parallel $+39^{\circ}8'$, können vermuthlich aber auch für das ganze Gebiet der nördlichen gemässigten Zone als gültig betrachtet werden. Ob es aber angängig ist, dieselben ohne weiteres auch als für den Aequator bezw. die Südhalbkugel geltend anzusehen, ist nicht erwiesen. Es wird sich daher zur Entscheidung dieser Frage empfehlen, zu den Beobachtungen auf dem internationalen Parallel noch solche auf einer möglichst nördlich gelegenen Sternwarte, sowie wenigstens einer Sternwarte auf der Südhalbkugel hinzuzuziehen. Als erstere erscheint Pulkowa sehr geeignet, da dort ein mit allen modernen Einrichtungen versehenes Zenithteleskop von 5 Zoll Objectivdurchmesser soeben in der Vollendung begriffen ist; als letztere dürfte in erster Linie wohl Capstadt in Betracht kommen.

Um ferner darzuthun, wie sich auf den sechs internationalen Stationen die unmittelbar beobachteten Normalwerthe der Polhöhe innerhalb einer jeden Gruppencombination dem berechneten Verlauf der Breitenvariation anschliessen, sind nachstehend für beide Lösungen II die Unterschiede der beobachteten und berechneten Werthe zusammengestellt. Eine Vergleichung der übrig bleibenden Fehler beider Lösungen erscheint auch schon aus dem Grunde wünschenswerth, weil aus ihr erst die Nothwendigkeit der Hinzuziehung eines von den Componenten der Polbewegung unabhängigen Gliedes in überzeugender Weise hervorgeht.

Lösung II A. x, y .

Comb.	Datum	Mizusawa $-141^{\circ}12'$	Tschardjui $-63^{\circ}29'$	Carloforte $-8^{\circ}19'$	Gaithersburg $+77^{\circ}11'$	Cincinnati $+84^{\circ}25'$	Ukiah $+123^{\circ}13'$	Mittel
I, II	1899 Nov. 2-Dec. 6	—	0.00	+0.06	0.00	-0.01	+0.11	+0.032
II, III	Dec. 7-Jan. 4	+0.03	-0.02	+0.01	-0.02	-0.01	+0.11	+0.017
III, IV	1900 Jan. 5-30	-0.01	+0.09	+0.03	+0.01	+0.03	0.00	+0.025
IV, V	31-Febr. 24	+0.01	+0.08	+0.04	-0.03	+0.02	+0.02	+0.023
V, VI	Febr. 25-März 21	0.00	+0.04	0.00	0.00	+0.06	0.00	+0.017
VI, VII	März 22-April 15	-0.04	-0.04	-0.01	0.00	-0.04	0.00	-0.022
VII, VIII	April 16-Mai 11	-0.02	-0.06	-0.05	+0.02	-0.03	-0.02	-0.027
VIII, IX	Mai 12-Juni 8	-0.04	-0.03	-0.10	+0.01	-0.01	-0.06	-0.038
IX, X	Juni 9-Juli 9	-0.06	+0.01	-0.06	0.00	-0.02	-0.06	-0.032
X, XI	Juli 10-Aug. 13	-0.05	+0.03	-0.05	0.00	+0.01	-0.04	-0.017
XI, XII	Aug. 14-Sept. 22	-0.05	-0.01	-0.05	-0.02	-0.03	0.00	-0.027
XII, I	Sept. 23-Nov. 1	-0.01	+0.01	-0.02	+0.01	+0.02	-0.01	0.000
I, II	Nov. 2-Dec. 6	+0.08	+0.06	0.00	+0.02	+0.12	+0.01	+0.048
II, III	Dec. 7-Jan. 4	+0.09	+0.14	+0.07	+0.03	+0.04	+0.03	+0.067
III, IV	1901 Jan. 5-30	+0.10	+0.03	+0.06	+0.03	+0.03	+0.04	+0.048
IV, V	31-Febr. 24	+0.11	+0.06	+0.08	+0.02	+0.03	0.00	+0.050
V, VI	Febr. 25-März 21	+0.02	-0.02	-0.01	-0.01	+0.06	+0.01	+0.008
VI, VII	März 22-April 15	-0.02	-0.01	-0.03	-0.06	+0.01	+0.02	-0.015
VII, VIII	April 16-Mai 11	-0.04	-0.05	-0.02	+0.02	-0.02	+0.03	-0.013
VIII, IX	Mai 12-Juni 8	-0.02	-0.05	-0.05	+0.02	-0.04	0.00	-0.023
IX, X	Juni 9-Juli 9	-0.07	-0.07	-0.01	0.00	-0.06	-0.06	-0.045
X, XI	Juli 10-Aug. 13	-0.07	-0.01	-0.05	-0.03	-0.09	-0.03	-0.047
XI, XII	Aug. 14-Sept. 22	-0.02	-0.07	+0.03	-0.05	+0.01	+0.01	-0.015
XII, I	Sept. 23-Nov. 1	0.00	-0.04	-0.02	+0.01	0.00	0.00	-0.008
I, II	Nov. 2-Dec. 6	+0.06	-0.05	+0.04	+0.01	0.00	+0.01	+0.012
II, III	Dec. 7-Jan. 4	+0.05	+0.02	+0.04	+0.05	+0.01	0.00	+0.028

Lösung IIB. x, y, z .

Comb.	Datum	Mizusawa -141° 12'	Tschardjui -63° 29'	Carloforte -8° 19'	Gaithersburg +77° 11'	Cincinnati +84° 25'	Ukiah +123° 13'	Mittel
I, II	1899 Nov. 2-Dec. 6	—	-0.02	+0.04	-0.02	-0.03	+0.09	+0.012
II, III	Dec. 7-Jan. 4	0.00	-0.05	-0.01	-0.04	-0.02	+0.09	-0.005
III, IV	1900 Jan. 5-30	-0.03	+0.07	+0.02	0.00	+0.02	-0.02	+0.010
IV, V	31-Febr. 24	0.00	+0.06	+0.03	-0.04	+0.01	+0.01	+0.012
V, VI	Febr. 25-März 21	0.00	+0.03	0.00	0.00	+0.05	0.00	+0.013
VI, VII	März 22-April 15	-0.02	-0.03	+0.01	0.00	-0.03	+0.01	-0.010
VII, VIII	April 16-Mai 11	+0.02	-0.03	-0.02	+0.03	-0.02	-0.01	-0.005
VIII, IX	Mai 12-Juni 8	+0.01	+0.02	-0.06	+0.03	+0.01	-0.04	-0.005
IX, X	Juni 9-Juli 9	0.00	+0.06	-0.02	+0.02	-0.01	-0.04	+0.002
X, XI	Juli 10-Aug. 13	-0.01	+0.07	-0.01	+0.02	+0.03	-0.02	+0.013
XI, XII	Aug. 14-Sept. 22	-0.02	+0.01	-0.03	-0.01	-0.03	+0.01	-0.012
XII, I	Sept. 23-Nov. 1	-0.02	0.00	-0.03	+0.01	+0.01	-0.02	-0.008
I, II	Nov. 2-Dec. 6	+0.03	+0.01	-0.03	-0.01	+0.10	-0.02	+0.013
II, III	Dec. 7-Jan. 4	+0.02	+0.07	+0.02	0.00	+0.01	-0.01	+0.018
III, IV	1901 Jan. 5-30	+0.02	-0.04	+0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.002
IV, V	31-Febr. 24	+0.05	0.00	+0.04	-0.01	+0.01	-0.03	+0.010
V, VI	Febr. 25-März 21	-0.01	-0.04	-0.02	-0.03	+0.05	-0.01	-0.010
VI, VII	März 22-April 15	-0.02	-0.01	-0.03	-0.06	+0.01	+0.01	-0.017
VII, VIII	April 16-Mai 11	-0.01	-0.02	0.00	+0.03	-0.01	+0.03	+0.003
VIII, IX	Mai 12-Juni 8	+0.03	0.00	-0.02	+0.03	-0.03	+0.02	+0.005
IX, X	Juni 9-Juli 9	-0.02	-0.01	+0.03	+0.02	-0.04	-0.03	-0.008
X, XI	Juli 10-Aug. 13	-0.02	+0.04	-0.01	-0.01	-0.08	-0.01	-0.015
XI, XII	Aug. 14-Sept. 22	+0.02	-0.03	+0.06	-0.03	+0.02	+0.02	+0.010
XII, I	Sept. 23-Nov. 1	0.00	-0.03	-0.01	+0.01	0.00	-0.01	-0.007
I, II	Nov. 2-Dec. 6	+0.04	-0.07	+0.03	0.00	-0.01	-0.01	-0.003
II, III	Dec. 7-Jan. 4	+0.01	-0.03	+0.02	+0.02	-0.02	-0.02	-0.003

Die letzten Columnen enthalten die Mittelwerthe der übrig bleibenden Fehler. Dieselben zeigen bei Lösung IIA einen in so hohem Grade ausgesprochenen systematischen Charakter, dass die Darstellung der beobachteten Werthe durch die Polbewegung allein als unbefriedigend bezeichnet werden muss. Dagegen entsprechen die übrig bleibenden Fehler bei Lösung IIB allen berechtigten Anforderungen und legen Zeugniß für den hohen Genauigkeitsgrad des gesamten Beobachtungsmateriales ab.

Die mittlere Abweichung der beobachteten und berechneten Werthe stellt sich, nach der Formel: $\sqrt{\frac{[v v]}{n}}$ abgeleitet, für die einzelnen Stationen auf:

	Lösung A	Lösung B
Mizusawa	±0.053	±0.021
Tschardjui	±0.052	±0.040
Carloforte	±0.045	±0.028
Gaithersburg	±0.024	±0.024
Cincinnati	±0.042	±0.034
Ukiah	±0.040	±0.032

Als mittlere Polhöhen der sechs internationalen Stationen haben sich die folgenden Werthe ergeben:

Mizusawa	39° 8' 3.62
Tschardjui	10.67
Carloforte	8.93
Gaithersburg (Davis)	13.20
Cincinnati	19.31
Ukiah	12.08

An cooperativen Beiträgen zur Erforschung der Breitenvariation liegen Beobachtungsreihen von Tokyo, Heidelberg, Leiden und Philadelphia vor. Obwohl dieselben des oben mitgetheilten Grundes wegen nicht mit zur Ableitung der Polcurve hinzugezogen werden konnten, so ist es doch von Interesse, zu untersuchen, wie die Resultate dieser Reihen durch den Ausdruck für die Breitenvariation dargestellt werden. Nachstehend sind daher auch für diese Reihen die Differenzen zwischen den beobachteten und den berechneten Mittelwerthen gebildet worden.

Tokyo		Heidelberg		Leiden		Philadelphia	
1899.98	-0.04	1900.56	+0.04	1899.98	+0.04	1899.97	+0.09
1900.06	-0.01	.64	-0.01	1900.10	0.00	1900.01	+0.01
.13	+0.02	.71	-0.04	.17	-0.04	.09	-0.02
.21	+0.04	.78	-0.03	.26	+0.01	.16	+0.09
.30	+0.06	.89	-0.05	.32	0.00	.37	-0.04
.37	+0.02	.95	-0.03	.39	+0.01	.43	-0.07

Tokyo		Heidelberg		Leiden		Philadelphia	
1900.45	+0"02	1901.03	-0"09	1900.48	-0"01	1900.48	-0"03
.57	0.00	.13	+0.02	.55	+0.02	.52	-0.04
.62	-0.05	.21	+0.06	.63	+0.02	.58	-0.01
.72	-0.02	.30	+0.09	.71	-0.04	.62	-0.01
.79	+0.07	.37	+0.04	.78	+0.03	.70	-0.02
.87	+0.01	.45	0.00	.93	-0.02	.79	-0.01
.95	-0.02	.54	-0.01	1901.03	-0.06	.83	+0.04
1901.05	-0.03	.63	+0.03	.11	-0.08	.88	-0.04
.23	-0.01	.74	+0.02	.22	-0.14	.96	+0.08
.28	+0.01	.79	-0.01	.29	+0.01	1901.01	-0.05
.38	+0.01	.87	-0.07	.38	+0.08	.08	-0.01
.46	-0.03	—	—	.45	+0.08	.12	+0.05
.57	-0.06	—	—	.55	+0.08	.16	+0.05
—	—	—	—	.62	+0.01	.25	+0.09
—	—	—	—	.71	+0.04	.36	-0.06
—	—	—	—	.81	-0.01	.43	-0.01
—	—	—	—	.88	-0.06	.53	+0.01
—	—	—	—	—	—	.58	-0.02
—	—	—	—	—	—	.65	+0.01

Der Anschluss ist zwar kein so günstiger als für die Stationen des internationalen Breitendienstes, aber im Allgemeinen doch auch für diese Stationen als befriedigend anzusehen.

Es erübrigt jetzt noch, nachstehend eine Zusammenstellung zu geben, wie sich die Breitenvariation für die einzelnen Zeitepochen von 30° zu 30° Länge gestaltet.

$$\varphi - \varphi_0 = x \cos \lambda + y \sin \lambda + z$$

Westliche Länge.

	+150°	+120°	+90° (Amerika)	+60°	+30°	0°	-30° (Europa, Afrika)	-60°	-90° (Asien, Australien)	-120°	-150°	-180°
1899.9	+0"05	+0"09	+0"13	+0"13	+0"11	+0"07	+0"02	-0"03	-0"07	-0"07	-0"05	-0"01
1900.0	+0.01	+0.05	+0.09	+0.10	+0.10	+0.08	+0.04	0.00	-0.03	-0.05	-0.05	-0.02
.1	-0.02	+0.01	+0.04	+0.06	+0.08	+0.08	+0.06	+0.03	0.00	-0.02	-0.04	-0.03
.2	-0.04	-0.03	-0.01	+0.02	+0.04	+0.05	+0.06	+0.05	+0.03	0.00	-0.02	-0.04
.3	-0.05	-0.06	-0.06	-0.04	-0.02	0.00	+0.02	+0.03	+0.03	+0.02	-0.01	-0.03
.4	-0.04	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.04	-0.01	+0.01	+0.03	+0.03	+0.01	-0.01
.5	-0.03	-0.06	-0.08	-0.09	-0.08	-0.06	-0.03	-0.01	+0.01	+0.02	+0.02	0.00
.6	0.00	-0.02	-0.05	-0.07	-0.08	-0.07	-0.05	-0.03	0.00	+0.02	+0.03	+0.02
.7	+0.04	+0.03	0.00	-0.03	-0.05	-0.06	-0.06	-0.04	-0.02	+0.01	+0.03	+0.04
.8	+0.09	+0.08	+0.06	+0.03	0.00	-0.03	-0.05	-0.04	-0.03	+0.01	+0.04	+0.07
.9	+0.10	+0.11	+0.10	+0.08	+0.05	+0.01	-0.01	-0.02	-0.01	+0.02	+0.05	+0.08
1901.0	+0.09	+0.11	+0.12	+0.11	+0.09	+0.06	+0.03	+0.01	0.00	+0.01	+0.03	+0.06
.1	+0.06	+0.09	+0.11	+0.11	+0.10	+0.08	+0.05	+0.02	0.00	0.00	+0.01	+0.03
.2	-0.01	+0.03	+0.07	+0.10	+0.11	+0.09	+0.06	+0.02	-0.03	-0.06	-0.06	-0.05
.3	-0.08	-0.03	+0.02	+0.06	+0.09	+0.09	+0.07	+0.03	-0.03	-0.07	-0.10	-0.10
.4	-0.14	-0.11	-0.06	+0.01	+0.06	+0.09	+0.09	+0.06	0.00	-0.06	-0.11	-0.14
.5	-0.18	-0.17	-0.13	-0.06	+0.01	+0.08	+0.11	+0.10	+0.06	-0.01	-0.09	-0.15
.6	-0.17	-0.19	-0.16	-0.10	-0.03	+0.05	+0.11	+0.12	+0.10	+0.04	-0.04	-0.12
.7	-0.12	-0.15	-0.16	-0.12	-0.06	+0.02	+0.08	+0.12	+0.12	+0.09	+0.03	-0.05
.8	-0.04	-0.09	-0.12	-0.11	-0.07	-0.01	+0.05	+0.10	+0.13	+0.12	+0.08	+0.02
.9	+0.04	-0.01	-0.06	-0.08	-0.08	-0.04	+0.01	+0.06	+0.11	+0.13	+0.13	+0.09
1902.0	+0.13	+0.07	+0.01	-0.05	-0.08	-0.07	-0.04	+0.02	+0.08	+0.14	+0.16	+0.16

Der Genauigkeitsgrad dieser Werthe ist auf $\pm 0"02$ zu veranschlagen.

Wenn man aber die Variation in Azimuth und Länge ermitteln will, wird es in Folge der Hinzufügung eines von den Componenten der Polbewegung unabhängigen dritten Gliedes im Ausdruck von $\varphi - \varphi_0$ nicht mehr angängig sein, die erforderlichen Reductionsgrößen der obigen Tabelle zu entnehmen. Man wird in diesem Falle der Polbewegung allein Rechnung zu tragen haben. Aus Anlass dessen ist nachstehend auch die Grösse $y \cos \lambda - x \sin \lambda$ tabulirt.

$$y \cos \lambda - x \sin \lambda$$

Westliche Länge.

	+150°	+120°	+90° (Amerika)	+60°	+30°	0° (Europa, Afrika)	-30°	-60°	-90° (Asien, Australien)	-120°	-150°	-180°
1899.9	-0".10	-0".08	-0".04	+0".01	+0".06	+0".10	+0".10	+0".08	+0".04	-0".01	-0".06	-0".10
1900.0	-0.08	-0.07	-0.05	-0.02	+0.02	+0.06	+0.08	+0.07	+0.05	+0.02	-0.02	-0.06
.1	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.01	+0.02	+0.04	+0.06	+0.05	+0.04	+0.01	-0.02
.2	-0.01	-0.03	-0.05	-0.05	-0.04	-0.02	+0.01	+0.03	+0.05	+0.05	+0.04	-0.02
.3	+0.03	+0.01	-0.02	-0.04	-0.05	-0.04	-0.03	-0.01	+0.02	+0.04	+0.05	+0.04
.4	+0.06	+0.04	+0.02	-0.01	-0.04	-0.05	-0.06	-0.04	-0.02	+0.01	+0.04	+0.05
.5	+0.06	+0.05	+0.03	0.00	-0.03	-0.05	-0.06	-0.05	-0.03	0.00	+0.03	+0.05
.6	+0.05	+0.05	+0.05	+0.03	0.00	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	0.00	+0.03
.7	+0.02	+0.04	+0.05	+0.05	+0.03	+0.01	-0.02	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	-0.01
.8	-0.01	+0.02	+0.05	+0.07	+0.06	+0.04	+0.01	-0.02	-0.05	-0.07	-0.06	-0.04
.9	-0.03	0.00	+0.03	+0.06	+0.06	+0.05	+0.03	0.00	-0.03	-0.06	-0.06	-0.05
1901.0	-0.05	-0.03	0.00	+0.03	+0.05	+0.06	+0.05	+0.03	0.00	-0.03	-0.05	-0.06
.1	-0.06	-0.05	-0.03	0.00	+0.03	+0.05	+0.06	+0.05	+0.03	0.00	-0.03	-0.05
.2	-0.08	-0.08	-0.07	-0.04	+0.01	+0.05	+0.08	+0.08	+0.07	+0.04	-0.01	-0.05
.3	-0.07	-0.09	-0.10	-0.07	-0.03	+0.02	+0.07	+0.09	+0.10	+0.07	+0.03	-0.02
.4	-0.03	-0.09	-0.12	-0.12	-0.09	-0.03	+0.03	+0.09	+0.12	+0.12	+0.09	+0.03
.5	+0.02	-0.05	-0.11	-0.14	-0.14	-0.09	-0.02	+0.05	+0.11	+0.14	+0.14	+0.09
.6	+0.07	-0.01	-0.08	-0.14	-0.16	-0.13	-0.07	+0.01	+0.08	+0.14	+0.16	+0.13
.7	+0.10	+0.04	-0.03	-0.10	-0.14	-0.14	-0.10	-0.04	+0.03	+0.10	+0.14	+0.14
.8	+0.11	+0.07	+0.02	-0.05	-0.10	-0.12	-0.11	-0.07	-0.02	+0.05	+0.10	+0.12
.9	+0.11	+0.10	+0.07	+0.01	-0.04	-0.09	-0.11	-0.10	-0.07	-0.01	+0.04	+0.09
1902.0	+0.09	+0.12	+0.12	+0.08	+0.03	-0.04	-0.09	-0.12	-0.12	-0.08	-0.03	+0.04

Die Variation in Azimuth und Länge beträgt:

$$\alpha - \alpha_0 = + (y \cos \lambda - x \sin \lambda) \sec \varphi$$

$$\lambda - \lambda_0 = - (y \cos \lambda - x \sin \lambda) \tan \varphi.$$

Potsdam, Juli 1902.

Th. Albrecht.

Beobachtungen des Planeten (72) Feronia

am 6 zöll. Steinheil'schen Refractor der Sternwarte Pola der k. u. k. Kriegs-Marine.

1902	M. Z. Pola	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Vgl.	Mikr.	α app.	$\log p.\Delta$	δ app.	$\log p.\Delta$	Red. ad l. app.	*
April 7	10 ^h 33 ^m 37 ^s	-1 ^m 26 ^s 8	+12' 39"	3	R	12 ^h 33 ^m 25 ^s 8	9.024 _n	-6° 11' 3"	0.831	+25.72 -16.1	1
8	9 8 39	+2 10.3	+5 9	3	»	12 32 12.2	9.377 _n	-6 3 43	0.824	+2.71 -16.2	2
8	11 30 10	+2 4.2	+5 45	3	»	12 32 6.1	7.461	-6 3 7	0.831	+2.71 -16.2	2
9	8 59 40	+1 16.6	+15 1	4	»	12 31 18.5	9.385 _n	-5 53 51	0.824	+2.70 -16.3	2
9	10 54 52	+1 11.6	+15 23	3	»	12 31 13.5	8.693 _n	-5 53 29	0.831	+2.70 -16.3	2

Mittlere Oerter der Vergleichsterne.

	α	δ	Autorität
1	12 ^h 34 ^m 26 ^s 91	-6° 23' 26.0	$\frac{1}{2}$ (W ₁ 531 + AG. Ottokr. Z. 40)
2	12 29 51.19	-6 8 35.8	$\frac{1}{8}$ (M ₁ 8240 + M ₂ 4502 + AG. Ottokr. Z. 42)

Grösse: 12^m 0. Beobachter: k. und k. Linien Schiffsfähnrich *Rudolf Höhl*.

April 10 und 12. Bewölkt. — April 13. Bei heiterem Wetter, aber sehr feuchter Luft sind Sterne 12^m 5 bis 13^m eben noch zu sehen; Planet nicht sichtbar.

Pola, 1902 April 15.

Der Vorstand: *K. Koss*, k. und k. Corvettenkapitän.

Beobachtungen des Planeten JL auf der k. k. Sternwarte in Wien.

1902	M. Z. Wien	Gr.	α app.	$\log p.\Delta$	δ app.	$\log p.\Delta$
Juli 30	10 ^h 58 ^m 3 ^s	11 ^m 0	20 ^h 8 ^m 11 ^s 45	8.865 _n	-22° 19' 28.7	0.916
Aug. 1	11 9 54	—	20 6 24.19	8.528 _n	-22 32 31.8	0.918

Wien, 1902 Aug. 3.

J. Palisa.