114 J. Bornmüller: Über eine unbeschriebene *Satureia* der Section *Sabbatia*.

exserto quam spatha fere radicali duplo longiore. An praecedentis mera varietas? Folia anni superioris longissima et latiora.

Chine: Yun-Nan: Yun-Nan-Sen: Tchong-Chan, 1 juillet 1905; nos. 349 et 820 (Ducloux).

118. *Streptolirion Duclouxii* Lévl. et Vant., nov. spec.

Affinis *S. volubili* Edg. a quo tamen facile distinguitur statura pusilla 15 cm, raro 30 cm alta et petiolis pedunculisque glandulosis, floribus rubris.

Chine: Yun-Nan: Mont Tchong-Chan, ravins; 16 août 1905; no. 232 (F. Ducloux); Lou-Pou près Tong-Tchouan, 11 août 1907; no. 234 (Siméon Ten).

119. *Ypsilandra thibetica* Franch. var. *latifolia* Vant., nov. var.

Differt a typo latitudine duplici foliorum; folia alia elliptica alia spathulata.

Chine: Yun-Nan: Kiu-Long-Chang, préfecture de Tchao-Tong, fleurs blanches odorantes, 16 mars 1901; no. 447 (F. Ducloux).

120. Diagnosis completa in *Disporopsis Pernyi* Hua.

Floris hucusque incogniti descriptio: perianthium tubulato-campanulatum apice fulvum, lobis ovatis, corona interna e basi staminum oriunda illisque brevior munitum; lobi coronae lineares obtusiusculi; antherae membranaceae dilatatae; ovarium fulvum, pyramidale, angulatum stylo crasso et stigmate bifido coronatum.

Planta 50 cm alta, rhizomate parum elongato; flores 1 cm longi, 1 cm apice lati, solitarii, nutantes.

Chine: Yun-Nan: Lan-Ngy près Lou-Lan, 23 mai 1904; no. 441 (Pierre Py).

XXX. Über eine unbeschriebene *Satureia* der Section *Sabbatia* aus der Flora von Assyrien.

Von J. Bornmüller (Weimar).

(Originaldiagnose.)

Satureia macrosiphonia Bornm., nov. spec. sect. *Sabbatiae* Briq. Nat., Pflanzenfam., IV, 3a, p. 298.

Perennis, basi lignosa multicaulis, undique minutissime setulosa vel scabrido-canescens; caulibus tenuibus, virgatis, vix pedalibus, superne paniculato-laxiramosis, ramulis rigidulis tenuibus; foliis glandulis purpureis immersis dense punctatis, parvis, oblongo-linearibus, sessilibus, acutis, axillis fasciculiferis, parcissime setulosis, floralibus et rameis minutis, oblongis vel squamiformi-ovatis; fasciculis foliorum omnibus remotis; cymulis longiuscule pedunculatis uni-vel subunifloris, oppositis; floribus pedicello calyce brevior scabrello suffultis; calyce 4 mm longo, campanulato-tubuloso, subbilabiato, decemnervio; dentibus e basi triangulari subulatis, divergentibus, inaequilongis, inferioribus tubo

calycino vix vel paulo brevioribus, superioribus ternis tubum dimidium aequantibus, corollae tubo longissimo et angustissimo, gracili (cum limbo brevi) 20—22 mm longo, calycem 5—6-plo longiore.

Assyriae in siccis ad MarJako ditionis urbis Mossul, ubi hanc plantam novam valde insignem legit m. septembro a. 1879 Barré de Lancy.

Das Original liegt im Herbarium Haussknecht aufbewahrt und entstammt ursprünglich dem damit vereinigten Herbarium Gaillardot.

S. macrosiphonia Bornm. gehört in die Gruppe der halbstrauchigen Arten der Sektion *Sabbatia* an, welche durch undeutlich-zweilippige Kelche gekennzeichnet sind (*Subbilabiatae* Boiss. Fl. Or., IV, 565), und ist neben *S. macrantha* C. A. Mey. und *S. longiflora* Boiss. et Hausskn. einzuordnen. Die ausserordentlich lange, gerade Blumenkronenröhre von über 2 cm Länge, also doppelt länger als bei genannten Arten, macht *S. macrosiphonia* Bornm. vor sämtlichen Arten der Gattung sofort kenntlich; die neue Art nimmt daher eine sehr isolierte Stellung ein.

Bemerkung. Nach den jetzt geltenden Nomenklaturregeln steht der Anwendung des Namens *S. longiflora* Boiss. et Hausskn., wie ich es oben getan habe, nichts mehr im Wege, auch wenn man im Sinne Briquets die Gattungen *Calamintha*, *Acinos*, *Clinopodium* und *Micromeria* mit *Satureia* vereint, da nach Briquet *Satureia longiflora* Presl (= *Micromeria longiflora* Tod., Nym.) nur als eine Unterart von *S. (Micromeria) Graeca* L. anzusehen und als „*S. Graeca* L. subsp. *longiflora* Briq.“ zu bezeichnen ist. Die neuen Briquet'schen Namen für diese nordsyrische Art Boissiers und Haussknechts fallen somit der Synonymik anheim. Es sind dies:

S. Boissieri Briq. (in Nat. Pflanzenfam., IV, 3a, S. 298; 1896) non Hausskn. (in Boiss., Fl. Or., IV, 565; 1879) und

S. Edmondi Briq. (Fragm. monogr. Labiat. fasc. V in Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève, 1898, p. 85).

XXXI. Vermischte neue Diagnosen.

242. *Carex dioica* L. × *echinata* Murray var. **grypos** (Schk.) J. Vetter. l. c., p. 237.

Stolones plerumque desunt, raro adsunt. Folia plana vel involuta, vix 2 mm lata, supra scabra. Caulis triqueter, rectus vel subflexuosus, sub inflorescentia semper scaber. Inflorescentia e 3 vel rarius 4 spiculis approximatis composita. Spicula suprema basi mascula, supra feminea, spiculae laterales totae femineae vel basi masculae et ceterum femineae. Spiculae omnes ovatae, suprema basi interdum velut petiolata. Squamae tegentes brunneae et plerumque albomarginatae, nervo medio plerumque brunnescenti-albo, nunquam viridi. Forma et longitudo squamarum, fructuum utriculorum et rostrorum eadem ac Caricis dioicae; sed utriculi partim manifeste, partim obsolete carinati, margo rostri plerumque aëvis. Fructus erecti, nunquam squarroso-patuli. Fructus steriles singuli tantum adsunt.