VIII.

Aus dem physiologischen Laboratorium der Sorbonne.

Bemerkungen zu Herrn Dr. Wilh. Meyersteins Abhandlung: Über den Einfluß des Cholesterins auf die Seifenhämolyse.

Von

Dr. Henri Iscovesco.

Herr Dr. Meyerstein erwähnt in seiner sehr interessanten Abhandlung, ich und mein Mitarbeiter Dr. Foucaud hätten angegeben, „daß Lösungen von ölsaurem Natron, welche Cholesterin enthielten, nicht mehr hämolysierten und daß es doch aus den Untersuchungsergebnissen von Kurt Meyer hervorgeht, daß der einfache Zusatz von Cholesterin zur Seifenlösung die hämolytische Wirkung nicht aufhebt“.

Ich erlaube mir dazu folgende Bemerkungen: Ich habe in einer ersten Abhandlung¹⁾ bewiesen, daß das Cholesterin imstande ist, die hämolysierende Wirkung eines natürlichen Serums (Hundeserum und Pferdeblutkörperchen) aufzuheben. Aber diese Schutzwirkung (siehe l. c. S. 405) kam nur zur Geltung, nachdem man zuerst $\frac{3}{4}$ Stunden Cholesterin mit hämolytischem Serum im Brutschrank stehen gelassen hatte.

In meiner zweiten Abhandlung²⁾, die ich mit Dr. Foucaud veröffentlicht habe, war die benutzte Methode dieselbe, das heißt, daß wir immer das Cholesterin mit dem hämolysierenden Stoff (in diesem Falle die Seife) im Brutschrank während wenigstens $\frac{3}{4}$ —1 Stunde stehen ließen.

Wir haben in dieser Abhandlung auch gezeigt, daß man auf Grund der Methode der Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Cholesterin-Seifenmischung, einmal sofort nach der Mischung und dann nach 2 Stunden, gezwungen ist, anzunehmen, daß die schützende Wirkung des Cholesterins eine chemische Wirkung ist, wie es in letzter Zeit auf chemischem Wege für Saponin von Windaus bewiesen worden ist³⁾.

---

1) Iscovesco, C. R. Soc. Biol. 1908 I, S. 404.

2) Iscovesco u. Foucaud, C. R. Soc. Biol. 1908 I, S. 677.

3) Siehe Windaus, Ber. d. D. Chem. Ges. 1909, S. 248.