J. D.	Schätzung	<i>H</i>	Bem.
2417602.28	<i>e</i> 2 <i>v</i>	11 ^m .4	☾, 2, 3
07.25	<i>f</i> 3 <i>v</i> ?	12.0?	1
7788.55	<i>v</i> = oder 1 <i>f</i>	11.65	☾, 1
90.45	<i>v</i> = <i>e</i>	11.20	1
92.43	<i>e</i> 4 <i>v</i> 2 <i>f</i>	11.53	1, 4
94.42	<i>f</i> 2 <i>v</i> 4 <i>g</i>	11.93	1
95.50	<i>f</i> 3 <i>v</i> 3 <i>g</i>	12.05	
98.42	<i>v</i> 1 oder 2 <i>g</i>	12.25	
99.53	<i>v</i> 1 <i>g</i>	12.3	
8137.58	<i>e</i> 5 <i>v</i> 3 <i>e</i>	10.98	☾, 4
38.46	<i>e</i> 6 <i>v</i> 3 <i>e</i>	11.00	☾
40.44	<i>e</i> 3 <i>v</i> 3 <i>f</i>	11.45	
41.57	<i>e</i> 4 <i>v</i> 1/2 <i>f</i>	11.64	☾
45.50	<i>v</i> = <i>g</i>	12.40	4
47.48	<i>v</i> = <i>g</i>	12.40	
8322.25	<i>v</i> 1 oder 2 <i>g</i>	12.25	
25.24	<i>e</i> 3 <i>v</i> 3 <i>f</i>	11.45	
27.25	<i>e</i> 4 <i>v</i> 1/2 <i>f</i>	11.56	
31.25	<i>f</i> 5 <i>v</i> 2 <i>g</i>	12.20	1
32.25	<i>v</i> 1 <i>g</i> ?	12.3?	☾, 1
33.25	<i>v</i> 1 <i>g</i> ?	12.3?	
8440.59	<i>e</i> 8 <i>v</i> 1 <i>e</i>	11.13	
41.60	<i>v</i> = <i>e</i>	11.20	1, 5
42.58	<i>v</i> = <i>f</i>	11.70	
45.58	<i>f</i> 4 <i>v</i> , <i>v</i> = <i>g</i>	12.3	1, 5
46.57	<i>f</i> 4 <i>v</i> , <i>v</i> = <i>g</i>	12.3	
8704.27	<i>e</i> 5 <i>v</i> 3 <i>e</i>	10.98	
05.27	<i>e</i> 5 <i>v</i> 2 <i>e</i>	11.03	
12.26	<i>v</i> = <i>f</i> ?	11.7?	2

Bemerkungen.

1. Schwierig und unsicher.
2. Unsicher; RU niedrig.
3. *f* unsichtbar.
4. Sehr klar.
5. Nebel.

Die Tabelle IV gibt eine Übersicht der bis jetzt gesicherten Maxima. Die Kolumne *n* enthält die Zahl der Beobachtungen; unter Dauer ist das Zeitintervall zu verstehen, während dessen der Stern heller als 12^m1 war.

Tabelle IV.

Nr.	<i>n</i>	J. D.	<i>H</i>	Typus	Dauer	Bem.
1	4	2417525	11 ^m .2	lang	13 ^d	
2	4	7600	11.4	kurz	9?	1
3	8	7790	11.3	kurz	8	2
4	6	8137	11.0	lang	> 8	3
5	6	8325	11.4	kurz	7	
6	5	8437	11.1	lang	?	3, 4
7	3	8704	11.0	lang	> 10	3

Bemerkungen.

1. Beobachtung durch Mondschein erschwert.
2. Gut.
3. Der Aufstieg wurde nicht beobachtet.
4. Sehr schwierig.

Utrecht, 1910 Febr. 24.

A. A. Nijland.

Über das letzte Minimum von R Coronae Borealis.

Von A. A. Nijland.

Sobald uns die Nachricht erreichte, daß R Coronae Bor. viel schwächer als gewöhnlich sei, unternahmen Herr *v. d. Bilt* und ich die Überwachung des Sterns. Vom 18. Jan. bis Ende 1909 liegen 117 in 91 Nächten angestellte Schätzungen der Helligkeit vor. Die Tabelle I enthält die benutzten Vergleichsterne, ihre Nummer nach der BD und nach Hagen (Atlas Stellarum Var.), ihre Bezeichnung bei Pickering (Harv. Ann. 37, II, S. 168), nebst ihrer auf das Potsdamer System bezogenen Helligkeit *H*.

Tabelle I.

	BD	Hagen	Pi	<i>H</i>
<i>b</i>	+30°2682	—	—	6 ^m .75
<i>d</i>	+28 2475	—	<i>f</i>	7.66
<i>e</i>	+29 2739	—	—	8.01
<i>f</i>	+28 2469	—	<i>h</i>	8.2
<i>g</i>	+29 2713	—	<i>l</i>	8.8
<i>h</i>	+29 2718	2	—	9.4
<i>j</i>	+28 2478	8	—	10.2
<i>k</i>	+28 2476	15	<i>r</i>	10.8

	BD	Hagen	Pi	<i>H</i>
<i>l</i>	—	20	<i>t</i>	(11 ^m .6)
<i>m</i>	—	24	—	12.1
<i>n</i>	—	30	—	12.6
<i>p</i>	—	33	—	12.9
<i>q</i>	—	—	—	13.5

Die Helligkeiten der Sterne *b*, *d* und *e* wurden der PD unmittelbar entnommen. Die Größen der schwächeren Sterne bestimmte ich aus den beobachteten Stufenzahlen und den Sehgrenzen der beiden benutzten Instrumente, des Zehnzöllers R und des dreizölligen Suchers S. Für diese Grenzen nahm ich 14^m0, bzw. 11^m.6 (s. A. N. 4116 und 4379) im Potsdamer System an. Der Stern *q* kommt auf der Karte von Hagen nicht vor; seine rohen Koordinaten sind:

$$q = R + 40^{\circ}, -2'.5.$$

Hagen hat die schwächeren Vergleichsterne bestimmt zu hell angesetzt: *m* und *n* sind bei ihm 10^m.8, resp. 11^m.2. Die Reduktion seiner in Stufen ausgedrückten Helligkeiten auf das HP-System (Harv. Ann. 37, II, S. 199) gibt aber

die Größen wohl etwas zu schwach. Für Stern p z. B. findet man 13^m42. Da aber der etwa 0^m6 schwächere Stern q noch ganz bequem im hiesigen Zehnzöller sichtbar ist, so dürfte p höchstens 12^m9 heißen.

Der Stern l ist verdächtig. Herr v. d. Bilt machte mich Anfang Mai darauf aufmerksam, daß er in Vergleichung mit k und m etwa 4 Stufen heller als gewöhnlich war. Da ich diese Tatsache völlig bestätigen konnte, haben wir später l immer an k und m angeschlossen; es wurden aber keine weiteren Schwankungen der Helligkeit beobachtet, und der Stern blieb von der Größe 11^m6.

Ich habe bei R Coronae Bor. nur einmal (J. D. 2418626) eine bestimmte Färbung (4^e) beobachtet; der Stern war damals aber ziemlich schwach (10^m3) und die Schätzung der Farbe sehr unsicher. Sonst war er im Jahre 1909 sowohl beim Abstieg im Januar (Größe 8^m4 bis 9^m0) als auch im Dezember, als er wieder heller als 9^m0 geworden war, nahezu rein weiß.

Die Tabelle II gibt eine kurz gefaßte Übersicht des vorjährigen Lichtwechsels. Die gleichzeitigen Beobachtungen (21 Stück) geben mir das Recht, die Schätzungen von v. d. Bilt (50 Stück) ohne irgend eine Reduktion mit den meinigen (67 Stück) zu kombinieren.

Tabelle II.

J. D.	Phase	H	Bemerkungen
2418340	M	8 ^m 4	
8361	m	10.4	
8371	M	9.8	
8398-8410	st	11.4	

Utrecht, 1910 Febr. 21.

J. D.	Phase	H	Bemerkungen
2418423	m	12 ^m 3	
8431	M	11.8	
8460	m	12.1	flach
8496	M	11.9	
8508	m	13.0	spitz. Hauptminimum
8538	M	11.4	
8559	m	12.1	
8589	M	10.7	
8604	m	11.2	

M = Maximum, m = Minimum, st = stationär.

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß die Lichtkurve sowohl beim Ab- als beim Aufstieg sehr unregelmäßig war.

Sämtliche sekundäre Maxima und Minima sind spitz, und durch eine nicht zu geringe Zahl von Beobachtungen ziemlich sicher festgelegt. Nur für das Zeitintervall 2418450 bis 2418500, in welchem bloß 5 Schätzungen erhalten wurden, fühle ich mich unsicher. Es läßt sich ohne Vergleichung mit den Resultaten anderer Beobachter nicht entscheiden, ob auch vielleicht unweit 2418480 nicht noch ein sekundäres Minimum stattgefunden hat.

Der Abstieg zum definitiven Minimum war sehr steil. J. D. 2418497 war der Stern nach Herrn v. d. Bilt 0^m3, nach mir 0^m2 heller als m ; 6 Tage später war er kaum heller als p .

Seit dem letzten sekundären Minimum (J. D. 2418604, Größe 11^m2) ist der Veränderliche fast ohne Verzögerungen allmählich heller geworden. Ende 1909 war er etwa 8^m0.

A. A. Nijland.

Bestätigung der Veränderlichkeit einiger neu entdeckten Variablen.

Von S. Enco.

40.1906 Geminorum.

Der Veränderliche erreichte nach meinen fortgesetzten Schätzungen ein Maximum um 1908 Dez. 13, zu welcher Zeit der Stern 0^m1 heller als BD +26°1407 und 0^m3 schwächer als BD +26°1410 geschätzt wurde. Die Größen dieser Sterne sind nach AG Cbr E. bzw. 8^m6 und 9^m0. Von 1909 Nov. 21 bis 1910 Jan. 11 sank sein Licht verhältnismäßig rasch von 9^m8 bis zum tiefsten Minimum bei 10^m5. Nachher war wieder eine schwache Erhellung merkbar.

Seit der Entdeckung seiner Veränderlichkeit 1904 März ist nun der Stern durch 6 Jahre so oft, wie es notwendig war, nachgesehen worden. In dieser Zeit sind 4 Minima und 3 Maxima beobachtet, deren Lichtunterschiede so beträchtlich waren, daß bei dem Beobachter kein Zweifel an der Veränderlichkeit übrig bleiben konnte. Bei der Bearbeitung des Materials (Beob. I und II) kam indessen eine für einen langperiodischen Stern sehr geringe Amplitude heraus, und da die Lichtänderung des Sterns von andern Beobachtern auch nicht bestätigt wurde, dürfte der noch herrschende Zweifel an ihrer Realität berechtigt sein.

Die Sache ist die, daß die in Beob. I und II benutzten

Größen der Vergleichsterne, besonders was den Stern a betrifft, sehr fehlerhaft sind. Für die jetzige Bearbeitung war es daher vor allem notwendig, diese Größen zu verbessern. Nun habe ich im letzten Winter meinen Stufenwert nach den L. Campbellschen Sterngrößen eingehend untersucht, und die neuen Größen, die sich auf diesen Wert stützen, dürften somit einigermaßen sicher sein. Als Fundamentalstern bot sich BD +26°1410 mit der in Cambridge ermittelten Größe 9^m0 dar, und wenn zunächst die Campbellsche Skala zugrunde gelegt wurde, fand ich für die Vergleichsterne $a = 10^m3$, $b = 9^m6$, $f = 10^m5$ und $k = 10^m7$ (vergleiche Beob. I und II). Auf diese Größen reduzierte ich weiter sämtliche seit 1904 angestellte Beobachtungen des Veränderlichen und zog durch sie die wahrscheinlichste Kurve. Diese Kurve zeigte 4 deutliche und verhältnismäßig scharfe Minima um die J. D. 2416550 (10^m6), 7300 (10^m2), 8010 (10^m4) und 8700 (10^m6). Die Maxima können nicht so gut festgelegt werden, weil der Stern in ihnen lange verweilt; ja es scheint sogar eine Biegung in der Maximumkurve vorzukommen, wodurch zwei ungleiche Maxima entstehen. Der Abstieg vom Maximum geht in 120-140 Tagen