Excursion Du Vendredi 6 Aout Au Vallon Supérieur De L'ubayette Ou Oronaye, Et En Particulier Au Vallon Du Lauzanier

Charles Flahault

To cite this article: Charles Flahault (1897) Excursion Du Vendredi 6 Aout Au Vallon Supérieur De L'ubayette Ou Oronaye, Et En Particulier Au Vallon Du Lauzanier, Bulletin de la Société Botanique de France, 44:sup1, CCXVI-CCXXII, DOI: [10.1080/00378941.1897.10839664](https://doi.org/10.1080/00378941.1897.10839664)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1897.10839664>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 11

View related articles [↗](#)

Salix herbacea.
 Bulbocodium vernum.
 Crocus vernus.
 Luzula multiflora.
 Carex Davalliana.

Nardus stricta.
 Avena montana.
 — spadicea.
 — heterophylla var. nigricans.
 Botrychium Lunaria.

Sauf un très petit nombre d'exceptions, c'est la flore du col de Valgelaye. Le hasard des recherches a fait trouver d'un côté quelques plantes qui n'ont pas été observées de l'autre; mais il n'y a aucune différence appréciable entre les deux localités, et l'on peut, sans crainte d'erreur, compléter les deux listes l'une par l'autre.

EXCURSION DU VENDREDI 6 AOUT AU VALLON SUPÉRIEUR
 DE L'UBAYETTE OU ORONAYE, ET EN PARTICULIER AU VALLON DU LAUZANIER.

Il s'agissait aujourd'hui d'atteindre la zone alpine supérieure, en pénétrant dans le massif même du Lauzanier. Ce n'était pas chose aisée d'entraîner cinquante botanistes à travers ce merveilleux vallon du Lauzanier, si justement vanté, sans égrener sa troupe au milieu des incomparables pelouses qui en tapissent les pentes. Tout le monde n'atteignit pas le but; mais il y avait partout à moissonner et si longue qu'ait été la journée, elle fut trop courte pour tous.

Comme l'herborisation au col de Valgelaye, celle-ci laissera les souvenirs les plus vifs à nos confrères; nous étions d'ailleurs guidés avec une compétence exceptionnelle par notre confrère M. Gust. Vidal. Pendant que la majorité de nos confrères suivait ce guide expérimenté entre tous, quelques-uns, tentés par la proximité de la frontière italienne, suivaient la route nationale jusqu'au col de la Madeleine et pénétraient dans le vallon du Lauzanier par les pentes de sa rive droite, se maintenant dès le début de l'herborisation dans la zone alpine. Nous sommes redevables à M. N. Roux et à M. Chatenier d'observations faites sur cette rive et surtout sur les pentes rocailleuses et dans les pâturages que dominent de ce côté la crête de la frontière, du col vers le sommet de l'Enclausette.

Pour l'ensemble de nos confrères, l'herborisation a commencé dans les champs qui bordent l'Ubayette, dans les bois de Mélèzes

plus ou moins étendus qui en couvrent la rive gauche (à l'ubac) ; elle est devenue particulièrement attentive et féconde dans les prés-bois vers 1900 mètres, puis dans les prairies fauchables qui s'étendent jusqu'à la cascade (vers 2100 mètres). Un détail géologique fixe ici l'attention ; entre les prairies fauchables et la pelouse alpine on rencontre un ressaut rocheux formé par le Grès tertiaire d'Annot ; c'est à l'affleurement de cette roche, où domine la silice, qu'on doit attribuer les particularités floristiques remarquées depuis longtemps au voisinage de la cascade du Lauzanier, particularités qui se retrouvent dans le vallon de Grange-Commune situé à l'E. du Lauzanier, un peu en amont du sommet de la Tour. En amont du seuil en question, on pénètre sans transition dans la zone alpine, contrairement à ce que nous avons observé au col de Valgelaye. Le lac, à l'altitude de 2304 mètres, appartient à la zone alpine inférieure, mais les hauteurs environnantes et les crêtes qui les dominent possèdent plusieurs des espèces de la zone alpine supérieure ; c'est le seul point où nous ayons pu la faire connaître à nos confrères pendant la première partie de la session.

L'herborisation se décomposant en plusieurs zones nettement distinctes, il importe de ne pas confondre les observations auxquelles chacune d'elles a donné lieu.

Dans les champs et les décombres au voisinage de Larche (1700 mètres), nous récoltons quelques-unes des plantes les plus vulgaires des plaines de la France tempérée, mais qui doivent être ici au voisinage de leur limite supérieure :

Lepidium campestre.
Thlaspi arvense.
Sisymbrium officinale.
Capsella Bursa-pastoris.
Silene inflata.
Melilotus officinalis.
Daucus Carota.
Tussilago Farfara.
Matricaria inodora.

Senecio vulgaris.
Artemisia vulgaris.
Carduus defloratus.
Taraxacum officinale.
Lamium purpureum.
Urtica dioica.
Euphorbia Cyparissias.
Poa annua.

et dans le lit même du ruisseau *Nasturtium officinale* et *Veronica Beccabunga*.

On a bientôt passé le ruisseau bordé de Saules sur lesquels M. Hy nous donne de précieux renseignements, pour longer ou dominer les berges ; nous sommes à l'ubac ; la végétation comprend surtout des prés-bois de Mélèzes, coupés de quelques mauvais champs en

jachère et des prairies la plupart marécageuses, souvent tourbeuses (sagnes). Les prés-bois fournissent, entre 1780 et 1900 mètres :

Anemone alpina.
— *narcissiflora*.
Ranunculus montanus.
Aconitum Anthora.
Actæa spicata.
Biscutella lævigata.
Erysimum virgatum.
Arabis brassicæformis.
Hugueninia tanacetifolia.
Dianthus neglectus.
Arenaria serpyllifolia.
Mœhringia muscosa.
Polygala vulgaris.
Helianthemum vulgare.
Linum catharticum.
Ononis cenisia.
— *striata*.
Trifolium pratense.
— *montanum*.
— *badium*.
Lotus corniculatus.
Hippocrepis comosa.
Rubus idæus.
— *saxatilis*.
Rosa pomifera et *var.*
— *alpina*.
Cotoneaster tomentosa.
Alchemilla vulgaris.
— *alpina*.
Epilobium alsinæfolium.
— *spicatum*.
Sempervivum tectorum.
— *arachnoideum*.
Sedum Anacampseros.
Saxifraga aizoides.
Ribes Uva-crispa.
— *petræum*.
— *alpinum*.
Myrrhis odorata.
Bupleurum ranunculoides.
— *gramineum*.
Cherophyllum aureum.
Heracleum Sphondylium.
Laserpitium gallicum.
— *latifolium*.
Athamanta cretensis.
Bunium aureum.
Astrantia major.

Meum athamanticum.
Asperula longiflora.
Lonicera Xylosteum.
— *cærulea*.
Centranthus angustifolius.
Valeriana montana.
Adenostyles alpina.
Erigeron alpinus.
— *Villarsii*.
Aster alpinus.
Bellidiastrum Michelii.
Leucanthemum coronopifolium.
Solidago Virga-aurea.
Centaurea montana.
— *uniflora*.
Cirsium acaule.
— *eriophorum*.
— *montanum*.
— *heterophyllum*.
Leontodon hispidus.
Soyeria paludosa.
Tragopogon pratensis.
Hieracium staticefolium.
Phyteuma hemisphæricum.
— *orbiculare*.
Campanula thyrsoides.
— *barbata*.
— *glomerata*.
— *pusilla*.
Gentiana campestris.
— *ciliata*.
— *lutea*.
— *asclepiadea*.
Arctostaphylos Uva-ursi.
Vaccinium Myrtillus.
Pirola rotundifolia.
Cerinthe minor.
Onosma echioides.
Cynoglossum officinale.
Linaria supina.
Euphrasia minima.
Salvia pratensis.
Thymus Serpyllum.
Plantago alpina.
Daphne alpina.
Rumex scutatus.
Polygonum viviparum.
Euphorbia Cyparissias.

Thesium alpinum.
Populus Tremula.
Colchicum officinale.
 — *alpinum*.
Fritillaria delphinensis.
Veratrum album.
Polygonatum verticillatum.
Listera ovata.
Orchis conopea.
Sesleria cærulea.
Anthoxanthum odoratum.
Dactylis glomerata.

Phleum bulbosum.
Brachypodium pinnatum.
Briza media.
Scirpus compressus.
Carex glauca.
 — *vesicaria*.
Larix europæa.
Juniperus communis.
 — *Sabina*.
Selaginella spinulosa.
Botrychium Lunaria.

Vers 1900 mètres, un peu en amont du confluent de l'Oronaye et du Lauzanier, la vallée du Lauzanier change d'orientation et nous nous dirigeons vers le Sud en suivant le chemin voisin du thalweg. Les Mêlèzes sont de plus en plus clairsemés ; nous entrons définitivement dans la zone des prairies fauchables que nous avons traversée rapidement au vallon de Chancelaye. La célébrité qu'ont acquise celles du Lauzanier parmi les botanistes serait une raison suffisante pour fixer notre attention ; mais le vallon est si frais, le chemin si facile avec sa pente à peine sensible et ses bordures d'herbes fleuries, qu'il serait difficile de ne pas s'y attarder. On y récolte :

Anemone alpina var. Burseriana.
 — *baldensis*.
 — *narcissiflora*.
Ranunculus montanus.
Trollius europæus.
Brassica Richerii.
Biscutella lævigata.
Silene inflata.
Dianthus neglectus.
 — *silvestris Wulfen*.
Linum catharticum.
Anthyllis Vulneraria.
Trifolium alpinum.
 — *nigrescens*.
 — *alpestre*.
 — *montanum*.
Onobrychis montana.
Potentilla grandiflora.
Alchemilla vulgaris.
 — *alpina*.
Laserpitium Siler.
Peucedanum latifolium.
Meum athamanticum.

Angelica silvestris var. montana.
Bunium Bulbocastanum var. minus.
Myrrhis odorata.
Astrantia major.
Eryngium alpinum.
Heracleum Sphondylium.
Galium boreale.
Scabiosa pyrenaica (inclus. vestita Jordan).
Erigeron Villarsii.
Aster alpinus.
Arnica montana.
Cineraria aurantiaca.
Cirsium acaule.
 — *heterophyllum*.
Centaurea uniflora.
 — *montana*.
 — *alpestris*.
 — *axillaris*.
Hypochoeris uniflora.
Crepis grandiflora.
 — *paludosa*.
Hieracium scorzoneraefolium.

Hieracium præaltum.
 — *glanduliferum*.
 — *saxatile*.
 — *prenanthoides* et *form.*
Phyteuma orbiculare.
Campanula barbata.
 — *spicata*.
Arctostaphylos Uva-ursi.
Gentiana asclepiadea.
 — *lutea*.
 — *punctata*.
Cerinth minor.
 — — *var. alpina*.
Pedicularis verticillata.
 — *foliosa*.
Bartsia alpina.
Salvia pratensis.
Betonica hirsuta.
Stachys recta.
Ajuga genevensis.
Plantago fuscescens.

Armeria alpina.
Thesium alpinum.
Polygonum viviparum.
Daphne Mezereum.
 — *alpina*.
Salix pentandra.
 — *hastata*.
 — *cæsia*.
 — *Myrsinites*.
 — *glauca*.
 — *daphnoides*.
Colchicum alpinum.
Veratrum album.
Tulipa Celsiana form. alpestris.
Lilium Martagon.
Phalangium Liliago.
Allium Schoenoprasum.
Agrostis alpina.
Triticum repens.
Phleum pratense var. nodosum.
Botrychium Lunaria.

MM. Roux et C. Chatenier rapportent des coteaux rocheux exposés au Sud et à l'Est au-dessus du niveau des prairies :

Delphinium elatum.
Aconitum paniculatum.
Sisymbrium austriacum.
Helianthemum vulgare.
Dianthus silvestris.
Astragalus aristatus.
Athamanta cretensis.

Bupleurum ranunculoides.
Artemisia camphorata.
Achillea lanata.
Nepeta Nepetella.
Linaria italica.
Sesleria cærulea.

Dans les sagnes et, d'une manière générale, dans les parties très humides des prairies, on trouve surtout :

Caltha palustris.
Geum rivale.
Parnassia palustris.
Cirsium montanum.
 — *heterophyllum*.
Primula farinosa.
Swertia perennis.
Pedicularis verticillata.

Pedicularis gyroflexa.
Allium narcissiflorum.
Tofieldia calyculata.
Eriophorum alpinum.
 — *angustifolium*.
Scirpus compressus.
Carex sempervirens.
Briza media.

Les rochers de la cascade, explorés avec soin par quelques-uns, révèlent dès l'abord les particularités minéralogiques que nous avons signalées plus haut. La présence du *Rhododendron ferrugineum* démontre assez que le sol en est pauvre en calcaire assimilable. Il pousse en buissons peu nombreux formant tache sur l'en-

semble des prairies que domine la cascade. On récolte au même point :

Brassica Richerii.
Cardamine asarifolia.
Hugueninia tanacetifolia.
Viola biflora.
Silene rupestris.
Hedysarum obscurum.
Sorbus Chamæmespilus.
Rosa alpina.

Saxifraga Aizoon.
Epilobium montanum.
Achillea tanacetifolia var. stricta.
 — — *var. dentifera.*
Globularia cordifolia.
Avena Hostii.
Asplenium septentrionale.

On a dépassé les dernières granges; le ressaut de la cascade surmonté, on aborde le plateau alpin dominé par le massif du Lauzanier; une bergerie marque le commencement des pâturages et la zone des pelouses alpines. Le lac est à 2304 mètres; l'herborisation se maintient entre 2200 et 2500 mètres environ. On recueille :

Thalictrum alpinum.
Anemone Halleri.
 — *vernalis.*
Arabis bellidifolia.
 — *alpina.*
Draba aizoides.
Iberis Garrexiana.
Viola biflora.
Silene acaulis.
 — — *var. exscapa.*
Dianthus neglectus.
Alsine verna.
Cerastium arvense form.
Linum alpinum.
Dryas octopetala.
Trifolium alpinum.
Saxifraga exarata.
Bupleurum petraeum.
Galium helveticum.
Homogyne alpina.
Aster alpinus.
Erigeron uniflorus.
Bellidiastrum Michelii.
Leucanthemum alpinum.
Gnaphalium norvegicum.
Cirsium spinosissimum.
Taraxacum officinale.
Hieracium dasytrichium.
 — *elongatum var. gracilentum.*
Campanula pusilla.

Campanula Allionii.
Phyteuma pauciflorum.
Gentiana verna.
 — *acaulis.*
Primula marginata.
Myosotis alpestris.
Euphrasia alpina.
 — *minima.*
Pedicularis verticillata.
 — *rostrata.*
Globularia cordifolia.
Armeria alpina.
Rumex scutatus.
 — *alpinus.*
Salix serpyllifolia.
 — *reticulata.*
 — *herbacea.*
Juncus triglumis.
 — *trifidus.*
Luzula pediformis.
Carex sempervirens.
 — *capillaris.*
 — *curvula.*
 — *tenax.*
Alopecurus Gerardi.
Avena Hostii.
Poa alpina.
Botrychium Lunaria.
Selaginella spinulosa.

Sur les rochers et les pentes escarpées qui dominent le lac, au-dessus de 2310 mètres, la flore comprend surtout :

Aconitum Lycoctonum.

Draba aizoides.

— *pyrenaica.*

— *tomentosa.*

Viola biflora.

— *cenisia.*

— *calcarata.*

Silene rupestris.

— *acaulis.*

Arenaria ciliata.

Cerastium latifolium.

Alsine Cherleri.

Potentilla grandiflora.

— — *var. pedemontana.*

Alchemilla montana.

Saxifraga muscoides (et var.).

Oxytropis pyrenaica.

— *campestris.*

— *cyanea.*

Adenostyles albifrons.

— *leucophylla.*

Cineraria aurantiaca.

Berardia subacaulis.

Artemisia mutellina.

— *spicata.*

Antennaria carpathica.

Cirsium spinosissimum.

Primula marginata.

Linaria alpina.

Veronica Allionii.

Euphrasia hirtella.

Armeria alpina.

Euphorbia Cyparissias.

Gagea fistulosa.

Salix serpyllifolia.

Carex capillaris.

— *curvula.*

Avena Hostii.

Alopecurus Gerardi.

Aspidium Lonchitis.

Asplenium septentrionale.

Nos confrères renoncent difficilement à poursuivre leurs recherches. Il faut expédier les voitures les unes après les autres, et c'est à une heure avancée que les plus zélés reviennent à Barcelonnette.

EXCURSION DU SAMEDI 7 AOUT AU RAVIN DU RIOU-CHANAL
ET DE GAUDEISSART.

L'herborisation d'aujourd'hui complète celle du 5 au vallon d'Enchastrayes et la relie à celle que nous avons négligée le 2 dans la partie inférieure de la vallée du Bachelard. Il s'agit, en effet, d'aborder le revers Nord du massif de la Mée et du Lan par l'un de ses ravins principaux, celui du Riou-Chanal et d'atteindre par les Alaris le ravin de Gaudaussart dont les eaux se joignent à celles de l'Ubaye en face de Barcelonnette. Plusieurs de nos confrères ont herborisé aussi entre le ravin de Gaudaussart et le vallon d'Enchastrayes, sur le territoire des hameaux de la Conchette, du Vi-