Salzsäure. Bei Anwendung von Chlornatrium dagegen ist der Verlust an Salzsäure unbedeutend.

Die zum Nachweis der Weinsteinsäure mittelst Resorcins von Mohler¹⁾ empfohlene Reaction ist von G. Denigès²⁾ neuerdings studirt worden. Mohler selbst hat schon darauf hingewiesen, dass auch Nitrite und Nitrate eine Blaufärbung der schwefelsauren Resorcinlösung bewirken. Denigès findet, dass auch andere Oxydationsmittel, insbesondere Chlorate sehr deutlich färben.

Die Mohler'sche, mit concentrirter Schwefelsäure bereitete Resorcinlösung ist wenig haltbar und das von Mohler vorgeschriebene Erhitzen ist lästig. Denigès vermeidet diese Uebelstände, indem er eine Lösung von 2 g weissem Resorcin in 100 cc Wasser bereitet und mit $\frac{1}{2}$ cc concentrirter Schwefelsäure versetzt. Diese Lösung ist unbegrenzt lange haltbar. Die Reaction nimmt der Verfasser direct mit der zu untersuchenden Flüssigkeit vor; enthält diese oxydirende Agentien, so reducirt man zuerst mit Zink und Schwefelsäure.

Als Reagens auf Zucker empfiehlt A. Conrady³⁾ das Resorcin. Rohrzucker, sowie Traubenzucker und Lävulose geben schon in 0,1 % iger Lösung (10 cc), mit 0,1 g Resorcin und 1 cc Salzsäure 3 Minuten lang gekocht, eine Rosa- bis Carminfärbung. Die Lösung trübt sich beim Erkalten, wird aber nach dem Neutralisiren mit Kalilauge wieder klar.

Um Milchzucker auf einen eventuellen Gehalt an Rohrzucker zu prüfen, löst man 1 g Milchzucker in 10 cc Wasser, versetzt mit 0,1 g Resorcin und 1 cc Salzsäure und kocht 5 Minuten.

Bei Abwesenheit von Rohrzucker darf sich die Lösung nicht roth färben. Auf diese Weise lässt sich auch Harnzucker nachweisen.

Einige Reactionen für Traubenzucker, Aldehyde und Ketone führt A. Jaworowsky⁴⁾ an.

Analog der Pikrinsäure gibt auch Orthonitrophenol beim Erwärmen mit alkalischer Traubenzuckerlösung Braunfärbung. Nitrobenzol des Handels färbt unter gleichen Bedingungen die Glukoselösung roth, dann schmutzig braun.

1) Vergl. diese Zeitschrift **30**, 620.

2) Bull. Soc. Pharm., Bordeaux **35**, 161; durch Zeitschrift d. allgem. österr. Apotheker-Vereins **49**, 626.

3) Apotheker-Zeitung 1894, S. 984; durch Zeitschrift d. allgem. österreich. Apotheker-Vereins **49**, 62.

4) Pharm. Post 1893, S. 549; durch Pharm. Centralhalle **35**, 50

Werden 3 cc verdünnter Schwefelsäure mit 0,1 g vanadinsaurem Natrium versetzt und mit Glukoselösung überschichtet, so tritt ein grüner oder blauer Ring auf.

Wird Glukoselösung mit wenig Jodsäure und Natronlauge gekocht, die erkaltete Flüssigkeit angesäuert und mit Ammoniak überschichtet, so bildet sich ein dunkler Niederschlag (Jodstickstoff).

Wird Glukoselösung mit Jaworowsky's Ammoniakreagens¹⁾ erwärmt, so bildet sich ein gelber, später grau werdender Niederschlag, bestehend aus Calomel und metallischem Quecksilber; eine ähnliche Reaction tritt mit Nessler'schem Reagens ein (der Niederschlag ist hier zuerst rothbraun, dann braun, schmutziggrün, zuletzt grau). Ganz damit übereinstimmend ist folgende Reaction; Wird Calomel mit 10 procentiger Jodkaliumlösung kalt behandelt und das Filtrat mit Glukoselösung und Natronlauge erwärmt, so entsteht ein grauer Niederschlag (metallisches Quecksilber).

Alle diese Reactionen gelten auch für Aldehyde und Ketone, mit Ausnahme der Jodsäure-Reaction.

Zum Nachweis des Zuckers empfiehlt Neitzel²⁾ bei der bekannten Reaction mit α -Naphthol dieses durch Kampher zu ersetzen. Der Nachweis selbst von Spuren von Zucker gelingt eben so gut. Der Ersatz des α -Naphthols durch Kampher hat den Vortheil, dass auf letzteren die Anwesenheit kleiner Mengen von Nitraten ohne Einfluss ist.

Einige Reactionen des Formaldehyds theilt T. H. Lee³⁾ mit. Kaliumpermanganat wird durch Formaldehyd sofort reducirt; letzterer wird hierbei zu Kohlensäure und Wasser oxydirt. Eine heisse Lösung von Eisenchlorid erhält bei Zusatz von Formaldehyd eine dunklere Färbung. Lässt man die Lösung erkalten und erhitzt dann wieder, so fällt nach Zufügen von Ammoniak basisch ameisensaures Eisenoxyd aus.

Die Reduction von ammoniakalischen Silberlösungen scheint in zwei Phasen vor sich zu gehen.

Das Silber scheidet sich dann als Metallspiegel aus

Bei der vollständigen Oxydation des Formaldehyds scheidet sich das Silber in Pulverform aus.

1) 1 Theil Quecksilberchlorid. 1 Theil kohlensaures Natrium, 4 Theile Natriumchlorid, 30 Theile Wasser.

2) Deutsche Zuckerindustrie 17, 441; durch Chemiker-Zeitung 18, R. 93.

3) Chem. News 72, 153.