DER PHYSIK UND CHEMIE.

NEUE FOLGE BAND VI.

I. Das electrische Leitungsvermögen der wässrigen Lösungen von den Hydraten und Salzen der leichten Metalle, sowie von Kupfervitriol, Zinkvitriol und Silbersalpeter; von F. Kohlrausch.¹⁾

Inhalt. Einleitung. I. Experimenteller Theil. 1. Neue Widerstandsgefässe. — 2. Der Neeff'sche Hammer als Stromerreger. — 3. Die untersuchten Flüssigkeiten. — 4. Die beobachteten Leitungsvermögen mit ihren Temperaturcoefficienten. — 5. Temperaturcoefficienten zweiter Ordnung. — 6. Aetznatron und doppelt Schwefelsaures Kali sowie Schwefelsaures Natron in weiteren Temperaturgrenzen. — 7. Heiss gesättigte Lösungen. — 8. Einfluss des Lichtes. — 9. Frühere Beobachtungen. II. Praktischer Theil. 10. Tabellen für den Gebrauch. — 11. Grösstes Leitungsvermögen der einzelnen Electrolyte. — 12. Abhängigkeit des Leitungsvermögens vom Gehalte der Lösungen. — 13. Formeln, insbesondere für verdünnte Lösungen. — 14. Flüssigkeiten, welche sich als Widerstandsetalons empfehlen. III. Theoretischer Theil. 15. Anordnung der Lösungen nach der Anzahl der gelösten Moleküle. — 16. Verdünnte Lösungen. — 17. Ergänzung der molecularen Leitungsvermögen nach Lenz. — 18. Gruppierung der molecularen L. — 19. Die Hittorf'schen Wanderungszahlen. — 20. Allgemeine Ansichten über die Leitung wässriger Lösungen. — 21. Gesetz von der unabhängigen Wanderung der Ionen. — 22. Electrolyte aus zwei einwerthigen Ionen. — 23. Zweiwerthige positive mit einwerthigen negativen Ionen. — 24. Einwerthige positive mit zweiwerthigen negativen Ionen. — 25. Sulfate von Magnesium, Zink und Kupfer. — 26. Aetzalkalien. — 27. Uebersicht über die molecularen L. der Ionen. — 28. Gang des L. mit dem Moleculargehalt der Lösungen. — 29. Ammoniakflüssigkeit. — 30. Saure Salze. — 31. Gesetze der Temp.

1) Die Ergebnisse dieser Arbeit sind grösstentheils in zwei Mittheilungen an die K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (1876, 17. Mai und 1877, 4. April) niedergelegt.

Coëfficienten. — 32. Umwandlung der Mol.-Zahlen und L. in absolutes Maass. — 33. Die absoluten Geschwindigkeiten der electrolytischen Wanderung. — 34. Die absoluten Geschwindigkeiten in verdünnten Lösungen. — 35. Die treibenden Kräfte mechanisch gemessen. — 36. Vergleichung der electrolytischen mit der capillaren Reibung.

Vor einiger Zeit haben O. Grotrian und ich gemeinschaftlich die wässerigen Lösungen von den Chloriden der wichtigsten Leichtmetalle auf ihr electrisches Leitungsvermögen untersucht.¹⁾ Der ebenfalls von uns damals behandelten Salpetersäure habe ich später eine grössere Anzahl von Säuren folgen lassen.²⁾ Hieran schliesst sich offenbar die Aufgabe, ein vollständiges Bild von einer grösseren zusammenhängenden Gruppe von Körpern zu gewinnen, mit anderen Worten, von den Leichtmetallen noch andere Salze als die Chloride zu untersuchen. Diess geschieht in der vorliegenden Arbeit.

Alle möglichen Combinationen konnte man nicht wohl durchnehmen, desswegen ist eine Auswahl so getroffen worden, dass die Verbindungen eines Metalles, des Kaliums, vollständig, die anderen in geeigneter Beschränkung untersucht wurden.

Ausser den leichten Metallsalzen habe ich, theilweise zur Vergleichung, theilweise wegen ihrer praktischen Bedeutung noch Kupfervitriol und Silbersalpeter hinzugenommen und Beetz' Beobachtungen an Zinkvitriol ergänzt.

Endlich sind den früheren Beobachtungen noch einige an ganz concentrirten Kochsalzlösungen und an einer Reihe von Chlorlithiumlösungen hinzugefügt worden.

Im Ganzen sind neu zur Beobachtung gekommen 158 Lösungen von 40³⁾ Körpern.

1) Pogg. Ann. CLIV. p. 215. 1875.

2) Pogg. Ann. CLIX. p. 233. 1876.

3) Die Hydrate von Kalium, Natrium, Lithium und Barium;

Die Jodide von Kalium, Ammonium, Natrium, Lithium;

Die Nitrate von Kalium, Ammonium, Natrium, Barium, Calcium, Magnesium, Silber;

Die früheren Untersuchungen umfassten die Chloride der acht verbreiteten leichten Metalle und die Säuren sämmtlicher Salze, so dass jetzt ein Bild des electrischen Leitungsvermögens von mehr als 50 Stoffen in 260 wässrigen Lösungen vorliegt.

Man wird also erwarten dürfen, dass die Gesetzmässigkeiten der Leitung, wenn solche vorhanden sind, sich zu erkennen geben, und der Versuch, diesen Verhältnissen näher zu treten, bietet wirklich nicht unwesentliche Erfolge. Indem man die Lösungen nach der Anzahl der in der Volumeneinheit gelösten Molecüle zusammenstellt, begegnet man einer Uebersichtlichkeit der Leitungsvermögen, grösser glaube ich, als man dieselbe nach den bisherigen Kenntnissen des Gegenstandes erwarten konnte. Die nahe Uebereinstimmung der Leitungsvermögen einer Anzahl von Säuren, welche ich durch die Zusammenstellung electrochemisch gleichwerthiger Lösungen fand, steht nicht mehr vereinzelt da, sondern ergibt sich angenähert auch bei vielen Salzen aus Stoffen, welche chemisch nahe verwandt sind.

Ueberhaupt zeigen verschiedene Elemente in ihren Verbindungen Eigenthümlichkeiten des Leitungsvermögens,

Die Sulfate von Kalium, Ammonium, Natrium, Lithium, Magnesium, Zink, Kupfer;

Die Carbonate von Kalium, Natrium und Lithium; ferner essigsaures Kalium und Natrium, Brom-, Cyan- und Fluorkalium, Chlornatrium und Lithium, oxalsaures Kali; dann saures schwefelsaures, phosphorsaures und kohlsaures Kali; endlich Aetzammoniak nebst kohlsaurem, essigsaurem und Cyanammonium, die drei letztgenannten aber nur qualitativ.

Nach den Metallen geordnet ergeben sich also:

KOH, KBr, KJ, KCN, KF, KNO₃, KC₂H₃O₂, K₂SO₄, K₂CO₃, K₂C₂O₄, KHSO₄, KHCO₃, KH₂PO₄;

NH₃, NH₄J, (NH₄CN), NH₄NO₃, (NH₄C₂H₃O₂), (NH₄)₂SO₄, ((NH₄)₂CO₃);

NaOH, NaCl, NaJ, NaNO₃, NaC₂H₃O₂, Na₂SO₄, Na₂CO₃;

LiOH, LiCl, LiJ, Li₂SO₄, Li₂CO₃;

BaO₂H₂, BaN₂O₆; MgN₂O₆, MgSO₄;

CaN₂O₆; ZnSO₄; CaSO₄; AgNO₃.

welche dieselben charakterisiren, so dass man künftig mit einiger Annäherung die Leitungsvermögen vieler Electrolyte voraussagen kann.

Die grösste Beachtung aber verdient, und zwar nicht nur für die Electrolyse sondern für die ganze Chemie der Lösungen, ein Gesetz, welches für verdünnte Lösungen allgemein zu gelten scheint, und welches man das Gesetz von der unabhängigen Beweglichkeit der Bestandtheile (Jonen) nennen kann. In verdünnter Lösung nämlich kommt einem bestimmten Elemente oder einer Atomgruppe, welche zusammen wandert, ein bestimmter Widerstand zu, gleichgültig, aus welcher Verbindung das Theilmolecul electrolysirt wird. Man kann also jedem Jon eine bestimmte Beweglichkeit im Wasser zuschreiben.

Dieses Gesetz findet eine hervorragende Stütze darin, dass die ausgezeichneten Untersuchungen Hittorf's über die gegenseitigen Weglängen der Jonen sich demselben vollständig anschliessen.

Auf diese Beiträge zu einer Mechanik der Electrolyse werde ich in der zweiten Hälfte dieses Aufsatzes zu sprechen kommen. Es würde im Anschluss hieran nahe liegen, auch die eigentlich theoretische Seite der Electrolyse zu beleuchten, z. B. die bestimmteren Vorstellungen anzuwenden, welche Clausius über diesen Vorgang mitgetheilt hat, die Beziehungen zwischen mechanischer Reibung und Leitungswiderstand zu verfolgen, deren Beobachtung wir hauptsächlich Wiedemann und später Grotrian verdanken. Auch die höchst beachtenswerthen Ansichten von Hittorf, Quincke, Bourgoin, neuerlich auch von R. Lenz über eine Theilnahme des Lösungsmittels an der Electrolyse durch Hydratbildung verdienen im Zusammenhange mit den erweiterten Kenntnissen des Leitungswiderstandes neu erwogen zu werden. Endlich liegt noch die Aufgabe vor, die chemischen Folgerungen, welche sich aus dem Leitungswiderstande der Lösungen ziehen lassen, zu entwickeln, Folgerungen, die ohne Zweifel von Bedeutung sind.

Wenn ich auf diese höheren Aufgaben hier nur ge-

gelegentlich streifend eingehe und mich vorwiegend auf diejenigen Schlüsse beschränke, welche sich von der unmittelbaren Erfahrung wenig entfernen, so liegen die Gründe davon einmal rein äusserlich in dem schon so grossen Umfange des Aufsatzes, da das Eingehen auf so schwierige Punkte eine ausführliche Darstellung erfordern würde. Zweitens aber möchte ich bei dem Eintritt in die Theorie noch weiteren, theilweise in der Beobachtung mir schon vorliegenden Erfahrungsstoff benutzen.

Die erste Hälfte des Aufsatzes ist rein experimentellen und praktischen Inhalts. Zunächst wird eine weitere Vereinfachung des Verfahrens der Widerstandsbestimmung mitgetheilt, und dann folgt das Beobachtungsmaterial und die Anpassung desselben für eine bequeme Benutzung.

Es ist dabei vorauszuschicken, dass die Herren Dr. Tollinger, Dr. Wolff und A. Schleiermacher die praktischen Arbeiten mehrfach in dankenswerther Weise unterstützt haben. Auch Herrn Dr. Rössler muss ich hier abermals für seine freundliche Hülfe danken. Ueber diese Theilnahme an den Arbeiten werde ich bei den einzelnen Gelegenheiten berichten.

I. Experimenteller Theil.

1. Neue Widerstandsgefässe und deren Prüfung.

Indem wegen des Verfahrens der Widerstandsbestimmung im allgemeinen auf die früheren Mittheilungen¹⁾ verwiesen werden kann, haben sich im Verlaufe der Arbeiten doch einige Vereinfachungen in den äusseren Hilfsmitteln ergeben.

Einmal wünschte ich seltene und kostbare Stoffe schon in geringen Mengen untersuchen zu können. Zu diesem Zwecke sind die Glasgefässe, in denen die Widerstände bestimmt werden, theilweise abgeändert worden. Man findet

1) Insbesondere Pogg. Ann. CLIV. p. 2. 1875; CLIX. p. 235. 1876.

die neuen Formen in Taf. I, Fig. 1—3 in $\frac{1}{3}$ Grösse abgebildet.

Das eine Gefäss besteht aus zwei cylindrischen Bechern, welche sich nach unten trichterförmig verjüngen und demnächst durch ein gebogenes Rohr — ich habe für verschieden gut leitende Flüssigkeiten drei solche Gefässe mit Rohrweiten von etwa 3, 5 und 9 mm — verbunden sind. Auf dem Rande der Trichter stehen platinirte Platin-electroden von kugelschaliger Gestalt; in der Nähe der Mitte sind die letzteren mit einer kleinen Durchbohrung versehen, damit man sie leicht luftfrei einsetzen kann. Die Stiele gehen durch Deckel aus Hartkautschuk.

Die zweite Form stimmt im wesentlichen, abgesehen von der Grösse, mit den früheren Gefässen überein. Die eingeschliffenen Stöpsel erlauben aber auch, leichtflüchtige Substanzen ohne Unbequemlichkeit zu untersuchen und ohne Gefahr einer Concentrationsänderung in hoher Temperatur zu beobachten. Die Platindrähte sind in das Glas eingeschmolzen. Ihre Zuleitungsklemmen werden von einem über die Hälse der Gefässe übergeschobenen Stück Hartkautschuk getragen.

Die dritte Form endlich ist für sehr schlecht leitende Flüssigkeiten bestimmt. Die Electroden bedecken jede etwa ein Drittel der Wandung. Da dieselben an das Glas angeschmolzen sind, so wird trotz dem geringen Abstände derselben voneinander eine genügend unveränderliche Stellung verbürgt.

Diese Gefässe sind von Herrn Günther Heym in Stützerbach hergestellt worden.

Die Flüssigkeitsmenge, welche zur Füllung genügt, beläuft sich bei diesen neuen Gefässen auf nur etwa 12 bis 25 ccm, während früher die zehnfache Menge erforderte wurde.

Ebenso aber haben die platinirten Electroden (5 bis 10 qcm) eine bedeutend kleinere Fläche, und es war deswegen zu untersuchen, in wie weit diese Verminderung der Fläche sich mit dem Ausschluss der Polarisation durch

die Wechselströme verträgt. Blanke Flächen von der angegebenen Grösse geben schon zu erheblichen Fehlern Veranlassung.¹⁾ Nun habe ich früher gezeigt (Jubelband, p. 301), dass die Platinirung eine vielfach grössere wirk-same Fläche hervorbringt; wie weit dieselbe aber im vor-liegenden Falle genügt, musste besonders festgestellt werden.

Zu dieser Prüfung kann zunächst eine vergleichende Widerstandsbestimmung mit Wechselströmen von verschie-dener Periode dienen.

Ich führe folgende Beispiele an, die sich auf ver-schiedene Lösungen von Zinkvitriol — einer Substanz, die bei constantem Strome zwischen Platinelectroden mit starker Polarisat-ion behaftet ist — beziehen. Man fand, bei der Anzahl N der Stromwechsel in der Secunde fol-gende, auf gleiche Temperatur zurückgeführte Widerstände.

Gefäss XI. (Fig. 1)		Gefäss XII. (Fig. 2)	
N	Widerstand.	N	Widerstand.
140	232,61 Siem.	160	187,09 Siem.
100	232,65	40	187,11
60	234,21	20	187,75

Hiernach macht sich bei geringeren Geschwindigkeiten des Stromwechsels eine Wirkung der Polarisat-ion als Ver-mehrung des scheinbaren Widerstandes bemerklich. Doch ist der Fehler nicht so gross, dass man nicht bei den in der gewöhnlichen Messung gebrauchten grösseren Geschwin-digkeiten eine Sicherheit auf 1 Proc. unbedenklich verbür-gen könnte, was für viele Zwecke genügt.

Diese Behauptung wird bestätigt durch die Ermittlung der Widerstandscapacität²⁾ w_0 der Gefässe mittels verschie-

1) Vgl. K. u. Nippoldt. Pogg. Ann. CXXXVIII. p. 297. 1869; auch CXLVIII. p. 143. 1873.

2) So nenne ich den Widerstand des Quecksilbers von 0°, welches ein Gefäss zwischen den Electroden ausfüllt.

dener in grossen Gefässen untersuchter Flüssigkeiten, welche Folgendes ergab.

Gefäss.	Flüssigkeit.	w_0	Mittel.	Abweichung.
IX	HBr 15 ⁰ / ₀	0,005966	0,005996	± 0,000030
	ZnSO ₄ 20 ⁰ / ₀	0,006025		
X	CaN ₂ O ₆ 15 ⁰ / ₀	0,002530	0,002528	± 0,000002
	ZnSO ₄ 20 ⁰ / ₀	0,002527		
XI	NaJ 5 ⁰ / ₀	0,001039	0,001040	± 0,000001
	ZnSO ₄ Max.	0,001040		
XII	ZnSO ₄ Max.	0,0008903	0,0008910	± 0,0000008
	ZnSO ₄ 20 ⁰ / ₀	0,0008918		

Die Abweichung vom Mittel beträgt höchstens $\frac{1}{2} \frac{0}{0}$.

2. Der Neeff'sche Hammer als Stromerregger.

Eine weitere, bei der vorliegenden Untersuchung übrigens noch wenig benutzte Vereinfachung des Verfahrens bietet die Anwendung eines unwesentlich abgeänderten Dubois'schen Schlittenapparates anstatt des Sinusinductors (Jub. p. 290). Die Stromerregung mittels des in einem Multiplikator rotirenden Magnets war angewendet worden, um durch den raschen Wechsel von Strömen, welche einzeln genau gleiche Electricitätsmengen in umgekehrter Richtung befördern, die Polarisierung auszuschliessen.

Diese verlangte Eigenschaft besitzen aber auch der Oeffnungs- und Schliessungsstrom des gewöhnlichen Inductionsapparates. Freilich verlaufen diese beiden Ströme viel ungleichmässiger und plötzlicher als diejenigen des rotirenden Magnetes, ja sogar beide untereinander verschieden. Aber man kann die Ungleichmässigkeit durch Anwendung eines massiven Eisenkernes anstatt des Drahtbündels, durch einen Quecksilberunterbrecher und nöthigenfalls noch durch eine weitere Dämpfung beträchtlich verringern.

Der Versuch zeigte, dass die Inductionsströme eines gewöhnlichen Schlittenapparates mit solidem Kerne als Stromquelle vollkommen anwendbar sind, indem die hier-

mit gefundenen Widerstände so gut wie vollständig mit den Angaben des Sinusinductors übereinstimmen. So fand ich mit letzterem das Leitungsvermögen einer Zinkvitriollösung $k \cdot 10^8 = 414$, von einer Lösung von Kalksalpeter gleich 1809. Der Schlittenapparat lieferte die Zahlen 414 bis 415 und 1811. Hierbei wurden die Rollen des Schlittenapparates in sehr verschiedenen Abständen voneinander angewandt, so dass die Dynamometerausschläge für gleiche Widerstandsdifferenzen bis zum 17fachen schwankten. Die gefundenen Unterschiede aber blieben durchaus innerhalb der Beobachtungsfehler. Ebenso fand sich bei der Untersuchung einer concentrirten Kochsalzlösung sowie einiger Lösungen von salpetersaurem Baryt (durch Hrn. Schleiermacher) mit beiden Stromquellen eine vollkommene Uebereinstimmung der Resultate.¹⁾

Da ein Schlittenapparat sich in jedem physikalischen Institut vorfindet, so ist hiermit das Verfahren der Wechselströme allgemein zugänglich gemacht.

Ich kann mir nicht versagen, hervorzuheben, dass durch die vorigen Versuche zugleich abermals eine Bestätigung des Ohm'schen Gesetzes für weitere Grenzen geliefert worden ist, denn die electromotorischen Kräfte, besonders mit Rücksicht auf die verschiedenen Phasen des einzelnen Inductionsverlaufes waren jedenfalls von sehr verschiedener Grösse.

Sollten also Erscheinungen, wie sie neuerdings von den Herren Christiani²⁾ und Herwig³⁾ bei dem Durchgange einzelner inducirter Stromstösse durch Electrolyte beobachtet worden sind, auch bei einzelnen Inductionsströmen von der von mir angewandten Stärke auftreten,

1) Durch eine Bemerkung in der eben erschienenen Arbeit von Exner und Goldschmidt über den Einfluss der Temperatur auf das Leitungsvermögen wird diess bestätigt. (Wied. Ann. IV. p. 417. 1878.)

2) Ueber irreciproke Leitung. Berlin 1876.

3) Pogg. Ann. CLIX. p. 61. 1876.

so sind sie in diesem Falle sicher nicht einer mangelhaften Gültigkeit der Ohm'schen Gesetze zuzuschreiben.

3. Die untersuchten Flüssigkeiten.

Die Materialien sind in grösstmöglicher Reinheit fast sämtlich aus den Laboratorien der Herren Merck in Darmstadt und Trommsdorf in Erfurt bezogen.

Bei der Herstellung und chemischen Untersuchung der Lösungen unterstützte mich in freundlichster Weise Hr. Dr. Wolff im chemischen Institut der hiesigen Universität. Ich verdanke demselben je die concentrirteste Lösung von den Stoffen KF , KNO_3 , KHSO_4 , KH_2PO_4 , NaJ , NaNO_3 , Na_2CO_3 , LiOH , NH_4J , LiJ , CaN_2O_6 , MgN_2O_6 .

Hierbei wurde die dem käuflichen Aetzlithion anhaftende grosse Menge von Kohlensäure durch Kalkwasser entfernt; das saure schwefelsaure Kali wurde aus äquivalenten Mengen von K_2SO_4 und H_2SO_4 gemischt; die Zusammensetzung des sauren phosphorsauren Kali nach obiger Formel wurde durch Analyse bestätigt; der käufliche Kalksalpeter reagierte alkalisch und wurde mit HNO_3 neutralisirt.

Jodlithium und kohlensaures Natron enthielten Spuren von Chlor. Der Magnesiumsalpeter war mit etwa $\frac{1}{20}$ BaN_2O_6 verunreinigt. Ammoniumsulfat und Lithiumcarbonat hinterliessen bei dem Auflösen einen kleinen Rückstand. Jodammonium war von freiem Jod gelb gefärbt.

Durch Auflösen gewogener Mengen trockenen Salzes wurden bereitet die Lösungen von KBr , KJ , KF , KCN , KNO_3 , $\text{KC}_2\text{H}_3\text{O}_2$, $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$, K_2CO_3 , KHCO_3 , NaJ , $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$, Na_2SO_4 , LiCl , Li_2SO_4 , Li_2CO_3 , NH_4J , NH_4NO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, BaN_2O_6 , BaO_2H_2 , ZnSO_4 , CuSO_4 .

Die Zinklösung war nach dem Vorgange von Beetz mit Zinkhydrat längere Zeit gekocht worden, wobei eine merkliche Menge von der letzteren Substanz sich auflöste. Nach dem Erkalten schied sich eine kleine Menge eines offenbar basischen Salzes ab.

Die Lösungen von Aetzkali und Aetznatron liess Hr. Dr. Rössler im chemischen Laboratorium des Darmstädter Polytechnicums titriren.

Jodlithium und Aetzlithion wurden von Hrn. Dr. Wolff als Li_2SO_4 , salpetersaures und kohlen-saures Natron und kohlen-saures Lithion durch Eindampfen und Trocknen bestimmt. Die salpetersaure Magnesia wurde als $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$, der salpetersaure Kalk mit $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ ausgefällt; letzterer als Carbonat gewogen. Im ersteren Falle habe ich das verunreinigende Bariumnitrat als äquivalente Menge Magnesiumnitrat mitgerechnet.

Die Lösungen von Kupfervitriol sämmtlich, sowie von Chlorlithium, Jodkalium und Salpeter die Lösungen über 10 Proc. sind von Hrn. Dr. Tollinger hergestellt und untersucht worden. Diese Chlorlithiumlösungen enthielten eine Spur Eisen.

Nach dem specifischen Gewicht berechnet wurde der Procentgehalt der nachträglich untersuchten nahe gesättigten Kochsalzlösungen aus der Tabelle von Gerlach.¹⁾ Ferner beruht der Gehalt der Ammoniaklösungen, unter Rücksichtnahme auf die Gewichtsverhältnisse bei der Mischung, auf der Tabelle von Carius.²⁾ Ich bemerke hierbei, dass die stärkste Ammoniaklösung einen Siedepunkt von 25° zeigte und dass 35 g derselben, vorsichtig eingedampft, höchstens 1 mg festen Rückstand ergaben.

Im allgemeinen sind aus der concentrirtesten Lösung die übrigen Lösungen von mir durch Verdünnen mit gewogenen Wassermengen bereitet worden. Ausgenommen sind die Lösungen von Li_2CO_3 0,2 Proc., von $\text{KC}_2\text{H}_3\text{O}_2$, KJ und KNO_3 5 und 10 Proc. und NH_3 0,1 und 0,4 Proc., welche selbstständig, und zwar die letzteren drei aus anderen Originalsubstanzen wie die übrigen entsprechenden Lösungen hergestellt worden sind.

Bei dem essigsauren Natron wurden die Lösungen

1) Ztschr. für analytische Chemie, VIII. p. 281. 1869.

2) Hoffmann, Tabellen p. 47.

von 3,76 und 7,51 Proc. aus derjenigen von 20,22 Proc. durch Verdünnung hergestellt. Die übrigen sind nach dem specifischen Gewicht dieser Reihe angeschlossen worden. Die Lösungen reagirten schwach alkalisch.

Bei der Herstellung des 10procentigen KH_2PO_4 ist wahrscheinlich vergessen worden, die Originalsäure und das verdünnende Wasser vor dem Ausgiessen zu schütteln, was durch das kleine specifische Gewicht und das gefundene Leitungsvermögen noch wahrscheinlicher gemacht wird.

Von den Bestimmungen des specifischen Gewichtes haben mir die Herren Tollinger und Schleiermacher eine Anzahl abgenommen.

Zum Theil, nämlich meistens bei solchen Flüssigkeiten, deren geringe Menge die Widerstandsbestimmung in einem der kleinen Gefässe (p. 5) geboten hatte, benutzte man die Mohr'sche Waage; die betreffenden Zahlen sind nur mit 3 Decimalen mitgetheilt.

Im allgemeinen habe ich wie früher die Temperatur 18° nahe inne gehalten. Wo aber zur Controle eine genauere Vergleichung mit den vorhandenen Tabellen, die sich meist auf 15° beziehen, gewünscht wurde, liegt das beobachtete specifische Gewicht nahe bei letzterer Temperatur.¹⁾

Zur Anbringung der kleinen Correction auf genau

1) Von bedenklichen Abweichungen meiner Werthe gegen sonstige Angaben wüsste ich nur das essigsaure Kali zu nennen, welches von Hittorf in zwei Lösungen dichter angegeben wird. Desgleichen aber weniger stark das essigsaure Natron in höheren Gehalten und das Jodlithium (Kremers). Umgekehrt gibt H. Schiff die Lösungen von Magnesiumnitrat etwas weniger dicht an. Sind die Unterschiede von meinen Zahlen verschuldet, so würden die Lösungsgehalte der beiden essigsauren Salze zu gross angegeben sein, bei dem Kalisalz um etwa $\frac{1}{15}$, u. s. w. Bei der hygroskopischen Natur des Kaliumacetates, welches ich wegen Säureverlust nicht im Vacuum zu trocknen wagte, welches übrigens äusserlich ganz trocken erschien, ist ein Irrthum allerdings leichter möglich.

18° bez. 15° dienten, soweit sie vorhanden, die Beobachtungen Gerlach's über die Ausdehnung von Salzlösungen.¹⁾ Im übrigen habe ich die Ausdehnung als Function des specifischen Gewichtes nach den von Gerlach beobachteten Zahlen im Mittel dargestellt und hiernach corrigirt, wobei aber, wenn der zu corrigirende Temperaturunterschied beträchtlich war, die 4. Decimale concentrirter Lösungen um mehrere Einheiten unsicher werden kann.

Einzelne Flüssigkeiten wurden bei der Dichtigkeitsbestimmung vergessen. In diesem Falle ist der (eingeklammerte) Werth aus den übrigen interpolirt oder aus einer Gerlach'schen Tabelle genommen worden.

Als Einheit gilt überall Wasser von 4°.

4. Die beobachteten Leitungsvermögen und ihre Temperaturcoefficienten.

Alle Ergebnisse der Beobachtung finden sich in Tab. I.

Der Procentgehalt bedeutet Gewichtstheile wasserfreien Salzes in 100 Gewichtstheilen der Lösung.²⁾

Ueber die specifischen Gewichte vgl. § 3.

Die 6. Spalte enthält die beobachteten Leitungsvermögen, Quecksilber von 0° gleich 10^8 gesetzt, nebst den Beobachtungstemperaturen und dem Gefäss, in welchem der Widerstand bestimmt wurde. Nach den

1) G. Th. Gerlach, Salzlösungen. Freiberg 1859.

2) Weil die Electricitätslehre zur Definition des Widerstandes den Leiter ausmisst und nicht sein Gewicht zu Grunde legt, so würde man besser auch die Lösungen nicht nach der in der Gewichtseinheit sondern nach der in der Volumeneinheit gelösten Menge des Electrolytes definiren. Indessen erwächst dann aus der Temperatúrausdehnung eine Unbequemlichkeit, ja Unnatürlichkeit. Bei der Bestimmung des Temperaturcoefficienten für das Leitungsvermögen müsste man in verschiedenen Temperaturen einer Lösung Salz oder Wasser zusetzen, um sie unverändert zu erhalten. Und zwar sind diese Correctionen keineswegs verschwindend, denn beispielsweise eine Kochsalzlösung, welche bei 0° in 100 ccm 30,0 g enthält, hat bei 10° in 100 ccm nur noch 28,6 g.

Widerstandscapacitäten der Gefässe¹⁾ kann man hieraus den beobachteten Widerstand entnehmen. Ich bemerke noch einmal, (vgl. § 1) dass die Gefässe IX bis XIII die kleineren Elektroden enthielten, welche vielleicht die Polarisatation nicht so vollständig wie die grossen ausschliessen.

Aus den beiden Leitungsvermögen in der Nähe von 18° und 26° ist dann das Leitungsvermögen k_{18} für genau 18° und der Temperaturcoefficient $\frac{\Delta k_{22}}{k_{18}}$, d. h. die mittlere Zunahme des Leitungsvermögens zwischen nahe 18° und 26° in Theilen von k_{18} berechnet werden. In den einzelnen Fällen, in denen noch weitere Beobachtungstemperaturen vorlagen (vgl. § 5) ist der sich hieraus ergebende zweite Differentialquotient zur Reduction des Leitungsvermögens auf genau 18° und des Temperaturcoefficienten auf genau 22° mitbenutzt worden.

Diese sämtlichen Rechnungen wurden mit einer Stelle mehr ausgeführt, als deren hier mitgetheilt werden.

In der dritten Spalte endlich wird die Anzahl m der electrolytischen Molecüle in der Volumeneinheit der Lösung bei 18° gegeben. Indem ich auf die Bemerkungen in § 15 verweise, sei hier nur erwähnt, dass man die Zahl m erhält als den Quotienten der in 1 ccm Lösung enthaltenen Milligramme des Electrolytes, getheilt durch das chemische Aequivalentgewicht der Substanz. Unter letzterer Grösse verstehen wir bei Verbindungen einwerthiger Bestandtheile das von der Chemie angenommene Moleculargewicht; bei Verbindungen mit zweiwerthigen Bestandtheilen halbiren wir das chemische Moleculargewicht, indem wir zum Beispiel $\frac{1}{2}(\text{BaCl}_2)$, $\frac{1}{2}(\text{MgSO}_4)$, $\frac{1}{2}((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4)$ u. s. w. schreiben. Die Aetzalkalien und die sauren Salze sind mit dem ganzen chemischen Moleculargewicht gerechnet.

Bezeichnet also p das in einem Gewichtstheile der

1) Pogg. Ann. CLIX. p. 235 und dieser Aufsatz p. 8.

Lösung enthaltene Gewicht des Electrolytes (d. h. Procentgehalt getheilt durch 100), s das specifische Gewicht der Lösung, A das oben definirte Aequivalentgewicht, so ist die Molecülzahl m :

$$m = 1000 \frac{ps}{A}.$$

Für die Atomgewichte der Elemente sind womöglich die Stas'schen Zahlen unter der Annahme von Sauerstoff $O = 16,00$ gewählt worden.¹⁾

Tabelle I.

	Gewichte- Procente	Mol.-Zahl 1000 <i>m</i>	Specifisches Gewicht		Leitungsvermögen <i>k</i> · 10 ⁸		$\frac{\Delta k}{k_{19}}$	
			Beob.	Bei 18 od. 15°	Beob.	Bei 18°		
Chloride. ²⁾								
Na Cl	24,92	5066	{ 1,1893 17,70	1,1892 (18°)	{ 0,04 ⁰	1256 III.	1994	0,0228
					{ 17,56	1975		
					{ 85,07	2795		
	25,90	5301	{ 1,1977 17,4	1,1974	{ 0,04	1259	2009	0,0230
					{ 17,96	2008		
					{ 23,40	2397		
26,40	5421	{ 1,2017 17,4	1,2014	{ 34,35	2792	2016	0,0234	
				{ 17,64	1999			
				{ 26,56	2420			
Li Cl	2,50	597	{ 1,0132 18,30	1,0132 (18°)	{ 18,26	385 V.	983	0,0228
					{ 26,46	457		
	20,00	5249	{ 1,115 17,4	1,115	{ 17,63	1517 X.	1530	0,0221
					{ 25,94	1799		
	30,00	8340	{ 1,181 18,0	1,181	{ 18,25	1314	1307	0,0229
					{ 25,92	1544		
Tollinger.	40,00	11820	{ 1,256 15,5	1,255	{ 32,81	1768	790	0,0285
					{ 17,03	768		
					{ 25,87	966		
					{ 33,20	1148		

1) Nämlich:

H	K	Na	Li	Ba	Sr	Ca	Mg	Zn
1,00	39,13	23,04	7,02	137,0	87,5	20,00	24,00	65,1
Cu	Ag	Cl	Br	J	S	P	N	C
63,5	107,9	35,46	79,95	126,8	32,07	31,00	14,04	12,00

2) Vgl. Pogg. Ann. CLIV. p. 217. 1874.

	Gewichte- Procente	Mol.-Zahl 1000 m	Specifisches Gewicht		Leitungsvermögen $k \cdot 10^8$		Δk k_{18}	
			Beob.	Bei 18 od. 15°	Beob.	Bei 18°		
Bromide.								
K Br	4,94	429	1,0351 15,40	1,0352 (15°)	17,78 ⁰ 27,46	429 II. 515	431 0,0207	
	9,98	900	1,0738 15,6	1,0740	17,32 27,22	857 1024	869 0,0195	
	20,50	2000	1,1626 15,5	1,1628	17,37 27,01	1814 2127	1834 0,0177	
	29,47	3093	1,2506 14,3	1,2501	17,72 27,04	2679 3094	2691 0,0165	
	36,15	4007	1,3214 15,2	1 3216	17,22 27,42	3262 3781	3301 0,0154	
	Jodide.							
	K J	5,03	314	1,0369 16,50	1,0366 (18°)	17,80 ⁰ 27,18	318 H. 379	319 0,0206
10,12		657	1,0780 15,6	1,0772	17,39 26,77	637 758	645 0,0201	
Von 20% an		20,00	1,1680 17,8	1,1679	18,11 26,23	1363 X. 1568	1360 0,0185	
Tollinger.		30,00	1,272 20,0	1,273	18,30 26,22	2165 IX. 2450	2154 0,0167	
		40,00	1,3960 19,1	1,3966	18,25 26,44	2974 3342	2962 0,0152	
		55,00	1,632 16,0	1,630	18,30 26,72	3967 4434	3950 0,0141	
NH ₄ J		10,01	736	1,0654 17,4	1,0653 (18°)	17,80 26,26	720 X. 843	723 0,0202
	20,00	1573	1,140 17,8	1,140	17,75 25,94	1487 1723	1494 0,0193	
	50,00	4974	1,442 16,7	1,441	18,17 26,48	3927 4427	3917 0,0154	
	NaJ	5,00	346	1,0374 17,9	1,0374 (18°)	18,16 26,42	279 X. 330	278 0,0222
9,99		720	1,0803 17,7	1,0802	17,65 26,75	538 645	542 0,0216	
19,99		1565	1,173 18,2	1,173	18,09 26,28	1070 1247	1068 0,0204	
40,00		3770	1,412 18,4	1,413	17,30 26,24	1945 2295	1972 0,0198	
Li J		5,28	409	1,0384 17,3	1,0382 (18°)	17,90 26,34	291 X. 345	292 0,0219
		10,56	852	1,081 17,1	1,081	17,64 26,04	560 662	564 0,0216
	21,09	1850	1,174 18,0	1,174	17,80	1070	1075	
	25,26	2296	1,215 21,5	1,217	17,63 26,05	1261 1478	1270 0,0203	

	Gewichte- Procenta	Mol.-Zahl 1000 m	Specifisches Gewicht		Leitungsvermögen $k \cdot 10^8$		Δk k_{18}
			Beob.	Bei 18 od. 15°	Beob.	Bei 18°	

Cyanide.

KCN	3,27	509	1,0155	1,0155	17,19°	488 II.	496	0,0208
			15,3°	(15°)	27,11	590		
			1,0313	1,0316	17,34	950		
	6,50	1029	15,8		27,35	1137	963	0,0194

Fluoride.

KF	6,91	1253	1,0570	1,0575	17,72°	816 X.	821	0,0214
			19,6°	(18°)	26,23	965		
	12,24	2317	1,1024	1,1025	18,04	1340	1339	0,0218
			18,3		26,31	1581		
	22,51	4641	1,200	1,200	18,38	2122	2105	0,0220
			17,5		26,82	2514		
	33,58	7542	1,3062	1,3066	17,90	2419	2425	0,0235
			18,7		26,32	2899		
	39,97	9455	1,376	1,378	18,33	2375	2356	0,025
			20,5		26,80	2868		

Nitrate.

KNO ₃	5,03	512	1,0314	1,0314	17,14°	420 II.	428	0,0209
			15,1°	(15°)	26,03	500		
			1,0642	1,0642	16,95	767		
	9,97	1048	15,1		26,94	929	784	0,0206
Von 16% an Tollinger.	16,0	1748	1,105	1,105	17,93	1170	1172	0,0203
			18,0		25,93	1361		
	20,0	2239	1,133	1,133	18,90	1433	1411	0,0198
			17,5		26,69	1654		
	22,0	2496	1,147	1,148	18,00	1523	1523	0,0195
			19,9		26,22	1768		
NH ₄ NO ₃	5,13	654	1,0206	1,0206	17,83	565 II.	567	0,0204
			15,2	(15°)	27,74	680		
	10,21	1329	1,0431	1,0428	17,46	1057	1068	0,0194
			13,6		27,88	1273		
	30,00	4231	1,1308	1,1304	17,65	2644 I.	2660	0,0169
			13,7		27,47	3085		
	49,27	7525	1,2240	1,2243	18,06	3396	3393	0,0157
NaNO ₃			15,7		27,86	3920		
					38,41	4471		
	5,02	610	1,0329	1,0329	18,10	410 III.	409	0,0222
			18,0	(18°)	25,59	478		
	10,04	1261	1,0685	1,0684	17,74	731	735	0,0218
			17,6		25,34	852		
	20,06	2697	1,1441	1,1440	18,08	1223	1221	0,0216
			17,6		26,12	1435		
	28,79	4116	1,218	1,216	17,94	1477	1479	0,0220
			14,8		26,03	1740		

	Gewichte- Procente	Mol.-Zahl 1000 m	Specificsches Gewicht		Leitungsvermögen $\kappa \cdot 10^8$		Δk k_{18}
			Beob.	Bei 18 od. 15°	Beob.	Bei 18°	
Ba N ₂ O ₆	4,18	331	{ 1,0338 18,4 ⁰	1,0338 (18°)	{ 18,06 ⁰ 26,57 35,30	196 V. 235 277	195 0,0236
Schleier- macher	8,36	685	{ 1,0707 18,6	1,0708	{ 17,84 26,39	328 397	329 0,0246
Ca N ₂ O ₆	6,34	811	{ 1,0493 18,4	1,0494 (18°)	{ 17,60 26,33	460 III. 549	464 0,0219
	12,68	1705	{ 1,1028 19,3	1,1032	{ 17,77 26,58	754 900	758 0,0218
	25,36	3782	{ 1,2230 19,0	1,2234	{ 17,55 26,36	971 1160	981 0,0219
	38,05	6311	{ 1,3602 19,2	1,3609	{ 17,62 26,57	796 982	804 0,0258
	50,74	9407	{ 1,5211 17,8	1,5210	{ 17,85 26,29	411 532	414 0,0344
Mg N ₂ O ₆	5,1	747	{ 1,0388 17,4	1,0386 (18°)	{ 17,67 25,98	414 III. 490	417 0,0217
	10,2	1488	{ 1,0781 17,9	1,0781	{ 17,71 27,17	728 876	732 0,0213
	17,3	2651	{ 1,1388 18,7	1,1391	{ 17,50 26,60	1029 1227	1039 0,0209
Ag NO ₃	5,00	307	{ 1,0422 18,3	1,0423 (18°)	{ 17,72 26,57	238 X. 284	239 0,0219
	9,99	640	{ 1,0888 19,3	1,0892	{ 17,98 25,72	444 519	444 0,0218
	19,98	1405	{ 1,1951 19,0	1,1955	{ 17,89 25,65	813 948	815 0,0213
	39,97	3473	{ 1,4766 18,2	1,4768	{ 17,67 26,63	1452 1722	1462 0,0206
	59,97	6757	{ 1,9149 18,1	1,9150	{ 17,57 26,35	1943 2305	1961 0,0210

Chlorate.

KClO ₃	4,98	419	{ 1,0314 15,3 ⁰	1,0315 (15°)	{ 17,65 ⁰ 27,43	340 II. 411	342 0,0212
-------------------	------	-----	-------------------------------	-----------------	-------------------------------	----------------	------------

Acetate.

KC ₂ H ₃ O ₂	5,03	525	{ 1,0228 15,6 ⁰	1,0230 (15°)	{ 17,22 ⁰ 27,71	321 II. 397	326 0,0224
	10,06	1074	{ 1,0468 15,3	1,0469	{ 17,20 28,16	578 720	588 0,0220
	29,98	3510	{ 1,1482 15,3	1,1482	{ 17,20 27,43	1155 1435	1177 0,0232
	50,50	6500	{ 1,2618 14,8	1,2617	{ 17,93 26,76	1038 1295	1040 0,0279
	70,41	9860	{ 1,3738 15,4	1,3740	{ 18,13 26,69	433 585	431 0,0412

	Gewichts- Procente	Mol.-Zahl 1000 m	Specificsches Gewicht		Leitungsvermögen $k \cdot 10^9$		$\frac{\Delta k}{k_{18}}$
			Beob.	Bei 18 od. 15°	Beob.	Bei 18°	
$\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$	3,76	466	1,0181	1,0181	18,03°	220 III.	220 0,0254
Die Lösun- gen in V: Tollinger.	5,0	625	18,10	(18°)	26,61	268	276 V.
			1,025		18,05	276 V.	
			18,0		26,43	335	
	7,51	950	1,0380	1,0378	17,59	372 III.	376 0,0255
	17,4	2306	17,2	1,0905	25,57	449	590 V.
			1,0906		18,31	595 V.	
	20,02	2725	17,6	1,1054	26,40	730	609 III.
			1,1054		17,82	609 III.	
	21,7	2944	17,9	1,113	25,56	746	616 V.
			1,113		18,33	616 V.	
	26,0	3610	18,1	1,137	26,08	760	595 V.
			1,136		17,97	595 V.	
	32,1	4581	20,5	1,170	26,44	759	596 0,0324
			1,170	1,170	18,29	537 V.	531 0,0375
			18,8		26,96	709	

Sulfate.

K_2SO_4	4,95	590	1,0396	1,0391	17,72°	423 II.	425 0,0217
	10,00	1240	15,6°	(18°)	26,88	507	806 0,0204
			1,0308		18,11	808	
			19,8		27,29	959	
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	5,09	793	1,0293	1,0297	17,39	519 II.	526 0,0216
	9,90	1584	16,4	(15°)	26,89	627	939 0,0204
			1,0575		17,08	922	
			14,9		27,16	1115	
	19,95	3366	1,1155	1,1157	17,58	1650	1664 0,0194
			15,6		27,61	1974	
	31,06	5537	1,1792	1,1792	18,10	2181	2177 0,0192
			15,0		27,66	2581	
Na_2SO_4	5,11	752	1,0458	1,0460	18,08	389 II.	388 0,0238
	10,28	1582	19,0	(18°)	26,70	469	656 0,0250
			1,0946		38,00	590	
			16,5		16,94	639	
vgl. noch § 6.	15,37	2479	1,1452	1,1463	27,43	811	842 0,0257
			20,7		15,95	799	
					28,99	1082	
Li_2SO_4	5,00	947	1,0430	1,0430	17,54	371 II.	375 0,0237
	9,93	1960	15,0	(15°)	27,30	458	570 0,0240
			1,0896		17,66	565	
			15,7		27,08	694	

	Gewichts- Procente	Mol.-Zahl 1000 m	Specifisches Gewicht		Leitungsvermögen $k \cdot 10^8$		Δk k_{18}
			Beob.	Bei 18 od. 15°	Beob.	Bei 18°	
MgSO ₄	4,95	866	1,0504 15,40	1,0505 (15°)	17,11 ⁰ 27,12	241 V. 296	246 0,0227
	10,09	1858	1,1061 15,8	1,1063	16,93 27,37	380 II. 478	390 0,0242
	14,95	2863	1,1595 15,5	1,1596	17,47 27,22	443 V. 554	449 0,0252
	24,97	5341	1,2855 15,3	1,2856	17,32 26,95	381 V. 490	389 0,0290
	5,05	660	1,0513 18,5	1,0515 (18°)	17,83 25,69	180 V. 212	181 0,0225
ZnSO ₄ neutral	10,12	1392	1,1086 17,1	1,1083	17,82 26,88	299 363	303 0,0224
	15,17	2203	1,1698 17,6	1,1696	17,70 26,35	388 466	391 0,0230
	23,22	3683	1,2781 18,1	1,2782	17,76 25,55	449 538	451 0,0252
	27,57	4589	1,343 17,7	1,343	17,93 26,70	436 538	437 0,0266
	käuflich rein	19,76	1,233 22	1,235	19,64	479 III.	461
CuSO ₄ Tollinger.	2,5	321	1,0246 17,8	1,0246 (18°)	18,22 26,08	102 V. 119	102 0,0214
	5,0	659	1,0512 18,2	1,0513	18,09 25,99	177 207	177 0,0217
	10,0	1388	1,1072 18,2	1,1073	18,24 26,32	301 354	300 0,0219
	15,0	2195	1,1675 18,0	1,1675	17,79 26,14	393 469	395 0,0232
	15,1		1,1681 18,4	1,1683	17,86 26,04	394 470	395 0,0234
geröstet.	17,3		1,1976 18,4	1,1978	18,03 26,20	430 513	429 0,0237
	17,6	2651	1,2011 19,3	1,2017	18,54 25,73	437 510	431 0,0237
Alaun.							
KAlS ₂ O ₈	4,97	201	1,0474 14,90	1,0474 (15°)	16,85 ⁰ 27,49	229 280	234 0,0203
Carbonate.							
K ₂ CO ₃	4,93	745	1,0445 14,20	1,0443 (15°)	18,01 ⁰ 27,02	520 II. 624	520 0,0223
	9,79	1541	1,0898 15,3	1,0899	17,18 27,53	939 1150	955 0,0214
	19,64	3371	1,1883 14,7	1,1882	17,85 27,63	1668 2013	1673 0,0211
	29,52	5522	1,2947 15,3	1,2948	17,61 27,28	2054 2094	2072 0,0220
	39,76	8123	1,4142 15,0	1,4142	16,33 27,18	1955 2499	2038 0,0246
	48,70	10740	1,5261 15,0	1,5261	17,29 27,27	1463 1921	1495 0,0307

	Gewichts- Procente	Mol.-Zahl 1000 m	Specifisches Gewicht		Leitungsvermögen $k \cdot 10^3$		$\frac{\Delta k}{k_{18}}$
			Beob.	Bei 18 od. 15°	Beob.	Bei 15°	
Na_2CO_3	4,99	989	1,0510	1,0510 (18°)	17,93 ⁰	421 III.	421
			18,10		25,76		
	9,98	2078	1,1043	1,1042	17,86	656	659
			17,8		25,80		
	14,97	3271	1,1582	1,1587	18,23	887	782
			19,1		25,65		
Li_2CO_3	0,20	54	1,0011	1,0006 (18°)	17,55	31,8 V.	32,2
			14,80		25,14		
	0,63	171	1,0049	1,0050	17,77	82,4	8,29
			18,6		24,49		

Oxalate.

$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$	4,90	610	1,0359	1,0359 (15°)	17,16 ⁰	440 II.	448
			14,90		27,11		
	9,95	1286	1,0746	1,0747	17,38	843	854
			15,4		27,01		

Hydrate.

KOH	4,19	774	1,0382	1,0381 (15°)	17,43 ⁰	1355 II.	1369
			14,70		27,85		
	8,42	1615	1,0773	1,0778	17,43	2530	2557
			16,7		26,72		
	16,78	3461	1,1582	1,1587	17,90	4260	4268
			16,4		27,24		
	25,11	5555	1,2424	1,2430	17,62	5018	5058
			16,3		27,20		
NaOH	33,33	7889	1,3295	1,3302	17,82	4890	4911
			16,3		27,94		
	41,7	10592	1,4255	1,427	18,01	3983	3984
			16,7		27,68		
	2,61	671		(1,0292) (15°)	17,84	1056	1059
					26,01		
	4,87	1282	1,0552	1,0552	18,24	1225 II.	1809
			15,2		27,78		
Vgl. noch § 6.	10,80	3026	1,1219	1,1222	17,81	3018	3031
			16,1		27,62		
	19,66	5995	1,2222	1,2224	17,26	3019	3087
			15,3		27,08		
	29,67	9868	1,3333	1,3337	18,54	1982	1934
			15,8		27,59		
	42,72	15640	1,4683	1,4685	17,50	937	967
			15,3		27,36		

	Gewichts- Procente	Mol.-Zahl 1000 m	Specifisches Gewicht		Leitungsvermögen $k \cdot 10^9$		Δk k_{18}
			Beob.	Bei 18 od. 15°	Beob.	Bei 18°	
LiOH	1,25	525		(1,0132)	17,99 ⁰	729 X.	729 0,0192
				(18 ⁰)	26,09	843	
	2,50	1070	1,0276	1,0276	18,24	1329	1329 0,0197
			17,8 ⁰		26,07	1534	
	4,99	2190	1,0540	1,0546	17,83	2226	2234 0,0204
BaO ₂ H ₂			20,5		26,50	2621	
	7,71	3474	1,083	1,083	18,37	2849	2826 0,0225
			18,0		26,35	3356	
BaO ₂ H ₂	1,33	158		(1,0128)	18,03	249 III.	249 0,0188
				(18 ⁰)	26,67	289	
	2,67	320	1,0271	1,0271	17,80	473	475 0,0186
			18,2		26,57	551	

Saure Salze.

KHSO ₄	5,0	380	1,0353	1,0354	17,63 ⁰	768 II.	770 0,0085
			18,4 ⁰		(18 ⁰) 26,84	829	
Tollinger.	10,0	787	1,0725	1,0726	17,51	1428	1434 0,0086
			18,4		26,28	1536	
Vgl. noch § 6.	20,0	1691	1,1516	1,1516	18,06	2599	2598 0,0088
			18,0		26,15	2783	
	27,0	2398	1,2108	1,2110	18,18	3213	3207 0,0094
			18,4		26,19	3454	
KHCO ₃	4,94	509	1,0324	1,0324	17,42	340 II.	344 0,0206
			15,0		(15 ⁰) 27,06	409	
	10,00	1065	1,0673	1,0674	17,25	636	645 0,0198
			15,6		27,11	771	
KH ₂ PO ₄	5,00	380	1,0339	1,0341	17,81	222 V.	223 0,0221
			18,8		(18 ⁰) 26,64	265	
	10,00	786	1,0693	1,0691	17,61	371 V.	375 0,0223
			17,1		27,33	453	
	15,00	1222	1,1089	1,1092	17,42	540 II.	547 0,0228
			18,9		26,90	658	

Ammoniaklösung.

NH ₃	0,10	59		(0,9987)	17,78 ⁰	2,34 XIII.	2,35 0,0247
				(15 ⁰)	26,51	2,85	
	0,40	234		(0,9974)	18,02	4,61	4,61
	0,80	467		(0,9957)	16,68	5,95 VIa.	6,14 0,0232
					27,80	7,54	
	1,60	933		(0,9924)	17,28	7,96	8,10 0,0239
					27,30	9,90	
	4,01	2307	0,9819	0,9818	16,81	9,92	10,23 0,0252
			14,6 ⁰		28,07	12,62	
	8,09	4549	0,9657	0,9656	17,28	9,51	9,70 0,0264
			14,3		28,50	12,39	
	16,15	8866	0,9367	0,9365	17,05	5,74	5,91 0,0303
			14,1		27,52	7,62	
	30,5	16010		(0,8955)	17,98	1,80	1,80

Ueber die Discussion und graphische Darstellung der Resultate, sowie über die Hervorhebung bemerkenswerther Punkte, Reihenfolge der grössten Leitungsvermögen u. s. f. vgl. § 11—15.

5. Temperaturcoefficienten zweiter Ordnung.

Im allgemeinen folgt aus den Untersuchungen früherer Beobachter und den unsrigen¹⁾, dass die Aenderung des Leitungsvermögens mit der Temperatur, ausgenommen besonders zähflüssige Lösungen, beiläufig gleichmässig stattfindet, wenigstens dass die Ungleichförmigkeit nicht erheblich genug ist, um eine besondere Aufmerksamkeit zu erregen. Desswegen habe ich, so wie schon bei meinen letzten Beobachtungen, nur bei einigen Lösungen die Beobachtung auf mehr als zwei Temperaturen ausgedehnt. Die betreffenden Resultate, welche in der vorigen Tabelle nicht bequem unterzubringen waren, lasse ich, theilweise unter Hinweis auf diese Tabellen, soweit es die Beobachtung selbst betrifft, hier folgen.

Das Leitungsvermögen bei der Temperatur t wird dargestellt durch die Interpolationsformel:

$$k_t = k_0(1 + \alpha t + \beta t^2).$$

Tabelle II.

Lösung.	k_0	α	β
NaCl 24,92 ^o / _o	1254	(1 + 0,0304 . t + 0,000133 t^2)	
NaCl 25,90	1257	(1 + 0,0307 . t + 0,000142 t^2)	
LiCl 30,0	855	(1 + 0,0254 . t + 0,000216 t^2)	
LiCl 40,0	456	(1 + 0,0345 . t + 0,000336 t^2)	
NH ₄ NO ₃ 49,3	2402	(1 + 0,0233 . t + 0,000024 t^2)	
Ba N ₂ O ₆ 4,18	121,2	(1 + 0,0317 . t + 0,000121 t^2)	
Na ₂ SO ₄ 5,11	231,2	(1 + 0,0361 . t + 0,000093 t^2)	
Na ₂ SO ₄ 15,37	452,0	(1 + 0,0460 . t + 0,000080 t^2)	
NaOH 2,61	683	(1 + 0,0295 . t + 0,000016 t^2)	
NaOH 42,7	240	(1 + 0,0866 . t + 0,004511 t^2)	
KHSO ₄ 5,0	599	(1 + 0,0181 . t - 0,000149 t^2)	

1) Hankel, Pogg. Ann. LXIX. p. 225. 1846; G. Wiedemann, ib. XCIX. p. 225. 1856; Beetz, ib. CXVII. p. 1. 1862; Grottrian, ib. CLI. p. 378. 1874; K. und Grotian, ib. CLIV. p. 1. 1875; K. ib. CLIX. p. 249. 1876.

Von diesen Körpern dienen NaCl und LiCl zur Vollständigkeit der von Grotrian und mir mitgetheilten Tabelle.¹⁾ Ueber NaOH, KHSO₄ und Na₂SO₄ wird in § 6 noch gehandelt werden.

Ich mache hierbei aufmerksam darauf, dass wenn auch die Formeln das Leitungsvermögen bei 0° enthalten, doch nur für NaCl und KHSO₄ diese Temperatur zur Beobachtung gekommen ist. Im übrigen liegen die Temperaturen oberhalb 16°.

Aus Tabelle II geht, den früheren Erfahrungen entsprechend, hervor, dass die zweiten Coëfficienten fast überall positiv und klein sind. Das Leitungsvermögen wächst also auch bei diesen Salzen mit der Temperatur ein wenig beschleunigt. Nur die beiden letzten Flüssigkeiten, die concentrirte Natronlauge und das doppelt-schwefelsaure Kali verhalten sich durchaus verschieden von den übrigen und noch mehr voneinander. Vgl. darüber § 6.

6. Aetznatron, doppelt-schwefelsaures Kali und schwefelsaures Natron in weiteren Temperaturgrenzen untersucht.

Ein besonderes Interesse, den Gang des Leitungsvermögens mit der Temperatur weiter als bisher zu verfolgen, liegt zunächst für die concentrirte Natronlauge vor, die einen eminent grossen Temperatureinfluss zeigte, demnächst, wegen der entgegengesetzten Eigenschaft für das doppelt-schwefelsaure Kali.

Die Untersuchungen geschahen in dem verschliessbaren Gefässe Nr. XII (Taf. I, Fig. 2) im Wasserbad, im Eis oder in einer Kältemischung. Die höchsten Temperaturen mögen um einen Grad unsicher sein.

Die Natronlauge war die S. 21 mit 42,72 Proc. bezeichnete, doch nach mehrjährigem Stehen unter Verschluss.

Den beobachteten Leitungsvermögen werde ich gleich eine Rechnung nach den Formeln:

für NaOH 43% $10^8.k = 222(1 + 0,1059.t + 0,004459.t^2)$
 für KHSO₄ 5,0% $10^8.k = 599(1 + 0,0181.t - 0,000149.t^2)$

1) Pogg. Ann. CLIV. p. 226. 1875.

an die Seite stellen. Eine kleine Zeichnung mit k als Ordinate findet sich Taf II, Fig. 4.

Tabelle III.

NaOH				KHSO ₄			
t	k beob.	k ber.	ber. — beob.	t	k beob.	k ber.	ber. — beob.
— 9,3 °	87	89	+ 2	+ 0,10°	600	600	±
+ 0,07	250	224	— 26	18,43	768	768	±
18,04	958	968	+ 10	26,14	821	821	±
42,9	3072	3052	— 20	34,29	865	866	+ 1
79,1	8214	8275	+ 61	48,1	919	913	— 6
				62,0	956	927	— 29
				94,2	1030	826	— 204

Es steigt also das Leitungsvermögen der starken Natronlauge in dem Temperaturintervalle von -10° bis $+80^{\circ}$, stark und ziemlich gleichmässig beschleunigt, bis zu dem etwa Hundertfachen des Anfangswerthes! Dass die quadratische Formel, freilich mit etwas anderen Constanten, als den in § 5 aus den mittleren Temperaturen abgeleiteten, bei diesem grossen Wachsthum noch eine ziemlich befriedigende Darstellung des Vorganges enthält, verdient besondere Beachtung.

Der mittlere Zuwachs zwischen 0 und 80° beträgt auf jeden Grad, im Verhältniss zu dem Leitungsvermögen bei 18° , mehr als ein Zehntel. Die bei 80° erreichte Zahl 8214 übersteigt das grösste Leitungsvermögen der bestleitenden Säuren in gewöhnlicher Temperatur. Bei 100° mag bestleitende Natronlauge mindestens ebenso gut leiten, wie die Säuren bei dieser Temperatur.

Dabei schätze ich, dass der günstigste Procentgehalt, der für 18° 15,2 beträgt, für 0° etwa 14, bei 100° dagegen bei 26 liegen mag.¹⁾

Die colossale Zunahme der Leitung mit der Temperatur hängt sicher mit den Zähigkeitsverhältnissen zusammen. Während die Flüssigkeit bei 80° leicht beweglich ist, zeigt sie sich in gewöhnlicher Temperatur ziemlich

1) Vergl. Beetz, über Zinkvitriol. Pogg. Ann. CXVII. p. 17. 1862.

trüg flüssig und ist in der Kältemischung, obwohl klar, doch mehr ein Syrup zu nennen.

Fast genau entgegengesetzt der Natronlauge verhält sich das doppelschwefelsaure Kali. Der schon anfangs ungewöhnlich geringe Temperatureinfluss vermindert sich noch beträchtlich, so dass die ganze Zunahme der Leitung von 0 bis 90° kaum $\frac{2}{3}$ des Anfangswerthes erreicht und der mittlere Zuwachs auf 1°, getheilt durch k_{18} , sich nur auf 0,006 stellt.

Trotz diesem geringen Wachsthum stellt die quadratische Formel nur den Verlauf bis über 40° gut dar. Von da an verlässt die Curve die Formel (welche bei etwa 60° ein Maximum ergibt); sie nimmt schon dem Augenschein nach einen anderen Charakter an, indem sie zuletzt fast geradlinig wird (Taf. II, Fig. 4).

In jeder Hinsicht also unterscheidet sich der Gang mit der Temperatur für das Leitungsvermögen des doppelschwefelsauren Kali von dem Gange bei allen untersuchten Säuren und anderen Salzen. Dass diese Erscheinungen auf einer Veränderlichkeit der Beziehungen zwischen Salz und Säure mit der Temperatur beruhen, dürfte um so weniger einem Zweifel unterliegen, als die Krystallisationsverhältnisse bei verschiedener Temperatur, die Wärmetönung bei dem Auflösen, auch die Diffusion des Salzes¹⁾ auf eigenthümliche Verhältnisse bei diesem Salze in Lösung schliessen lassen.

An dem schwefelsauren Natron habe ich, durch Herrn Heumann veranlasst, einige grössere Versuchsreihen wegen der merkwürdigen Krystallisations- und Löslichkeitsverhältnisse dieses Salzes angestellt. Ausser dem siebenfach gewässerten Salz, welches unter besonderen Vorichtsmaassregeln erhalten wird, entsteht aus einer Glaubersalzlösung, in niederer Temperatur (bis 34°) eingedampft, das 10fach gewässerte Salz, in höherer Temperatur dagegen wasserfreies schwefelsaures Natron. Eine solche Abhängigkeit

1) Gmelin-Kraut, Handbuch I. p. 48; nach Jacquelin, Berthelot, Graham.

des Krystallwassers von der Temperatur der Krystallbildung ist freilich nichts seltenes; hier aber spricht sich dieselbe noch in den merkwürdigen Löslichkeitscurven des Glaubersalzes aus. Nach Gay-Lussac und Löwel enthält eine gesättigte Lösung an Na_2SO_4 bei 0° nur 4,8 Proc., dann beschleunigt steigend bei 34° 35,5 Proc., worauf die Löslichkeit bis zu 100° auf 29,8 Proc. sinkt. Also auch in der Lösung spielt hier das Krystallwasser offenbar eine Rolle.

Ob dasselbe auch bei der electrolytischen Leitung mit- spricht, ist eine Frage von grosser Bedeutung.

Die Versuche, mit nahe 15 und 25 procentigen Lösungen im Gefässe II angestellt, und nach den Formeln:

$$15,37\% \quad k = 452 (1 + 0,0460 \cdot t + 0,000080 \cdot t^2)$$

$$24,67\% \quad k = 454 (1 + 0,0628 \cdot t + 0,000100 \cdot t^2)$$

berechnet, lieferten folgende Resultate.

Tabelle IIIa.

Na_2SO_4 15,37%				Na_2SO_4 24,67%			
t	$k_{\text{beob.}}$	$k_{\text{ber.}}$	ber.—beob.	t	$k_{\text{beob.}}$	$k_{\text{ber.}}$	ber.—beob.
15,95 ⁰	799	792	±	25,64 ⁰	1218	1214	— 4
21,74	922	921	— 1	29,69	1340	1340	±
23,09	951	951	±	33,13	1449	1447	— 2
28,99	1082	1084	+ 2	38,88	1629	1630	+ 1
33,30	1184	1183	— 1	47,84	1925	1920	— 5
35,23	1227	1227	±	50,55	2003	2009	+ 6
38,71	1308	1309	+ 1	83,0	3109	3129	+ 20
46,63	1497	1498	+ 1	64,1	2468	2467	— 1
58,1	1770	1777	+ 7	30,72	1879	1372	— 7
80,1	2302	2338	+ 36				
16,00	806	794	— 12				

Hiernach tritt also nicht, wie man wohl erwartet hätte, bei der kritischen Temperatur 34° irgend eine besondere Erscheinung ein (Vgl. auch Taf. II, Fig. 4); die Curve geht in gleichmässigem Zuge durch diesen Punkt hindurch, zeigt überhaupt nichts Ungewöhnliches.

Auch die nach dem Abkühlen erhaltenen letzten Zahlen zeigen wieder die früheren Werthe, bis auf kleine

Unterschiede, welche aus dem inzwischen erfolgten Verdunsten erklärt werden können.

Wir haben also einen Einfluss des Krystallwassers auf das Leitungsvermögen nicht constataren können.

Doch halte ich eine weitere Untersuchung der Frage nicht für überflüssig.

7. Heiss gesättigte Lösungen von Salmiak und essigsaurem Natron.

Es sind endlich noch zwei übersättigte Lösungen zur Beobachtung gekommen, nämlich eine Salmiaklösung von etwa 39 Proc. NH_4Cl und eine solche von essigsaurem Natron, welches in seinem Krystallwasser geschmolzen war, also von etwa 60 Proc. $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$.

Man fand:

	NH_4Cl				$\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$			
Temp. =	75,7°	80,6°	87,6°		70°	74°	79°	94°
$k \cdot 10^9$ =	8520	8850	9250		890	960	1070	1330

Die Zunahme von $k \cdot 10^9$ auf 1° beträgt bez. 62 und 18; in Theilen des Leitungsvermögens bei 80° ausgedrückt 0,007 bez. 0,017; das Wachsthum ist bei beiden Körpern ungefähr gleichförmig. Um die Temperaturcoefficienten nach unserer Gewohnheit in Theilen von k_{18} auszudrücken, setzen wir den Curvenzug für k_{18} (Taf I, Fig. 5 und Taf. II, Fig. 1) bis zu den Gehalten unserer Lösungen fort und sehen die so entstehenden Werthe als Leitungsvermögen der (übersättigten) Lösungen bei 18° an. Dies gibt für NH_4Cl etwa 4800, für NaA mag, aber unsicher, etwa 100 geschätzt werden. So hätten wir zwischen 18° und 80° den mittleren Temperaturcoefficienten $\frac{4k}{k_{18}}$ gleich etwa 0,013 bez. 0,16. Der kleine Werth für Salmiak schliesst sich den für geringere Lösungen dieses Salzes gefundenen an; für das essigsaure Natron war ein grosser Werth zu erwarten.

Es mag noch bemerkt werden, dass die obigen Leitungsvermögen der Salmiaklösung diejenigen der bestlei-

tenden Säuren in gewöhnlicher Temperatur namhaft übersteigen.

Die Salze begannen bei den tiefsten oben angegebenen Temperaturen auszukrystallisiren. Man bemerkte den Erfolg an einer rascheren Abnahme des Leitungsvermögens; irgend ein Sprung fand so wenig statt, als bei den von Beetz untersuchten auskrystallisirenden Zinklösungen.¹⁾

8. Einfluss des Lichtes auf das electrische Leitungsvermögen.

Nach den bekannten Arbeiten von W. Smith, Sale, Adams, Siemens kann kaum bezweifelt werden, dass das Licht einen directen Einfluss auf das electrische Leitungsvermögen ausüben kann. Electrolyte hat man meines Wissens auf eine solche Lichtempfindlichkeit noch nicht untersucht.

Dieselbe ist hier kaum zu erwarten, wenn im Electrolyte die Electricität sich nur mit dem ponderabelen Molecül fortschiebt. Anders aber ist es, wenn noch eine metallische Leitung hinzukommen sollte. Denn wenn nach C. Neumann, Lorenz, Maxwell Licht und Electricität denselben Träger haben, so kann die Electricitätsleitung durch die Wellenbewegung dieses Trägers beeinflusst werden.

Ich untersuchte eine 25procentige Glaubersalzlösung und eine 30procentige Salzsäure im Schatten und im Sonnenlicht mehrmals rasch abwechselnd, so dass die Erwärmung durch das Licht möglichst eliminirt wurde. Man beobachtete nämlich jedesmal die Ruhelage des Dynamometers aus drei Umkehrpunkten, wozu nur etwa 20 Secunden erforderlich waren. Die gefundenen Unterschiede beliefen sich nach der Mittelnahme auf höchstens $\frac{1}{15}$ mm an der Scale, entsprechend $\frac{1}{3300}$ bis $\frac{1}{6000}$ des ganzen Widerstandes und fielen vollständig in die möglichen Fehlergrenzen.

Ein merklicher Einfluss des Lichtes auf das Leitungsvermögen wurde also nicht gefunden.

1) Pogg. Ann. CXVII. p. 18. 1862.

9. Frühere Beobachtungen.

Soweit es möglich ist, sollen die Untersuchungen, welche theils früher, theils in neuester Zeit über einzelne von unseren Lösungen angestellt worden sind¹⁾, hier mit unseren Beobachtungen verglichen werden. Es wird dadurch zugleich möglich sein, einiges andere Material für uns verwertbar zu machen.

Ich beginne mit den Bestimmungen, welche in demselben Maasse wie die unsrigen ausgeführt, d. h. auf Quecksilber bezogen sind.

Für das Leitungsvermögen des Zinkvitriol hat Beetz in seiner bekannten Arbeit die Interpolationsformel²⁾ gegeben:

$$10^3 \cdot k = 12,4 + 34,13 \cdot p' - 0,7874 \cdot p'^2 + 0,005079 \cdot p'^3.$$

Die Formel gilt für 20°; p' bedeutet den Gehalt an ZnSO_4 auf 100 Wasser. Werden hieraus die Leitungsvermögen meiner Lösungen berechnet und mit den Zahlen, die sich aus meinen Beobachtungen (Tab. I) für 20° ergeben zusammengestellt, so bekommt man:

ZnSO ₄ auf		10 ³ · k bei 20°	
100 Lösung	100 Wasser	Beetz	K.
5,05	$p' = 5,30$	172	189
10,12	11,25	304	317
15,17	17,89	400	409
23,22	30,25	465	474
27,57	38,06	451	460

Die Unterschiede der drei letzten Zahlen entsprechen höchstens 1° Temperaturdifferenz. Die ersten Zahlen waren nach Beetz' Angabe, dass bei seiner verdünntesten Lösung

1) Hankel, Pogg. Ann. LXIX. p. 225. 1846; G. Wiedemann, ib. XCIX. p. 227. 1856; W. Schmidt, ib. CVII. p. 556. 1859; Beetz, ib. CXVII. p. 1. 1862; Paalzow, ib. CXXXVI. p. 492. 1869; Berggren, Wied. Ann. I. p. 506. 1877; Tollinger, ib. I. p. 510; Ewing, und Mac Gregor, Edinb. Trans. XXVII, 51. 1872; R. Lenz, Mélanges phys. de St. Pétersb. X. p. 239. 1876; Pogg. Ann. CLX. p. 425. 1877

2) Durch einen Druckfehler steht in der Abhandlung 4131 p' anstatt 3413.

(7 Proc.) bereits Spuren von Polarisation merklich wurden, zu klein zu erwarten. Der erste Werth liegt auch schon ausserhalb der von Beetz untersuchten Grenzen.

Zu den von Paalzow beobachteten Lösungen der Sulfate von Magnesium, Zink und Kupfer entnehme ich die zugehörigen Werthe meiner Beobachtungen aus graphischen Darstellungen, unter Reduction auf die von Paalzow angegebenen (Zimmer-) Temperaturen. Die Aequivalentverhältnisse, welche Paalzow angibt, wurden in Lösungsprocente p umgerechnet, die Widerstände in Leitungsvermögen.

			P	K
MgSO ₄ + 107 H ₂ O	5,87%	22°	308	305
„ 34 „	16,40	22°	502	500
ZnSO ₄ + 107 H ₂ O	7,72	23°	282	280
„ 50 „	15,18	?	430	434
„ 24 „	27,16	23°	524	498
„ 23 ¹⁾ „	28,01	23°	514	491
CuSO ₄ + 105 H ₂ O	7,78	22°	295	270
„ 55 „	13,88	?	444	411
„ 50 „	15,06	?	468	431
„ 45 „	16,47	22°	494	456

Bittersalz und die verdünnten Lösungen von Zinkvitriol stimmen sehr gut; die sechs letzten Lösungen würden nach Paalzow ein grösseres Leitungsvermögen besitzen. Aus dem Vergleiche mit Beetz (v. S.) und Tollinger am Zinkvitriol und mit G. Wiedemann und Tollinger (vgl. später) am Kupfervitriol ergibt sich dies als unwahrscheinlich.

Beobachtungen an einigen Sulfaten, nach dem Verfahren von Paalzow angestellt, sind ganz kürzlich auch von Berggren mitgetheilt worden. Seine Lösungen sind so zahlreich, dass man aus ihnen solche entnehmen kann,

1) In der Abhandlung ist verdruckt 33 H₂O. Bei den Lösungen, deren Temperatur nicht mitgetheilt wird, habe ich diejenige der anderen zugehörigen Lösungen angenommen.

welche den meinigen sehr nahe liegen. Die Temperaturen liegen etwa 10° unterhalb 18° , wesswegen die Reduction mit meinen Temperaturcoefficienten (zwischen 18 und 26°), besonders für concentrirtere Lösungen, etwas unsicher wird.

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$		B	K	MgSO_4		B	K
5,66 %	7,70	429	453	4,41 %	8,70	174	176
9,90	8,3	729	754	9,72	7,8	278	288
19,95	6	1244	1279	15,00	7,8	330	333
31,06	8,0	1693	1756				
K_2SO_4				Na_2SO_4			
4,93 %	7,70	331	330	5,09 %	70	282	291
				KHSO_4			
				5,08 %	9,30	352	692

Kalium-, Magnesium- und auch Natriumsalz stimmen gut. (Auch Kochsalz hat der Verfasser zum Zwecke einer Vergleichung mit den Beobachtungen von Grotrian und mir bestimmt und nahe gleich gefunden.) Grössere negative Unterschiede ergibt das schwefelsaure Ammon. Unverständlich ist die ungeheure Abweichung des doppelt schwefelsauren Kali, welches nach Berggren nicht besser leiten würde als das neutrale Salz. Dies ist von vornherein höchst unwahrscheinlich, und es muss irgend ein Irrthum vorliegen.

Die Beobachtungen von Ewing und Mac Gregor sind zwischen Platinelectroden mit momentanen Strömen ausgeführt worden, in der Meinung, dass die Polarisation hierbei einflusslos gemacht werden könne. Schon Beetz hat einen Zweifel an der Verwirklichung dieser Absicht ausgesprochen und findet in der That, dass die Leitungsvermögen der Zinkvitriollösungen von Ewing und Mac Gregor kleiner gefunden wurden als von ihm selbst. Nach eigenen Messungen über die electromotorischen Kräfte sehr dünner Gasschichten¹⁾ war ich von selbst der nämlichen Meinung. Denn da nach meiner Schätzung schon bei einer Wasserzersetzung von $\frac{1}{10^9}$ mg auf jedes

1) Pogg. Ann. CXLVIII. p. 143. 1873.

Quadratmillimeter Platinelectrode eine Polarisation von etwa $\frac{1}{10}$ Daniell entsteht, so wird sich ein hinreichend bewegliches Galvanometer, um die Stromverhältnisse vor Eintritt merklicher Polarisation anzuzeigen, kaum herstellen lassen.

Wenn ich zu einer Anzahl aus den von Ewing und Mac Gregor beobachteten Lösungen aus meinen Curven die zugehörigen Zahlen entnehme und thunlichst auf ihre Beobachtungstemperatur 10^0 reducire, so erhalte ich:

K ₂ SO ₄	E. u. M.	K	ZnSO ₄	E. u. M.	K	CuSO ₄	E. u. M.	K
3,85 $\frac{0}{10}$	267	277	5,10 $\frac{0}{10}$	150	150	3,04	97	99
4,76	306	340	9,35	227	246	5,81	162	165
5,88	374	415	16,04	298	328	7,99	202	208
8,33	503	570	22,45	336	360	10,66	251	274
9,54	576	645	23,73	337	359	12,79	280	292
			27,93	308	342	15,98	312	333
						17,78	326	351

Meine Zahlen sind, bis auf eine gleiche, sämmtlich grösser und zwar bis zu 12 Procent¹⁾, wodurch also der Einwand gegen die Anwendbarkeit momentaner einzelner Ströme zur Widerstandsbestimmung von Electrolyten bedeutend gestützt wird.

Hr. Tollinger endlich hat seine Beobachtungen nach einer einwurfsfreien Methode mit constantem Strome auf meinen Wunsch angestellt, um die Resultate der Wechsel-

1) In einer Replik gegen Beetz' Einwände (Proc. Edinb. Soc. 1874—75. p. 545) äussert sich Hr. Mac Gregor auch wiederholt nicht eben freundlich gegen unser Verfahren. Indem ich die Bemerkungen, welche bloss als Staffage der Polemik dienen, übergehen darf, möchte ich aber einen Punkt berichtigen: Die Widerstandsbestimmung derjenigen Zinklösung, welche zur Ermittlung der Widerstandscapacität unserer Glasgefässe diente, und somit die Grundlage unserer Zahlen bildet (K. u. Grotthian, Pogg. Ann. CLIV. p. 10. 1875), setzte nicht polarisationsfreie Electroden voraus, wie Hr. Mac Gregor behauptet (p. 557). Vielmehr wurden die etwaigen „Reste der Polarisation“ durch „Differenzbeobachtungen mit gleich starkem Strome“ eliminirt, was übrigens kaum übersehen werden konnte, da wir diese grundlegenden Versuche ausführlich mitgetheilt haben.

ströme zu prüfen. Die von ihm selbst gegebene, durchaus befriedigende Vergleichung bezieht sich theilweise schon auf Zahlen, welche der vorliegenden Abhandlung zum Voraus entlehnt worden waren. Ich darf hier auf Tollinger's Mittheilung (l. c. p. 514) verweisen.

Nächst den vorgenannten, von den Verfassern gleich auf das Quecksilber bezogenen Bestimmungen liegen noch einige andere Messungen vor, welche wenigstens vergleichbar gemacht werden können.

So führt G. Wiedemann unter seinen correspondirenden Beobachtungen über Zähigkeit und Leitungswiderstand zwei Reihen von Silbersalpeter- und Kupfervitriollösungen auf. Die Flüssigkeiten wurden zwischen gleichnamigen Metallelektroden nach dem sog. Horsford'schen Verfahren untersucht, wobei die Versuchsfehler mit einiger Sorgfalt auf einen mässigen Betrag reducirt werden können.

Ich rechne Wiedemann's Volumenprocente in Gewichtsprocente um und dividire die Widerstände, welche sich auf das Platin des Rheostaten beziehen, in den constanten Factor 6,30.¹⁾ Die mit K überschriebenen Leitungsvermögen sind meinen Curven entnommen.

AgNO ₃ 16°			CuSO ₄ 18–20°		
	W	K		W	K
4,11 %	192	197	1,95 %	81	85
5,09	246	237	3,82	150	145
7,95	356	359	4,74	179	176
11,57	487	496	5,63	198	199
15,02	618	624	7,37	245	243
			9,06	289	285
			10,68	325	320

Die Abweichungen sind von unregelmässigen Vorzeichen und nicht grösser, als sie nach den Umständen zu erwarten waren.

Den Temperaturcoefficienten $\frac{\Delta k}{k_{18}}$ erhält man aus Wiede-

1) Der Reductionsfactor hatte sich aus den Beobachtungen Wiedemann's an der Schwefelsäure = 5,3 ergeben, war aber wegen der fehlenden Temperaturangabe unsicher. (Pogg. Ann. CLIX. p. 255. 1876).

mann's Beobachtungen der 10,68 procentigen Kupferlösung gleich 0,0212 und zwar bis 70° hinauf ziemlich constant. Für die gleiche Lösung erhielten wir 0,0220.

Hierbei möge gleich bemerkt werden, dass aus Hankel's Bestimmungen für eine concentrirte Lösung von Kupfervitriol für die relative Aenderung des Leitungsvermögens mit der Temperatur 0,025, nahe übereinstimmend mit unserem 0,0237 erhalten wird. Für verdünnte Kupfervitriol- und Zinkvitriollösungen ergibt sich nach Hankel 0,025 bez. 0,023, während wir etwa 0,022 finden.

Zu den ersten Beobachtungen gehören ferner diejenigen von W. Schmidt an Kalisalpeter. Der Gang seiner Zahlen mit dem Gehalte der Lösung schliesst sich dem unsrigen hinreichend nahe an.

Ganz neuerdings hat endlich R. Lenz eine Untersuchung über verdünnte Lösungen der Haloidsalze mehrerer leichten Metalle mitgetheilt. Von den Salzen des vorliegenden Aufsatzes kommen fünf vor. Eine genaue Temperaturangabe macht Lenz nicht, hat aber die Schwankungen bereits in den mitgetheilten Resultaten berücksichtigt.

Indem ich den Reductionsfactor von Lenz' Widerständen auf unser Maass gleich 15200 setze¹⁾, erhalte ich:

		k. 10 ⁸				k. 10 ⁸	
		Lenz	K			Lenz	K
KBr	5,75 %	504	504	NaJ	7,10 %	375	391
KJ	7,83	492	493	NH ₄ J	6,86	497	485
KCN	3,21	486	487				

Von den Chloriden macht Lenz selbst eine Vergleichung mit den Bestimmungen von Grottrian und mir, ungefähr mit demselben Erfolge wie oben.

Später werde ich auf die Arbeit von Lenz zurückkommen und eine Anzahl von seinen Resultaten benutzen (§ 17).

1) Dieser Factor entsteht unter der Annahme gleicher Temperatur bei Lenz und uns, ferner, dass die Platinelectroden den Trog ganz ausfüllen.

Im allgemeinen glaube ich aus den Vergleichen meiner Resultate mit anderen schliessen zu dürfen, dass keine Unterschiede vorkommen, welche nicht aus den grösseren Schwierigkeiten der früheren Methoden erklärbar wären.

II. Praktischer Theil.

10. Tabellen für den Gebrauch.

Ebenso wie in den früheren Mittheilungen über Chloride und Säuren habe ich nun aus den beobachteten Resultaten des § 4 bequemere Tabellen abgeleitet, welche nach gleichen Intervallen des Salzgehaltes fortschreiten. Meistens bedarf es zu diesem Zwecke nur kleiner Correctionen an den Resultaten, wodurch deren Genauigkeit nicht geschmälert wird. Die eingeklammerten Zahlen dagegen, wozu auch sämtliche zu einem eingeklammerten Procentgehalt gehörende zu rechnen sind, entstammen bloss graphischen, allerdings möglichst sorgfältigen Aufzeichnungen und sind je nach ihrem Abstände von beobachteten Punkten und nach der Stärke der Krümmung der Curven mit einer kleineren oder grösseren Unsicherheit behaftet.

Unter den Flüssigkeiten dieses Aufsatzes befinden sich einige Lösungen von Chlornatrium und Chlorlithium als Ergänzung der früheren Beobachtungen von Grotrian und mir über die Chloride der Leichtmetalle. Ich werde aus mehreren Gründen die ganze Reihe der Chloride hier noch einmal mit einigen Abänderungen anschliessen.

Erstens nämlich wurden unsere specifischen Gewichte (l. c. p. 226) damals von den um 18° herumliegenden Beobachtungstemperaturen auf 18° zurückgeführt, indem man in Ermangelung von Besserem die Ausdehnung des Wassers zu Grunde legte. Wir bemerkten, dass hierdurch theilweise die vierten Decimalen um einige Einheiten unsicher würden. Es liegen nun aber, was wir damals nicht wussten, eingehende Untersuchungen über die Aus-

dehnung gerade unserer Chloride in der bekannten Schrift von Gerlach „über die specifischen Gewichte der Salzlösungen“ (Freiberg 1859) vor; und somit habe ich hiernach die folgenden Zahlen geändert. Selten geht diese Aenderung über zwei Einheiten der vierten Decimale hinaus und erreicht ein einziges Mal (CaCl_2 24%) fünf Einheiten.¹⁾ Im Zusammenhang hiermit stehen geringfügige Aenderungen des Leitungsvermögens k_{18} bei Chlor-Magnesium, dessen Procentgehalte theilweise aus dem specifischen Gewicht bestimmt worden waren.

Ferner enthielt die frühere Tabelle die Temperaturcoëfficienten für 18° , während ich später die Coëfficienten für 22° (gemessen in dem Leitungsvermögen von 18°) bestimmt habe. Im Interesse der Vergleichbarkeit berechne ich desswegen jetzt auch für die Chloride die Temperaturcoëfficienten im letzteren Sinne unter $\frac{\Delta k}{k_{18}}$, und zwar aus den quadratischen Temperaturformeln, deren Coëfficienten a. a. O. zu finden sind.

Endlich benutze ich die Gelegenheit, unter m die in der Volumen-Einheit enthaltene Anzahl der electrolytischen Molecüle (vgl. S. 14 dieses Aufsatzes) hinzuzufügen.

Tabelle IV.

Lösung.	Mol.-Zahl		Spec. Gew.		$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	Lösung.	Mol.-Zahl		Spec. Gew.		$\frac{\Delta k}{k_{18}}$
$\frac{\circ}{100}$	1000 m		18 od. 15°	$k \cdot 10^3$ 18°		$\frac{\circ}{100}$	1000 m		18 od. 15°	$k \cdot 10^3$ 18°	
Chloride (K. und Grottrian.)											
KCl		18°				NH_4Cl		18°			
5	691	1,0308	645	0,0202		5	948	1,0142	859	0,0199	
10	1427	1,0638	1271	0,0189		10	1923	1,0289	1661	0,0187	
15	2208	1,0978	1889	0,0180		15	2924	1,0430	2419	0,0172	
20	3039	1,1335	2504	0,0169		20	3952	1,0571	3147	0,0162	
25	3213	1,1408	2628	0,0167		25	5002	1,0710	3765	0,0155	

1) Dagegen war in der früheren Arbeit irrtümlich gedruckt 1,0724 anstatt 1,0710 zu NH_4Cl 25 Proc., 1,2060 anstatt 1,2023 zu SrCl_2 20 Proc., endlich das Leitungsvermögen 1239 anstatt 1245 zu BaCl_2 20 Proc.

Lösung.	Mol.-Zahl.	Spec. Gew.	$k \cdot 10^3$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	Lösung.	Mol.-Zahl.	Spec. Gew.	$k \cdot 10^3$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$
%	1000 . m	18 od. 15°	18°		%	1000 . m	18 od. 15°	18°	
NaCl	18°				SrCl ₂	18°			
5	884	1,0345	628	0,0218	5	659	1,0443	452	0,0215
10	1830	1,0707	1132	0,0215	10	1380	1,0932	829	0,0209
15	2843	1,1087	1535	0,0213	15	2169	1,1456	1151	—
20	3924	1,1477	1830	0,0217	(20)	3036	1,2023	1398	—
25	5085	1,1898	1996	0,0228	22	3405	1,2259	1480	—
26	5325	1,1982	2011	0,0231					
26,4	5421	1,2014	2016	0,0234	CaCl ₂	18°			
LiCl	18°				5	938	1,0409	601	0,0214
2,5	597	1,0132	383	0,0228	10	1957	1,0852	1067	0,0207
5	1209	1,0274	685	0,0224	(15)	3059	1,1311	1407	0,0203
10	2487	1,0563	1139	0,0219	20	4253	1,1794	1616	0,0201
20	5249	1,115	1530	0,0221	25	5546	1,2305	1665	0,0205
30	8340	1,181	1307	0,0229	30	6946	1,2841	1550	0,0217
40	11820	1,255	789	0,0285	35	8469	1,3420	1277	0,0237
BaCl ₂	18°				MgCl ₂	18°			
5	502	1,0445	364	0,0215	5	1097	1,0416	639	0,0223
10	1052	1,0939	686	0,0207	10	2288	1,0859	1055	0,0221
15	1655	1,1473	983	0,0201	20	4957	1,1764	1311	0,0238
(20)	2318	1,2047	1245	0,0196	30	8078	1,2779	991	0,0284
24	2899	1,2559	1435	0,0193	34	9463	1,3210	717	0,0319

Lösung.	Specificches Gewicht.	$k \cdot 10^3$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	Lösung.	Specificches Gewicht.	$k \cdot 10^3$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$
%	18° oder 15°	18°		%	18° oder 15°	18°	
Bromide.				Jodide.			
KBr	15°			NH ₄ J	18°		
5	1,0357	436	0,0207	10	1,0652	722	0,0202
10	1,0741	870	0,0195	20	1,1397	1494	0,0193
20	1,1583	1788	0,0178	(30)	1,2260	2318	0,0180
30	1,2553	2740	0,0165	(40)	1,3260	3166	0,0167
36	1,3198	3287	0,0155	50	1,4415	3917	0,0154
Jodide.				NaJ			
KJ	18°			5	1,0374	279	0,0222
5	1,0363	317	0,0206	10	1,0803	543	0,0216
10	1,0762	637	0,0201	20	1,1735	1069	0,0204
20	1,1679	1360	0,0185	(30)	1,2836	1545	0,0198
30	1,273	2154	0,0167	40	1,4127	1972	0,0198
40	1,3966	2962	0,0152				
(50)	1,545	3668	0,0144				
55	1,630	3950	0,0141				

Lösung.	Specifisches Gewicht.	$\kappa \cdot 10^8$	$\frac{\Delta \kappa}{\kappa_{18}}$	Lösung.	Specifisches Gewicht.	$\kappa \cdot 10^8$	$\frac{\Delta \kappa}{\kappa_{18}}$
$\%$	18° oder 15°	18°		$\%$	18° oder 15°	18°	
Jodide.				Nitrate.			
LiJ	18°			Ba N ₂ O ₆	18°		
5	1,0361	277	0,0219	4,2	1,0340	196	0,0236
10	1,0756	536	0,0216	8,4	1,0712	330	0,0246
(15)	1,1180	783	0,0212	Ca N ₂ O ₆	18°		
20	1,1643	1023	0,0207	6,25	1,0487	459	0,0219
25	1,2138	1258	0,0203	12,5	1,1016	752	0,0218
				25	1,2198	980	0,0219
				37,5	1,3546	819	0,0254
				50	1,5102	438	0,0337
Cyanide.				Mg N ₂ O ₆	18°		
KCN	15°			5	1,0378	410	0,0217
3,25	1,0154	494	0,0208	10	1,0763	720	0,0213
6,5	1,0316	962	0,0194	(15)	1,1181	955	0,0209
				17	1,1372	1031	0,0209
Fluoride.				Ag NO ₃	18°		
KF	18°			5	1,0422	239	0,0219
5	1,041	610	0,0214	10	1,0893	445	0,0218
10	1,084	1130	0,0217	(15)	1,1404	638	0,0216
(20)	1,176	1942	0,0219	20	1,1958	815	0,0213
(30)	1,272	2390	0,0228	(25)	1,2555	989	0,0211
40	1,378	2355	0,025	(30)	1,3213	1158	0,0210
				(35)	1,3945	1314	0,0208
Nitrate.				40	1,4773	1462	0,0206
KNO ₃	18°			(45)	1,5705	1603	0,0205
5	1,0305	426	0,0209	(50)	1,6745	1733	0,0206
10	1,0632	786	0,0206	(55)	1,7895	1853	0,0207
15	1,097	1112	0,0203	60	1,9158	1962	0,0210
20	1,133	1411	0,0198				
22	1,148	1523	0,0195				
				Chlorate.			
NH ₄ NO ₃	15°			KClO ₃	15°		
5	1,0201	553	0,0204	5	1,0316	344	0,0212
10	1,0419	1047	0,0195				
(20)	1,0860	1930	0,0180	Acetate.			
30	1,1304	2660	0,0169	KC ₂ H ₃ O ₂	15°		
(40)	1,1780	3158	0,0161	5	1,0228	325	0,0224
50	1,2279	3402	0,0157	10	1,0466	586	0,0220
				(20)	1,0960	980	0,0223
				30	1,1484	1177	0,0232
NaNO ₃	18°			(40)	1,2028	1183	0,0251
5	1,0327	408	0,0222	50	1,2590	1051	0,0277
10	1,0681	732	0,0218	(60)	1,3152	790	0,0325
20	1,1435	1219	0,0216	70	1,3714	448	0,0411
30	1,2278	1502	0,0221				

Lösung.	Specificches Gewicht.	$k \cdot 10^3$	$\frac{\Delta k}{k_{15}}$	Lösung.	Specificches Gewicht.	$k \cdot 10^3$	$\frac{\Delta k}{k_{15}}$
$^{\circ}/_{10}$	18° oder 15°	18°		$^{\circ}/_{10}$	18° oder 15°	18°	
Acetate.				Sulfate.			
$\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$	18°			CuSO_4	18°		
5	1,025	276	0,0252	2,5	1,0246	102	0,0214
(10)	1,051	450	0,0260	5	1,0513	177	0,0217
20	1,104	609	0,0295	10	1,1073	300	0,0219
(30)	1,159	562	0,0352	15	1,1675	395	0,0232
32	1,170	533	0,0373	17,5	1,2003	430	0,0237
Sulfate.				Alaun.			
K_2SO_4	18°			KAlS_2O_4	15°		
5	1,0395	429	0,0217	5	1,0477	236	0,0203
10	1,0813	806	0,0204	Carbonate.			
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	15°			K_2CO_3	15°		
5	1,0292	517	0,0216	5	1,0449	526	0,0222
10	1,0581	947	0,0204	10	1,0919	973	0,0213
20	1,1160	1667	0,0194	20	1,1920	1693	0,0211
30	1,1730	2148	0,0192	30	1,3002	2082	0,0220
31	1,1787	2175	0,0192	40	1,4170	2031	0,0247
				50	1,5428	1376	0,0320
Na_2SO_4	18°			Na_2CO_3	18°		
5	1,0450	383	0,0237	5	1,0511	422	0,0253
10	1,0915	644	0,0250	10	1,1044	659	0,0272
15	1,1426	830	0,0257	15	1,1590	782	0,0295
Li_2SO_4	15°			Oxalate.			
5	1,0430	375	0,0237	$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$	18°		
10	1,0877	572	0,0240	5	1,0367	457	0,0216
MgSO_4	15°			10	1,0751	858	0,0206
5	1,0510	247	0,0227	Hydrate.			
10	1,1052	388	0,0242	KOH	15°		
15	1,1602	450	0,0253	4,2	1,0382	1372	0,0188
(20)	1,2200	446	0,0270	8,4	1,0776	2552	0,0187
25	1,2861	389	0,0290	(12,6)	1,1177	3526	0,0189
ZnSO_4	18°			16,8	1,1588	4271	0,0194
5	1,0509	179	0,0226	(21,0)	1,2008	4784	0,0200
10	1,1069	301	0,0224	25,2	1,2439	5061	0,0210
15	1,1675	389	0,0229	(29,4)	1,2880	5090	0,0222
(20)	1,2323	439	0,0242	33,6	1,3332	4890	0,0237
25	1,3045	450	0,0259	(37,8)	1,3803	4484	0,0258
(30)	1,3788	416	0,0274	42,0	1,4298	3944	0,0284

Lösung.	Specifisches Gewicht.	$k \cdot 10^3$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	Lösung.	Specifisches Gewicht.	$k \cdot 10^3$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$
$\%$	18° oder 15°	18°		$\%$	18° oder 15°	18°	
Hydrate.				Saure Salze.			
NaOH	18°			KHSO ₄	18°		
2,5	(1,0280)	1019	0,0195	5	1,0354	770	0,0085
5	1,0568	1845	0,0202	10	1,0726	1434	0,0086
10	1,1131	2927	0,0218	(15)	1,1116	2044	0,0086
(15)	1,1700	3244	0,0250	20	1,1516	2598	0,0088
20	1,2262	3062	0,0301	(25)	1,192	3054	0,0092
(25)	1,2823	2543	0,0370	27	1,2110	3207	0,0094
30	1,3374	1892	0,0452				
(35)	1,3907	1409	0,0554	KHCO ₃	15°		
40	1,4421	1088	0,0652	5	1,0328	348	0,0206
42	1,4615	995	0,0695	10	1,0674	645	0,0198
LiOH	18°			KH ₂ PO ₄	18°		
1,25	(1,0132)	730	0,0192	5	1,0341	223	0,0221
2,5	1,0276	1323	0,0197	10	1,0691	375	0,0223
5	1,0547	2237	0,0204	15	1,1092	547	0,0228
7,5	1,0804	2798	0,0222				
BaO ₂ H ₂	18°						
1,25	(1,0120)	234	0,0188				
2,5	1,0253	448	0,0186				

11. Grösstes Leitungsvermögen der einzelnen Electrolyte.

Bei folgenden Körpern tritt die bekannte, wohl von Matteucci zuerst beschriebene Erscheinung ein, dass einem bestimmten, unterhalb der Sättigung gelegenen Konzentrationsgrad der Lösung ein Maximum des Leitungsvermögens entspricht.

1. Aetz-Alkalien: Kaliumhydrat, Natriumhydrat, Ammoniak, und ohne Zweifel nach der Krümmung der Curve zu schliessen, bei dem nur in mässiger Concentration untersuchten Lithiumhydrat.

2. Salze: Fluorkalium, kohlensaures und essigsaures Kalium, essigsaures Natrium, Chlorlithium, Chlorcalcium, salpetersaures Calcium, Chlormagnesium, schwefelsaures und ohne Zweifel auch salpetersaures Magnesium und Zinkvitriol. Wahrscheinlich noch salpetersaures Natrium und

Ammon, und schwefelsaures Lithium; vielleicht auch Jodlithium und schwefelsaures Ammon.

3. Säuren¹⁾: Chlorwasserstoff, Bromwasserstoff und ohne Zweifel auch Jodwasserstoff, Salpetersäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Weinsäure, Essigsäure.

An ein Maximum tritt nahe heran, wie schon bekannt ist, das Chlornatrium. W. Schmidt folgerte aus seinen Beobachtungen und man nimmt dieses häufig so an, dass ein wenig unterhalb der gesättigten Lösung ein Maximum sich befinde. Schon nach unseren früheren Beobachtungen hatten wir dieses für unwahrscheinlich erklärt; die zur Entscheidung jetzt nachträglich beobachtete ganz gesättigte Lösung bestätigt, dass für Chlornatriumlösung in gewöhnlicher Temperatur kein Maximum des Leitungsvermögens eintritt. In niedrigerer Temperatur dagegen werden das Maximum und die Grenze der Löslichkeit nahe zusammenfallen.

Umgekehrt steht wohl in höherer Temperatur das alsdann leichter lösliche schwefelsaure Natron in gesättigter Lösung dem Maximum nicht fern.

Wir wollen nun, ausser den Maxima im strengen Sinne, von den Körpern, welche ein Maximum nicht erreichen, das Leitungsvermögen der gesättigten Lösung nehmen und die bestleitenden Lösungen aller untersuchten Körper für 18°, der Grösse nach geordnet, in Tab. V. zusammenstellen.²⁾

1) Vgl. Pogg. Ann. CLIX. p. 260. 1876.

2) Die Fluorwasserstoffsäure war käuflich unrein. Sie wurde in einem Gefäss von Guttapercha untersucht.

Ueber Kupfer-Chlorid und Nitrat liegen Beobachtungen von E. Becquerel vor. (Wied. Galv. (2) I; p. 319.)

Kleinere Ziffern bedeuten die vollständige Unsicherheit der betreffenden Stelle.

Die Grenze der Löslichkeit habe ich, möglichst für 18°, aus Gmelin-Kraut's Handbuch und aus den Tabellen von Hoffmann-Schädler entnommen. Die Leitungsvermögen $10^8 \cdot \kappa_{18}$ sind aus mehreren graphischen Darstellungen abgeleitet. Da, wo meine Curven bei trüchtlich verlängert werden mussten, entsteht die durch die kleinen Nullen bezeichnete Unsicherheit.

Tabelle V.

	Procenta.	Mol. Z.	Sp. Gew.	$10^4 \cdot k_{11}$		Procenta.	Mol. Z.	Sp. Gew.	$10^4 \cdot k_{11}$
HNO ₃	29,7	5,6	1,185	7330 m	LiCl	21,2	5,6	1,122	1533
HCl	18,3	5,5	1,092	7174 m	LiJ	62	8,5	1,83	1500 m?
HBr	36	5,8	1,31	7170 m	BaCl ₂	26,1	3,2	1,284	1490
H ₂ SO ₄	30,4	7,6	1,224	6914 m	MgCl ₂	19,4	4,8	1,170	1312 m
HF	—	—	—	6100 m?	KC ₂ H ₃ O ₂	35,6	4,3	1,178	1203 m
KOH	28,1	6,4	1,274	5095 m	MgN ₂ O ₆	28	4,7	1,25	1200 m
NH ₄ J	>50	—	—	>4000	CuN ₂ O ₆	—	—	—	1100 m
KJ	58,5	6,0	1,70	4100	KHCO ₃	20,8	2,4	1,15	1100
NH ₄ Cl	27	5,4	1,078	3980	CaN ₂ O ₆	26,7	4,0	1,238	983 m
KBr	38,5	4,4	1,347	3480	CuCl ₂	—	—	—	900
KHSO ₄	31	2,8	1,24	3440	Na ₂ SO ₄	16,8	2,7	1,162	880
NH ₄ NO ₃	5,5	8,7	1,25	3430 m?	Na ₂ CO ₃	17,5	3,9	1,187	812
NaOH	15,2	4,5	1,172	3276 m	K ₂ SO ₄	10,0	1,25	1,081	806
KCl	25,8	4,1	1,175	3210	H ₂ C ₂ O ₄	7	1,6	1,033	734
LiOH	11	5	1,12	3000 m	Li ₂ SO ₄	16	3,3	1,15	640 m
NaJ	64	8,5	2,0	2700	NaC ₂ H ₃ O ₂	21,8	3,0	1,114	610 m
KF	33,7	7,6	1,308	2427 m	BaC ₂ H ₂	3,1	0,37	1,032	540
(NH ₄) ₂ SO ₄	43	8	1,25	2350 m?	MgSO ₄	17,3	3,4	1,187	456 m
K ₂ CO ₃	34,3	6,7	1,350	2117 m	ZnSO ₄	23,7	3,8	1,285	452 m
AgNO ₃	68	8,7	2,18	2100	CuSO ₄	18,1	2,7	1,208	440
NaCl	26,4	5,4	1,201	2016	KClO ₃	6,3	0,53	1,040	432
H ₃ PO ₄	46,8	18,7	1,307	1962 m	BaN ₂ O ₆	8,4	0,69	1,071	330
SrCl ₂	34,4	6,0	1,38	1770	KAl ₂ SO ₄	6,4	0,26	1,061	300
K ₂ C ₂ O ₄	22,8	3,2	1,17	1700	Li ₂ CO ₃	0,77	0,21	1,063	194
CaCl ₂	24,0	5,3	1,220	1669 m	C ₄ H ₆ O ₆	22,4	3,3	1,107	94 m
NaNO ₃	40	6,2	1,32	1600 m	C ₂ H ₄ O ₂	16,6	2,8	1,022	15,2 m
KNO ₃	22,5	2,6	1,151	1550	NH ₃	5,3	3,0	0,977	10,4 m

Die sehr verschiedene Löslichkeit der Körper beeinflusst selbstverständlich diese Reihenfolge in hohem Maasse.

Ich werde in § 28 auf diese Verhältnisse zurückkommen; für praktische Zwecke sei indessen schon hier Folgendes bemerkt. In der Reihenfolge obiger Verbindungen spricht sich auf den ersten Blick eine ungefähre Reihenfolge auch der electrolytischen Bestandtheile aus, nämlich nach der Grösse des Leitungsvermögens geordnet

die electropositiven Bestandtheile: Wasserstoff, Kalium und Ammonium, Silber, Natrium, Lithium, Barium, Strontium, Calcium, Magnesium, Zink;

und die electronegativen Bestandtheile: Jod, Brom, Chlor,

Salpetersäure, Schwefelsäure, Kohlensäure, Phosphorsäure, Oxalsäure, Essigsäure.

In beiden Reihen stehen im allgemeinen die chemisch einwerthigen Bestandtheile voran.

Eine vollkommene Ausnahmestellung haben Aetzammoniak- und Essigsäure-Lösungen, welche sehr schlecht leiten.

12. Die Abhängigkeit des Leitungsvermögens von dem Gehalte der Lösungen.

Es würde zu ganz falschen Anschauungen führen, aus der im vorigen Abschnitt aufgestellten Reihenfolge der bestleitenden Lösungen auf eine Reihenfolge der gelösten Körper in beliebiger gleich starker Lösung überhaupt schliessen zu wollen.

Nimmt man z. B. die Aetzalkalien (Tab. IV, p. 40, vgl. auch Taf. I, Fig. 4), so leitet in verdünnter Lösung Lithion am besten, Kali am schlechtesten. In der gleichen Reihenfolge aber sind die Curven in der Art verschieden stark gekrümmt, so dass später Kali am besten, Lithion am schlechtesten leitet.

Aehnlich übertrifft in verdünnter Lösung Chlormagnesium um mehr als das Doppelte das Jodkalium. Bei 20 Proc. aber sind sie etwa gleich leitend, und bei 35 Proc. leitet das Jodkalium etwa viermal besser. Vgl. auch KJ und CaN_2O_6 Taf. I, Fig. 4.

Ja sogar Aetzammoniak, welches im Vergleich mit Jodammonium oder Jodkalium in bester Lösung nur etwa $\frac{1}{100}$ des Leitungsvermögens aufweist, wird in sehr verdünnter Lösung (0,1 Proc.) ein Leiter gleicher Ordnung wie die anderen Körper.

Als Beispiele solcher Regellosigkeiten sind Taf. I, Fig. 4 einige Leitungsvermögen zu den Gehalten als Ab-scissen graphisch veranschaulicht, nämlich von den Körpern Salzsäure, Aetzkali und Aetznatron, Chlor- und Jod-Kalium, Kochsalz und Kalksalpeter. Während sich in den meisten der Curven der bekannte Charakter ausspricht, dass sie verzögert ansteigen, so erhebt sich Chlorkalium (wie wir

schon früher bemerkten) fast geradlinig; Jodkalium wächst sogar anfangs beschleunigt, zeigt etwa bei 30 Proc. einen Wendepunkt und von da an die gewöhnliche Krümmung nach unten.

Es ist unnöthig, diese Mannigfaltigkeit und die einzelnen Anomalien weiter auszuführen, denn in § 28 wird sich zeigen, dass dieselben nur aus der nicht rationellen Einführung der Gewichtsprocente herkommen, und dass im Gegentheil fast ausnahmslos eine ausgezeichnete Regelmässigkeit entsteht, wenn man die Lösungen nach der Anzahl der in der Volumeneinheit gelösten Molecüle ordnet.

13. Formeln für das Leitungsvermögen, insbesondere verdünnter Lösungen.

Wollte man das Leitungsvermögen als Function des Lösungsgehaltes durch eine Interpolationsformel darstellen, so müsste man theilweise über einen Ausdruck vierten Grades hinausgehen. Theilweise aber werden auch quadratische, meistens cubische Ausdrücke, ähnlich wie Beetz' Formel für Zinkvitriol, aber ohne constantes Glied, genügen. Ich will letzteres an zwei Beispielen, dem Chlornatrium und Chlorcalcium zeigen.

k stellt das Leitungsvermögen zum Gewichtsgehalte p der Gewichtseinheit der Lösung an Salz dar. Setze ich dann für:

$$\text{NaCl } 10^8 \cdot k = 13650 \cdot p - 22700 \cdot p^2$$

$$\text{CaCl}_2 10^8 \cdot k = 13010 \cdot p - 21750 \cdot p^2 - 14500 \cdot p^3,$$

so entsteht die befriedigende Uebereinstimmung (Vgl. Tab. IV p. 38.)

NaCl				CaCl ₂			
p	beob.	ber.		p	beob.	ber.	
0,05	628	626	— 2	0,05	601	594	— 7
0,10	1132	1139	+ 6	0,10	1067	1069	+ 2
0,15	1535	1537	+ 2	0,20	1616	1616	±
0,20	1830	1822	— 8	0,25	1665	1666	+ 1
0,25	1996	1994	— 2	0,30	1550	1554	+ 4
0,26	2011	2014	+ 3	0,35	1277	1267	— 10

Als Maximalleitungsvermögen findet sich für Chlorcalcium aus der Formel die Zahl 1669 für den Gehalt $p = 0,241$, während unabhängig hiervon die gleiche Zahl für $p = 0,240$ aus den graphischen Darstellungen gefunden worden war. (Tab. V.)

Des geringen Vortheils wegen erspare ich mir bei den übrigen Körpern die Mühe, vollständige Interpolationsformeln für den ganzen Verlauf des Leitungsvermögens aufzustellen, will aber wie früher wenigstens den ersten Theil aller Curven in einem quadratischen Ausdruck wiedergeben.

Zu letzterem Zwecke werden um der Gleichförmigkeit willen soweit möglich immer die beiden Gehalte 0,05 und 0,10 (5 und 10 Proc.) benutzt; wo diese nicht beobachtet worden sind, nehme ich statt dessen für KOH 0,042 und 0,084, LiOH 0,025 und 0,05, BaO₂H₂ 0,0125 und 0,025, NH₄J 0,10 und 0,20, BaN₂O₈ 0,042 und 0,084, CaN₂O₈ 0,0625 und 0,125 Li₂CO₃ 0,002 und 0,006 (Tab. IV, p. 38).

Aus diesen beiden Beobachtungen stelle ich alsdann das Leitungsvermögen der verdünnten Lösung in dem Ausdrucke dar:

$$k = \kappa p - \kappa' p^2.$$

Die Zahl κ , welche das Verhältniss des Leitungsvermögens zum Gehalte bei grosser Verdünnung der Lösung darstellt, haben wir das specifische Leitungsvermögen der gelösten Substanz genannt; der zweite Coëfficient κ' liefert ein Maass für die nach unten gerichtete Krümmung der Curve.

Indem wir die Körper nach der Grösse von κ ordnen, erhalten wir folgende Tabelle, welcher ich um der Uebersicht willen die früher beobachteten Säuren und die mit Grotrian untersuchten Chloride einfüge.¹⁾

1) Zählt man den Gehalt p auf 100 Theile Lösung und will man $k \cdot 10^8$ berechnen, so werden die Coëfficienten $\kappa = 887$ $\kappa' = 29,7$ u. s. w.

Tabelle VI.

	$\times$	$\times'$		$\times$	$\times'$
Salzsäure	0,000	0,00	Lithiumsulfat	0,000	0,00
Aetzlithion	887	297	Magnesiumnitrat	093	036
Salpetersäure	611	327	Kalialsalpeter	092	020
Aetznatron	534	101	Kaliumsulfat	091	010
Schwefelsäure	445	153	Natronsalpeter	090	017
Bromwasserstoff	415	048	Glaubersalz	089	024
Aetzkali	383	050	Bromkalium	087	005
Jodwasserstoff	350	055	Calciumnitrat	087	021
Aetzbaryt	250	—	Chlorbarium	087	008
Salmiak	196	066	Saures Kaliumcarbonat	077	010
Lithiumcarbonat	177	011	Kaliumacetat	075	013
Oxalsäure	175	708	Jodammonium	071	—003
Saures Kaliumsulfat	167	089	Kaliumchlorat	070	—
Cyankalium	165	021	Natriumacetat	069	023
Chlorlithium	156	012	Phosphorsäure	067	011
Chlormagnesium	160	046	Jodkalium	064	—001
Chlornatrium	150	045	Bittersalz	060	021
Chlorcalcium	138	025	Jodnatrium	057	003
Chlorkalium	134	027	Jodlithium	057	003
Fluorkalium	131	004	Bariumnitrat	054	017
Ammoniumnitrat	131	018	Saures Kaliumphosphat	052	014
Ammoniumsulfat	116	012	Silbersalpeter	051	007
Kaliumcarbonat	112	017	Alaun	047	—
Natriumcarbonat	113	016	Zinkvitriol	042	012
Chlorstrontium	103	037	Kupfervitriol	041	011
Kaliumoxalat	098	015			
	097	011			

Auch in dieser Reihenfolge der Körper nach der Güte der Leitung in gering- aber gleichhaltigen Lösungen bemerkt man leicht, dass die beiden Elemente, aus denen der Electrolyt besteht, grösstentheils durchaus charakteristische Stellungen in der Reihe einnehmen.

Unter den positiven Bestandtheilen steht wiederum der Wasserstoff weit voran, welcher in den zwölf ersten Körpern nirgends fehlt. Demnächst schliesst sich das Lithium an, alsdann Ammonium vor Natrium und Kalium, Magnesium und dann Calcium vor Strontium und Barium. Weit rückwärts steht auch das Silber.

Von den negativen Elementen steht Chlor vor Brom, letzteres wieder vor Jod. Salpetersäure und demnächst Schwefelsäure haben ihre Stellung zwischen Chlor und Brom, Essigsäure kommt wenig vor Jod. Oxalsäure und mehr noch Phosphorsäure sind ungünstig gestellt.

Auffallend ist die tiefe Stellung des Alauns sowie der Sulfate von Magnesium, Zink und Kupfer.

Eine Vergleichung mit den Zahlen und Bemerkungen des § 12 beweist, dass die Reihenfolge der Elemente für die verdünnten Lösungen sich von derjenigen für die bestleitenden Lösungen in manchen Punkten unterscheidet. Der Wasserstoff steht allerdings in beiden Fällen obenan; Lithium und Kalium dagegen haben ihre Stellung gewechselt. Jod verhält sich in grösserer Verdünnung viel ungünstiger als in bester Lösung.

Man bemerkt im allgemeinen noch, wie die einwerthigen Bestandtheile den mehrwerthigen überlegen sind.

Es soll indessen hier nicht weiter auf eine Erörterung dieser Verhältnisse eingegangen werden, da dieselben in § 16 durch die Einführung der gelösten Molecüle anstatt der gelösten Gewichtsmengen sich in einem anderen Lichte und zwar sehr viel durchsichtiger zeigen werden.

Ebenso wenig lohnt es sich hier auf den zweiten Differentialquotienten α' einzugehen. Ich mache nur darauf

aufmerksam, dass derselbe bei KJ und NH_4J positiv, sonst immer negativ ist (vergl. S. 45). Der eminent grosse Werth bei Li_2CO_3 hängt jedenfalls mit der grossen Verdünnung der untersuchten Lösungen zusammen.

14. Flüssigkeiten, welche sich als Etalons für das electrische Leitungsvermögen empfehlen.

Wenn wir gleich im Quecksilber einen Körper von genau definirtem Leitungsvermögen besitzen, so erscheint es doch nicht überflüssig, auch unter den Electrolyten nach Körpern zu suchen, welche diesem Zwecke dienen können; denn für die meisten Zwecke ist die Leitungsfähigkeit des Quecksilbers unbequem gross. Hierher gehört z. B. die Aufgabe, die Widerstandscapacität eines Raumes zu bestimmen, welcher der Messung oder der Rechnung unzugänglich ist, etwa eines Gefässes, das zur Widerstandsbestimmung von Electrolyten dient. Die Füllung mit Quecksilber liefert in den praktisch wichtigsten Fällen so kleine Widerstände, dass eine genaue Messung der letzteren unthunlich ist.

Man wird von den bisher untersuchten Flüssigkeiten vorzüglich die folgenden als geeignet für Etalons des electrischen Leitungsvermögens erklären dürfen.

1) Die Schwefelsäure von maximalem Leitungsvermögen, d. h. bei 30,4 Proc. H_2SO_4 oder 1,224 spec. Gewicht, empfiehlt sich durch ihre leichte Zugänglichkeit und ihre Haltbarkeit. Aus Grotrian's Beobachtungen in verschiedenen Temperaturen¹⁾ geht noch eine Bequemlichkeit hervor, nämlich, dass die Maximalschwefelsäure ein sehr gleichförmiges Wachsthum des Leitungsvermögens mit der Temperatur besitzt. Hiernach und aus meinen Beobachtungen²⁾ folgt dann für die Temperatur t :

$$10^9 \cdot k = 6914 + 113 \cdot (t - 18).$$

2) Wünscht man ein kleineres Leitungsvermögen, so

1) Pogg. Ann. CLI. p. 378. 1874.

2) Pogg. Ann. CLIX. p. 242. 1876.

dürfte die Bittersalzlösung von 17,3 Proc. MgSO_4 (wasserfrei) oder dem specifischen Gewicht 1,187 besonders geeignet sein, die auch einem Maximum entspricht.

$$10^8 \cdot k = 456 + 11,9 (t - 18).$$

3) Für Arbeiten mit constantem Strome bleibt aus bekannten Gründen immer die Maximallösung von Zinkvitriol (23,7 Proc. ZnSO_4 ; spec. Gew. = 1,285) die geeignetste Substanz. Es hat sich aber auch im vorigen wieder gezeigt, dass eine genaue Definition des Leitungsvermögens eine besondere Behandlung verlangt. Von der Maximallösung, die mit Zinkoxydhydrat im Ueberschuss gekocht ist, würde bei 18° das Leitungsvermögen betragen nach:

Beetz	Tollinger	K
$10^8 \cdot k_{18} = 443$	461	452

im Mittel also 452. Die Zunahme auf 1° beträgt 11,2.

4) Ausserordentlich bequem aber ist endlich noch Chlornatrium in gesättigter Lösung. Denn bekanntlich hängt die Löslichkeit dieses Salzes von der Temperatur nur sehr wenig ab, so dass man ohne Analyse leicht eine bis auf 0,2 Proc. bekannte Lösung herstellen kann. Auch eine Uebersättigung ist nicht zu fürchten. Zweitens aber liegt (S. 42) die gesättigte Lösung in gewöhnlicher Temperatur nahe bei einem Maximum des Leitungsvermögens.

Um endlich zu prüfen, welche Bedeutung die vollständige Reinheit des Stoffes für die Leitung besitzt, habe ich auch gewöhnliches käufliches Kochsalz in gesättigter Lösung untersucht, welches sich nicht einmal klar löste und unter anderm verhältnissmässig viel schwefelsaures Salz enthielt. Trotzdem belief sich der Unterschied nur auf etwa 1 Proc. des Leitungsvermögens zu Gunsten des reinen Salzes. Der Temperaturcoefficient war merklich der nämliche.

Löst man also Chlornatrium, bez. durch Umkrystallisiren gereinigtes Kochsalz bis zur Sättigung (am einfachsten durch Auflösen in der Wärme und Abkühlung zur Zimmertemperatur) so hat man einen Körper, dessen Leitungs-

vermögen fast auf ein Tausendtel verbürgt werden kann. Nach den obigen Bestimmungen wird in der Nähe von 18° :

$$10^8 \cdot k = 2015 + 45,1 (t - 18),$$

für weiter entfernte Temperaturen:

$$10^8 \cdot k = 1259 (1 + 0,0308 \cdot t + 0,000146 \cdot t^2)$$

5) Da die Essigsäure in grosser Reinheit käuflich ist, so wird eine bekannt geringleitende Flüssigkeit in der Maximalessigsäure (16,6 Proc. $C_2H_4O_2$; spec. Gew. = 1,022) gegeben sein, für welche:

$$10^8 \cdot k = 15,2 + 0,27 (t - 18)$$

ist. Spuren von Salzen, z. B. die Aufnahme von nur wenig Ammoniak vergrössern hier jedoch das Leitungsvermögen merklich.

(Schluss im nächsten Heft.)

II. Ueber die thermoelectrischen Eigenschaften des Apatits, Brucits, Coelestins, Prehnits, Natroliths, Skolezits, Datoliths und Axinit; von W. Hankel.

(Ber. d. math.-phys. Classe d. K. S. Ges. d. Wiss. (4. Febr. 1878); mitgetheilt vom Herrn Verf.)

Die folgende Abhandlung (die 13. in der Reihe meiner electrischen Untersuchungen) enthält die Untersuchung der thermoelectrischen Erscheinungen an einer Reihe von Krystallen, welche den verschiedensten Krystallsystemen angehören. Ich werde mich, da ein Eingehen auf das specielle Verhalten der einzelnen geprüften Individuen in diesem Berichte nicht möglich ist, auf die Mittheilung der allgemeinen Resultate beschränken.

DER PHYSIK UND CHEMIE.

NEUE FOLGE. BAND VI.

I. Das electrische Leitungsvermögen der wässerigen Lösungen von den Hydraten und Salzen der leichten Metalle, sowie von Kupfervitriol, Zinkvitriol und Silbersalpeter; von F. Kohlrausch.(Fortsetzung von p. 51.)

III. Theoretischer Theil.**15. Anordnung der Lösungen nach der Anzahl der gelösten electrolytischen Molecüle.**

Wie jede Betrachtung chemischer Vorgänge, so muss auch eine rationelle Behandlung der Electrolyse sich auf das chemische Molecül stützen. Welche grosse Vereinfachung der Erscheinungen man erzielen kann, indem man die Lösungen nach der in der Volumeneinheit enthaltenen Molecüle anstatt nach den gebräuchlichen Gewichtsverhältnissen definirt, habe ich schon früher¹⁾ bei den Lösungen einer Anzahl von Säuren gezeigt. Unsere nächste Aufgabe also ist, auch die im Vorigen untersuchten Flüssigkeiten ebenso zu ordnen.

Nun ist aber dasjenige Molecül, welches die Chemie insbesondere aus der Dampfdichte ableitet, nicht immer auch electrolytisch maassgebend. Wir werden vielmehr die Moleculargrössen so zu bestimmen haben, dass jedes Molecül eine und dieselbe Electricitätsmenge zu seiner Zersetzung bedarf, welche Bestimmung nach dem Faraday'schen Gesetz geschieht.

In diesem Sinne wollen wir von einer Verbindung, welche aus zwei einwerthigen Bestandtheilen besteht, das Molecül in der gewöhnlichen chemischen Formel ansetzen;

1) Pogg. Ann. CLIX. p. 268.

Ann. d. Phys. u. Chem. N. F. VI.

andernfalls soll als „electrochemisches Molecül“¹⁾ bezeichnet werden das chemische Molecül getheilt durch die Anzahl der bei seiner Zerlegung durch den Strom gelösten Affinitäten. Also z. B. $K - Cl$; $NH_4 - NO_3$; $\frac{1}{2} (Ba = Cl_2)$; $\frac{1}{2} (H_2 = SO_4)$; $\frac{1}{2} (Zn = SO_4)$; $\frac{1}{3} (H_3 = PO_4)$; immer natürlich in der Voraussetzung, dass die Electrolyse den Körper in die beiden Bestandtheile zerlegt, welche zu beiden Seiten der Verbindungsstriche stehen. In manchen Fällen ist man über die Trennung noch unsicher, z. B. bei den Aetzalkalien. Wird im Kalihydrat KOH das Kalium mit der positiven und das Hydroxyl OH mit der negativen Electricität verschoben, so ist $K - OH$ auch unser Molecül. Geschieht dagegen die Wanderung so, dass Kalium und Wasserstoff einseitig, Sauerstoff entgegengesetzt sich bewegt, so müssen wir setzen $\frac{1}{2} \left(\frac{K}{H} > O \right)$. In solchen zweifelhaften Fällen wird es am besten sein, zunächst das durch die chemische Formel bestimmte Molecül beizubehalten.

Die Anzahl der eben definirten electrochemischen Molecüle, welche in der Volumeneinheit enthalten sind, werde ich kurz die Molecülzahl oder den Moleculargehalt der Lösung nennen und durch m bezeichnen.

Um eine geeignete Grösse dieser natürlich nur relativen Zahlen zu haben, (welche zugleich der in § 32 einzuführenden absoluten Grösse nahe steht), mögen die Einheiten folgendermaassen gewählt werden (vgl. auch p. 14): Aus dem Procentgehalt und dem specifischen Gewicht bei 18° berechnet man die in 1 ccm Lösung enthaltene Milligrammzahl des Electrolytes und theilt letztere Zahl durch das electrochemische Moleculargewicht der Substanz. Diese Wahl der Einheiten kommt auf das nämliche hinaus, wie wenn man für die Volumeneinheit das Cubikmillimeter nimmt und dem Wasser-

1) Man könnte auch sagen „electrochemisches Aequivalent“, wenn nicht dieser Ausdruck in einer anderen Bedeutung gebräuchlich wäre.

stoffatome das Gewicht von ein Tausendtel Milligramm zuschreibt.

Die Molecülzahlen gelten also für 18° .

Die so definirten Molecülzahlen m haben wir bereits in Tabelle I für alle beobachteten Lösungen berechnet und den Lösungen beigeschrieben. Wegen der Verschiedenheit der Zahlen für verschiedene Körper gewährt diese Tabelle aber keine vergleichende Uebersicht. Desswegen findet man in Taf. I und II graphische Darstellungen mit den Molecülzahlen als Abscisse, dem Leitungsvermögen, bez. dem Temperaturcoefficienten als Ordinate. (Vgl. auch § 28). Ausserdem sollen der folgenden Tabelle VII Lösungen von lauter gleichen und nach gleichen Intervallen fortschreitenden Molecülzahlen zu Grunde gelegt werden. Man wird Lösungen von gleicher Molecülzahl passend als electrochemisch gleichwerthige oder äquivalente bezeichnen, denn zur vollständigen Erschöpfung ihres Electrolytes würden gleiche Volumina gleicher Strommengen bedürfen.

Die m sollen in Intervallen gleich 1, im Anfang aber bei stärker gekrümmten Curven, gleich 0,5 fortschreiten; schwer lösliche Körper und NH_3 werden nicht mit aufgeführt.

Zur Herstellung dieser Tafel aus den Beobachtungen von Tab. I dienten graphische Darstellungen der k und Δk dieser Tabelle, welches Verfahren eine grössere Genauigkeit gewährt als man auf den ersten Blick meinen wird. Denn die entstehenden Curven haben durchaus einen ähnlichen Charakter, und Auge und Hand erwerben desswegen bei dem Ausziehen dieser Curven bald eine grosse Sicherheit.

Ich habe die betreffenden Zeichnungen für jede Substanz mindestens zweimal, bei steilen Curven von nur wenigen Beobachtungspunkten (KOH , NaOH u. s. w.) auch drei- oder viermal gezeichnet, zum Theil auch in verschiedenen Dimensionen, und habe schliesslich aus den einzelnen Ergebnissen zu jedem m das Mittel genommen. Dabei bestätigte sich das eben über die Genauigkeit ge-

sagte, denn von etwa 900 graphisch entnommenen einzelnen Zahlen k unterschieden sich von dem schliesslichen Mittel nur etwa 25 Werthe um mehr als $\frac{1}{2}$ Proc. ihres Betrages; alle Unterschiede aber blieben unterhalb 1 Proc. Man kann daher mit einiger Zuversicht sagen, dass dieses graphische Verfahren höchst selten Fehler von 0,01 des Ganzen bewirkt haben wird. Man wird aus den Figuren der Taf. I und II leicht schätzen können, wo die Unsicherheiten grösser werden. Die letzte Stelle ist bei vierziffrigen Zahlen in der Regel unzuverlässig. Wo erheblich über die Beobachtungen hinaus gezeichnet wurde, ist der Werth von k eingeklammert.

CuN_2O_6 ist nach den Beobachtungen von Wiedemann (vgl. §. 9 p. 34), ZnSO_4 von $m = 4$ an nach Beetz dargestellt.

Tabelle VII.

m	$10^8 k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	m	$10^8 k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	m	$10^8 k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$
Chloride.			1,5	974	216	$\frac{1}{2}\text{BaCl}_2$		
KCl			2	1209	214	0,5	362	0,0214
			2,5	1412	213	1	658	207
	0,5	471 0,0206	3	1584	213	1,5	909	202
	1	911 199	3,5	1728	214	2	1128	199
	1,5	1328 188	4	1846	217	2,5	1311	196
	2	1728 182	4,5	1935	222	3	1462	0,0193
	2,5	2112 176	5	1991	227			
	3	2480 170	5,5	2018	0,0234	$\frac{1}{2}\text{SrCl}_2$		
NH ₄ Cl	3,5	2822 0,0164				0,5	353	0,0217
			LiCl			1	640	212
	0,5	466 0,0204	0,5	328	0,0229	1,5	882	208
	1	904 198	1	590	225	2	1082	0,0204
	1,5	1318 192	2	990	220	2,5	1250	—
	2	1720 186	3	1264	218	3	1387	—
	2,5	2102 179	4	1432	218	3,5	1499	—
	3	2474 172	5	1517	220			
NaCl	3,5	2836 166	6	1529	222	$\frac{1}{2}\text{CaCl}_2$		
	4	3181 162	7	1473	224	0,5	348	0,0218
	4,5	3491 158	8	1353	227	1	633	213
	5	3760 0,0155	9	1208	236	2	1083	207
			10	1057	251	3	1389	203
	0,5	380 0,0220	11	911	269	4	1583	201
	1	698 218	12	763	0,0288	5	1666	202
						6	1644	206

<i>m</i>	$10^8 \cdot k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	<i>m</i>	$10^8 \cdot k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	<i>m</i>	$10^8 \cdot k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$
7	1541	218	Na J			4	2561	0,0170
8	1370	231	0,5	388	0,0219	5	2929	165
9	1172	0,0244	1	729	212	6	3190	161
$\frac{1}{2}$ Mg Cl ₂			2	1296	201	7	3351	158
0,5	330	0,0226	3	1726	197	8	3419	0,0157
1	593	223	4	2026	0,0201	Na NO₃		
2	974	221	Li J			0,5	342	0,0223
3	1193	224	0,5	350	0,0218	1	615	219
4	1296	229	1	648	214	2	1019	216
5	1311	238	1,5	908	209	3	1290	216
6	1264	249	2	1142	205	4	1463	0,0219
7	1157	264	2,5	1352	0,0202	$\frac{1}{2}$ Ba N ₂ O ₆		
8	1001	282	Cyanide.			0,5	264	0,0241
9	817	306	KCN			$\frac{1}{2}$ Ca N ₂ O ₆		
10	616	0,0340	0,5	488	0,0208	0,5	314	0,0219
Bromide.			1	938	0,0195	1	541	219
K Br			Fluoride.			2	818	217
0,5	497	0,0203	K F			3	946	217
1	960	193	0,5	367	—	4	983	220
1,5	1404	184	1	676	0,0214	5	946	230
2	1832	177	2	1196	217	6	845	250
2,5	2243	171	3	1609	219	7	716	275
3	2623	166	4	1936	220	8	584	302
3,5	2977	160	5	2182	222	9	461	331
4	3294	0,0156	6	2338	226	10	355	0,0363
Jodide.			7	2416	232	$\frac{1}{2}$ Mg N ₂ O ₆		
K J			8	2422	238	0,5	309	0,0218
0,5	497	0,0203	9	2385	248	1	546	215
1	976	194	10	2303	0,026	2	890	211
2	1894	172	Nitrate.			3	1096	0,0207
3	2695	156	KNO₃			Ag NO₃		
4	3364	147	0,5	418	0,0209	0,5	363	0,0218
5	3826	142	1	754	206	1	632	216
6	(4070)	0,0140	1,5	1043	204	2	1036	211
$\text{NH}_4 \text{J}$			2	1298	201	3	1343	207
0,5	499	0,0205	2,5	1525	195	4	1577	206
1	973	199	3	1717	0,0188	5	1756	206
2	1862	188	$\text{NH}_4 \text{NO}_3$			6	1889	207
3	2647	176	0,5	442	0,0206	7	1981	0,0211
4	3347	164	1	831	199	$\frac{1}{2}$ Cu N ₂ O ₆		
5	3926	0,0153	2	1507	187	0,5	308	—
			3	2082	0,0178	1	512	—

<i>m</i>	$10^8 \cdot k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	<i>m</i>	$10^8 \cdot k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	<i>m</i>	$10^8 \cdot k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$			
Chlorate.			$\frac{1}{2} \text{Na}_2\text{SO}_4$			KHCO_3					
KClO_3	401	0,0212	0,5	280	0,0232	0,5	337	0,0206			
			1	482	242	1	613	0,0199			
			1,5	633	249	$\frac{1}{2} \text{Na}_2\text{CO}_3$	247	0,0244			
			2	752	254						
			2,5	848	0,0257						
Acetate.			$\frac{1}{2} \text{Li}_2\text{SO}_4$			1					
$\text{KC}_2\text{H}_3\text{O}_2$	312	0,0224	0,5	226	0,0236	0,5	423	252			
			1	389	237	1,5	553	262			
			2	574	0,0240	2	647	270			
			3	$\frac{1}{2} \text{MgSO}_4$	160	2,5	715	280			
			3			763	289				
			4			794	0,029 9				
			5			848					
			6			896					
			7			944					
			8			992					
9	1040										
10	1088										
Oxalate.			$\frac{1}{2} \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$			3,5					
$\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$	233	0,0253	0,5	145	0,0226	0,5	373	0,0214			
			1	244	224	1	688	209			
			2	373	228	1,5	959	0,0205			
			3	438	241	Hydrate.	KOH	928	0,0188		
			4	449	258						
			5	412	277						
			6	360	308						
			7	301	0,0336						
			8	240	218						
			9	375	228						
10	(451)	0,0241									
Sulfate.			$\frac{1}{2} \text{ZnSO}_4$			11					
$\frac{1}{2} \text{K}_2\text{SO}_4$	364	0,0218	0,5	142	0,0216	0,5	817	0,0194			
			1	240	218	1	1488	199			
			2	375	228	2	2447	209			
			3	(451)	0,0241	3	3020	221			
KHSO_4			Carbonate.			NaOH					
0,5	982	0,0086	$\frac{1}{2} \text{K}_2\text{CO}_3$	363	0,0227	0,5	817	0,0194			
						1	669	219	1	1488	199
						2	1166	211	2	2447	209
						3	1552	210	3	3020	221
						4	1839	212	4	3264	241
$\frac{1}{2} (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	351	0,0221	5	2016	216	5	3259	266			
			6	2102	223	6	3086	296			
			7	2114	232	7	2820	333			
			8	2052	244	8	2512	369			
			9	1905	262	9	2196	409			
			10	1695	285	10	1896	452			
			11	1412	0,0316	11	1644	497			
			12	1166	211	12	1424	0,0542			

m	$10^8 \cdot k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	m	$10^8 \cdot k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$
Na OH			Li OH		
13	1247	0,0586	0,5	694	0,0191
14	1115	633	1	1253	196
15	1016	681	1,5	1719	199
16	946	0,0726	2	2108	202
			2,5	2421	207
			3	2660	215
			3,5	2835	0,0225

16. Verdünnte Lösungen.

Wie wir schon öfter bemerkt haben, liegt ein besonderes Interesse, sobald man nach Beziehungen zwischen den Leitungsvermögen verschiedener Körper sucht, in ihren verdünnten Lösungen. Denn nur in solchen ist das Mittel, in welchem die Bestandtheile wandern, genähert dasselbe. Während in verdünnter Lösung die Bestandtheile, sie mögen selbst aus beliebigen Electrolyten stammen, wesentlich nur den Wassertheilchen begegnen, so finden dieselben in concentrirterer Lösung ein veränderliches Gemisch von Molecülen des Wassers, des Electrolytes und der entgegenkommenden Bestandtheile. Gewiss wird man auch im letzteren Falle Gesetze und Zusammenhänge zwischen den einzelnen Körpern finden können allein ohne Zweifel weniger einfach als im verdünnten Zustande.

Von der bekannten Thatsache ausgehend, dass von dem nicht leitenden Wasser ab durch Zusatz des Electrolytes ein stetiges Wachsthum des Leitungsvermögens, und zwar in erster Annäherung bei verdünnter Lösung dem Gehalte proportional, stattfindet¹⁾, berechnen wir wie

1) Aeusserste Verdünnung sei einer besonderen Untersuchung vorbehalten, wesswegen das kohlensaure Lithium aus den ferneren Betrachtungen weggelassen wird. Lösungen von Ammoniak und Essigsäure schliesse ich aus wegen ihrer anfangs sehr stark gekrümmten Curven.

früher das Leitungsvermögen k als Function der Molecülzahl m in dem Ausdruck:

$$k = \lambda \cdot m - \lambda' \cdot m^2.$$

Der Coëfficient λ , die Grenze, welcher sich das Verhältniss des Leitungsvermögens zur Molecülzahl bei grosser Verdünnung annähert, soll das moleculare Leitungsvermögen des Körpers in wässriger Lösung heissen.

Der Berechnung der Coëfficienten λ und λ' lege ich um der Gleichförmigkeit willen, wo es möglich ist, die Lösungen mit den Molecülzahlen m gleich 0,5 und 1 zu Grunde. Bei schwerlöslichen Körpern musste man zuweilen kleinere Gehalte nehmen, so für BaO_2H_2 0,15 und 0,3, BaN_2O_6 0,35 und 0,7.

Alaun, Jodwasserstoff und chlorsaures Kali sind nur in einer einzigen Lösung beobachtet worden, also lässt sich der quadratische Ausdruck nicht herstellen. Das aus $k = \lambda m$ berechnete λ wird aber, weil $\lambda' m^2$ überall positiv ist, etwas zu klein. Daher habe ich an KClO_3 und HJ eine kleine Correction angebracht. Nämlich die vorkommenden Coëfficienten λ' halten sich überhaupt in ziemlich engen Grenzen und sind bei verwandten Körpern für gleiche λ auch nahe gleich. Deswegen wird ohne Zweifel dem Jodwasserstoff ebenfalls nahe das für HCl und HBr so gut wie gleich gefundene λ' zukommen. Chlorsaures Kali wird sich dem Kalisalpeter nahe anschliessen. Unter diesen Annahmen habe ich das aus der einzelnen Lösung berechnete moleculare Leitungsvermögen corrigirt.

Während die aus $m = 5$ und $= 10$ gewonnenen λ den Vorzug gleichförmiger Gewinnung bieten, welche wegen der Willkürlichkeit des Ausdrucks $k = \lambda m - \lambda' m^2$ wünschenswerth ist, so darf doch eine andere Unsicherheit hier nicht übersehen werden, nämlich dass die zur Rechnung benutzten k nur graphisch interpolirt sind. Wir wollen deshalb noch eine zweite Berechnung der λ direct aus den Beobachtungen ausführen. Die Uebereinstimmung zwischen den Ergebnissen beider Wege wird entscheiden, ob überhaupt eine Berechtigung vorlag, von einem spe-

cifischen Leitungsvermögen der Substanzen in verdünnter Lösung zu reden.

Zum Zwecke dieser zweiten Berechnung machen wir von den Zahlen κ der Tab. VI p. 47 Gebrauch. Diese Zahlen bedeuten das Verhältniss des Leitungsvermögens zum gelösten Gewicht. Da die Molecülzahl aus dem Gewicht durch Division mit dem Moleculargewicht gewonnen wird, so erhalten wir λ , d. h. das Verhältniss des Leitungsvermögens zu der Molecülzahl, indem wir die κ mit dem Moleculargewicht multipliciren. (Wegen unserer Festsetzung der Volumeneinheit, p. 146, tritt noch eine Division durch 1000 hinzu, wie man leicht sieht.)

Dass der Gleichung des § 13 die Gewichtseinheit der Lösung zu Grunde lag, während wir jetzt auf die Volumeneinheit beziehen, hat natürlich auf den Coëfficienten des linearen Gliedes der Gleichung keinen Einfluss sondern würde sich erst geltend machen, wenn wir auch λ' aus κ' berechnen wollten. Denn mit wachsender Verdünnung nähert sich ja die Volumeneinheit der wässerigen Lösung der Gewichtseinheit immer mehr an.

Wir werden die so gefundenen λ in der ersten Spalte folgender Tabelle mittheilen, während daneben diejenigen Werthe stehen, welche aus $m = 0,5$ und $1,0$ berechnet worden sind.

Tabelle VIII.

	Aus 50% u. 100%.	Aus Mol.- Zahl. $m = 0,5$ u. $m = 1,0$.			Aus 50% u. 100%.	Aus Mol.- Zahl. $m = 0,5$ u. $m = 1,0$.	
	$\lambda \cdot 10^8$	$\lambda \cdot 10^8$	$\lambda' \cdot 10^8$		$\lambda \cdot 10^8$	$\lambda \cdot 10^8$	$\lambda' \cdot 10^8$
KCl	977	973	62	KBr	1044	1028	68
NH ₄ Cl	949	960	56	HBr	3098	3116	472
NaCl	808	822	124				
LiCl	680	722	132	KJ	1048	1012	36
HCl	3234	3231	466	NH ₄ J	1009	1023	50
$\frac{1}{2}$ BaCl ₂	799	790	132	NaJ	867	823	94
$\frac{1}{2}$ SrCl ₂	776	772	132	LiJ	765	752	104
$\frac{1}{2}$ CaCl ₂	742	759	126	HJ	—	3280	—
$\frac{1}{2}$ MgCl ₂	711	727	134				

	Aus 50/0 u. 100/0.	Aus Mol.- Zahl $m=0,5$ u. $m=1,0$.			Aus 50/0 u. 100/0.	Aus Mol.- Zahl. $m=0,5$ u. $m=1,0$.	
	$\lambda \cdot 10^8$	$\lambda \cdot 10^8$	$\lambda' \cdot 10^8$		$\lambda \cdot 10^8$	$\lambda \cdot 10^8$	$\lambda' \cdot 10^8$
KNO ₃	927	918	164	$\frac{1}{2}$ K ₂ SO ₄	793	783	110
NH ₄ NO ₃	932	937	106	$\frac{1}{2}$ (NH ₄) ₂ SO ₄	769	761	118
NaNO ₃	764	753	138	$\frac{1}{2}$ Na ₂ SO ₄	631	638	156
AgNO ₃	870	820	188	$\frac{1}{2}$ Li ₂ SO ₄	511	515	126
HNO ₃	3365	3323	442	$\frac{1}{2}$ H ₂ SO ₄	2032	2097	238
$\frac{1}{2}$ BaN ₂ O ₆	705	679	290	$\frac{1}{2}$ MgSO ₄	370	368	96
$\frac{1}{2}$ CaN ₂ O ₆	711	715	174	$\frac{1}{2}$ ZnSO ₄	336	336	92
$\frac{1}{2}$ MgN ₂ O ₆	680	690	144	$\frac{1}{2}$ CuSO ₄	325	328	88
KCN	1014	1014	76	$\frac{1}{2}$ K ₂ CO ₃	783	783	114
KF	763	792	116	$\frac{1}{2}$ Na ₂ CO ₃	546	565	142
KClO ₃	—	886	—	$\frac{1}{2}$ K ₂ C ₂ O ₄	806	804	116
KC ₂ H ₃ O ₂	700	694	140	$\frac{1}{2}$ H ₂ C ₂ O ₄	752	777	218
NaC ₂ H ₃ O ₂	550	543	154	KOH	1963	1991	270
				NaOH	1783	1782	294
				LiOH	1477	1523	270
				BaO ₂ H ₂	1673	1650	511

17. Ergänzung der molecularen Leitungsvermögen aus den Versuchen von R. Lenz.

In der neuen Arbeit von Lenz¹⁾, welche schon in § 9 zu einigen Vergleichen herangezogen wurde, sind mehrere Stoffe untersucht, welche in unseren Versuchen nicht vorkommen und als eine Ergänzung derselben von Werth sind, nämlich NH₄Br, NaBr, BaJ₂ und BaBr₂, CaJ₂ und CaBr₂, ZnJ₂, ZnBr₂ und ZnCl₂. Wir wollen, so weit es möglich ist, die Ergebnisse der Lenz' Messungen mit den unsrigen vergleichbar machen und wenigstens zu einer ungefähren Controle unserer späteren Schlüsse Näherungswerthe der molecularen Leitungsvermögen für die genannten Stoffe ableiten.

Lenz gibt (l. c. p. 310) die Gewichtsverhältnisse nebst genäherten specifischen Gewichten der Lösungen. Die Mole-

1) Dieser Aufsatz ist erst nach der theilweisen Veröffentlichung unserer Resultate (Gött. Nachr. 1876 p. 213) erschienen. Anm. bei der Correctur. Aus den Beibl. II p. 710; 1878 Nr. 12 erfahre ich eben das Vorhandensein einer neuesten Arbeit von Lenz, die leider hier nicht mehr benutzt werden konnte.

cülzahlen, welche sich hiernach für die Lösungen berechnen, liegen überall sehr nahe bei $m = 0,5$. Ich habe zuerst, unter Voraussetzung der Proportionalität des Leitungsvermögens mit dem Salzgehalt, die von Lenz beobachteten Widerstände alle genau auf $m = 0,5$ reducirt.

Lenz theilt die Temperaturen seiner Bestimmungen nicht mit¹⁾, hat aber durch vergleichende Widerstandsmessungen derselben Flüssigkeit an den verschiedenen Tagen alles auf den gleichen Wärmegrad zurückgeführt. Da die Temperaturcoëfficienten verdünnter Lösungen nach meinen Bestimmungen wenig verschieden sind, so werden die Leitungsvermögen bei 18° nahe in demselben Verhältniss stehen wie bei der gemeinsamen Temperatur, auf welche Lenz reducirt hat.

Es kam also nur darauf an, einen Reductionsfactor auf unsere Maasse zu finden, der aus denjenigen Flüssigkeiten, welche sowohl von Lenz wie von uns beobachtet worden sind, leicht bestimmt werden kann. Diese Flüssigkeiten sind²⁾ Lösungen von KCl , NH_4Cl , $NaCl$, KBr , KJ , NaJ , KCN . Die Leitungsvermögen dieser Stoffe für $m = 0,5$ wurden nun aus Tab. VII entnommen und daraus der Reductionsfactor in leicht ersichtlicher Weise bestimmt. Derselbe Factor diente dann, um auch die übrigen Beobachtungen von Lenz auf unser Maass zurückzuführen. Hierbei habe ich auf die Curvenkrümmung in folgender Weise möglichst Rücksicht genommen. Aus der graphischen Darstellung sämmtlicher Curven der Jod-, Brom- und Chlormetalle sieht man leicht, dass die selben ungefähr eine zusammenhängende Schaar bilden, d. h. dass der quadratische Coëfficient λ' durch den linearen λ nahezu bestimmt ist. Auch in den Zahlen der

1) Nachträgliche Anmerkung. Wenigstens nicht in dem ausführlicheren Aufsätze in den Bull. de Pétersb., nach welchem ich meine Rechnungen ausführte. In dem Auszuge (Pogg. Ann. CLX. p. 427) sagt Lenz, dass nahezu 18° die Temperatur sei.

2) Unter Ausschluss der Messungen an $BaCl_2$ und $CaCl_2$, die von Lenz selbst als ungenau bezeichnet werden und es auch ohne Zweifel sind.

Tab. VII spricht sich dies aus. Indem man diesen Zusammenhang graphisch darstellte, konnte man hieraus und aus den von Lenz beobachteten Leitungsvermögen für $m = 0,5$ die λ leicht berechnen. Eine Unsicherheit von mehreren Procenten haftet diesem Verfahren jedoch an.

In Tab. VIIIa sind zuerst die vergleichbaren, dann die nur von Lenz bestimmten molecularen Leitungsvermögen $\lambda \cdot 10^8$ aufgestellt.

Tabelle VIIIa.

	L.	K.	L.-K.	Lenz.	
KCl	983	975	+ 8	$\frac{1}{2}$ Zn Cl ₂	681
NH ₄ Cl	965	954	+ 11	NH ₄ Br	1029
NaCl	822	815	+ 7	Na Br	813
KBr	1045	1036	+ 9	$\frac{1}{2}$ Ba Br ₂	882
KJ	1027	1030	- 3	$\frac{1}{2}$ Ca Br ₂	729
NH ₄ J	1019	1016	+ 3	$\frac{1}{2}$ Zn Br ₂	692
NaJ	796	845	-29	$\frac{1}{2}$ Ba J ₂	881
KCN	1000	1014	-14	$\frac{1}{2}$ Ca J ₂	734
				$\frac{1}{2}$ Zn J ₂	705

Die Uebereinstimmung der acht vergleichbaren Werthe (die von Lenz selbst als fehlerhaft bezeichneten ausgeschlossen) ist bis auf NaJ sogar eine recht gute. Wir werden also auch die Reduction der übrigen Beobachtungen auf unsere Maasse als genähert richtig ansehen und die reducirten Zahlen neben den unsrigen verwenden dürfen, wenn auch, wie gesagt, Fehler von einigen Procenten dem Reductionsverfahren anhaften könnten. Auch dass Lenz nicht mit Sicherheit angeben kann, dass seine Substanzen bei der Lösung immer ganz trocken angewendet wurden, ist zu erwähnen. Die Zinksalze sind übrigens titirt worden, und ihre Resultate nehmen nach Lenz eine bedeutend grössere Genauigkeit in Anspruch als die übrigen.

18. Gruppierung der molecularen Leitungsvermögen der Electrolyte.

Stellen wir die molecularen Leitungsvermögen $\lambda \cdot 10^8$, wie dieselben in den vorigen drei Abschnitten definirt und

numerisch bestimmt worden sind, übersichtlich zusammen, indem wir die positiven Bestandtheile der Electrolyte nach den horizontalen, die negativen nach den verticalen Spalten ordnen, so dass also jedes Feld die Verbindung bezeichnet, welche aus seiner horizontalen und verticalen Bezeichnung zusammengesetzt ist, so entsteht folgende Tafel. Die aus der Arbeit von Lenz abgeleiteten Zahlen sollen mit einem * bezeichnet werden. CuN_2O_8 ist nach Wiedemann's Beobachtungen berechnet.

Tabelle IX.

	Cl	Br	J	NO_3	$\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2$	$\frac{1}{2}\text{SO}_4$	$\frac{1}{2}\text{CO}_3$	OH
K	$\lambda \cdot 10^9 = 975$	1036	1030	922	697	788	783	1977
NH_4	954	1029*	1016	934	—	765	—	—
Na	815	813*	845	758	546	634	555	1782
Li	701	—	758	—	—	513	—	1500
Ag	—	—	—	845	—	—	—	—
H	3232	3107	3280	3344	—	2064	—	—
$\frac{1}{2}\text{Ba}$	794	882*	881*	692	—	—	—	1661
$\frac{1}{2}\text{Sr}$	774	—	—	—	—	—	—	—
$\frac{1}{2}\text{Ca}$	750	729*	734*	713	—	—	—	—
$\frac{1}{2}\text{Mg}$	719	—	—	685	—	369	—	—
$\frac{1}{2}\text{Zn}$	681*	692*	705*	—	—	336	—	—
$\frac{1}{2}\text{Cu}$	—	—	—	720*	—	326	—	—

Zu der ersten Zeile kommen noch die einzelnen Stoffe:

KF	KCN	KClO_3	$\frac{1}{2}\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$
$10^9 \lambda = 777$	1014	886	764

Die Erwartung, dass vorhandene Gesetzmässigkeiten nach der Einführung der Molecülzahlen der Lösungen hervortreten würden, finden wir in dieser Zusammenstellung in vollkommenem Maasse erfüllt. Die Schwierigkeiten, welche noch in Tab. VI einer Gruppierung der Körper entgegenstanden, sind verschwunden.

Als diejenige Gruppe von Verbindungen, deren Leitungsvermögen dasjenige der übrigen weit überwiegt, steht obenan die Gruppe der einbasischen Säuren (Wasserstoffverbindungen), und zwar mit fast gleichen molecularen Leitungsvermögen, d. h. mit Unterschieden voneinander,

welche über die Fehler der Beobachtung und der Ableitung der λ aus der Beobachtung kaum hinausgehen.¹⁾

Als eine zweite Gruppe bietet sich, mit Leitungsvermögen, welche hinter den eben genannten erheblich zurückstehen, aber den übrigen weit überlegen sind, die der Aetzalkalien (OH-Verbindungen) in der Reihenfolge Ka, Na, Ba, Li.

Demnächst fällt die durchgängige, fast vollkommene Gleichheit der Leitungsvermögen von Kalium und den entsprechenden Ammoniumverbindungen auf²⁾, sowie andererseits auch die Haloide Chlor, Brom, Jod, Cyan, aber nicht das Fluor, in ihren Verbindungen mit diesen Metallen nur geringe Unterschiede zeigen. Man kann also eine dritte und zwar fast gleiche Gruppe der Haloidsalze des Kaliums und Ammoniums constatiren. Auch die Salpetersäure gehört nahe hierher.

Auch die übrigen Metalle geben, wie auch Lenz findet, jedesmal mit den drei Haloiden nicht sehr verschiedene Leitungsvermögen, selbst in der Reihenfolge Natrium, Barium, Strontium, Calcium, Lithium, Magnesium, Zink sich ordnend.³⁾

Die zweibasische Schwefelsäure steht unterhalb der einbasischen Säuren. Dass sie der Gruppe der Aetzalkalien nahe kommt, ist wohl nur ein Zufall.

Ebenso stehen die schwefelsauren Salze der einwerthigen Metalle stets eine Stufe unter den entsprechenden Haloidsalzen oder Nitraten. Noch weiter unten befinden sich die kohlen sauren und dann die essig sauren Salze.

Eine letzte in jeder Beziehung nahe zusammenhängende Gruppe haben wir endlich in den Sulfaten von Magnesium, Zink und Kupfer.

1) Hierauf habe ich schon in einer früheren Abhandlung über das Leitungsvermögen einiger Säuren hingewiesen. Münch. Sitzungsber. 1875. p. 299; Pogg. Ann. CLIX. p. 268.

2) Welche Gleichheit auch in der Tabelle von Grotrian und mir hervortritt. (Pogg. Ann. CLIV. p. 236.)

3) Vgl. auch K. und Grotrian l. c.

Quantitativ drücken sich die erwähnten Beziehungen innerhalb der Alkaligruppe der einbasischen Salze folgendermaassen aus. Bilden wir die Differenzen aus unseren Beobachtungen der $\lambda \cdot 10^8$ für die Kalisalze gegen die entsprechenden Salze der anderen Alkalien, so finden wir:

	Cl	J	NO ₃	C ₂ H ₃ O ₂
K — NH ₄	21	14	—12	—
K — Na	160	185	164	151
K — Li	274	272	—	—

Alle diese Beziehungen werden wir in § 21 zu einem Gesetze zusammenzufassen suchen.

19. Die Hittorf'schen Wanderungszahlen der Jonen.

Einen hervorragenden Dienst bei diesem Vorhaben werden uns die relativen Geschwindigkeiten der wandernden Bestandtheile leisten, die wir den so vortrefflichen und grossen Arbeiten Hittorf's¹⁾ und den anschliessenden und theilweise ergänzenden Untersuchungen von G. Wiedemann²⁾ und von Weiske³⁾ verdanken.

Es ist offenbar zu erwarten, dass das electrische Leitungsvermögen des Electrolytes, das ist die Leichtigkeit, mit welcher dessen Theile die Lösung durchschreiten, einen nahen Zusammenhang mit der relativen Weglänge der beiden Bestandtheile zeigen werde, welche Weglänge eben durch die oben genannten Arbeiten festgestellt worden ist. Unsere erste Aufgabe wird darin bestehen, aus den von den Beobachtern mitgetheilten Resultaten jedesmal die Zahlen für verdünnte Lösungen abzuleiten.

Wir werden uns dabei an Hittorf's Bezeichnungsweise halten und jedesmal die Ueberführungszahl n des

1) Ueber die Wanderungen der Jonen während der Electrolyse, Pogg. Ann. LXXXIX. p. 176; XCVIII. p. 1; CIII. p. 1; CVI. p. 337, 513. Eine fast vollständige Zusammenstellung der Resultate auch Wiedemann, Galv. I. p. 558.

2) Pogg. Ann. XCIX. p. 177.

3) Pogg. Ann. CIII. p. 466.

Anions mittheilen. Diese Zahl hat folgende Bedeutung: Denkt man sich irgend einen zwischen den Electroden durch die Flüssigkeit gelegten Querschnitt, jedoch so gelegen, dass die Aenderungen der Concentration um die Electroden diesen Querschnitt nicht erreichen. Bestimmen wir vor und nach dem Stromdurchgang die Bestandtheile zu beiden Seiten dieses Querschnittes, so stellt sich einerseits eine Vermehrung des positiven, andererseits des negativen Bestandtheiles durch die Electrolyse heraus.¹⁾ Diese Zuwächse entsprechen den durch diesen Querschnitt electrolytisch durchgetriebenen Mengen der beiden Ionen.

Die Hittorf'sche Ueberführungszahl n des Anions bedeutet die durch den Querschnitt gewanderte Anzahl der Molecüle (Aequivalente) des Anions im Verhältniss zu der gleichzeitig zersetzten Anzahl der Molecüle des Electrolytes. Mit anderen Worten bedeutet n , wie Hittorf zeigt, das Verhältniss der Geschwindigkeit des Anions zu der Summe der beiden Geschwindigkeiten des Anions und des Kations. Hittorf hat nachgewiesen, dass dieses Verhältniss von der Stromstärke nicht beeinflusst wird, dass also jeder Lösung ein ganz bestimmtes n zukommt.

Wir wollen stets mit u die Geschwindigkeit des Kations, mit v diejenige des Anions bezeichnen.

Dann ist also:

$$n = \frac{v}{u + v}, \quad 1 - n = \frac{u}{u + v}, \quad \frac{1 - n}{n} = \frac{u}{v}.$$

Die Ueberführungszahlen sind in der Regel für jeden Electrolyt in mehreren Lösungsverhältnissen ermittelt worden und zeigen sich im allgemeinen mit dem Concentrationsgrade veränderlich.

Die Ableitung der n für verdünnte Lösungen aus diesen Beobachtungen wird sich leider nicht so einfach und gleichmässig für alle Körper durchführen lassen, wie

1) Von seltenen Fällen abgesehen, welche übrigens in verdünnter wässriger Lösung nicht vorkommen.

dies bei den Leitungsvermögen möglich war. Denn die Bestimmungen der letzteren Grösse erlaubten eine grosse Genauigkeit; die Curven ihrer graphischen Darstellung liessen sich leicht und ziemlich sicher ausziehen, und daraus konnte man das Leitungsvermögen, wie wir gethan haben, jedesmal für die beiden Molecülzahlen $m = 0,5$ und $1,0$ entnehmen und unter der erleichternden Kenntniss, dass das reine Wasser überhaupt nicht leitet, eine Formel für das Leitungsvermögen aufstellen.

So genau lassen sich selbstverständlich die Ueberführungszahlen nicht beobachten. Wenn es Hittorf auch gelungen ist, durch eine bewundernswürdige Geschicklichkeit in der Anordnung seiner Apparate und die entsprechende Sorgfalt seiner Strombestimmungen und Analysen seinen Resultaten ein überraschendes Maass von Sicherheit zu geben, so war doch wohl überall die dritte Decimale einer Bestimmung von n um mehrere Einheiten unsicher; häufig wird auch die zweite Decimale nicht mehr zu verbürgen sein.¹⁾ Insbesondere wird das letztere für diejenigen Electrolyte gelten, bei denen nicht die Ionen beide durch Analyse bestimmt werden konnten, sondern wo die Wanderung des einen aus derjenigen des anderen berechnet werden musste. Dies ist aus ersichtlichen Gründen bei allen Säuren und auch bei den von Wiedemann beobachteten Aetzalkalien der Fall.

Diese Sachlage spricht sich auch in der graphischen Darstellung der Resultate aus. Die Beobachtungen liegen keineswegs in dem Maasse wie diejenigen der Leitungsvermögen auf einem Curvenzuge, den man nur mechanisch zu ergänzen brauchte. Man ist oft zweifelhaft, wie man die Curve durchziehen soll, und wenn man aus diesen Darstellungen überall die n für zwei oder drei bestimmte Molecülzahlen entnehmen und daraus auf Null zurückrechnen wollte, so könnten bedeutende Fehler entstehen.

1) Vgl. Hittorf, Pogg. Ann. CIII. p. 35.

Theilweise freilich liegen Beobachtungen an äusserst verdünnten Lösungen direct vor, und es entsteht die Frage, ob man nicht diese Werthe ohne Weiteres annehmen soll. Allein dagegen habe ich einige Bedenken. Für Salzsäure z. B. findet Hittorf die Ueberführungszahlen n des Chlors in Lösungen¹⁾:

von 25	9,1	2,7	1,2	0,7	0,31	0,047 % HCl
oder $m = 7,8$	2,6	0,7	0,3	0,19	0,08	0,012
$n = 0,319$	0,193	0,163	0,161	0,171	0,216	0,210.

Von der starken Lösung ausgehend sinken also die Ueberführungszahlen zunächst bedeutend bis auf den Werth 0,16 bis 0,17, welcher zwischen den Moleculzahlen 0,19 und 0,7 ziemlich constant bleibt, steigen alsdann jedoch wieder erheblich. Aehnliches zeigt sich bei der Schwefelsäure, das umgekehrte dagegen bei dem Jodkalium und in geringerem Maasse auch bei dem Chlorkalium.

Diese Abweichungen können entweder mit Neben Umständen zusammenhängen, welche vielleicht die Versuche mit den äussersten Verdünnungen betroffen haben, oder sie sind gesetzmässigen Ursprunges. Aber auch in dem letzteren Falle trage ich Bedenken, diese Zahlen mit zu berücksichtigen, weil so weit gehende Verdünnungen auch bei den Leitungsvermögen bisher ausgeschlossen worden sind, aus dem Grunde, weil auch hier in äusserster Verdünnung eigenthümliche Verhältnisse auftreten, über die ich in einem anderen Zusammenhange berichten werde.

Hittorf selbst legt offenbar kein Gewicht auf den Gang der Zahlen bei äusserster Verdünnung, denn er sagt über die Salzsäure: „Die Ueberführungszahlen sind grossen „Schwankungen unterworfen, solange die Concentrationen „der Lösung bedeutend sind, halten sich aber dann inner- „halb ziemlich enger Grenzen.“²⁾

1) Pogg. Ann. CVI. p. 394.

2) Nachträglich. In seinem neuen Aufsätze macht übrigens Hittorf selbst auf den eigenthümlichen Gang der Ueberführungszahlen bei Salzsäure und Schwefelsäure aufmerksam. (Wied. Ann. IV. p. 415).

Indem ich es dahin gestellt sein lasse, ob nicht besser die äussersten Verdünnungen ganz auszuschliessen wären, habe ich einstweilen folgendes Verfahren zur Ableitung der von uns gesuchten Zahlen angewandt: Wenn mehrere Lösungen unter $m = 0,5$ untersucht worden waren, nehme ich das Mittel aus den betreffenden n . Liegt dagegen nur eine einzige geringhaltige Lösung vor, so habe ich den Werth n etwa für $m = 0,2$ inter- oder extrapoliert.

Ausser den Zahlen von Hittorf sind dabei diejenigen von Wiedemann für Aetzkali ausschliesslich, für Schwefelsäure und für Chlornatrium mit benutzt worden. Für Aetznatron, Kupfernitrat und Salpetersäure wurden die von Wiedemann an seinen verdünntesten Lösungen gefundenen Zahlen eingesetzt¹⁾, welche freilich bei Aetznatron der Zahl $m = 0,8$ entsprechen. Ich bemerke dabei, dass die Zahlen der Aetzkalkalien nicht die Ueberführung des Anions sondern des Metalles bedeuten.

Chlorstrontium wurde den Beobachtungen von Weiske entnommen.

An Jodnatrium, Jodcalcium und Jodmagnesium ist nur je eine Beobachtung von Hittorf in ziemlich starker Lösung angestellt worden. Den Unterschied, welchen diese Zahlen gegen die gleichhaltigen Lösungen der entsprechenden Chloride ergeben, habe ich auch für grössere Verdünnungen angenommen, was natürlich einige Unsicherheit mit sich bringt.

Bei dem oxalsauren Kali, dessen n für $m = 2,6$ gilt, fehlt jedes Reductionsmittel auf verdünnte Lösungen.

Im Ganzen also, ganz besonders aber bei den letztgenannten Stoffen, werden wir die aus den Beobachtungen abgeleiteten Ueberführungszahlen der verdünnten Lösungen bis auf mehrere Procente unsicher annehmen müssen.

1) Pogg. Ann. XCIX. p. 186, 192, 204, unter Ausschluss der von Wiedemann als nicht ganz zuverlässig bezeichneten Electrolyse der Salpetersäure mit eingeschaltetem Diaphragma und der zwischen Platinelectroden untersuchten Kupferlösung ohne Diaphragma, welche ein weit von den übrigen abweichendes Resultat ergibt.

Tabelle X. Ueberführungszahlen n verdünnter Lösungen.

	Cl	Br	J	CN	NO ₃	C ₂ H ₃ O ₂	$\frac{1}{2}$ SO ₄	OH
K	0,515	0,514	0,505	0,47	0,498	0,329	0,499	0,23 Ka
NH ₄	0,510	—	—	—	—	—	—	—
Na	0,623	—	0,60	—	0,613	0,430	0,635	0,16 Na
Ag	—	—	—	—	0,526	0,375	0,556	—
H	0,19	0,19	0,25	—	0,14	—	0,195	—
$\frac{1}{2}$ Ba	0,618	—	—	—	0,61	—	—	—
$\frac{1}{2}$ Sr	0,655	—	—	—	—	—	—	—
$\frac{1}{2}$ Ca	0,673	—	0,68	—	0,59	—	—	—
$\frac{1}{2}$ Mg	0,682	—	0,66	—	—	—	0,63	—
$\frac{1}{2}$ Zn	0,70	—	0,68	—	—	—	0,64	—
$\frac{1}{2}$ Cu	—	—	—	—	0,59	—	0,645	—

20. Allgemeine Bemerkungen über die Electrolyse wässriger Lösungen.

Die früher verbreitete Ansicht, dass neben der electrolytischen Leitung eine der ersteren an Grösse vergleichbare „metallische“ Leitung hergehe, kann jetzt als widerlegt betrachtet werden. Gegen eine Leitung der Flüssigkeiten ohne Zersetzung spricht, ausser den bekannten Versuchen von Buff, de la Rive u. A.¹⁾ das Faraday'sche Gesetz, insbesondere im Zusammenhange mit Hittorf's Untersuchungen. Man müsste sonst von der metallischen Leitung annehmen, dass sie zu der zersetzenden Leitung in allen Electrolyten im gleichen Verhältniss stehe, wofür doch gar kein Grund vorliegt. Ja es wäre sonderbar, wenn die „metallische“ Leitung ein Maximum für bestimmte Mischungsverhältnisse des Electrolytes mit dem Lösungsmittel haben sollte; wenn diese Leitung erst durch die Mischung verschiedener Körper entstehen, in den einzelnen dagegen ausgeschlossen sein sollte, was jetzt fast allgemein von der electrolytischen Leitung nachgewiesen ist.²⁾

1) Wiedemann, Galv. (2) I. p. 474.

2) Es mögen hier einige Worte zu der neuen interessanten Arbeit von Bleekrode (Wied. Ann. III. p. 161) gestattet sein. Nach den von mir an der Schwefelsäure und der Essigsäure beobachteten Erscheinungen

Als einen fernerer Wahrscheinlichkeitsgrund gegen eine nicht zersetzende Leitung kann man auch anführen, dass die Electrolyte durchsichtig sind, und dass man bekanntlich eine „metallische“ Leitung an keinem durchsich-

hatte ich die Vermuthung ausgesprochen, es würden auch Flüssigkeiten, wie HCl und HNO_3 im wasserfreien Zustande „ein sehr geringes Leitungsvermögen besitzen, ja vielleicht Nichtleiter sein“, (Münch. Sitzungsber. 1875, p. 304; Pogg. Ann. CLIX. p. 271) und hatte besonders betont, dass man keine einzige Flüssigkeit kennt, welche in gewöhnlicher Temperatur für sich ein gut leitender Electrolyt wäre. Bleekrode's reichhaltige Arbeit hat seitdem nicht nur den letzteren Satz an einer sehr grossen Reihe von Körpern bestätigt, sondern insbesondere auch das wohl allgemein angenommene Leitungsvermögen von HCl , HBr , HJ (vgl. z. B. Wiedemann's Galv. I. p. 615) widerlegt. Ich will selbst hinzufügen, dass eine etwa 92-procentige Salpetersäure nur den zehnten Theil des Maximalleitungsvermögens der wässrigen Salpetersäure besitzt, wonach die wasserfreie HNO_3 ebenfalls sehr wenig oder nicht leiten wird.

Bleekrode führt die von mir ausgesprochene Vermuthung in einer Anmerkung an und sagt (Wied. Ann. III. p. 194), diese Vermuthung sei von mir ausgesprochen worden, „bevor ich von seinen Versuchen in Kenntniss gesetzt worden war“. Ebenso correct hätte dieser Ausdruck auch lauten können, dass meine Vermuthung ein Jahr vor seinen Versuchen veröffentlicht worden ist.

Es kommt freilich nicht viel auf diese Prioritätsfrage an, denn wie ebenfalls Bleekrode mittheilt, ist die Thatsache des Isolationsvermögens von wasserfreier HCl und HF schon 1869 von Gore gefunden worden. Das Uebersehen dieser wichtigen Entdeckung meinerseits ist wohl verzeihlich, da dieselbe unter dem vorwiegend chemischen Inhalte von Gore's Arbeit auch von den „Fortschritten der Physik“ übersehen worden ist.

Das Ammoniak und die Cyanwasserstoffsäure betreffend, welche Bleekrode sehr gute Leiter nennt, pflichte ich Hittorf (Wied. Ann. IV. p. 412) bei, dass man diesen Schluss aus Bleekrode's Versuchen nicht ziehen kann. Denn die Flüssigkeiten befanden sich zwischen Electroden von 2 bis 3 mm Abstand, wurden mit sehr kräftigen Säulen angegriffen, und die Stromstärke beobachtete man an einem sehr empfindlichen Galvanoskope. Im Gegentheile kann man von dem flüssigen Ammoniak, welches unter diesen Umständen mit 20 Bunsen'schen Bechern nur 5° Auschlag lieferte, mit Bestimmtheit behaupten, dass es ein äusserst schlechter Leiter ist. Von HCN ist dasselbe sonst wahrscheinlich.

tigen Körper kennt. Auch die Unabhängigkeit des Leitungsvermögens von der Beleuchtung (§ 8) ist hier zu nennen.

Eine Thatsache endlich, welche man als eine Stütze der metallischen Leitung aufzählen konnte¹⁾, dass man nämlich Ströme in Flüssigkeiten beobachtet, deren Zersetzung unter den bestimmten Umständen gegen das Energieprincip streiten würde, hat Helmholtz auf andere Umstände zurückgeführt.²⁾

Von einer Leitung der Electrolyte ohne Zersetzung darf man also vollständig absehen. Eine zweite Vereinfachung der Anschauungen tritt nun noch dadurch ein, dass jetzt allgemein, und wohl mit Recht, angenommen wird, die Electrolyse wässriger Lösungen zersetze nicht theilweise das Wasser, theilweise den gelösten Körper, sondern lediglich den letzteren allein. In der That leitet das reine Wasser mindestens eine Millionmal schlechter, als manche Lösungen.³⁾ Freilich würde diese Thatsache allein immer noch die Möglichkeit offen lassen, dass das Wasser durch den Zusatz anderer Körper selbst leitend wird. Indessen liegen zahlreiche Bestimmungen von Hittorf vor, welche sich auf die Wanderung beider Jonen in wässrigen Lösungen beziehen; jedesmal fand sich die Summe beider Wanderungen merklich gleich derjenigen, welche zu erwarten war, wenn das Wasser nicht mit zersetzt wurde. Noch durch andere Erscheinungen hat Hittorf diese Annahme vielfach gestützt.⁴⁾

Einstweilen werden wir also auf dieser Anschauung weiter zu bauen haben.

1) Vgl. z. B. Favre, Compt. rend. LXXIII. p. 1463.

2) Pogg. Ann. CL. p. 483.

3) Pogg. Ann. Ergbd. VIII. p. 1.

4) Siehe insbesondere Pogg. Ann. CIII. p. 36; auch Wiedemann's Galv. (2) I. p. 471, 490.

21. Das Gesetz von der unabhängigen Wanderung der Jonen.

Diese Annahme, dass die Electricitätsleitung von Lösungen lediglich durch die Wanderung der electrolytischen Bestandtheile des gelösten Körpers stattfindet, erleichtert natürlich die Uebersicht über unser Gebiet wesentlich und wird dasselbe auch einer quantitativen Betrachtung zugänglich machen, wobei wir in dem Faraday'schen Gesetze, dass mit der Trennung äquivalenter Mengen beliebiger Stoffe stets die Scheidung derselben Electricitätsmengen verbunden ist, den einfachsten Ausgangspunkt haben.

Da das lösende Wasser nur als das Mittel dient, in welchem die electrolytischen Verschiebungen stattfinden, so werden wir unbedenklich mit Wiedemann, Beetz, Quincke sagen können, dass der electricische Widerstand einer Lösung sich aus den Bewegungswiderständen zusammensetzt, welche die Bestandtheile des Electrolytes an den Wassertheilchen, aneinander und vielleicht noch an unzersetzten Molecülen des Electrolytes finden. Diese verschiedenen Hindernisse von einander zu trennen, wird indessen nicht leicht sein, besonders da dieselben, wie auch Quincke hervorhebt, nicht constant zu sein brauchen, sondern zum Beispiel von den Lösungsverhältnissen abhängen können. Der Vorgang der Leitung wird sich also auch unter diesen Gesichtspunkten im allgemeinen noch als ein verwickelter darstellen.

Anders aber gestaltet sich die Betrachtung, wenn man sich auf verdünnte Lösungen beschränkt. Für diesen Fall scheint ein einfacher Schluss nahezuliegen, der wesentlich zur Entwirrung der Erscheinungen beitragen muss, der aber meines Wissens bis jetzt nirgends ausgesprochen worden ist: In verdünnter Lösung wird das electricische Leitungsvermögen (ausser von der Anzahl der gelösten Molecüle) nur von den wandernden Bestandtheilen, nicht aber von deren Verbindung miteinander abhängen.

Je mehr nämlich die Anzahl der Wassertheilchen diejenige des Electrolytes überwiegt, desto mehr wird wesent-

lich nur die moleculare Reibung der Jonen an den Wassertheilchen, nicht aber ihre Reibung aneinander in Betracht kommen. Dann aber wird es, um ein Beispiel zu wählen, für das Chloratom gleichgültig sein, ob dasselbe aus KCl , NaCl , HCl u. s. w. electrolysirt wird. Es ist ja in allen Fällen dasselbe Chlor, nach Faraday verbunden mit derselben mitgeführten Electricitätsmenge, welches von der electrischen Scheidungskraft durch das Wasser getrieben wird.

Hiernach muss also jedem electrochemischen Elemente — z. B. dem H , K , Ag , NH_4 , Cl , J , NO_3 , $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2$ — in verdünnter wässriger Lösung ein ganz bestimmter Widerstand zukommen, gleichgültig aus welchem Electrolyte der Bestandtheil abgeschieden wird. Aus diesen Widerständen, welche für jedes Element ein für allemal bestimmbar sein müssen, wird sich das Leitungsvermögen jeder (verdünnten) Lösung berechnen lassen.

Um Missverständnissen vorzubeugen, will ich zu dem eben Gesagten gleich folgendes hinzufügen.

Erstens kann man selbstverständlich nicht von vornherein behaupten, dass ein Atom, welches für sich wandert, denselben Widerstand finden wird, wie wenn es mit einem zweiten Atome zusammen aus einer Verbindung mit einem mehrwerthigen Elemente abgeschieden wird. Ob z. B. zwei einzeln wandernde Atome KK oder ClCl aus zwei Moleculen KCl oder dergleichen sich mit derselben Leichtigkeit durch das Wasser schieben wie das Doppelatom K_2 oder Cl_2 , welches etwa aus dem Molecüle K_2SO_4 oder BaCl_2 entsteht, ist im allgemeinen nicht vorauszusehen.

Daher wird es auch nicht gleichgültig sein, ob z. B. das Chlorkalium, wie man gewöhnlich annimmt, in wässriger Lösung als einfach KCl existirt, oder ob es, wie manche neuere Chemiker für wahrscheinlich halten, zu Moleculen K_3Cl_3 oder ähnlichen zusammengehäuft ist.¹⁾

1) L. Meyer, Theorien der Chemie (2) p. 267.

Ebenso wird die Beweglichkeit beeinflusst werden, wenn die gelösten Körper etwa mit dem Wasser selbst chemische Verbindungen eingehen, oder, wie Quincke als den allgemeinsten Fall hervorhebt, wenn zwischen den gelösten und den lösenden Theilchen electriche Scheidungen (durch Contact) stattfinden, anstatt dass das Lösungsmittel bloss die Rolle eines mechanischen Trägers spielte. Zu diesen Fällen würde auch die Möglichkeit zu rechnen sein, welche Hittorf¹⁾ als von Thomsen sowie Berthelot aufgestellt anführt, dass z. B. die Salzsäure nicht als HCl sondern als $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O}$ oder $\text{HCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ in der Lösung vorhanden wäre. Auch die wichtige Streitfrage, ob das Krystallwasser schon in der Lösung eine besondere Rolle spielt, oder erst bei der Festwerdung des Stoffes (vgl. § 6), muss hier erwähnt werden.

Da wir von dem Wesen einer „Lösung“ in der That sehr wenig wissen, so können wir Möglichkeiten, wie die eben genannten, sicher nicht von vornherein ausschliessen. Aber ebenso sicher dürfte sein, dass unter der Berücksichtigung aller der Möglichkeiten, welche die neuere Chemie aufstellt, einstweilen auf theoretische Anschauungen der Electrolyse überhaupt Verzicht geleistet werden müsste.

Einer Rechtfertigung bedürfen wir deswegen nicht, wenn wir, uns an die hergebrachten einfachsten chemischen Anschauungen haltend, den Versuch anstellen, wie weit dieselben, in Verbindung mit dem oben aufgestellten Satze von der unabhängigen Beweglichkeit der Bestandtheile, eine rationelle Auffassung der Electrolyse ermöglichen.

Vielleicht ergibt dieser Versuch in der Folge für die Chemie selbst, welche die Electrolyse bis jetzt auffallend wenig zu Rathe gezogen hat, einen Prüfstein oder einen Ausgangspunkt von Vorstellungen über die chemische Beschaffenheit der Lösungen, insbesondere über die Mole-

1) Wied. Ann. IV. p. 414.

culargrösse der gelösten Stoffe und ergänzt somit eine von den Chemikern schwer empfundene Lücke.¹⁾

Stellen wir uns nun von einem Electrolyte eine verdünnte Lösung von cylindrischer Gestalt vor, welche die Einheit des Querschnittes und der Länge besitzt. In dieser Volumeneinheit sollen m electrochemische Molecüle (chemische Aequivalente) des Electrolytes gelöst sein. Nach der Richtung der Cylinderaxe wirke die electromotorische Kraft (wegen der Längeneinheit können wir auch sagen das Potentialgefälle) Eins. Durch diese Kraft mögen die Jonen fortgeschoben werden: das Kation mit der Geschwindigkeit U , das Anion mit der Geschwindigkeit V in entgegengesetzter Richtung.

Es sei endlich ϵ die Menge positiver oder negativer Electricität, welche, nach dem Faraday'schen Gesetze für alle Electrolyte identisch, mit jedem Theilmolecüle sich fortschiebt.

Der Strom, welchen die electromotorische Kraft Eins im Cylinder von Länge und Querschnitt Eins erzeugt, heisst das Leitungsvermögen des betreffenden Stoffes und werde mit k bezeichnet. Andererseits ist dieser Strom nach Obigem gleich $\epsilon(U+V)m$, oder, wenn $\epsilon U = u$, $\epsilon V = v$ gesetzt wird:

$$k = (u + v)m.$$

Den Factor, mit welchem die Molecülzahl m zu multipliciren ist, um das Leitungsvermögen einer (verdünnten) Lösung zu erhalten, nannten wir aber specifisches moleculares Leitungsvermögen des gelösten Körpers (§ 16, p. 152). Behalten wir für diese Grösse unsere Bezeichnung λ bei, so haben wir also:

$$(1) \quad u + v = \lambda.$$

1) Lothar Meyer sagt (l. c. p. 226): Die Mittel zur Bestimmung des Moleculargewichtes im flüssigen oder festen Zustande sind bis jetzt noch ganz unentwickelt. — Ferner (p. 278): Wir bewegen uns da auf einem rein hypothetischen Gebiete, auf dem auch dem kühnsten Fluge der Phantasie keine Schranke gesteckt ist.

Die Theile u und v , in welche so λ zerlegt ist, welche einzeln einem der beiden Ionen angehören, können wir kurz die „Beweglichkeit“ oder auch geradezu das „moleculare Leitungsvermögen“ des Ions in wässriger Lösung nennen.

Die Beziehung der Gleichung (1) kann offenbar auf jedes Maasssystem angewandt werden; wir wollen einstweilen unser bisheriges beibehalten.

Weiter ist nun das Verhältniss:

$$(2) \quad \frac{v}{u+v} = n,$$

die Hittorfsche Wanderungszahl des Anions (vgl. p. 160).

Aus den Gleichungen (1) und (2) können wir, wenn λ und n gegeben sind, die Beweglichkeiten der Ionen u und v einzeln berechnen, nämlich:

$$(3) \quad u = (1 - n) \lambda, \quad v = n \lambda.$$

Diese Berechnungen haben wir jetzt auszuführen.

Wenn man, um unsere Beziehungen an einem Beispiele zu prüfen, die Rechnung mit Hülfe der in Tab. IX und X gegebenen λ und n an einigen Kali- und Natronsalzen anstellt, so findet man aus dem:

	Chloride	Jodide	Nitrate	Acetate
für Kalium	$10^7 u = 48$	51	46	47
„ Natrium	$10^7 u = 31$	34	29	31.

Ferner für:

	Cl	J	NO ₃	C ₂ H ₃ O ₂
aus dem Kalisalze . .	$10^7 v = 50$	52	45	23
„ „ Natronsalze .	$10^7 v = 51$	51	46	23.

In diesen Beispielen sehen wir unsere Vermuthung, dass die Beweglichkeit eines Ions in verschiedenen Verbindungen die gleiche ist, mit grosser Annäherung bestätigt. Die Mittelwerthe der obigen Einzelbestimmungen geben für:

K	Na	Cl	J	NO ₃	C ₂ H ₃ O ₂
48,0	31,2	50,5	51,5	45,5	23,0

und von diesen weichen die einzeln berechneten Zahlen kaum stärker ab, als die Unsicherheit der ihnen zu Grunde liegenden λ und n erwarten liess.

Leider sind wir bis jetzt nicht in der Lage, diese directe Berechnung auf die Leitungsvermögen aller Elemente anwenden zu können, weil eben nicht überall zugleich das Leitungsvermögen und die Ueberführungszahl vorliegt. Insbesondere fehlt die letztere bei allen Lithium- und allen Kohlensäureverbindungen.

Man muss also bei der Berechnung der molecularen Leitungsvermögen u und v , nachdem man möglichst viele Beobachtungspaare zu directen Bestimmungen benutzt hat, die noch übrigen Einzelbeobachtungen λ oder n mit Hülfe der bereits gewonnenen u und v in den Gleichungen (1) und (2) verwerthen. In welcher Weise ich dies ausgeführt habe, bietet kein Interesse; ich gehe deswegen gleich dazu über, die Endzahlen mitzutheilen und die Werthe der λ und n , welche rückwärts sich aus ihnen ergeben, mit der Beobachtung zu vergleichen.¹⁾

22. Electrolyte aus zwei einwerthigen Bestandtheilen.

Ich setze die molecularen Leitungsvermögen:

	K	NH ₄	Na	Li	Ag	H	
$u \cdot 10^7 =$	48	47	31	21	40	278	
• Cl	Br	J	CN	F	NO ₃	ClO ₃	C ₂ H ₃ O ₂
$v \cdot 10^7 =$	49	53	53	50	30	46	40 23.

Dann ergibt sich folgender Vergleich unserer Hypothese mit der Erfahrung, indem man λ und n aus u und v nach Gleichung (1) und (2) (p. 170 und 171) berechnet.

Tabelle XIa.

	Mol. Leitungsvermögen $\lambda \cdot 10^7$.			Ueberführungszahl n des Anions.		
	beob.	ber.	ber.—beob.	beob.	ber.	ber.—beob.
KCl	97	97	$\pm$	0,51	0,50	—0,01
NH ₄ Cl . . .	95	96	+1	0,51	0,51	$\pm$
NaCl	81	80	—1	0,62	0,61	—0,01

1) Ich beschränke mich dabei auf eine Stelle weniger als früher, sowohl in λ als in n , weil die letzte Stelle hier fast immer werthlos sein würde.

	Mol. Leitungsvermögen $\lambda \cdot 10^7$			Ueberführungszahl n des Anions.		
	beob.	ber.	ber.—beob.	beob.	ber.	ber.—beob.
LiCl	70	70	$\pm$	—	0,70	—
HCl	323	327	+4	0,19	0,15	—0,04
KBr	104	101	—3	0,51	0,52	+0,01
NH ₄ Br	103*	100	—3	—	0,53	—
NaBr	81*	84	+3	—	0,63	—
HBr	311	331	+20	0,19	0,16	—0,03
KJ	103	101	—2	0,50	0,52	+0,02
NH ₄ J	102	100	—2	—	0,53	—
NaJ	84	84	$\pm$	0,60	0,63	+0,03
LiJ	76	74	—2	—	0,72	—
HJ	328	331	+3	0,25	0,16	—0,09
KCN	101	98	—3	0,47	0,51	+0,04
KF	78	78	—	—	0,38	—
KNO ₃	92	94	+2	0,50	0,49	—0,01
NH ₄ NO ₃ . . .	93	93	$\pm$	—	0,50	—
NaNO ₃	76	77	+1	0,61	0,60	—0,01
AgNO ₃	84	86	+2	0,53	0,53	$\pm$
HNO ₃	334	324	—10	0,14	0,14	$\pm$
KClO ₃	89	88	—1	0,46	0,45	—0,01
K ₂ C ₂ H ₃ O ₂ . .	70	71	+1	0,33	0,32	—0,01
Na ₂ C ₂ H ₃ O ₂ .	55	54	—1	0,43	0,43	$\pm$
Ag ₂ C ₂ H ₃ O ₂ .	—	63	—	0,37	0,37	$\pm$

Wir haben hier aus den von uns aufgestellten molecularen Leitungsvermögen der 14 electrischen Elemente das Leitungsvermögen von 24 und die Ueberführungszahlen von 18 beobachteten Verbindungen abgeleitet, also zusammen 42 Grössen verglichen. Der Erfolg ist, wie ein Blick auf die Differenzen zwischen Rechnung und Beobachtung zeigt, durchaus befriedigend.

Eine Abweichung, welche über diejenige Grenze der Ungenauigkeit hinaus reicht, die wir erwarten mussten (p. 163), kommt nur ein einziges Mal vor, nämlich bei der Ueberführungszahl des Jodwasserstoffes. Nun liegen für diesen Körper überhaupt nur zwei Beobachtungen Hittorf's vor, und da die Wasserstoffverbindung nur die Ueberführung des Anions bestimmen lässt, so erscheint ein Irrthum der Beobachtung hier leichter möglich als bei den Salzen. Eine Lösung von der Molecülzahl $m=1,4$ ergab $n=0,201$, eine solche von $m=0,066$ gab $n=0,258$. Nun liegt die Zahl $m=0,066$ bereits unterhalb der

Grenze, welche wir sonst zur Ableitung der n eingehalten haben. Sollte HJ sich ähnlich verhalten wie HCl, so wäre zunächst von 0,258 ein rasches Sinken der Zahl mit wachsender Concentration zu erwarten. In diesem Falle würden wir ein kleineres n erhalten haben, wenn zwischen $m = 1,4$ und $m = 0,066$ andere Beobachtungen vorlägen. Also diese einzige grössere Abweichung kann durch Nebenumstände bedingt sein.

Und so wird es nicht gewagt sein, wenn wir unseren a priori gefolgerten Satz von der unabhängigen Beweglichkeit der Jonen in verdünnter Lösung jetzt für die einwerthigen Verbindungen durch die Erfahrung bestätigt erklären.

Ich will dabei einstweilen die Frage, ob die in der Tabelle vorhandenen Abweichungen durch genauere Bestimmungen verschwinden werden, unbeantwortet lassen. Dass die aufgestellten molecularen Leitungsvermögen durch weitere Versuche noch kleine Abänderungen erfahren werden, steht freilich zu erwarten, doch bezweifle ich, dass dieselben so gross sein werden, um die Abweichungen verschwinden zu machen.

Es liegt eben auch die Möglichkeit vor, dass unser Satz, ähnlich wie das Dulong'sche Gesetz über die Atomwärme, nur genähert gilt; dies halte ich sogar für wahrscheinlich.

Ich will beispielsweise eine mögliche Ursache solcher Abweichungen anführen. Hittorf vermuthet nach seinen Versuchen¹⁾, dass in den Lösungen von KBr und KJ das Wasser einen dissociirenden Einfluss auf diese Salze äussere, besonders in verdünnten Lösungen, so dass also ein Bruchtheil des gelösten Salzes etwa als KOH und HJ vorhanden wäre. Da die letzteren Körper besser leiten als die Salze, so müssten die beobachteten Leitungsvermögen zu gross, die Ueberführungszahlen, welche nur aus dem Kalium und dem Brom oder Jod bestimmt werden,

1) Pogg. Ann. CIII. p. 37.

nicht aber aus dem Hydroxyl oder dem Wasserstoff, zu klein erscheinen. Letzteres findet sich wirklich in den obigen Zahlen, wenn auch in unbedeutendem Maasse, ausgesprochen. Und so könnte man diese Abweichungen, anstatt sie auf die Ungenauigkeit der Bestimmungen zu schieben, als eine Bestätigung der von Hittorf vermutheten Dissociation ansehen.

23. Zweiwerthige Metalle mit einbasischen Säuren.

Wir betrachten jetzt diejenigen Verbindungen, welche die electronegativen Bestandtheile der vorigen Gruppe mit mehrwerthigen positiven Bestandtheilen eingehen, z. B. BaCl_2 . Für diese Fälle haben wir uns bereits dahin ausgesprochen (p. 168), dass keineswegs von vornherein angenommen werden kann, zwei miteinander wandernde Elemente z. B. Cl_2 verhalten sich ebenso, wie wenn sie einzeln fortbewegt würden. Man kann nicht wissen, ob nicht die beiden Atome wie in dem Chlorgas sich bei ihrem Austritt aus dem Salze zu einem Molecül verbinden. Hierdurch aber würde ihre Beweglichkeit im Wasser vielleicht wesentlich geändert werden.

Berechnen wir also, um vorurtheilsfrei zu handeln, etwa aus den vorliegenden Chloriden die Beweglichkeit v des Chlors nach der Formel (p. 171):

$$v = \lambda \cdot n,$$

so erhalten wir:

aus BaCl_2	SrCl_2	CaCl_2	MgCl_2	ZnCl_2
$10^8 \lambda = 794$	774	750	719	681*
$n = 62$	65	67	68	70
$10^8 \lambda \cdot n = 10^8 \cdot v = 492$	503	502	488	477

Dies ist aber fast genau die vorhin für das Chlor eingesetzte Beweglichkeit.

Zunächst müssen wir deswegen versuchen, wie weit überhaupt die Beweglichkeiten, die sich bei der Electrolyse der einwerthigen Verbindungen ergeben haben, gültig bleiben.

Lassen wir also die früheren Beweglichkeiten:

	Cl	Br	J	NO ₃
$v \cdot 10^7 =$	49	53	53	46

und setzen für:

$\frac{1}{2}$ Ba	$\frac{1}{2}$ Sr	$\frac{1}{2}$ Ca	$\frac{1}{2}$ Mg	$\frac{1}{2}$ Zn	$\frac{1}{2}$ Cu
$u \cdot 10^7 = 29$	28	26	23	20	29

so kommen wir auf folgende mit der Erfahrung verglichene Leitungsvermögen und Ueberführungszahlen der Salze.

Tabelle XIb.

	Mol. Leitungsvermögen $\lambda \cdot 10^7$			Ueberführungszahl n des Anions		
	beob.	ber.	ber. - beob.	beob.	ber.	ber. - beob.
$\frac{1}{2}$ BaCl ₂	79	78	-1	0,62	0,63	+0,01
$\frac{1}{2}$ SrCl ₂	77	77	±	0,65	0,64	-0,01
$\frac{1}{2}$ CaCl ₂	75	75	±	0,67	0,65	-0,02
$\frac{1}{2}$ MgCl ₂	72	72	±	0,68	0,68	±
$\frac{1}{2}$ ZnCl ₂	68*	69	+1	0,70	0,71	+0,01
$\frac{1}{2}$ BaBr ₂	88*	82	-6	—	0,65	—
$\frac{1}{2}$ CaBr ₂	73*	79	+6	—	0,67	—
$\frac{1}{2}$ ZnBr ₂	69*	73	+4	—	0,73	—
$\frac{1}{2}$ BaJ ₂	88*	82	-6	—	0,65	—
$\frac{1}{2}$ CaJ ₂	73*	79	+6	0,68	0,67	-0,01
$\frac{1}{2}$ MgJ ₂	—	76	—	0,66	0,70	+0,04
$\frac{1}{2}$ ZnJ ₂	70	73	+3	0,68	0,73	+0,05
$\frac{1}{2}$ Ba(NO ₃) ₂ . . .	69	75	+6	0,61	0,61	±
$\frac{1}{2}$ Ca(NO ₃) ₂ . . .	71	72	+1	0,59	0,64	+0,05
$\frac{1}{2}$ Mg(NO ₃) ₂ . . .	68	69	+1	—	0,67	—
$\frac{1}{2}$ Cu(NO ₃) ₂ . . .	72*	75	+3	0,59	0,61	+0,02

Man ersieht hieraus, dass moleculare Leitungsvermögen auch für die zweiwerthigen Metalle aufgestellt werden können und dass die vorhin den negativen einwerthigen Elementen zugetheilten Zahlen mit den ersteren zusammen die beobachteten Thatfachen einigermaassen darstellen. So gut wie bei den Verbindungen aus bloß einwerthigen Bestandtheilen stimmen freilich die jetzigen Resultate nicht überein. Theilweise mag das Beobachtungsmaterial dort sicherer gewesen sein, aber unerklärt bleibt z. B. der verhältnissmässig grosse Unterschied in dem beobachteten und berechneten Leitungsvermögen des Bariumnitrats. Einen Beobachtungsfehler argwöhne ich

hier um so weniger, als die Beobachtung zweimal ausgeführt wurde, mit wesentlich gleichem Erfolge.

Ein Versuch, alle Constanten dieser Gruppe, auch die der negativen Elemente ganz selbstständig aufzustellen, bessert die Resultate nicht erheblich.

24. Einwerthige Metalle mit zweibasischen Säuren.

Aus den Zahlen der Tabellen IX und X (p. 157. 164) sieht man sofort, dass die Schwefelsäure und ihre Salze auch nicht angenähert mit denjenigen Verbindungen, die nur durch eine Verwandtschaftseinheit zusammengehalten werden, in dieselbe Gruppe eingestellt werden können. Dies folgt sogleich aus der Schwefelsäure selbst. Deren Ueberführungszahl n nämlich kommt dem n der Wasserstoffsäuren nahe. Wenn der Wasserstoff in jener und in den letzteren dieselbe Beweglichkeit besäße, so müssten auch die molecularen Leitungsvermögen nahe gleich sein. Statt dessen besitzt die Schwefelsäure nur etwa $\frac{2}{3}$ von den anderen, eine Zahl, welche kleiner ist als die früher aufgestellte Beweglichkeit des Wasserstoffs allein.

Berechnen wir gerade wie früher die Beweglichkeit v des Jons $\frac{1}{2}\text{SO}_4$, so kommt aus:

	K_2SO_4	Na_2SO_4	H_2SO_4
$10^8 \lambda = 788$	634	2060	
$n = 0,50$	0,63	0,20	
$10^8 v = 10^8 \lambda n = 394$	399	412,	

also wieder fast übereinstimmende Zahlen.

Ich nehme die Kohlensäure hinzu und stelle folgende Beweglichkeiten auf:

$\frac{1}{2}(\text{K})_2$	$\frac{1}{2}(\text{NH}_4)_2$	$\frac{1}{2}(\text{Na})_2$	$\frac{1}{2}(\text{Li})_2$	$\frac{1}{2}(\text{Ag}_2)$	$\frac{1}{2}(\text{H}_2)$
$10^7 u = 40$	37	22	11	32	166
	$\frac{1}{2}(\text{SO}_4)$	$\frac{1}{2}(\text{CO}_3)$			
	$10^7 v = 40$	36			

Man sieht, dass die Zahlen der Metalle hier um etwa 10 kleiner sind als in den einwerthigen Verbindungen des § 22. Wasserstoff aber ist um 112, d. h. etwa $\frac{2}{5}$ seines früheren Werthes 278 heruntergegangen.

Dann entsteht folgende Vergleichung.

Tabelle XIc.

	Mol. Leitungsvermögen $\lambda \cdot 10^7$			Ueberführungszahl n des Anions.		
	beob.	ber.	ber.—beob.	beob.	ber.	ber.—beob.
$\frac{1}{2} \text{K}_2 \text{SO}_4$	79	80	+1	0,50	0,50	$\pm$
$\frac{1}{2} (\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4$	76	77	+1	—	0,52	—
$\frac{1}{2} \text{Na}_2 \text{SO}_4$	63	62	—1	0,63	0,65	+0,02
$\frac{1}{2} \text{Li}_2 \text{SO}_4$	51	51	$\pm$	—	0,78	—
$\frac{1}{2} \text{Ag}_2 \text{SO}_4$	—	72	—	0,56	0,56	$\pm$
$\frac{1}{2} \text{H}_2 \text{SO}_4$	206	206	$\pm$	0,20	0,19	—0,01
$\frac{1}{2} \text{K}_2 \text{CO}_3$	78	76	—2	—	0,47	—
$\frac{1}{2} \text{Na}_2 \text{CO}_3$	55	58	+3	—	0,62	—

Wir gelangen so zu einer guten Uebereinstimmung, wenn wir die Sulfate und Carbonate zu einer Gruppe zusammenfassen, d. h. den Metallen in beiden Verbindungen dieselbe Beweglichkeit zuschreiben. Immerhin ist unser Beobachtungsstoff hier etwas dürftig, und es ist zu wünschen, dass von den Lithiumsalzen sowie von einigen Carbonaten die Ueberführung bekannt wäre.

Zu einer grösseren Vorsicht in der hier vorliegenden Gruppe von Körpern mahnt nämlich der Umstand, dass durch den Eintritt einer grösseren Anzahl, insbesondere auch von mehr als zweiwerthigen Elementen die Möglichkeiten einer Anordnung der Atome im Molecül sich vermannichfachen, so dass man der Spaltung dieser Verbindungen durch den Strom weniger sicher ist. Auch könnten mehrere von der Chemie angenommene Molecüle in Lösung zu einem einzigen zusammentreten. In den Gruppen der §§ 22 und 23 fielen diese Möglichkeiten aus.

So ist an dieser Stelle auch die Oxalsäure zu erwähnen. Das neutrale Kalisalz derselben besitzt verdünnt das moleculare Leitungsvermögen $10^7 \lambda = 80$ (p. 157), steht also dem Kaliumsulfat gleich. Infolge dessen würde dem Jon $\frac{1}{2}(\text{C}_2\text{O}_4)$ die Zahl $10^7 v = 40$ zukommen. Hittorf fand in einer etwa 20procentigen Lösung ($m = 2,6$) die Ueberführungszahl $n = 0,44$, welche der abgeleiteten Beweglichkeit des C_2O_4 nicht widersprechen würde.

Dies angenommen liegt aber in der Oxalsäure $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$

selbst ein Widerspruch, denn deren moleculares Leitungsvermögen müsste demjenigen der Schwefelsäure gleich sein, während es factisch etwa $2\frac{1}{2}$ mal kleiner ist. (Tab. VIII.)

Hiernach würden wir schliessen, dass, wenn auch das Salz nach der Formel $K_2 | C_2O_4$ electrolysirt wird, dass die Säure nicht nach $H_2 | C_2O_4$ spaltet. — In der That nimmt die Chemie in der Oxalsäure Constitutionswasser an.

25. Schwefelsaure Salze von Magnesium, Zink und Kupfer.

In § 22 und 23 hatten wir gefunden, dass die einwerthigen negativen Bestandtheile bezüglich ihrer Electricitätsleitung sich nahe gleich verhielten, sie mochten mit ein- oder zweiwerthigen Metallen verbunden sein. Betrachten wir ebenso die letzte noch übrige Gruppe von Salzen, nämlich die Sulfate von Magnesium, Zink und Kupfer, also Verbindungen zweiwerthiger Metalle mit der zweibasischen Säure, indem wir diese Gruppe mit den beiden vorigen zusammenhalten, so sehen wir sofort, dass diese zweiwerthigen Bestandtheile sich ganz anders verhalten, wenn sie miteinander, als wenn sie mit einwerthigen Bestandtheilen verbunden sind.

Wir hatten dem Magnesium aus seinem Chloride die Beweglichkeit 23, dem Bestandtheile SO_4 aus dem Kalisalz die Zahl 40 gegeben. Anstatt der Summe 63 begegnen wir bei dem Leitungsvermögen des Magnesiumsulfats nur wenig mehr als der Hälfte dieser Zahl.

Wir werden hieraus schliessen, dass die Zusammensetzung des Magnesium- (und auch Zink- und Kupfer-) Sulfates in Lösung nicht durch die gewöhnlich geschriebene Formel $MgSO_4$ ausgedrückt wird. Es ist von grossem Interesse, dass die neuere Chemie in der That durch andere Erscheinungen zu der gleichen Annahme gelangt ist.¹⁾

Stellen wir einstweilen nach der angenommenen Zersetzungsformel $MgSO_4$ u. s. w. aus den beobachteten Lei-

1) Nach Erlenmeyer. Vgl. Lothar Meyer l. c. p. 277.

tungsvermögen und Ueberführungszahlen die Beweglichkeiten der SO_4 und der drei untersuchten Metalle in deren Sulfaten auf, so erhalten wir:

$$\begin{array}{cccc} \frac{1}{2}\text{Mg} & \frac{1}{2}\text{Zn} & \frac{1}{2}\text{Cu} & \frac{1}{2}\text{SO}_4 \\ 10^7 \cdot u = 14 & 12 & 12 & 10^7 \cdot v = 22 \end{array}$$

Die hieraus berechneten Leitungsvermögen und Ueberführungszahlen der Salze, verglichen mit der Beobachtung, werden wie oben zusammengestellt.

Tabelle XI d.

	Mol. Leitungsvermögen 10 ⁷ l.			Ueberführungszahl n des Anions.		
	beob.	ber.	ber.—beob.	beob.	ber.	ber.—beob.
$\frac{1}{2}\text{MgSO}_4$	37	36	—1	0,63	0,61	—0,02
$\frac{1}{2}\text{Zn SO}_4$	34	34	±	0,64	0,65	+0,01
$\frac{1}{2}\text{Cu SO}_4$	33	34	+1	0,64	0,65	+0,01

Die drei Metalle verhalten sich nahe gleich. Die Uebereinstimmung ist gut.

26. Aetzalkalien.

Die Aetzalkalien besitzen in verdünnter Lösung ein viel grösseres moleculares Leitungsvermögen als alle Salze. Diese Ausnahmstellung der Hydrate hängt ohne Zweifel mit ihrem Wasserstoffgehalt zusammen, denn die langsame Wanderung des Kaliums und Natriums¹⁾ beweist, dass nicht etwa das Metall hier ungewöhnlich viel zum Leitungsvermögen beiträgt.

Um dem Gegenstande näher zu treten, müsste eine Frage erledigt sein, welche bis jetzt noch ganz offen liegt, nämlich in welche wandernden Bestandtheile das gelöste Hydrat zerfalle. Angenommen, dass es die Verbindung KOH ist, welche in Lösung zersetzt wird, so lässt sich bis jetzt nicht, weder durch die Ueberführungsversuche noch durch die an den Electroden ausgeschiedenen Zer-

1) Nach Wiedemann, vgl. Tab. X; für Kali bestätigt durch Bourgoin, Ann. d. chim. et phys. (4) XV. p. 48. 1868.

setzungsproducte, entscheiden, ob das Kation nur K und andererseits OH das Anion ist, oder ob nur O mit dem negativen Strome, und K nebst H mit dem positiven wandert. Die Ueberführung lässt sich offenbar nur am Kalium messen, und als Zersetzungsproducte treten, wie man leicht sieht, unter allen Umständen nur Wasserstoff und Sauerstoff in die Erscheinung. Dem ersteren lässt sich dabei durchaus nicht absehen, ob er selbst gewandert ist, oder ob er durch Kalium aus dem Wasser abgeschieden wird.

Bunge glaubt, dass nur Kalium das Kation bilde, und Wiedemann scheint derselben Ansicht zuzuneigen. Bourgoin andererseits spricht für die Zerlegung nach der Formel $KH|O$. Ich halte, obwohl Bourgoin's vermeintlicher Beweis, wie Wiedemann bemerkt, nicht Stich hält, letzteres für wahrscheinlicher, weil keine Veranlassung vorliegt, anzunehmen, das Hydroxyl OH, welches nach der ersteren Annahme doch wohl als Ganzes wandern müsste, besitze eine hervorragende Beweglichkeit. Dass dagegen der Wasserstoff als Kation sehr leicht beweglich ist, wissen wir schon von den Säuren.

Eine interessante Frage ist alsdann diejenige: ob K und H gleich schnell wandern, oder ob etwa der Wasserstoff dem Metall vorausseilt. Unmöglich darf man die letztere Annahme einstweilen nicht nennen.

Nach dem Ebengesagten braucht kaum betont zu werden, dass wir, wenn wir von einer Beweglichkeit des OH einerseits und des Metalles andererseits sprechen, nur die Theilnahme des Metalles an der Leitung mit der Summe der Leitungen durch die anderen beiden Elemente vergleichen wollen, ohne aber auszuschliessen, dass der Wasserstoff vielleicht nach der Kathode wandert.

Die molecularen Leitungsvermögen haben wir oben (Tab. IX) für die Hydrate von Kalium, Natrium, Lithium und Barium bestimmt; nur für Kali und Natron liegen beobachtete Ueberführungen von Wiedemann vor. Die-

selben gelten für mässig concentrirte Lösungen und sind deswegen für unsere Zwecke weniger genau.

Es liegt nun offenbar am nächsten der Versuch, ob die Metalle in den Aetzalkalien eine Beweglichkeit von ähnlicher Grösse besitzen wie in den Salzen. Auf diese Frage beschränke ich mich bei dem lückenhaften Material.

Wir setzen also wie früher (p. 172. 176)

$$\begin{array}{cccc} \text{für K} & \text{Na} & \text{Li} & \frac{1}{2}\text{Ba} \\ 10^7 \cdot \alpha = 48 & 31 & 21 & 29 \end{array}$$

Dann erhalten wir für den Rest OH:

$$10^7 v = 141.$$

Die hieraus für die molecularen Leitungsvermögen λ und die Ueberführungszahlen $1 - n$ des Metalles berechneten Zahlen vergleichen sich alsdann mit der Beobachtung, wie folgt.

Tabelle XIe.

	Mol. Leitungsvermögen $10^7 \lambda$.			Ueberführungszahl n des Kations.		
	beob.	ber.	ber.—beob.	beob.	ber.	ber.—beob.
KOH	198	189	— 9	0,23	0,25	+0,02
NaOH	178	171	— 7	0,16	0,18	+0,02
LiOH	150	162	+12	—	0,13	—
$\frac{1}{2}\text{BaO}_2\text{H}_2$	166	170	+ 4	—	0,17	—

Ist gleich die Uebereinstimmung nicht mit der früheren zu vergleichen (was theilweise auch an der Beobachtung liegen könnte), so bietet auch die Annäherung schon Interesse.

Von Bedeutung würde auch diesmal die Untersuchung der Ueberführungen im Lithion sein, ob hier wirklich die Wanderung des Metalles nur den 8. Theil zum Leitungsvermögen beiträgt.

Da die Beweglichkeit 141 des OH kleiner ist, als diejenige des Wasserstoffs allein (§ 22), so sehen wir, dass letzterer, es mag die Zerlegung so oder so geschehen, jedenfalls durch den Begleiter auf seiner Wanderung gehindert wird.

27. Uebersicht über die molecularen Leitungsvermögen der Ionen.

Stellen wir die in § 22—26 gefundenen Beweglichkeiten der electrolytischen Bestandtheile ihrer Grösse nach zusammen, wobei wir den mit der negativen Electricität wandernden Ionen negatives Vorzeichen geben, so kommt:

Tabelle XII.

H	$\frac{1}{2}\text{H}_2$	OH	J	Br	CN	Cl	K	NH ₄	NO ₃	ClO ₃
278	166	(-141)	-53	-53	-50	-49	48	47	-46	-40
$\frac{1}{2}\text{K}_2$	$\frac{1}{2}\text{SO}_4$	Ag	$\frac{1}{2}\text{NH}_4)_2$	$\frac{1}{2}\text{CO}_3$	$\frac{1}{2}\text{Ag}_2$	Na	F	$\frac{1}{2}\text{Ba}$	$\frac{1}{2}\text{Cu}$	$\frac{1}{2}\text{Sr}$
40	-40	40	37	-36	32	31	-30	29	29	28
$\frac{1}{2}\text{Ca}$	$\frac{1}{2}\text{Mg}$	C ₂ H ₃ O ₂	$\frac{1}{2}\text{Na}_2$	$\frac{1}{2}\text{SO}_4^*)$	Li	$\frac{1}{2}\text{Zn}$	$\frac{1}{2}\text{Mg}^*)$	$\frac{1}{2}\text{Zn}^*)$	$\frac{1}{2}\text{Cu}^*)$	$\frac{1}{2}\text{Li}_2$
26	23	-23	22	-22	21	20	14	12	12	11

28. Gang des Leitungsvermögens mit wachsendem Gehalt der Lösungen.

Nachdem uns im Vorausgehenden gelungen ist, einfache Beziehungen für die Leitungsvermögen verdünnter Lösungen aufzustellen, müssen wir den Versuch machen, wie weit eine solche Uebersichtlichkeit sich fortsetzt, wenn wir den weiteren Verlauf der Leitung mit wachsendem Lösungsgehalt in die Betrachtung ziehen. Wir werden sehen, dass die Anordnung der Lösungen nach der Zahl der gelösten Molecüle auch hier zu namhaften Erfolgen führt.

Wir betrachten zunächst die Verhältnisse bei unserer Normaltemperatur +18°.

Das Material, aus welchem wir zu schliessen haben, liegt numerisch am bequemsten in Tab. VII p. 148 und in übersichtlicherer graphischer Darstellung in den Curven von Taf. I und II vor. In die Zeichnungen sind auch einzelne Säuren, soweit ihr Verlauf zur Vergleichung mit den Salzen von Bedeutung ist, eingetragen.¹⁾

*) In den Sulfaten von Mg, Zn und Cu.

1) Pogg. Ann. CLIX. p. 242 und 268. 1876.

Das mir bemerkenswerth Erscheinende werde ich einzeln hervorheben.

1) Vor allem springt hier, wie wir schon gelegentlich bemerkten, sofort der gemeinsame Charakter aller der Curven ins Auge, durch welche wir das Leitungsvermögen der Lösungen als Function ihres Moleculargehaltes dargestellt haben. Während solche Curven, wenn man als Abscisse den gewöhnlichen Procentgehalt der Lösung setzt, einen äusserst verschiedenen Verlauf nehmen¹⁾, eine Menge von scharfen Schnitten miteinander haben, theilweise sogar nach oben gekrümmt ansetzen, um dann Wendepunkte zu zeigen, so fällt in der Anordnung nach electrochemisch äquivalenten Lösungen diese Mannichfaltigkeit fast vollkommen weg. Es ist eine Schaar von Curven entstanden, welche bei gleichem Charakter nur noch Grössenunterschiede aufweisen. Schnittpunkte der Curven kommen nur noch wenige vor, und diese wenigen Schnitte verlaufen ziemlich flach. Nur die Aetzkalkalien bilden Ausnahmen von dieser Behauptung, indem ihre Curven durch diejenigen einiger Salze scharf hindurchgehen. Hierüber werden wir nachher noch sprechen.

2) Sämmtliche Curven krümmen sich, vom Nullpunkte des reinen Wassers anfangend, zunächst der Abscisse zu. Ohne Ausnahme also wächst das Leitungsvermögen verzögert mit dem Moleculargehalt der Lösungen; die Anhäufung der Theilchen beeinträchtigt die Wirkung des einzelnen Molecüls. Dieser Satz erleidet bis jetzt keine einzige Ausnahme.²⁾ (Schon auf p. 153 hatte sich

1) Vgl. K. u. Grotrian, Pogg. Ann. CLIV Taf. III, CLIX Taf. V und p. 37 und Taf. I Fig. 4 dieses Aufsatzes.

2) Als wir nach Gewichtsprocenten rechneten, fanden wir freilich einzelne auch anfangs beschleunigte Leitungsvermögen. Eine Einschränkung des obigen Satzes liegt hierin aber doch nicht. Wenn man nämlich den Gehalt der Gewichtseinheit zu Grunde legt, so muss man folgerichtig auch das Leitungsvermögen auf Prismen von der Länge Eins und dem Gewichte Eins beziehen. Dadurch aber entstehen auch lauter im Anfange nach unten concave Curven.

dies darin ausgesprochen, dass das quadratische Glied der Interpolationsformel stets negativ war.)

3) Die anfängliche Krümmung der verschiedenen Curven ist von sehr verschiedener Grösse, worüber die Coëfficienten des quadratischen Gliedes (p. 153) den besten Aufschluss geben. Im Allgemeinen finden wir unter den Salzen die anfangs steileren Curven weniger stark gekrümmt, und zwar sind die Coëfficienten des quadratischen Gliedes nicht nur im Verhältniss zu den linearen, sondern sogar für sich schon im Allgemeinen um so kleiner, je grösser die linearen Coëfficienten sind.

Je besser also ein Salz leitet, desto geringer scheint auch die wechselseitige Beeinträchtigung der gelösten Theilchen zu sein.

4) Deutlich tritt hier andererseits eine quantitative Verschiedenheit der einzelnen Gruppen hervor. Vergleichen wir z. B. die Salze der einwerthigen Säuren untereinander, so zeigen die Jodide die geringste, die Nitrate die stärkste Krümmung. Schwefelsaure und kohlensaure Salze verhalten sich wenig verschieden.

Die Säuren selbst haben verhältnissmässig grosse zweite Coëfficienten.

Ueber diejenigen Körper, deren Leitungsvermögen vor der Sättigung ein Maximum zeigen, vgl. § 11, p. 41. Ein Minimum, wie bei der Schwefelsäure¹⁾, findet sich nirgends. Bei Aetznatron habe ich mich hiervon eigens überzeugt.

5) Ich habe schon früher eine Bemerkung Hittorf's mitgetheilt²⁾, dass diejenigen Salze, deren Leitungscurven ausnehmend schwach gekrümmt aufsteigen, insbesondere die Haloidsalze des Kaliums und Ammoniums, eine von der Concentration der Lösung ziemlich unabhängige relative Ueberführung der Bestandtheile aufweisen.

1) Pogg. Ann. CLIX. p. 262. 1876.

2) Gött. Nachr. 1876. p. 223. Vgl. auch Hittorf in Wied. Ann. IV. p. 389. 1878.

Gegenseitig bedingend sind aber die beiden Eigenschaften nicht, wie man aus den essigsauren Salzen erkennt. Die Ueberführungszahlen dieser Körper nämlich sind in den vorhandenen Beobachtungen Hittorf's nahe constant, während ihre Leitungscurven sich ziemlich stark krümmen.

6) Eine durch ihre starke Curvenkrümmung ausgezeichnete Gruppe bilden die Aetzalkalien. Vergleicht man z. B. in Taf. I Fig. 1 Jodkalium oder Jodammonium mit Aetznatron oder Aetzlithion, so leiten die letztgenannten Körper anfänglich bei weitem besser. Bei Molecülgehalten der Lösungen zwischen 3000 und 4000 aber gehen die Curven scharf durcheinander hindurch und von da an leiten die Salzlösungen wesentlich besser.

Hier muss jedoch auf die Unsicherheit hingewiesen werden, welche in den angenommenen Molecülzahlen der Aetzalkalien besteht. Wir haben als electrolytisches Molecül z. B. vom Aetzkali das von der Chemie angenommene Molecül KOH gesetzt. Sollte nun aber die electrochemische Zersetzung nach der Formel $\begin{matrix} \text{K} \\ \text{H} \end{matrix} \rangle \text{O}$ stattfinden, was wir schon auf p. 181 als mindestens nicht unmöglich erklärt haben, so würden in jedem Molecüle zwei Verwandtschaftseinheiten gelöst werden, das Molecül wäre doppelwerthig, und wir müssten nach unserem sonstigen Gebrauch $\frac{1}{2}\text{KOH}$ als electrochemisches Molecül einsetzen. Dadurch würden die Abscissenlängen zu jedem Punkte der Curve verdoppelt werden, und es würden sich die Aetzalkalien ohne auffallende Schnittpunkte in die Salzcurven einreihen, wie man an den punktirten Linien in Taf. I Fig. 1 sieht, welche für das Molecül $\frac{1}{2}(\text{KHO})$ und $\frac{1}{2}(\text{NaHO})$ gelten.

7) Unter den Curven der Salzlösungen fallen mehrere nahe zusammen, die also eine besondere Betrachtung verdienen.

Theilweise ist diese Congruenz sozusagen zufällig, wie z. B. bei Chlornatrium, Jodlithium und kohlensaurem Kali, oder auch Fluorkalium und schwefelsaurem Ammon, bei

Chlorlithium und salpetersaurem Natron, endlich auch Jodnatrium, salpetersaurem Kali und Aetzlithion, wenn man dem letzteren die doppelte Abscisse gibt (vgl. oben). Die „schlechter leitenden Metalle“ sind hier jedesmal so mit „besser leitenden“ Säuren verbunden, dass die Unterschiede sich ungefähr aufheben. Immerhin ist beachtenswerth, dass auch so verschiedenen Körpern so nahe gleiche Curven angehören.

8) Andere Electrolyte aber verbinden sich offenbar aus inneren Gründen zu zusammenhängenden Gruppen.

So habe ich schon früher¹⁾ für die einbasischen Säuren HCl , HBr , HJ , HNO_3 gezeigt, dass dieselben in Lösungen von gleicher Molecülzahl ein ungefähr gleiches Leitungsvermögen besitzen.

9) Derselbe Zusammenhang zeigt sich in auffallender Weise zwischen den Haloidsalzen des Kaliums und des Ammoniums. Vgl. auch p. 158. Chlorkalium und Chlorammonium fallen fast vollständig zusammen (Taf. II Fig. 1); das Bromid des Kaliums und die Jodide des Kaliums und Ammoniums (Taf. I Fig. 5 und 6) liegen dicht über den erstgenannten Salzen. Auch Cyankalium schliesst sich hier an.

Dass äquivalente Lösungen von Chlorkalium und Jodkalium gleich gut leiten würden, hat übrigens Hittorf aus seinen Versuchen über die Ueberführung in einem Gemisch beider Körper vorausgesagt.²⁾ Auch hat R. Lenz in der schon erwähnten Arbeit Versuche veröffentlicht, in denen beide Substanzen bis zu einem Moleculargehalt der Lösungen gleich 2 ungefähr gleichleitend gefunden wurden.³⁾

Aus Obigem folgt, dass die nahe Verwandtschaft, welche in der sonstigen Chemie zwischen den Haloiden sowie

1) Pogg. Ann. CLIX. p. 268. 1876.

2) Hittorf, Pogg. Ann. CIII. p. 50. 1858.

3) R. Lenz, Mém. phys. d. Pétersb. 1876. p. 329; Pogg. Ann. CLX. p. 431. 1877.

zwischen Kalium und Ammonium besteht, sich auf dem Gebiete der Electrochemie wiederfindet.

Auch schwefelsaures Ammon und Kali, obwohl dieselben sich in Bezug auf ihre Löslichkeit im Wasser sehr verschieden verhalten, haben in äquivalenter Lösung ein nahe gleiches Leitungsvermögen, wonach also ein Zusammenhang des letzteren mit der Löslichkeit nicht ausgesprochen ist.

Hingegen steigt das Leitungsvermögen des Nitrates bei dem Ammonium merklich rascher als bei dem Kalium.

10) Eine ungefähre Uebereinstimmung des Leitungsvermögens findet sich ferner bei den Chloriden von Barium, Strontium und Calcium, während Chlor-magnesium beträchtlich zurücksteht.

11) Nahe gleich gut leiten endlich die Sulfate von Magnesium, Zink und Kupfer.

Betrachten wir ferner die Ungleichheiten, welche sich unter den verschiedenen Körpern zeigen. Es stehen

12) in allen untersuchten Verbindungen die Alkalimetalle nach der Grösse des Leitungsvermögens geordnet in der Reihenfolge Kalium und Ammonium, dann Natrium und endlich Lithium.

13) Die alkalischen Erden geben durchweg schlechter leitende Verbindungen als Kalium und Natrium, theilweise aber bessere als Lithium. Eine durchgehende Reihenfolge zeigen sie nicht; in den Chloriden folgen sie in der Reihe Barium, Strontium, Calcium, Magnesium, in den Nitraten dagegen nicht.

14) Ueber den Einfluss des negativen Bestandtheils ergibt sich zunächst unter den Haloidsalzen, soweit dieselben untersucht worden sind, die Reihenfolge Jod, Brom, (Cyan), Chlor. Die Unterschiede sind unerheblich in den Kaliumverbindungen, grösser in den Natrium- und Lithiumsalzen.

15) Das Fluor steht beträchtlich hinter den genannten Elementen zurück.

16) Auch die salpetersauren und mehr noch die essigsauren Salze leiten erheblich schlechter als die Haloidsalze.

17) Schwefelsaure, oxalsaure und kohlen-saure Salze leiten nicht sehr verschieden voneinander, aber schlechter als die Salze der einbasischen Mineralsäuren.

18) Ein besonders geringes Leitungsvermögen kommt den Salzen der zweiwerthigen Metalle mit der zweibasischen Schwefelsäure zu.

19) Eine naheliegende Frage betrifft einen etwaigen allgemeinen Zusammenhang des Leitungsvermögens mit dem Atomgewicht. Eine überall zutreffende Reihenfolge der Elemente nach dieser Eigenschaft besteht freilich nicht. Aber in den Gruppen Kalium, Natrium, Lithium, dann Jod, Brom, Chlor finden wir nach dem Ebengesagten überall das grössere Atomgewicht dem Leitungsvermögen günstig. In der Gruppe Barium, Strontium, Calcium, Magnesium gilt das nämliche für deren Haloidsalze (vgl. auch Tab. XII p. 183).

29. Das Aetzammoniak.

Ich habe um des äusseren Zusammenhanges willen den Aetzkalkien auch die Ammoniaklösungen hinzugefügt. Da unter den Salzen diejenigen des Ammoniums am besten leiten, da andererseits die Hydrate besser leiten als die neutralen Salze, so hoffte ich in dem wässerigen Ammoniak einen besonders guten Leiter zu finden. Ich hätte das Gegentheil wissen können, denn nach einem Citat¹⁾ hat schon Faraday bemerkt, dass „concentrirtes wässriges Ammoniak so schlecht leitet wie reines Wasser.“

Wenn letztere Bemerkung auch übertrieben ist, indem ganz reines Wasser²⁾ mindestens einige hundertmal schlechter leitet, als 30procentige Ammoniaklösung, so wurde doch meine Erwartung gänzlich getäuscht. Das Ammoniak-

1) Gmelin-Kraut's Handbuch der Chemie I, 2. p. 503.

2) K. Pogg. Ann. Ergbd. VIII. p. 1. (1876).

wasser ist ein Leiter ganz anderer, geringerer Ordnung als die Salze und die übrigen Aetzalkalien. In dem Maassstabe der übrigen Figuren eingezeichnet, würde die Ammoniakcurve sich kaum um die Dicke eines Striches über die Abscisse erheben.

Deswegen findet man die Curve in Taf. I Fig. 7 mit 100facher Ordinate. Hier sieht man sofort, wie nicht nur in den Dimensionen, sondern im ganzen Charakter die Curve sich durchaus von denen der übrigen Figuren unterscheidet. Will man von einer bestimmten Anfangsrichtung reden, so muss man dieselbe vertical aufsteigend nennen. In der That sieht man aus den zu 0,1 und 0,4% beobachteten Leitungsvermögen 2,35 und 4,61 (Tab. I p. 15), dass das Leitungsvermögen im ersten Anfang fast genau der Quadratwurzel aus dem Ammoniakgehalt proportional wächst. Demnächst wird schon bei $m = 3$ ein Maximum erreicht, worauf die Curve langsamer und mit einem Wendepunkte wieder abfällt.

Zu fast denselben Bemerkungen gab früher schon die Essigsäure Veranlassung, welche ebenfalls in Wasser gelöst einen Leiter niedrigerer Ordnung ergab.¹⁾ Es ist auffallend, wie ähnlich die nach äquivalenten Lösungen dargestellten Curven der Essigsäure und des Ammoniaks verlaufen. (Taf. I Fig. 7).

Aus dem Verhalten des Ammoniaks können wir mit Sicherheit schliessen, dass seine wässrige Lösung nicht, wie in älteren und theilweise auch in neueren chemischen Lehrbüchern behauptet wird, als eine Lösung von Ammoniumhydrat, NH_4OH angesehen werden darf; ein Schluss, welcher aus ganz anderen Thatsachen, nämlich aus der Wärmeentwicklung bei der Bildung von Ammoniakwasser schon von J. Thomsen gezogen worden ist.²⁾

Ein weiteres Eingehen in diese Verhältnisse behalte ich einer zusammenhängenden Untersuchung der Leiter niederer Ordnung vor.

1) K. Pogg. Ann. CLIX. p. 263. 1876.

2) Pogg. Ann. CXLIII. p. 522. 1871.

Bemerken will ich hier nur noch, dass Mischungen von Ammoniak mit den sehr schlechten Leitern Kohlensäure, Essigsäure, Cyanwasserstoff, wie zu erwarten, sehr gut leitende Salze gab. So stieg das Leitungsvermögen $k \cdot 10^8$ eines 23procentigen Ammoniakwassers durch Einleiten von Kohlensäure von 3 auf 1100.

30. Saure Salze.

Eigenthümlich verhalten sich das saure schwefelsaure, kohlensaure und phosphorsaure Kali.

Doppeltkohlensaures Kali leitet nahezu so, als ob das überschüssige Aequivalent Kohlensäure gar nicht vorhanden wäre.

Doppeltschwefelsaures Kali dagegen hat in verdünnter Lösung beinahe dasselbe Leitungsvermögen, wie wenn nur das zweite Aequivalent Säure zersetzt würde, nicht aber das schwefelsaure Kali. Später leitet es schlechter, als es die Säure allein thun würde. Ganz auffallend ist hierbei der niedrige Temperaturcoefficient, welcher zwischen 0,0086 und 0,010 liegt. (Vgl. § 6.)

- Das saure phosphorsaure Kali (KH_2PO_4) endlich hat ungefähr dasselbe Leitungsvermögen wie eine äquivalente Menge reiner Phosphorsäure, zeigt aber im Gegensatz zu deren kleinem Temperaturcoefficienten einen ähnlichen Einfluss der Temperatur wie die neutralen Salze.

Allgemeinere Regeln für saure Salze sind also aus diesen Körpern noch nicht zu entnehmen.

31. Gesetze des Temperatureinflusses auf das Leitungsvermögen.

Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als ob die Beziehungen, welche wir zwischen den Leitungsvermögen der Electrolyte aufgestellt haben, an Bedeutung sehr dadurch einbüßen, dass auf die Leitung ein so grosser Einfluss von der Wärme ausgeübt wird. Eine Aenderung des Leitungsvermögens um etwa 1 Proc. auf 1° ist die geringste, welche wir kennen; in der Regel steigt dieser

Einfluss auf das Dreifache, in einzelnen Fällen auf das Siebenfache. Das Leitungsvermögen der starken Natronlauge haben wir von -10° bis $+80^{\circ}$ auf den hundertfachen Betrag anwachsen sehen.

Bei näherer Ansicht aber findet man, dass unter den Temperaturcoefficienten selbst höchst einfache, merkwürdige Beziehungen herrschen, welche die obige Befürchtung beseitigen, die aber auch an sich, wie ich glaube, von grosser Bedeutung sind. Diese Verhältnisse sollen jetzt näher untersucht werden.

Um der Kürze willen sollen die Curven, welche den Temperaturcoefficienten zum Moleculargehalt als Abscisse darstellen, Temperaturcurven heissen. Dieselben finden sich in den Figuren der Tafeln I und II unter den Leitungscurven. Die interpolirten Tabellen VII (p. 148) liefern genauere numerische Anhaltspunkte.

Ich erinnere daran, dass wir als Temperaturcoefficient den Zuwachs des Leitungsvermögens (um 22°) auf 1° in Theilen des Leitungsvermögens bei 18° bezeichnen.

20) Die bis jetzt beobachteten Temperaturcoefficienten liegen zwischen 0,0087 oder $\frac{1}{115}$ (KHSO_4) und 0,072 oder $\frac{1}{14}$ (NaOH 43%). Dazwischen sind alle möglichen Werthe vertreten. Die neutralen Salze bleiben den äussersten Grenzen fern, denn die Zahlen liegen zwischen 0,0141 oder $\frac{1}{70}$ (KJ 55%) und 0,0412 oder $\frac{1}{24}$ ($\text{KC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ 70%).

21) Im Gegensatze zu diesem weiten Spielraum stehen die engen Grenzen, denen wir bei verdünnten Lösungen begegnen. Wie das Leitungsvermögen der letzteren, so nimmt auch der Wärmeeinfluss auf die Leitung von verdünnten Lösungen eine sehr übersichtliche Gestalt an.

Ein Blick auf Taf. II Fig. 1 zeigt z. B., dass die Temperaturcurven der Chlormetalle, wenn sie auch später weit auseinandergehen, im Anfange alle nahe beisammen liegen und fast aus einem und demselben Anfangspunkt zu entspringen scheinen. Verlängert man den Zug der

beobachteten Curven bis zur Abscisse Null (reines Wasser), so erhält man die Anfangswerthe für:

NH_4Cl	KCl	$\text{NaCl, CaCl}_2, \text{BaCl}_2, \text{SrCl}_2$	LiCl, MgCl_2
0,0211	0,0215	0,0222	0,0232.

Es liegen also die Temperaturcoefficienten sehr verdünnter Lösungen zwischen den engen Grenzen 0,0211 und 0,0233 oder $\frac{1}{47}$ und $\frac{1}{43}$ eingeschlossen.

Hierauf haben wir schon früher hingewiesen.¹⁾

An den übrigen Gruppen der Electrolyte zeigt sich nun, dass dieses Verhalten der Chloride nicht vereinzelt oder zufällig dasteht. Die Jodide, Nitrate und Sulfate, Bromkalium, Fluorkalium, Cyankalium und oxalsaures Kali (Taf. I, Fig. 1, 2 und 3) zeigen dasselbe Ausstrahlen der Temperaturcurven von fast genau derselben Gegend aus. Auch die Anfangspunkte der kohlensauren und der essigsauren Salze fallen nahe zusammen, liegen jedoch etwas höher als die vorhin genannten, nämlich zwischen 0,0238 und 0,0244 für die kohlensauren, zwischen 0,0230 und 0,0255 für die essigsauren Salze.

22) Bei dem geringen Unterschiede der äussersten Werthe $0,0255 - 0,0211 = 0,0044$ oder $\frac{1}{236}$ unter allen Salzen, $0,0233 - 0,0211 = 0,0022$ oder $\frac{1}{460}$ unter den Salzen mit einbasischen Mineralsäuren dürfen wir also ohne weitere Erörterungen sagen, dass die Beziehungen, welche wir in § 16—27 für die Leitungsvermögen verdünnter Salzlösungen bei 18° aufgestellt haben, überhaupt bei mittlerer Temperatur gelten.

23) Auch die Temperaturcurven der Aetzalkalien strahlen von nahe einem und demselben Punkte aus, der aber tiefer liegt, als bei den Salzcurven; 0,0190 ist hier als der Temperaturcoefficient verdünnter Lösungen zu bezeichnen.

24) Aus meinen früheren Untersuchungen über die Säuren²⁾ entnehme ich, dass die einbasischen Säuren

1) K. und Grotrian, Pogg. Ann. CLIV. p. 229. 1875.

2) Pogg. Ann. CLIX. p. 264. 1876.

HCl, HBr, HJ und HNO_3 (und merkwürdiger Weise auch die Essigsäure) ebenfalls einen gemeinsamen Temperaturcoefficienten 0,016 in verdünnter Lösung besitzen, während 0,011 der Anfangswerth für die Schwefelsäure, 0,0095 für die dreibasische Phosphorsäure ist.

25) Da auch Weinsäure und Oxalsäure nur 0,018 beziehungsweise 0,014 aufweisen, das Kaliumsulfat sogar nur 0,0087, so mag darauf hingewiesen werden, dass es lauter wasserstoffhaltige Electrolyte sind, die einen geringen Einfluss der Wärme auf das Leitungsvermögen verdünnter Lösungen zeigen.

26) In der Verschiedenheit der gefundenen Grenzoëfficienten verschiedener Gruppen von verdünnten Electrolyten liegt die Bestätigung einer schon bei den Chloriden ausgesprochenen Behauptung (K. und Grotrian l. c.), die damals auf das geringe Leitungsvermögen des reinen Wassers gestützt wurde, dass es nämlich unmöglich ist, den Grenzoëfficienten als den Einfluss der Wärme auf das Leitungsvermögen des Wassers selbst anzusehen.

Sucht man nach einer Auslegung der gefundenen Thatsachen, so wird man also dieselbe wohl nur in der Annahme finden, dass die Widerstände der Jonen (den Wasserstoff ausgenommen) im Wasser alle durch die Temperatur im nahe gleichen Verhältniss geändert werden. Es ist dies ein höchst beachtenswerther Satz.

27) Mit steigendem Salzgehalte nehmen anfangs die Temperaturcoefficienten aller Salze mit einbasischen Säuren ab.¹⁾

Nur das Bariumnitrat (zweimal beobachtet) scheint eine Ausnahme zu machen. Vielleicht hängt diese mit der Abweichung zusammen, welche derselbe Körper bezüglich seines molecularen Leitungsvermögens gezeigt hat (p. 176).

Fluorkalium ist nicht hinreichend weit nach dem Anfangspunkte beobachtet worden, um zu entscheiden, ob

1) Vgl. auch K. und Grotrian p. 230.

die sehr flach gekrümmte Curve sich noch nach oben umbiegt.

28) So gut wie alle Temperaturcurven sind nach oben gekrümmt. Die wenigen kleinen Abweichungen können auf Beobachtungsfehlern beruhen.

29) Es bleiben die Temperaturcoefficienten abnehmend bis zu den stärksten untersuchten Lösungen bei sämtlichen Kali- und Ammoniaksalzen, mit Ausnahme des Fluorkaliums, des kohlen-sauren und essigsauen Kali, sowie des Aetzkali. Die genannten vier Körper sind die einzigen Kaliumverbindungen, bei denen die Leitungsfähigkeit ein Maximum gezeigt hat.

30) Auch bei allen übrigen Körpern, soweit dieselben ein Maximum des Leitungsvermögens besitzen, tritt, und zwar vor der Erreichung des Maximums, ein Wachsthum des Temperaturcoefficienten ein. Sämtliche Maxima rücken also, wie Beetz am Zinkvitriol zuerst bemerkt hat¹⁾, mit steigender Temperatur nach grösseren Salzgehalten.

Von diesem allgemeinen Verhalten macht nur die Salzsäure eine Ausnahme, indem sie einen nahe constanten Temperaturcoefficienten besitzt.²⁾

31) Die Salze des Kaliums und des Ammoniums, welche uns früher ein nahe gleiches Leitungsvermögen gezeigt haben, besitzen auch Temperaturcoefficienten von nahe derselben Grösse. Gleiches zeigt sich in den Gruppen Barium-, Strontium- und Calciumchlorid, dann Magnesium-, Zink- und Kupfersulfat, endlich Chlor-, Brom- und Jodwasserstoff nebst Salpetersäure.

32) Schliesslich hebe ich noch das merkwürdige Gesamtverhalten der Leitungs- und der Temperaturcurven gegeneinander hervor. Bei der Be-

1) Pogg. Ann. CXVII. p. 17. 1862.

2) Grotrian, Pogg. Ann. CLI. p. 391. 1873.

trachtung von irgend einer der Zeichnungen, besonders auf Taf. II, wird man leicht bemerken, dass die Reihenfolge der Electrolyte, wenn auch nicht ausnahmslos, aber doch fast durchgängig oben und unten vertauscht ist. Die Temperaturcurven bilden sozusagen eine Art von verzerrtem Spiegelbild der Leitungscurven. Auch die in Taf. I Fig. 1 und 2 herrschenden grösseren Abweichungen verschwinden wesentlich, sobald man die Abscissen der Aetzalkalien verdoppelt.¹⁾

Also je besser ein Körper leitet, desto langsamer wächst im allgemeinen sein Leitungsvermögen mit der Temperatur; mit anderen Worten: Die Unterschiede des Leitungsvermögens verschiedener Körper vermindern sich im allgemeinen in höherer Temperatur.

32. Umwandlung der im Vorigen gebrauchten Molecülzahlen und der Leitungsvermögen in absolutes Maass.

Wir hatten uns bestimmte Zahlen für den Gehalt einer Lösung an electrolytischen Molecülen so verschafft, wie man es gewöhnlich thut, indem wir das auf das Wasserstoffatom bezogene Aequivalentgewicht eines Körpers als das Gewicht seines Molecüls behandelten. Wir setzten, unter Annahme des Cubikmillimeters [Cubikcentimeters] als Volumeneinheit, das Wasserstoffatom = 0,001 mgr [0,001 gr].

Wir haben ferner aus bekannten praktischen Gründen die Leitungsvermögen auf Quecksilber bezogen.

Wir wollen angeben, wie man von diesen der Beobachtung angeschlossenen Maassen zu Einheiten von wissenschaftlicher Bedeutung gelangt.

Dabei sollen die Grundeinheiten des Gauss-Weber'schen Maasssystems mgr, mm und sec gelten. In

1) Abermals eine Veranlassung, die Zersetzung so anzunehmen, dass in den Hydroxylverbindungen der Wasserstoff mit dem Metall wandert. (Vgl. p. 181 und 186.)

kleiner Schrift aber sollen noch die Zahlen beigefügt werden, welche für die Grundmaasse gr, cm und sec gelten.

Die Moleculargehalte der Lösungen, ausgedrückt in electrochemischen Aequivalenten. Bei der Willkür in der Annahme über die Grösse des Molecüls wird man dasjenige Maass wählen, welches die grösste Bequemlichkeit bietet. Für electrolytische Zwecke liegt es also am nächsten, die Molecüle nach der mit ihnen verbundenen, beziehungsweise, mit ihnen wandernden Electricitätsmenge zu zählen. Nach dem von W. Weber eingeführten und eingebürgerten Ausdrücke würden wir diese Zählung also nach „electrochemischen Aequivalenten“ vornehmen.

Unter electrochemischem Aequivalent eines Electrolytes versteht man ja diejenige Menge desselben, zu deren Zerlegung die Electricitätsmenge Eins nothwendig ist, d. h. diejenige Menge von Electricität, die von dem Strome Eins in der Zeiteinheit durch den Querschnitt der Leitung befördert wird. Positive Electricität nach der einen Seite zählt dabei gerade so, wie negative nach der entgegengesetzten Seite.

Die Zerlegung des Electrolytes findet nun dadurch statt, dass mit dem Kation eine bestimmte Menge positiver, mit dem Anion die gleiche Menge negativer Electricität wandert. Und so kann man auch von dem electrochemischen Aequivalente jedes Bestandtheils reden, indem man darunter diejenige Menge des letzteren versteht, mit welcher die Einheit positiver oder negativer Electricität wandert. Die Bestandtheile können chemisch einfach sein oder eine Gruppe von Elementen umfassen.

Nach dem Faraday'schen Gesetze ist das electrochemische Aequivalent eines Körpers seinem chemischen Aequivalentgewicht oder dem von uns so genannten electrochemischen Moleculargewichte proportional.

Gehen wir, wie gewöhnlich, vom Wasser aus. Nach den bisherigen Messungen ist, wie ich gezeigt habe,¹⁾ 0,00942 mg [0,000942 g; im Gramm-Centimetersystem ist nämlich die Stromeinheit 100 mal so gross] die Wassermenge, welche durch den Strom Eins nach electromagnetischem Weber'schen Maasse in 1 sec zersetzt wird.

Hiervon der neunte Theil, also $0,001047 = \frac{1}{955}$ mg [$0,0001047 = \frac{1}{9550}$ g], ist das electrochemische Aequivalent des Wasserstoffs, d. h. mit dieser Wasserstoffmenge wandert die nach electromagnetischem Maasse gemessene Einheit der positiven Electricitätsmenge durch die Flüssigkeit.

Irgend ein anderer electrolytischer Bestandtheil vom chemischen Aequivalentgewichte A besitzt demnach das electrochemische Aequivalent:

$$0,001047 \cdot A \text{ mg } [0,0001047 \cdot A \text{ g}].$$

Hatten wir bis jetzt 0,001 mg [0,001 g] Wasserstoff als Moleculargrösse willkürlich eingesetzt, so sieht man, dass die neue rationelle Einheit hiervon nur wenig verschieden, nämlich gleich 1,047 [0,1047] mal der früheren ist.

Wir führen also die Anzahl M der gelösten electrochemischen Aequivalente (mm, mg, sec) ein, wenn wir die früheren willkürlichen Molecülzahlen m (Tab. I und VII) mit $\frac{1}{1,047} = 0,955$ [$\frac{1}{0,1047} = 9,55$] multipliciren; mit anderen Worten, wenn wir die früheren m um $\frac{1}{2}$ ihres Werthes verkleinern:

$$M = 0,955 \cdot m [9,55 \cdot m].$$

Die Leitungsvermögen in absolutem Maasse. Unsere Leitungsvermögen k der Lösungen sind auf Quecksilber von 0° bezogen. Dividirt man k in den absoluten Widerstand einer Quecksilbersäule von 1 mm Länge und 1 qmm Querschnitt, d. i. $9700000 \frac{\text{mm}}{\text{sec}}$ [1 cm und 1 qcm ; $97000 \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$], so bekommt man den absoluten Widerstand der Einheit der Flüssigkeitssäule gleich $\frac{9700000}{k} \frac{\text{mm}}{\text{sec}}$ [$\frac{97000}{k} \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$].

1) Pogg. Ann. CXLIX. p. 179. 1873.

Das Leitungsvermögen in absolutem Maasse K ist also:

$$K = \frac{k}{9700000} = \frac{k \cdot 1,03}{10^7} \left[\frac{k \cdot 1,03}{10^5} \right],$$

mit anderen Worten: Zu den in den bisherigen Tabellen enthaltenen Zahlen (welche $k \cdot 10^8$ vorstellen) den dreissigsten Theil hinzugefügt, gibt das mit 10^{15} $_{[10^{11}]}$ multiplicirte absolute Leitungsvermögen der Lösungen.

Das moleculare Leitungsvermögen. Diese Grösse, d. h. der Grenzwert, welchem sich das Verhältniss des Leitungsvermögens zum Moleculargehalte bei wachsender Verdünnung annähert, wird in den eben eingeführten absoluten Maassen ausgedrückt, wenn wir die Zahlen λ (Tab. VIII und IX) mit $\frac{1,047}{9700000} = \frac{1,08}{10^7}$ multipliciren:

$$\mathcal{A} = \frac{1,08}{10^7} \lambda \left[\frac{1,08}{10^6} \lambda \right].$$

33. Die absoluten Geschwindigkeiten der electrolytischen Wanderung.

Wie rasch die Ionen unter irgend welchen Verhältnissen sich fortschieben, ergibt sich leicht aus dem Vorigen.

Eine Säule von 1 mm $_{[1 \text{ cm}]}$ Länge und 1 qmm $_{[1 \text{ qcm}]}$ Querschnitt enthalte in Lösung die Anzahl M electrochemischer Aequivalente eines Electrolytes. Das absolute Leitungsvermögen sei K , und die electromotorische Kraft Eins wirke nach der Axe der Säule.

Wenn U und V die Geschwindigkeiten des Kations und des Anions in diesem Falle, so ist die Stromstärke (vgl. auch p. 170):

$$M(U + V) = K$$

also:

$$U + V = \frac{K}{M} = \frac{k \cdot 1,03}{10^7 m \cdot 0,955} \frac{\text{mm}}{\text{sec}} \quad (\text{vgl. vor. S. und oben}),$$

oder:

$$U + V = \frac{k \cdot 1,08}{m \cdot 10^7} \frac{\text{mm}}{\text{sec}} \left[\frac{k \cdot 1,08}{m \cdot 10^6} \frac{\text{cm}}{\text{sec}} \right].$$

Hieraus ergibt sich zu jeder Lösung vom gegebenen Leitungsvermögen k und Moleculargehalte m (welche Grössen in unserem alten Maasse auszudrücken sind, Tab. I und VII), die zu der absoluten electromotorischen Kraft Eins zugehörige wechselseitige Geschwindigkeit $U+V$ der Ionen.

Ist ausserdem noch die Ueberführungszahl n (des Anions) bekannt, so hat man, weil:

$$U:V = (1-n):n,$$

die einzelnen Geschwindigkeiten:

$$U = (1-n) \frac{k}{m} \frac{1,08}{10^7} \frac{\text{mm}}{\text{sec}} \text{ des Kations.}$$

$$V = n \frac{k}{m} \frac{1,03}{10^7} \frac{\text{mm}}{\text{sec}} \text{ des Anions.}$$

[10^6 für Gramm-Centimeter.]

Wegen der Kleinheit der absoluten Einheit der electromotorischen Kraft sind U und V sehr klein. Multiplicirt man mit 10^{11} [10^9], so hat man diejenige electromotorische Kraft, welche in England 1 Volt genannt wird, die nahe gleich $\frac{8}{9}$ Daniell ist, als Triebkraft angenommen.

Wie sich die Geschwindigkeiten der Ionen für concentrirtere Lösungen gestalten, will ich einstweilen nur an einigen Beispielen zeigen, für welche ausreichende Ueberführungszahlen von Hittorf vorliegen. Ich wähle erstens ein Salz, welches nahe constante Ueberführungszahlen und ein dem Gehalte möglichst proportionales Leitungsvermögen zeigt, das Chlorammonium; demnächst das Chlormagnesium wegen seiner gerade umgekehrten Eigenschaften und endlich die Schwefelsäure.¹⁾ Die Leitungsvermögen k sind der Tab. VII (p. 148), die Ueberführungszahlen n des Anions einer graphischen Aufzeichnung von Hittorf's Beobachtungen entnommen. Zu den letzten, eingeklammerten Werthen

1) Bei der Schwefelsäure wird die nicht bewiesene Unterstellung gemacht, dass in allen Concentrationen die Zerlegung in H_2 und SO erfolgt.

mussten die n aus einer Verlängerung der Curven über die Grenzen der Beobachtung hinaus abgeleitet werden; sie sind deswegen nur Näherungen.

In der folgenden Tabelle bedeutet m wie früher die in 1 cmm der Lösung enthaltene Molecülzahl der oben angegebenen Electrolyte, $H = 0,001$ mg angenommen.

Unter der Wirkung einer electromotorischen Kraft $10^{11} \frac{\text{mm}^{\frac{3}{2}} \text{mg}^{\frac{1}{2}}}{\text{sec}^2} = 1 \text{ Volt} = \frac{1}{3} \text{ Daniell}$ auf eine Säule aus dieser Lösung von 1 mm Länge haben die Bestandtheile in $\frac{\text{Millimetern}}{\text{Secunden}}$ die angegebenen Geschwindigkeiten U beziehungsweise $V \cdot 10^{11}$. Die neben $m=0$ stehenden Zahlen sollen die Geschwindigkeiten in grosser Verdünnung bedeuten. Ueber ihre Ableitung siehe folgenden Abschnitt.

Tabelle XIII.

m	$\text{NH}_3 + \text{Cl}$		$\text{Mg}^{\frac{1}{2}} + \text{Cl}$		$\text{H} + \frac{1}{2} \text{SO}_4$	
	$U \cdot 10^{11}$	$V \cdot 10^{11}$	$U \cdot 10^{11}$	$V \cdot 10^{11}$	$U \cdot 10^{11}$	$V \cdot 10^{11}$
0	0,0502	0,0529	0,0246	0,0529	0,179	0,043
0,5	0,0490	0,0514	0,0218	0,0493	0,175	0,039
1	0,0473	0,0501	0,0187	0,0452	0,166	0,034
2	0,0449	0,0477	0,0142	0,0383	0,153	0,031
4	0,0412	0,0445	0,0084	0,0265	0,125	0,027
6			0,0049	0,0178	0,095	0,025
8		$\frac{\text{mm}}{\text{sec}}$	0,0025	0,0109	0,071	0,022
10			0,0011	0,0056	0,0518	0,0188
12				$\frac{\text{mm}}{\text{sec}}$	0,0370	0,0160
14					0,0263	0,0134
16					0,0185	0,0109
18					0,0129	0,0087
(20)					0,0088	0,0069
(22)					0,0059	0,0054

Man sieht aus diesen Zahlen, dass die Beweglichkeit eines jeden Bestandtheiles mit wachsender Concentration stetig abnimmt, dass diese Abnahme aber sehr verschieden gross ist. Sie betrifft bei dem Salmiak das Chlor und das Ammonium fast gleichmässig und beträgt bis zur gesättigten Lösung ($m = 5$) etwa ein Fünftel des Anfangswerthes. In der Verbindung mit dem

Magnesium dagegen bösst das Chlor seine Anfangsbeweglichkeit, die derjenigen im Chlorammonium nahe gleich ist, schliesslich bis auf den zehnten Theil ein. Das Magnesium selbst ist in gesättigter Lösung nicht einmal den zwanzigsten Theil so beweglich wie im Anfange. In der Schwefelsäure endlich sinkt SO_4 bis auf den achten, Wasserstoff sogar bis auf den dreissigsten Theil des Anfangswerthes hinab. Dabei ist die stärkste obige Säure eine solche von etwa 68 Procent, also von dem Minimum des Leitungsvermögens (85 Procent) noch ziemlich weit entfernt.

34. Die absoluten Geschwindigkeiten der Ionen in verdünnten Lösungen.

Während wir bis zu grösseren Lösungsgehalten die Beweglichkeiten der Bestandtheile nur an einigen Beispielen durchgerechnet haben, der Zukunft die Frage überlassend, wie diese Verhältnisse in Gesetze aufzulösen sind, wollen wir die Elemente in verdünnter Lösung wieder vollständig behandeln. Für diesen Fall liegen ja durch den Satz von der unabhängigen Beweglichkeit der Bestandtheile (§ 21—27) die Erscheinungen bereits geordnet vor.

Es wird auch nur einer ganz einfachen Reduction bedürfen, um aus dem früheren Materiale die absoluten Grössen zu gewinnen. Wir hatten nämlich das auf unsere früheren Maasse bezogene moleculare Leitungsvermögen λ eines Electrolytes in verdünnter Lösung definirt durch die Beziehung (p. 160, 170):

$$\lambda = u + v = \frac{k}{m},$$

worin:

$$u = (1 - n) \lambda, \quad v = n \lambda.$$

Es bedeuten also:

$$u = (1 - n) \frac{k}{m} \quad \text{und} \quad v = n \frac{k}{m}.$$

die in § 22—26 aufgestellten molecularen Beweglichkeiten der Ionen.

Nach p. 200 ergeben sich dieselben Grössen in absolutem Maasse als:

$$U = \frac{1,08}{10^7} u \text{ und } V = \frac{1,08}{10^7} v \frac{\text{mm}}{\text{sec}}.$$

[10⁶ für Centimeter-Gramm-]

Diese Zahl U oder V ist also die Geschwindigkeit, welche einem Jon in verdünnter Lösung durch die absolute Einheit der electromotorischen Kraft, die auf die Längeneinheit der Lösung wirkt, mitgetheilt wird. Durch Multiplication mit 10^{11} [10⁹] erhalten wir also die Geschwindigkeit $10800 \cdot u$ (oder v) $\frac{\text{mm}}{\text{sec}}$ [108 $\frac{\text{cm}}{\text{sec}}$], welche der electromotorischen Kraft 10^{11} [10⁹] = 1 Volt auf 1 mm [cm] entspricht. Der Kraft 1 Daniell auf die Säule von 1 mm Länge entspricht eine um den achten Theil grössere Geschwindigkeit.

Für Wasserstoff in einbasischen Säuren z. B. erhält man auf 1 $\frac{\text{Volt}}{\text{mm}}$ die Geschwindigkeit $10^{11} U = 10800 \cdot 0,0000278 = 0,300 \frac{\text{mm}}{\text{sec}}$. Andere Zahlenresultate siehe in Tab. XIV.

35. Die treibenden Kräfte mechanisch gemessen.

Wenn die Geschwindigkeit U zu dem Potentialgefälle Eins gehört, so gibt nach dem Ohm'schen Gesetze $E = \frac{1}{U}$ das Potentialgefälle, welches für die Geschwindigkeit Eins nöthig ist.

Wir wollen die treibenden Kräfte aber noch in gewöhnlichem Gewichtsmaasse ausdrücken. W. Weber und R. Kohlrausch haben bei ihrer Vergleichung der electromotorischen und der mechanischen Stromeinheit schon vor 22 Jahren eine solche Rechnung zuerst ausgeführt, bezogen auf Wasser, welches mit Schwefelsäure zum Maximum der Leitungsfähigkeit angesäuert ist. Wir wissen aber jetzt, dass in dieser Flüssigkeit nicht das Wasser, sondern wahrscheinlich nur die Schwefelsäure zersetzt wird, und des-

1) Abh. d. Kgl. Sächs. Ges. d. Wiss. V. p. 270; Pogg. Ann. XCIX. p. 21. 1856.

wegen haben die damals berechneten Zahlen nicht die Bedeutung, welche W. und K. denselben beilegen zu müssen glaubten. Abgesehen von dieser Auffassung der Electrolyse selbst aber werden wir auf derselben Grundlage schliessen können, wie W. und K.

Diese Grundlage der Berechnung besteht in der Annahme, dass die electrolytische Fortschiebung der Theilchen ausschliesslich durch die ganze Wirkung der electromotorischen Kräfte auf die wandernden Electricitäten verursacht wird. Wer eine Leitung der Electricität ohne Zersetzung, sowie andererseits eine directe Wirkung der electromotorischen Kraft auf die ponderable Substanz ausschliesst — und beides thut die Physik gegenwärtig, — der muss auch die obige Grundlage als richtig anerkennen.

Nun übt ein in absolutem Maasse gemessenes Potentialgefälle (electromotorische Kraft auf die Längeneinheit) E auf jede Electricitätsmenge Eins eben die in absoluten Krafteinheiten gemessene Kraft E aus, d. h. eine Kraft, welche der Masse von 1 mg $_{[1g]}$ in 1 sec die Geschwindigkeit $E \frac{mm}{sec} \left[E \frac{cm}{sec} \right]$ ertheilen würde. Da nun das Gewicht von 1 mg $_{[1g]}$ der Masse von 1 mg $_{[1g]}$ in 1 sec die Geschwindigkeit $9810 \frac{mm}{sec} \left[981 \frac{cm}{sec} \right]$ ertheilt, so ist eine Kraft von E absoluten Einheiten gleich dem Gewichte von $\frac{E}{9810}$ mg

$$= \frac{E}{9810 \cdot 10^6} \text{ kg} \left[\frac{E}{981} g = \frac{E}{981000} \text{ kg} \right].$$

Damit ein electrolytischer Bestandtheil mit der Geschwindigkeit 1 wandert, wird, wie oben gefunden, ein Potentialgefälle $E = \frac{1}{U}$ (beziehungsweise $\frac{1}{V}$) gefordert, wo U die (p. 200) gegebene Bedeutung besitzt. Hierdurch wird auf die Electricitätseinheit im Electrolyte, mit anderen Worten auf jedes wandernde electrochemische Aequivalent, die Kraft ausgeübt gleich:

$$\frac{1}{U \cdot 9810 \cdot 10^6} \text{ kg-Gewicht} \left[\frac{1}{U \cdot 981000} \right].$$

Wollen wir endlich noch die Kraft berechnen, welche auf die Mengeneinheit der Substanz ausgeübt werden muss, so haben wir nur noch das chemische Aequivalentgewicht A derselben einzuführen. Auf jedes Milligramm [Gramm] Substanz kommt die Anzahl $\frac{955}{A} \left[\frac{9650}{A} \right]$ electrochemische Aequivalente, mit welcher Anzahl also die obige Kraft zu multipliciren ist. Dies ergibt:

die Kraft, welche auf 1 mg [1g] eines Jons wirken muss, damit dasselbe mit der Geschwindigkeit $1 \frac{\text{mm}}{\text{sec}} \left[1 \frac{\text{cm}}{\text{sec}} \right]$ wandert, hat die Grösse $\frac{955}{UA \cdot 9810 \cdot 10^6}$

oder:

$$\frac{0,974}{10^7} \frac{1}{UA} \text{ kg-Gewicht } \left[\frac{0,00974}{UA} \right],$$

(beziehungsweise V überall für ein Anion).

Nehmen wir z. B. 1 mg Wasserstoff in der verdünnten Lösung einer einbasischen Säure, so haben wir $A = 1$, $U = \frac{0,300}{10^{11}} \frac{\text{mm}}{\text{sec}}$, also die Kraft = 32500 kg-Gewicht.

[Im Centimeter-Gramm-System wird die tausendfache Menge mit zehnfacher Geschwindigkeit bewegt, also ist die Kraft 10000 mal grösser. Wir bekommen in der That = $325 \cdot 10^6$ kg-Gewicht.]

Nehmen wir als zweites Beispiel die von Weber und R. Kohlrausch behandelte Schwefelsäurelösung von maximalem Leitungsvermögen (1,224 specifisches Gewicht, 30,4 Procent H_2SO_4)¹⁾ oder $m = 7,59$, unterstellen dabei, dass nur die H_2SO_4 zerlegt werde, so finden wir aus Tab. XIII (p. 201):

für Wasserstoff $A = 1$ $U = 0,076 \cdot 10^{-11}$,

für $\frac{1}{2}\text{SO}_4$ $A = 48$ $V = 0,023 \cdot 10^{-11}$.

Um in dieser Lösung 1 mg eines Bestandtheiles mit $1 \frac{\text{mm}}{\text{sec}}$ zu befördern, muss auf diese Menge also wirken

bei Wasserstoff eine Kraft gleich 128000 kg-Gewicht

bei SO_4 „ 9000 „ „

1) Pogg. Ann. CLIX. p. 260. 1876.

Es handelt sich also, wie bereits Weber und R. Kohlrausch entwickelten, um immense Kräfte, welche zur Anwendung kommen müssen, damit die Ionen schneckenartig

um 1 mm in der Secunde durch das lösende Wasser vorwärts geschoben werden. Diese Kräfte, wie oben, auf die Masseneinheit des bewegten Bestandtheils bezogen, sind nach der Substanz von sehr verschiedener Grösse. Während an einem Milligramm der leicht beweglichen und schweren Jodatome 1300 kg ziehen müssen, verlangt die gleiche Masse Wasserstoffatome mindestens die 25 mal grössere Kraft von 32500 kg, das schwer bewegliche und leichtatomige Lithium 62000 und in zweiwerthigen Salzen gar 113000 kg oder 2300 Ctr. Zugkraft. Dieses Gewicht hat ein Bleiklotz von etwa 10 cbm. Die bei der Fortschiebung des Milligramms Lithium um $\frac{1}{2}$ mm geleistete Arbeit ist mehr als ausreichend, um 1 ccm der Lösung zum Sieden zu erhitzen. Noch viel grösser als in den verdünnten Lösungen ist, wie wir sahen, der Bewegungswiderstand in concentrirten Flüssigkeiten.

Neue Gruppierungen von besonderem Interesse bieten die Zahlen der obigen Tabelle nicht. Freilich stehen die grössten Zahlen, welche bei den Salzen der einwerthigen Säuren vorkommen, nämlich 62000 kg bei Lithium, 33000 kg bei Wasserstoff und Magnesium, 17700 kg bei Calcium, beiläufig im Verhältniss $1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{4}$, allein dieser Umstand ist wohl als ein Zufall zu bezeichnen.

36. Vergleichung der electrolytischen Reibung mit der capillaren Reibung.

Ehe wir den Gegenstand verlassen, werden wir noch eine Frage von der grössten Bedeutung zu beantworten suchen. Schon i. J. 1856 hat G. Wiedemann den Zusammenhang zwischen electrolytischem Leitungswiderstand und dem mechanischen Reibungswiderstande quantitativ verfolgt.¹⁾ Neuerdings verdanken wir Grotrian den Nachweis von auffallenden Beziehungen zwischen beiden Grössen.²⁾

Wird hiernach die bekannte Annahme immer wahrscheinlicher, dass mechanische Fluidität und electricches

1) G. Wiedemann, Pogg. Ann. XCIX. p. 230. 1856.

2) Pogg. Ann. CLVII. p. 130. 1876; CLX. p. 238. 1878.

Leitungsvermögen einer Flüssigkeit in irgend einem Zusammenhange stehen, so muss offenbar, um eine nähere Kenntniss der Verbindung zwischen beiden Gebieten zu gewinnen, die Frage beantwortet werden, wie der electrolytische Widerstand sich numerisch mit dem gewöhnlichen Reibungswiderstande vergleicht.

Auf den ersten Blick will es nach den obigen Zahlen freilich scheinen, als ob der electrolytische Widerstand unvergleichlich viel grösser wäre, als der capillare. Ergibt doch die Poiseuille'sche Formel, dass wenige Gramme Triebkraft genügen, um das Wasser in kilometerlanger Röhre mit einer Geschwindigkeit von $1 \frac{\text{mm}}{\text{sec}}$ zu bewegen.

Bei näherer Betrachtung werden wir jedoch sehen, dass die capillare Reibung, wenn wir zu molecularen Dimensionen übergehen, allerdings mit den Zahlen des electrolytischen Widerstandes vergleichbar wird.

Wir können uns bei dieser Untersuchung am bequemsten an die Begriffsbestimmung anschliessen, welche Hagenbach in seiner Begründung des Poiseuille'schen Gesetzes¹⁾ benutzt. P. 425 dieser Arbeit heisst es:

Wir bezeichnen mit dem Namen Zähigkeit die Kraft, die nöthig ist, um eine Flüssigkeitsschicht von der Dicke eines Molecüls und der Einheit der Oberfläche in einer Secunde mit gleichförmiger Geschwindigkeit um die Entfernung zweier Molecüle an einer zweiten Schicht vorbeizuschieben. Diese Zähigkeit beträgt für Wasser von 10° C. und bei dem Quadratmeter als Flächeneinheit 0,13351 g (bei 18° 0,1083 g).

Es kann natürlich nicht die Rede davon sein, diesen Ausdruck wörtlich zu nehmen, als ob die Molecüle in einer Flüssigkeit in ebenen Schichten angeordnet wären und schichtenweise aneinander vorbeibewegt werden könnten, wie man eine Schicht rechteckiger Klötze auf einer anderen gleiten lässt. Die Vorstellung ist vielmehr nur eine

1) Pogg. Ann. CIX. p. 385. 1860.

wahrscheinlich nur ganz entfernt zutreffende Annäherung an die Wirklichkeit, deren sich Hagenbach allerdings für seine Zwecke ganz exact bedienen durfte. Auch bedurfte er keineswegs einer Kenntniss des molecularen Abstandes, weil die letztere Grösse sich in seiner Definition der Zähigkeit wieder heraushebt.

Die neueste Zeit hat bekanntlich mehrere Anhaltspunkte für den Abstand der Molecüle geliefert. Nehmen wir mit O. E. Meyer¹⁾ nach Maxwell und van der Waals an, dass 280 Trillionen Wasserstoffatome 1 mg wiegen, dass also in 1 mg Wasser $16 \cdot 10^{18}$ Molecüle enthalten sind. Diese Molecüle seien um der Einfachheit willen würfelförmig angeordnet, so berechnet sich der Molecularabstand $\delta = 0,0000004$ mm.

Zu einer Schicht von einzelnen Molecülen ausgebreitet würde also 1 mg Wasser eine Fläche von $16 \cdot 10^{18} \cdot 0,0000004^2$ qmm = 2,5 qm einnehmen.

Soll diese Schicht von 2,5 qm an einer gleich grossen Wasserschicht mit der Geschwindigkeit δ vorbei bewegt werden, so ist dazu nach Hagenbach bei 18° die Kraft $2,5 \cdot 0,1083 = 0,27$ Grammgewicht nöthig. Befindet sich die Schicht auf beiden Seiten mit Wasser in Berührung, so ist die doppelte Kraft gleich 0,54 Grammgewicht erforderlich. Soll endlich die Geschwindigkeit nicht δ , sondern 1 betragen, so ist die Kraft im Verhältniss $\frac{1}{\delta} = 25 \cdot 10^5$ zu vermehren, was also das Gewicht von 1300000 g oder

1300 kg

ergibt.

Wir gelangen also, wenn ein Milligramm Wasser in Schichten von molecularer Dicke durch Wasser gleiten soll, zu Triebkräften, welche mit den für die electrolytische Beförderung gefundenen von gleicher Ordnung sind.

Offenbar kann man dieses Resultat auch dahin aussprechen, dass die Annahme, der electrolytische

1) Vgl. O. E. Meyer, Die kinetische Theorie der Gase, p. 234.
Ann. d. Phys. u. Chem. N. F. VI.

Widerstand sei eine Grösse von der Ordnung des capillaren Widerstandes, auf Molecularabstände von der gleichen Ordnung führt, wie die anderen Ableitungen dieser Abstände.

Würzburg, November 1878.

Seite 162 habe ich eine schon 1877 in den Göttinger Nachrichten (April 4, p. 184) ausgesprochene Bemerkung wiederholt, dass sehr verdünnte Lösungen eigenthümliche Widerstandsverhältnisse zeigen, die ich einer besonderen Mittheilung vorbehalte. Ich finde eine wesentliche Bestätigung und Erweiterung meiner Erfahrungen in der neusten Arbeit von R. Lenz (Beibl. 1878 Nr. 12, p. 710), welchem meine Bemerkung offenbar unbekannt geblieben war. Indem ich meine Versuche bald mitzuthellen hoffe, werde ich alsdann die Gründe entwickeln, aus denen ich hier vorgezogen habe, auf sehr verdünnte Lösungen nicht einzugehen.

14. Januar 1879.

II. *Untersuchungen über schnell wechselnde electrische Ströme; von A. Oberbeck.*

Bei der fundamentalen Wichtigkeit des Ohm'schen Gesetzes für die Electricitätstheorie ist die Frage nach der Grenze der Gültigkeit desselben für veränderliche Ströme vielfach der Gegenstand theoretischer und experimenteller Untersuchungen gewesen. Auf die Bedeutung wirklicher Abweichungen von dem Ohm'schen Gesetz hat besonders W. Weber¹⁾ hingewiesen und gezeigt, dass sich aus denselben ein Schluss auf die „Masse“ der Electricität

1) Electr. Maassb. V. Ueber electrische Schwingungen. Abh. d. k. sächs. Ges. d. Wiss. IX. p. 593–599; p. 616–618.