$c_A - c_B$	Farbe		μ_5	n	$c_A - c_B$	Farbe		μ_5	n
	A	B				A	B		
-0.4	1.8	2.2	0.233	4	+0.4	3.4	2.9	0.113	3
+0.3	2.2	1.9	0.250	6	+4.0	5.0	1.0	0.080	2
+1.4	2.7	1.3	0.204	3	Spektr. K u. M.				
+2.2	3.4	1.2	0.228	2	-1.8	3.4	5.2	0.436	2
+3.6	4.1	0.5	0.208	3	+1.1	5.0	3.9	0.126	2
Spektr. G.					+3.0	3.8	0.8	0.018	2
-0.7	3.3	4.0	0.330	2	+4.8	6.8	2.0	0.026	2

Man sieht, daß die Beziehung zwischen Eigenbewegung und Farbe nur bei den »späteren« Typen vorhanden ist. Bei den A- und F-Sternen ist eine Abhängigkeit nicht zu erkennen, was sehr zugunsten meiner Erklärung spricht.

Zieht man die Spektraltypen G, K und M in eine Gruppe zusammen, so tritt die Erscheinung noch deutlicher hervor:

$c_A - c_B$	μ_5	n	$c_A - c_B$	μ_5	n
-1.8	0.436	2	+2.5	0.077	2
-0.5	0.306	3	+4.4	0.023	2
+0.1	0.143	2	+4.9	0.024	2
+1.1	0.101	3			

Die Zunahme der Eigenbewegung von 0.024 bis 0.436 entspricht bei gleicher Geschwindigkeit einem Unterschied von 6 Sterngrößen in der absoluten Lichtstärke.

Nach *Wirtz* (l.c. Sp. 6) ist der m. F. seiner Katalogfarben ± 0.6 , der m. F. eines Wertes $c_A - c_B$ also 0.8 oder 0.9. Das vorliegende Material gestattet daher nicht, die Frage zu entscheiden, ob die Werte von $c_A - c_B$ in zwei scharf getrennte Gruppen zerfallen oder nicht.

Hörsholm, 1918 Juli.

H. E. Lau.

Mitteilungen über Kleine Planeten.

Beobachtungen auf der Königstuhl-Sternwarte.				
Nr.	1919 Feb.-März	Planet	Position 1919.0	Tägl. Bew. Gr.
1	20	754 [1906 UT]	8 ^h 42 ^m 1 — 6° 48'	-0.6 + 11' 12 ^m 6
2	1	1919 FB (neu)	8 48.3 + 31 13	-0.7 0 13.1
		519 Sylvania	8 59.6 + 32 48	-0.7 0 12.8
		529 Preziosa	9 0.7 + 32 29	-0.7 0 13.0
3	1	588 Achilles	11 45.1 — 7 18	-0.5 + 2 14.5
4	7	659 Nestor	11 11.1 + 5 36	-0.5 + 3 15
		1919 FC (neu)	11 13.1 + 5 24	-1.2 + 2 15
5	7	510 Mabella	9 19.3 + 3 50	-0.7 + 7 13.6
		7 Iris	9 21.4 + 6 40	-0.7 + 5 8.4
		840 [1916 AK]	9 27.7 + 2 55	-0.7 + 3 13.6

Nr.	Platte	Plattenmitte	M. Z. Kgst.	Beob.
1	B 4203	8 ^h 39 ^m 7 — 6° 56'	10 ^h 28 ^m 9 ¹⁾	K. Reinmuth
2	B 4205	8 54.4 + 32 45	9 7.0	»
3	D 1858	— —	12 10.7	M. Wolf
4	D 1859	11 12.0 + 5 35	10 51.5	»
5	B 4207	9 19.1 + 3 51	12 17.9	K. Reinmuth

¹⁾ Platten schlecht, da Linsen naß.

Heidelberg, 1919 März 8.

M. Wolf.

Beobachtungen auf der Fabra-Sternwarte.				
Planète	1919	T. m. Gr.	Position 1919.0	
7 Iris	Jan. 29	12 ^h 15 ^m	9 ^h 56 ^m 26 ^s	+ 3° 57'5
45 Eugenia	» 29	12 15	10 19 40	+ 9 47.8
49 Pales	» 26	12 0	9 30 50	+ 12 26.6
54 Alexandra	» 28	12 20	9 48 16	+ 11 11.4
71 Niobe	» 26	12 0	9 37 54	+ 14 12.7
	» 28	12 20	9 35 35	+ 14 5.5
81 Terpsichore	Févr. 7	12 10	9 59 6	+ 20 43.3
405 Thia	Jan. 24	11 50	8 43 50	+ 0 51.3
478 Tergeste	» 24	11 50	8 56 33	- 3 10.0

Planète	1919	T. m. G.	Position 1919.0
516 Amherstia	Jan. 28	12 ^h 20 ^m	10 ^h 10 ^m 45 ^s + 15° 53'5 ¹⁾
	Févr. 7	12 10 10	0 54 + 14 49.6
804 Hispania	Jan. 25	7 45	8 24 5 + 36 41.2
851 [Σ 26]	» 28	12 20	9 40 23 + 13 31.2

¹⁾ Dekl. wohl + 14° 53'5 zu lesen. Red.

Barcelona, 1919 Févr. 20.

J. Comas Solá.

Beobachtung auf der Universitätssternwarte Wien.

Planet	1919	M. E. Z.	Position 1919.0
146 Lucina	März 2	10 ^h 26 ^m	11 ^h 14 ^m 2 ^s + 26° 49'4

Wien, 1919 März 3.

J. Rheden.

Ephemeriden-Korrekturen.

Planet	1919	Korr.	Ephem.	Beob.
7 Iris	Jan. 29	+ 1 ^m 1 — 5'	R. I.	J. Comas Solá
19 Fortuna	Febr. 26	- 2.8 + 16	»	W. Luther
29 Amphitrite	März 1	+ 0.1 — 1	»	»
45 Eugenia ¹⁾	Jan. 29	+ 0.1 + 6	»	J. Comas Solá
81 Terpsich.	Febr. 7	- 1.3 + 9	»	»
146 Lucina	März 2	- 0.3 0	»	J. Rheden
241 Germania	» 3	- 1 ^s 0 + 6"	»	J. Fischer-Petersen
405 Thia	Jan. 24	- 12 ^m 6 + 78'	»	J. Comas Solá
471 Papagena	März 19	- 0.6 + 2	»	W. Luther
478 Tergeste	Jan. 24	+ 11.5 — 59	»	J. Comas Solá
510 Mabella	März 7	+ 0.3 0	»	K. Reinmuth
519 Sylvania	» 1	- 0.2 — 3	»	»
529 Preziosa	» 1	+ 10.9 — 29	»	»
588 Achilles	» 1	+ 0.1 0	A. N. 4975	M. Wolf
659 Nestor	» 7	- 0.9 + 6	A. N. 4969	»
754 [1906 UT]	Febr. 20	+ 1.8 — 6	R. I.	K. Reinmuth
840 [1916 AK]	März 7	- 1.0 + 12	»	»

¹⁾ Die Angabe in A. N. 4978 ist hiernach zu berichtigen.

Berichtigung. In unserer »Untersuchung des Lichtwechsels von β Lyrae usw.«, Berl. Ber. 1917, XII, ist zu S. 229, Zeile 8 v. u. zu bemerken, daß das graphische Verfahren zur Ermittlung der Elliptizität der Komponenten nicht von *Russell* sondern von *Stein* (Verh. Kon. Akad. van Wetensch. Amsterdam 10.472, 1907) zuerst angegeben worden ist. Ferner ist in den Formeln 8a auf derselben Seite ein bei der Herstellung des druckfertigen Manuskripts begangenes Versehen zu berichtigen. Das erste Glied rechts muß überall statt 1 heißen $\sqrt{1 - \epsilon^2 \sin^2 i \cos^2 \theta}$. Die Rechnungen sind mit den richtigen Formeln ausgeführt worden.

P. Guthnick. R. Prager.