Über eine Reaktion des Amylalkohols.

Von

H. v. Wyss, E. Herzfeld und O. Rewidzoff.

(Aus dem chemischen Laboratorium der medizinischen Klinik in Zürich.)

(Der Redaktion zugegangen am 30. Januar 1910.)

Beschäftigt mit der Untersuchung der Körperflüssigkeiten auf oxydierende Fermente fanden wir, daß jeder normale Harn versetzt mit α -Naphthol, p-Phenylendiamin, Sodalösung und H_2O_2 in bestimmter Weise intensiv blaue Farbe annimmt. Die dazu notwendigen Lösungen wurden folgendermaßen hergestellt:

1. 4,5 g α -Naphthol kalt gelöst in 100 ccm 50%igem Alkohol.

2. 4,5 g p-Phenylendiamin kalt gelöst in 100 ccm absolutem Alkohol.

3. 4,5 g Na_2CO_3 gelöst in 100 ccm H_2O .

4. 3%ige H_2O_2 -Lösung.

Wenn man von den unter 1), 2) u. 3) angegebenen Lösungen je 4 Tropfen und von der Lösung 4) 10 Tropfen nimmt, tritt obige Reaktion ein. Wir versuchten, den betreffenden Körper aus dem Harn mit den verschiedensten Extraktionsmitteln zu extrahieren, und fanden dabei die auffallende Tatsache, daß Amylalkohol, mit obigen Körpern exkl. H_2O_2 versetzt, eine intensiv blaue Farbenreaktion zustande kommen läßt. Die genauen Bedingungen der Reaktion sind folgende:

2 ccm Amylalkohol,

4 Tropfen Lösung 1 } frisch hergestellt
4 Tropfen Lösung 2 }
4 Tropfen Lösung 3.

Es tritt rasch eine intensiv dunkelblau-violette Farbe auf, ohne daß man schüttelt, und auch wenn man den Luftzutritt durch Abschluß mit Xylol verhindert. Vorderhand verzichten wir

darauf, eine Erklärung der Reaktion zu geben. Dagegen fügen wir hinzu, daß diese Reaktion schwach positiv noch bei folgenden Körpern ausfällt:

Isobutylalkohol (Wirkung ungefähr 4 mal so schwach wie bei Amylalkohol, jedoch stärker wie bei folgenden)

Heptylalkohol schwach

Äthylalkohol »

Cetylalkohol »

Glycerin »

Wachs »

Die vier letzten Körper zeigen nach etwa 5 Minuten eine schwache violette Färbung. Alle Reaktionen wurden zugleich mit einer Kontrollprobe angestellt, d. h. zu etwa 2 ccm H_2O wurden je 4 Tropfen der obigen Lösungen exkl. H_2O_2 gegeben.

Bei folgenden Substanzen: Methylalkohol, Propylalkohol, Rohrzucker, Inosit, Methylacetat, Äther acetic., Aceton, Petroläther, Benzol, Toluol, Xylol, Chloroform, Fettsäuren, Harnsäure, Purinbasen, Kreatinin, Xanthin und einer Reihe anderer Körper fällt die Reaktion negativ aus. Selbstverständlich wurden Amylalkohol, Isobutylalkohol und einige andere positiv reagierende Körper auf Reinheit geprüft, da wir zuerst den Eintritt der Reaktion der Unreinheit der untersuchten Körper zuschrieben. Weitere Versuche sind noch im Gange.

Das Auffallende an der Reaktion ist also, daß bei der Bildung des Indophenols der Amylalkohol die Stelle einer Peroxydase plus H_2O_2 einnimmt.