kennen würden als es ihm möglich war) sagt er nicht; aber man darf wohl voraussetzen, daß er nicht nach einem flüchtigen Anblick das Fernrohr abgab. Der Gehülfe war mit der Handhabung des langen Fernrohrs so wenig bekannt, daß er nicht einmal den Mond finden konnte. *Vassenius* nahm also das Fernrohr wieder, und sah nachher noch den größten Berg ganz unverändert, und an derselben Stelle des Mondsrandes über 40 Secunden. Auch hier stimmt er mit meiner Beobachtung, ich habe in der Zeit, in der ich die Erscheinungen sah, keine Veränderungen an ihnen bemerkt.

Tandem vero radius Solaris, fulguris instar, in boreali Lunae limbo emissus oculo Mercurium fere perigeum in tanta festinatione frustra inquisituro jucundissimum hoc Spectaculum, expectatione citius, subudxit.

Ebenso wie in Wien brach der erste Sonnenstrahl, plötzlich wie ein Blitz hinter dem Monde hervor, und mit ihm verschwand die ganze schöne Erscheinung.

Wenn ich mich an *Vassenius* Stelle vor seinem Fernrohre denke, das nicht die deutlichen Bilder des 8füßigen *Fraunhoferschen* Achromaten geben konnte, glaube ich, daß ich die Erscheinung mit denselben Worten beschrieben hätte.

Wahrscheinlich ist *Vassenius's* Beobachtung vergessen, weil sie damals keinen Glauben fand. *Celsius*, der die Finsternis in Berlin beobachtete, wo sie nicht total war, hat

nachher eine Geschichte der in Schweden gemachten Beobachtungen geschrieben, die Herr Professor *Weber* auf der Göttinger Bibliothek durchzusehen die Güte hatte. Es kommen außer der hier angeführten Beobachtung nur 2 andere darin vor, die auf unsere Erscheinung gedeutet werden könnten.

M. Johannes Edström Lect. Math. in Regio Gymnasio Carolostadii Wermelandiae sagt:

sub totali per 2 minuta obscuratione annulus circum visus est ejusdem ubique latitudinis, superne pariter atque infra radios emittens, pares quidem lumine, sed longitudine dispares, atque situm plane eundem servantes, donec limbo solis relucente, una cum annulo disparuerint.

M. Andreas Swebilius, Propositus et Pastor in Åblem (prope mare balticum, 4 mill. Calmaria septentrionem versus) beobachtete:

ad dextram solis versus boream duas fascias lucidas sibi invicem parallelas et ad horizontem inclinatas.

Indessen kann das, was diese Herren gesehen haben, da sie nicht die röthliche Farbe der Erscheinungen angeben, eben so gut auf die Strahlen gedeutet werden, die *Vassenius* und *Struve* aus dem Lichtringe ausfahrend gesehen haben.

S.

Beobachtungen des Cometen im November 1842.

Von Herrn Director *Rümker*.

1842.	Mittl. Hamb. Zeit.	Scheinb. AR.	Scheinb. Decl.	Zahl der Beob.	Scheinb. Sternörter zur Zeit ihrer Vergleichung mit dem Cometen.
		Scheinb. AR.*	Scheinb. Decl.*
Nov. 7	6 ^h 39' 57" 46	18° 6' 2" 11	42° 20' 6" 69	1	18° 2' 14" 563	46° 15' 37" 76
Nov. 8	7 16 56,02	18 12 18,687	42 55 3,34	9	18 8 43,141 18 9 18,553 18 8 53,162 18 12 27,448 18 13 43,826	43 17 40,61 43 14 46,79 42 50 19,07 42 44 56,30 42 30 25,57
Nov. 9	7 1 56,69	18 17 59,019	39 27 5,62	16	18 17 50,907 18 19 2,181	39 26 30,76 39 25 41,68
Nov. 15	6 4 36,96	18 45 39,574	15 56 40,48	3	18 42 37,693 18 45 8,012 18 45 17,099	15 45 42,36 15 52 40,26 15 54 1,02
Nov. 16	6 26 55,58	18 49 22,962	11 49 35,20	9	18 47 11,672 18 50 48,250 18 52 22,134 18 53 15,359	11 52 9,68 11 49 28,29 11 51 18,59 12 0 46,49
Nov. 17	6 0 12,90	18 52 44,113	7 55 33,68	10	18 54 48,385 18 55 58,091 18 56 55,993 18 52 30,911 x 18 52 46,93	8 9 10,64 8 4 15,03 8 4 12,26 7 52 53,37 7 52 0,43

bedeckte der Comet den Stern x.

1842.	Mittl. Hamb. Zeit.	Scheinb. AR.	Scheinb. Decl.	Zahl der Beobb.	Scheinb. Sternörter zur Zeit ihrer Vergleichung mit dem Cometen.	
Nov. 20	7 ^h 10' 47" 39	19° 1' 39" 926	— 3° 25' 59" 64	5	Scheinb. AR. *	Scheinb. Decl. *
					19 ^h 3' 25" 402	— 3° 19' 8" 67
					19 6 50,505	3 35 34,21
					19 6 56,725	3 37 5,92
					19 7 12,484	3 22 55,47
					19 7 23,545	3 18 30,30
Nov. 21	5 55 18,21	19 4 3,186	— 6 40 18,26	11	19 2 31,882	— 6 52 18,73
					19 3 26,281	6 40 18,94
					19 4 14,807	6 42 57,95

Hamburg 1842. Decbr. 1.

Rümker.

Schreiben des Herrn Professors *Kaiser*, Directors der Sternwarte in Leiden, an den Herausgeber.
Leiden 1842. Novbr. 12.

Indem ich Ihnen beigefügte kleinen Aufsätze übersende, mit der Bitte, dieselben in die Astr. Nachr. einzurücken, benutze ich die Gelegenheit, Ihnen Einiges über meine letzten Geschäfte mitzutheilen. Es ist mir Vieles mißlungen, und das Mißlungene hat öfters die meiste Zeit und Mühe gekostet. Besonders bin ich mit den Plejaden-Bedeckungen unglücklich gewesen, welche sich in den letzten Jahren bis dreizehnmal wiederholten, und wovon nur eine einzige (am 13^{ten} Oct. 1840) von der Witterung begünstigt worden ist, grade zu einer Zeit, wo mich eine anhaltende Krankheit traf. Meine früheren Beobachtungen der Plejaden-Bedeckungen, bis zum 27^{sten} Febr. 1841, sind in den Astr. Nachr. Nr. 391 und 432 angeführt. Nachher haben noch vier Bedeckungen Statt gefunden, nämlich am 10^{ten} August, 31^{sten} Octbr., 27^{sten} Novbr. 1841 und 21. Januar 1842, und während der drei letzten war der Himmel vom Anfang bis zum Ende ganz und gar bezogen. Jede Bedeckung wurde voraus berechnet und die Berechnung über so viele Sterne der Plejaden ausgebreitet, als mit hinlänglicher Genauigkeit bestimmt sind. Im Ganzen sind nicht weniger als 460 Momente voraus berechnet, und es war ganz unmöglich mehr als 43 dieser Momente zu beobachten.

Am 10^{ten} August 1841 des Morgens erhielt ich Nr. 430 der Astr. Nachrichten, also zeitig genug, um das *Besselsche* Verzeichniß von 53 Sternen der Plejaden, zur Vorbereitung der Beobachtungen an diesen Tagen benutzen zu können. Es sollten 40 Sterne bedeckt werden, welche sich bei günstiger Witterung mit unserm kraftvollen Refraktor wahrscheinlich alle hätten beobachten lassen, und unter diese Sterne gehörten 7 der 10 hellen Sterne der Plejaden. Kurz vor den Bedeckungen wurde aber der Himmel mit schweren Dünsten überzogen, und obschon noch eine gute Zeitbestimmung erlangt war, wurde es unmöglich, mehr als sechs Phänomene zu beobachten, welche die folgenden sind:

Plejaden-Bedeckung am 10^{ten} Aug. 1841.

- Eintritt b Plejad. 20^h 9' 6" 73 Sternz. = 10^h 52' 12" 42 Mittl. Z. durch dichte Nebel, auf $\frac{1}{2}$ Secunde ungewiss.
 Eintritt g Plejad. 20^h 19' 23" 13 St.z. = 11^h 2' 27" 14 Mittl. Z. Der Stern wegen Nebel äußerst schwach, die Beobachtung eine ganze Secunde unsicher.
 Eintritt i Plejad. 20^h 44' 13" 47 St.z. = 11^h 27' 13" 40 Mittl. Z. Unter heftigem Unduliren $\frac{1}{2}$ Secunde unsicher.
 Eintritt d Plejad. 20^h 48' 48" 59 St.z. = 11^h 31' 47" 78 Mittl. Z. Wegen Nebel $\frac{1}{2}$ Secunde unsicher.
 Austritt g Plejad. 20^h 55' 49" 93 St.z. = 11^h 38' 47" 96 Mittl. Z. Durch dichte Nebel, aber doch plötzlich. Die Unsicherheit nicht größer als 0"2.
 Austritt b Plejad. 21^h 0' 6" 50 Sternz. = 11^h 43' 3" 84 Mittl. Z. In einem einzigen günstigen Moment. Die einzige sehr gute Beobachtung, deren Unsicherheit 0"1 nicht übersteigt.

Die kleineren Sterne waren durch den Nebel gar nicht zu erblicken, und die helleren zeigten sich nur bisweilen und dann noch sehr schwach. Besser gelang die Beobachtung der

Venus-Bedeckung am 12^{ten} Sept. 1841.

Bei dieser Bedeckung war die Luft heiter, welches hier im Jahr 1841 zu den großen Seltenheiten gehörte. Eine Stunde vor dem Eintritt wurde, bei Tageshelle, eine gute Zeitbestimmung durch α Aurigæ und β und δ Orionis erhalten. Der Austritt des Planeten fand an dem dunkeln Mondes-Rande Statt, welcher, wegen des Tageslichtes, gar nicht sichtbar war, und kein erleuchteter Theil des Mondes konnte sich im Felde des Refractors befinden, als er beim Austritt auf den Planeten gerichtet war. Jedoch ist die Beobachtung des Austritts vollkommen gelungen, indem ich, wenige Minuten vor dem Austritt das Fernrohr mittelst seiner Kreise genau auf den Ort