Léon Ronnet: Die Herstellung und Analyse von Schaumweinen der Champagne. (Neue Deutsche Wein-Ztg. 1914, 9, 2—3.)

P. Trübsbach: Zur Wermutweinfrage. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1913, 19, 63—72.)

W. Henneberg: Obstwein und seine Bereitung. (Deutsche Essigind. 1913, 17, 361—362, 374—376, 384—385, 398—399 u. 407—408.)

Bier.

T. Chrzaszcz: Über die Malzamylase aus verschiedenen Getreidearten. (Wochenschr. f. Brauerei 1913, 30, 538—541 und 545—549.) — Die stärkeverflüssigende, -dextrinierende und -verzuckernde Kraft der Malzamy-lasen entwickelt sich mehr oder weniger rasch bis zum 10.—12. Tage der Keimung; darnach wird in langsamerer Entwicklung, gewöhnlich zwischen dem 18. und 22. Tage die höchste Stufe der Wirksamkeit erreicht. Bei Hirse kann das Maximum schon mit dem 12.—16. Tage erreicht werden. Hiernach gehen die Kräfte zurück, die stärke-verzuckernde Kraft gewöhnlich in stärkerem Maße. Temperatur und Art der Malz-führung sind von Einfluß: feuchte und luftige Malzführung sowie höhere Temperatur wirken beschleunigend. Das Mengenverhältnis neigt aber definitiv zum Vorteil einer kühlen Malzführung. Auf die quantitative Gestaltung der drei Kräfte kann nur die Qualität des Kornes und die Zeitdauer der Malzführung einen Einfluß haben. Durch die Charakterisierung einer derselben, z. B. der stärkeverzuckernden Kraft, kann man weder auf die Menge noch die Eigenschaften der übrigen Enzyme schließen. Die stärkeausfällende Kraft, die bei den Getreideamylasen markant zum Vorschein kam, ließ sich bei den Malzamy-lasen nicht wahrnehmen. Höchstwahrscheinlich ist diese durch die stärkeverflüssigende Kraft, die beim Malz besonders hervortritt, aufgehoben.
W. Sutthoff.

W. Windisch und Derz: Über den Einfluß der Reaktion auf die Stärkeverzuckerung mit besonderer Berücksichtigung der Phosphate. (Wochenschr. f. Brauerei 1913, 30, 533—537.) — In bezug auf die Reaktion von Malzauszügen spielen die Phosphate eine hervorragende Rolle. Von der gesamten wasserlöslichen Phosphorsäure, 0,586% der Trockensubstanz eines hellen Darrmalzes, waren 8,22% organisch gebunden; von dem Rest waren 90,00% als primäres Phos-phat und 1,78% als sekundäres Phosphat, bestimmt nach einem vom Verf. dem-nächst bekannt zu gebenden Verfahren, vorhanden. Verzuckerungsversuche an neutralisierter Stärkelösung mit Malzauszug ergaben eine Abnahme der diastatischen Kraft sowohl bei Säure- als auch bei Laugenzusatz, jedoch vertrug die Diastase bis zu ihrer völligen Vernichtung erheblich größere Mengen Lauge als Säure, wohl des-halb, weil nach Demoussy (Wochenschr. f. Brauerei 1906, S. 349) der gereinigten Stärke die Eigenschaften einer schwachen Säure zukommen. Die vernichtende Wirkung der Schwefelsäure zeigt sich erst von dem Augenblicke an, in dem die sekundären Phosphate in primäre und die organischen Salze in Mineralsalze übergeführt sind. Tertiäres Kaliumphosphat wirkt ebenso schädigend wie Schwefelsäure und Natron-lauge; sekundäres Phosphat wirkt hemmend, jedoch einigermaßen schädigend erst bei Zusatz ziemlich großer Mengen; primäres Phosphat, das, wie oben festgestellt, den Hauptteil der löslichen Phosphorsäure ausmacht, wirkt fördernd, jedoch erst bei Zusatz ziemlich großer Mengen. Nachdem Fernbach den Einfluß der Reaktion auf die enzymatische Wirkung der Diastase in die Formel gefaßt hat: die verzuckernde Wirkung der Diastase auf die Stärke ist am günstigsten in einer gegen Methylorange neutralen Lösung, würde man nach landläufiger Anschauung der Maische am besten auf künstlichem oder natürlichem Wege soviel Säure zuführen, daß dieser Reaktions-punkt erreicht wäre. Weil sich aber die Reaktion der Maische gegen Methylorange dauernd verschiebt, so ist es unmöglich, den Maischprozeß bei konstanter Reaktion

durchzuführen, und aus demselben Grunde kann man beim Maischen, ohne die enzymatische Arbeit zu stören, viel größere Mengen Säure zufügen als der Neutralität der Ausgangsmaische gegen Methylorange entspricht. Die Maischeacidität gegen Lackmus nimmt in den Versuchen des Verf.'s, wenn man die zugesetzte Säure abzieht, ständig ab, wobei offenbar die Eiweißkörper bzw. deren Abbauprodukte die Hauptrolle spielen.

W. Sutthoff.

W. Windisch und M. Glaubitz: Über den Einfluß der Verdünnung der Maische auf die bei der Untersuchung des Malzes nach dem Kongreßverfahren berechnete Extraktausbeute. (Wochenschr. f. Brauerei 1914, **31**, 1—4.) — Die Abweichungen, die sich bei der Berechnung des Extraktes für verdünnte Maische nach dem Proportionalitätsverfahren ergeben, sind bei Benutzung der Tabelle von Windisch konstanter und erheblich kleiner als bei Benutzung der Balling'schen Tabelle; sie sind außerdem bei verschiedenen Malzen nicht konstant. Bei vereinbarten Verfahren muß sich der Analytiker genau an die gegebene Verdünnungsvorschrift halten. Beim Verdünnen der Maischen auf etwa 12 %ige Würzen erhält man gegenüber der Verdünnung auf 8,5 %ige Würzen bei der Balling'schen Tabelle Extraktzahlen, die im Durchschnitt um 0,75—0,8 %, bei der Tabelle von Windisch um 0,4 % höher liegen. Der Grund hierfür liegt vorwiegend in dem Verhalten der Extraktbestandteile bei der Verdünnung, nicht in den Maisch- und Extraktionsverhältnissen. Zu erwägen bleibt, ob das Kongreßverfahren nicht zweckmäßig dahin geändert wird, daß die Laboratoriumswürzen denen der Praxis annähernd entsprechen. Statt der Balling'schen Tabelle sollte nur noch die richtigere von Windisch angewendet werden. Es ist der Frage näher zu treten, ob die Unstimmigkeiten in der Bestimmung der Stammwürze eines Bieres aus seinem Alkohol- und Extraktgehalt ausschließlich auf die Fehler der alten Balling'schen Tabelle oder zum Teil darauf zurückzuführen sind, daß bei Bestimmung des Extraktes in der Stammwürze und im Bier wesentlich verschiedene Extraktkonzentrationen vorliegen.

W. Sutthoff.

W. Windisch, H. Asemann und O. Hoffmann: Über den Einfluß des Brauwassers, des Auflösungsgrades des Malzes und des Maischverfahrens auf den Stickstoffgehalt der Würze, insbesondere auf den Gehalt der Würze an assimilierbarem Stickstoff. (Wochenschr. f. Brauerei 1913, **30**, 565—567, 573—575, 584—586 und 592—594.) — Die Stickstofffrage in der Brauerei ist nach wie vor akut, trotzdem schon eine Unsumme von Arbeit darauf gerichtet worden ist; von besonderer Bedeutung ist der für die Hefe assimilierbare Stickstoff in der Würze. Verff. vermaischten ein helles und ein dunkles Malz mit destilliertem Wasser sowie mit Wasser, das je 50 g Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumsulfat, Calciumsulfat und mit Wasser, das je 30 g Magnesium- und Calciumcarbonat und je 20 g Magnesium- und Calciumsulfat im Hektoliter enthielt. Der zufärbende Einfluß der Carbonate wurde auch hier wieder bestätigt. Der korrigierende Einfluß der Erdalkalisulfate auf diese Zufärbung war nur geringfügig. Erdalkalicarbonate, und zwar Magnesiumcarbonat in stärkerem Maße, hemmen die Stickstofflösung, die Sulfate fördern sie, und zwar Calciumsulfat in höherem Maße. Die in dem gemischten Wasser neben den Erdalkalicarbonaten vorhandenen Erdalkalisulfate vermochten die hemmende Wirkung der ersteren nicht aufzuheben. Neben der Stickstofflösung wird auch der Stickstoffabbau, gemessen am Verhältnis des assimilierbaren Stickstoffs zum Extrakt, durch die Carbonate gehemmt, durch die Sulfate gefördert. Auch hierbei wirkt Magnesiumcarbonat nachteiliger und steht in seiner Wirkung dem Natriumcarbonat nahe. Die Wirkung des Calciumcarbonates ist je nach dem Charakter des Malzes verschieden. Über die unterschiedliche Wirkung beider Carbonate soll demnächst berichtet werden. Die durch Acetonfällung nach

Petit ermittelten Gehalte an assimilierbarem Stickstoff sind durchweg ganz erheblich niedriger als die durch die Gärungsmethode ermittelten. Erstere ist für wissenschaftliche Untersuchungen durchaus unbrauchbar, da sie höchstens, wie es auch in der Absicht Petit's lag, einen Ausdruck für die Stickstoffmenge, die die Hefe im Höchsfalle unter praktischen Verhältnissen zu assimilieren vermag, geben könnte. Nach den Versuchen der Verff ist außerdem zum vollkommenen Ausfällen des acetonunlöslichen Stickstoffs der doppelte Acetonzusatz der Petit'schen Vorschrift erforderlich. Zur Prüfung des Einflusses des Auflösungsgrades des Malzes und des Maischverfahrens dienten zwei Malze, die im großen aus derselben Gerste in 5 Tagen als Kurzmalz und in 8 Tagen Mälzungsdauer als Langmalz hergestellt waren; gemaischt wurde mit einem an Gips ziemlich reichen, an Carbonaten ärmeren Wasser, und zwar nach dem Kongreßverfahren, einem Eiweißrastverfahren und einem Vormaisch-Eiweißrastverfahren. Das Langmalz gab unter den gleichen Maischbedingungen im allgemeinen etwas mehr Stickstoff in Lösung als das Kurzmalz; durch das Kochen der Würze wurden die Unterschiede nicht ausgeglichen, wohl aber durch ein passendes Maischverfahren. Im allgemeinen ist die Langmalzwürze auch etwas reicher an assimilierbarem Stickstoff als die Kurzmalzwürze; der Anteil des Gesamtstickstoffes an assimilierbarem Stickstoff ist jedoch beim Langmalz nur um ein Geringes höher. Die Langmalzwürzen sind nicht reicher, aber auch nicht wesentlich ärmer an Albumosen als die Kurzmalzwürzen. Entschieden eiweißlösend und -abbauend wirkte das Vormaischen, und die Befunde der Verff. scheinen überdies darauf hinzudeuten, daß die Hefe gerade in den Vormaischwürzen eine vorzüglich geeignete Stickstoffnahrung findet. Das assimilierbare Eiweiß dient in erster Linie der Hefe zur Nahrung. Nach früherer Annahme stellen die am weitesten abgebauten Eiweißstoffe als Amide und Aminosäure die besten Nährstoffe für die Hefe dar. Nach den Untersuchungen von H. T. Brown hat sich die Anschauung gebildet, daß die höheren Eiweißstoffe hauptsächlich der Ernährung und Vermehrung der Hefe, die weiter abgebauten der Enzymbildung dienen. In dieser Hinsicht wie auch betreffs der praktisch bedeutungsvollen Frage nach den Beziehungen zwischen assimilierbarem Stickstoff und der Haltbarkeit des Bieres harren noch manche Fragen der wissenschaftlichen Forschungsarbeit.

W. Sutthoff.

F. Schönfeld: Der assimilierbare Stickstoff in der Würze und seine Beziehung zur Hefe und Gärung. (Wochenschr. f. Brauerei 1914, **31**, 197—199.) — Bei der Biergärung werden von dem Gesamtstickstoff der Würze etwa 15—30% assimiliert, während etwa 45—65% assimilierbar sind. Hier liegen die Bedingungen so, daß ein großer Teil der für den Geschmack, das Aroma und besonders für den Nährwert bedeutungsvollen Stickstoffverbindungen dem Bier erhalten bleiben. Die grundverschiedene Gärführung bei der Preßhefefabrikation zielt auf höchste Stickstoffassimilation. Das analytische Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes der Würze an assimilierbarem Stickstoff benutzt dieselben Bedingungen: hohe Gärtemperatur, starke Bewegung und Lüftung, starke Verdünnung, Benutzung geeigneter, starker Vermehrung fähiger Heferassen. Eine nach Ansicht des Verf.'s bei geeigneter Versuchsanstellung nur unwesentliche Vermehrung des Stickstoffs in der vergorenen Flüssigkeit kann bei diesem Verfahren vielleicht durch den Austritt nicht assimilierbarer Stickstoffverbindungen aus lebenden oder abgestorbenen Hefezellen eintreten. Kurz gewachsene sowie eiweißarme Malze geben Würzen mit geringem Stickstoffgehalt von im allgemeinen geringer Assimilationsfähigkeit. Die stickstoffreichen Bierwürzen verlieren absolut sowohl wie relativ durch die Gärung weniger Stickstoff als die stickstoffarmen Würzen, weil sich die Hefe in stickstoffreichen Würzen leicht zur Bruchform ausbildet, wodurch sie in ihrer Vermehrungsfähigkeit Einbuße erleidet. Hohe Vergärung geht Hand in Hand mit starker Stickstoffentnahme. Das ist besonders bei der Weißbiergärung zu beobachten. Wegen der Verwendung kurz gewachsenen

Weizenmalzes erhält man eiweißarme Würzen, deren Stickstoff nach Versuchen des Verf.'s zu nicht mehr als 45% assimilierbar ist. Deshalb kann die Hefe aber in der Weißbierwürze nicht träge werden, sie zerstört den Zucker restlos und nimmt den assimilierbaren Stickstoff bis auf den kleinsten Anteil auf. *W. Sutthoff.*

W. Windisch und K. ten Doornkaat-Koolman: Über die freien und gebundenen organischen Säuren in Würze und Bier. (Wochenschr. f. Brauerei 1914, **31**, 225—228, 235—237, 252—255, 275—282, 295—296, 303—308 und 311—316.) — Die Extraktion von Würze und Bier mittels des umgeänderten Perforators nach Partheil-Rose ist durchführbar, und somit ist die Zerlegung der darin vorhandenen Säuren in freie und gebundene möglich. In der Würze ist die Menge freier organischer Säuren so gering, daß sie nicht genau bestimmt werden kann, während gebundene organische Säuren in beträchtlicher Menge vorhanden sind. Im halbfertigen (schlauchreifen) Bier sowie im fertigen Bier sind erhebliche Mengen freier wie gebundener organischer Säuren vorhanden. Die Summe beider übersteigt die in der Würze vorhandenen Gesamtsäuren; es liegt also auch hier wie bei der Weingärung eine Neubildung organischer Säuren vor. Die Zusammensetzung einer Würze bezüglich der anorganischen Salze ist für die säurebildende Tätigkeit einer Hefe ein sehr wichtiger Faktor. Je reicher eine Würze infolge eines hohen Carbonatgehaltes eines Maischwassers an basischen Stoffen ist, desto stärker ist das Bestreben der Hefe, organische Säuren zu bilden. Ist dagegen die Kohlensäure durch Schwefelsäure ersetzt, so ist die endgültige Säurezunahme bei der Gärung geringer. Das Gesagte gilt in verstärktem Maße für die freien Säuren, deren Gehalt für den Geschmack eines Bieres ohne Frage mitbestimmend ist, und gilt auch insbesondere für die Milchsäure, in ihrer Gesamtheit sowohl als auch für die freie. Alle diese Tatsachen lassen sich in den Satz von Windisch zusammenfassen: Eine Hefe sucht sich in einem gegebenen Medium die ihr günstigste Säuremenge, „ihr Säuremilieu“, zu schaffen, das für jede Heferasse eine bestimmte Größe zu sein scheint. Die Titration mit Natronlauge gegen Lackmus gibt trotz ihrer Ungenauigkeit noch das beste Bild von der Acidität der Würze und des Bieres. Die Alkalität gegen Methylorange wird keineswegs ausschließlic, sondern, wenn überhaupt, nur zum weitaus geringsten Teil durch sekundäre Phosphate, in der Hauptsache jedoch durch die Salze der organischen Säuren bewirkt. Von den flüchtigen Säuren findet sich der Hauptanteil unter den freien, von den fixen Säuren der Hauptanteil unter den gebundenen Säuren. Die Milchsäure ist zu etwa einem Drittel ihrer Gesamtmenge unter den freien und zu etwa einem Drittel unter den gebundenen Säuren. Sie ist mit Hilfe der Vakuum-dampfdestillation als freie Säure quantitativ leicht zu bestimmen. *W. Sutthoff.*

O. Fürnrohr: Über Änderungen in der Konstitution des Eiweißes im Biere bei Anwendung von Wärme und Kälte. (Zeitschr. ges. Brauwes. 1913, **36**, 429—431 u. 438—439.) — Sowohl durch Anwendung von Wärme beim fertigen Bier (beim Pasteurisieren) wie auch bei der Einwirkung von Kälte erfolgt eine teilweise Denaturierung von Eiweißstoffen, also ein Unlöslichwerden und Ausscheiden von löslichem Eiweiß. Verf. hat die Denaturierung nachgewiesen einerseits durch den Rückgang des Säuregrades, andererseits durch die Bestimmung des beim Kochen bzw. teilweisen Aussalzen mit Zinksulfat und Fällen mit Phosphorwolframsäure sich ausscheidenden Eiweißes. Er hat ferner gefunden, daß durch gewisse Maßnahmen, wie Unterkühlung vor der Pasteurisation, durch „Eiweißverdünnungsmittel“, durch peptische, hochmolekulare Eiweiß abbauende Enzyme, durch gut gelöstes Malz, verbunden mit geeigneten Maischtemperaturen bei kurzem Sudverfahren, auf die für die Pasteurisation geeignete Zusammensetzung der Eiweißstoffe im fertigen Biere eingewirkt werden kann. Enzymatische Einflüsse bei etwaigen Eiweißveränderungen sind bei der Pasteurisation im fertigen Biere nicht vorhanden. Diese bewegen sich auf chemisch-physikalischer Basis (Einwirkung von Kälte, Wärme, Druck, Salzen). *A. Scholl.*

H. T. Brown: Studien über Hefe. (Wochenschr. f. Brauerei 1914, **31**, 272—275, 287—292 und 297—300.) — I. Die Beziehung zwischen der Zellvermehrung und der Zufuhr von freiem Sauerstoff. Während der Periode des aktiven Hefenwachstums in passender Nährlösung bei Beschränkung des Sauerstoffs auf die ursprünglich in der Flüssigkeit vorhandene Menge ist die Zahl der in einem gegebenen Augenblick vorhandenen Zellen direkt proportional der Zeit. Die Kurve aus der Zeit und der Anzahl der Zellen in der Volumeneinheit ist bis zum Punkt der höchsten Zellvermehrung ausgesprochen gradlinig. Die Ursache des Abweichens vom logarithmischen Verhältnis ist nicht etwa in einer räumlichen Behinderung der Zellen bei der Nahrungsaufnahme zu suchen. Wenn die Sauerstoffzufuhr sich auf den durch die vollkommene Lüftung der Flüssigkeit zu Beginn der Versuches gebotenen Sauerstoff beschränkt, wird ein Einfluß des Alkoholgehaltes auf die Zellvermehrung erkennbar, wenn er etwa 2,5 % erreicht; etwa 8 % heben die Zellenbildung unter diesen Bedingungen gänzlich auf. Wenn für Nahrung und Luft genügend gesorgt wird, wird der Alkoholgehalt oberster Faktor der Zellenneubildung. Die experimentellen Ergebnisse aus Versuchen des Verf. mit überschüssig vorhandenen mineralischen und organischen Nährsubstanzen betreffs des Einflusses des Sauerstoffs auf die Hefenvermehrung lassen sich, wie folgt, zusammenfassen: 1. Bei der Beschränkung des verfügbaren Sauerstoffs auf den zu Beginn in der Nährflüssigkeit vorhandenen strebt die Anzahl der Hefezellen in der Volumeneinheit einem Maximum zu, das ganz oder annähernd unabhängig ist von der Anzahl der Aussaathefezellen, in erster Linie aber abhängig ist von der Menge des zu Beginn gelösten Sauerstoffs. 2. Innerhalb gewisser Grenzen der Sauerstoffversorgung — bei Aussaat von einer Zelle auf die Volumeneinheit von $\frac{1}{4000}$ cmm liegt die Grenze bei etwa 60—65 % der Sauerstoffsättigung — ist die Höchstvermehrung genau proportional der Anfangsmenge dieses Sauerstoffs. Die Vermehrungsgeschwindigkeit ist unter diesen Umständen keine logarithmische, sondern eine lineare Funktion der Zeit. 4. Der gelöste Sauerstoff bleibt während der Vermehrungsperiode nicht als solcher in der Flüssigkeit, sondern wird schnell von der Aussaathefe am Beginn der Sprossung absorbiert. Da dementsprechend die Aussaathefe schon einen gewissen Teil Sauerstoff selbst in sauerstofffreie Nährlösungen mitbringt, erklärt sich hieraus die Beobachtung, daß in solchen Lösungen stets eine gewisse Vermehrung eintritt. II. Der Metabolismus der Hefenzelle mit besonderem Bezug auf die Wärmeerscheinungen bei der Gärung. Nach Versuchen des Verf.'s liefert 1 g Maltose 125 Kalorien Vergärungswärme. Zwischen 14 und 16° braucht die Hefe zur Vergärung ihrer eigenen Gewichtsmenge an Zucker etwa $8\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$ Stunden, und die während einer Stunde entwickelte Wärme genügt zur Steigerung der Temperatur der Zelle von 15 auf 16°. Die Geschwindigkeit der Gärung und damit die in der Zeiteinheit von der Hefe freigemachte Wärmemenge steigt mit der Temperatur erheblich an. Die bei der Temperatur des menschlichen Körpers durch den Stoffwechsel der Hefe entwickelte Wärme ist im Verhältnis zum Organismus etwa siebenmal so groß als beim ruhenden Menschen. Die physiologische Bedeutung dieser riesigen Energieentwicklung, die zu den Vermehrungs- und Ernährungsbedürfnissen der Hefe in gar keinem Verhältnis zu stehen scheint, glaubt Verf. nur aus der Betrachtung der natürlichen Lebensbedingungen der Hefe am reifen Obst in einem Medium hoher spezifischer Wärme und unter Bedingungen, unter denen ein rascher Temperatúrausgleich mit der Umgebung möglich ist, erklären zu können. Hier dient die untergeordnete Gärtätigkeit der Hefe zur Unterstützung der Wärmeentwicklung durch den Atmungsprozeß bei der Vermehrung, während im Gärbottich die Vermehrungsfähigkeit der Hefe im Zaume gehalten und ihr Gärvermögen dienstbar gemacht wird. In einem Falle, wo das Verhältnis von vergorenem Zucker zur gebildeten Hefetrockensubstanz den hohen Wert von 1 : 0,23 zeigte, betrug die entwickelte Wärme pro Gramm vergorenem Zucker nur 114,4 Kolorien, an Stelle des normalen Wertes von 125.

W. Sutthoff.

P. Lindner und C. W. Naumann: Zur Frage der Assimilation des Luftstickstoffs durch Hefen und Pilze. (Wochenschr. f. Brauerei 1913, **30**, 589—592.) — Nach 17-tägigem Wachstum in einer Nährlösung mit 5% Dextrose, 0,025% MgSO_4 , 0,5% KH_2PO_4 und annähernd 0,025 g Asparagin und nachdem täglich eine Stunde lang mit einem von Ammoniak und etwaigen Stickoxydverbindungen befreiten Luftstrom gelüftet worden war, konnte bei den üppig gewachsenen Pilzen *Endoblast. salmicolor*, *Saccharomyces farinosus* und *Oidium lactis* eine Luftstickstoffassimilation nicht nachgewiesen werden.

W. Sutthoff.

H. Pringsheim: Zur Totalhydrolyse des Hefeneiweiß. (Wochenschr. f. Brauerei 1913, **30**, 399—400.) — Durch Anwendung der Fischer'schen Methode der Destillation der veresterten Aminosäure zum Zwecke ihrer Trennung konnte Verf. feststellen, daß im Hefeneiweiß Glykokoll und Alanin nicht vorhanden sind; in relativ geringen Mengen wurden Prolin und Phenylalanin, desgleichen Glutaminsäure aufgefunden; die Anwesenheit von Serin konnte nur wahrscheinlich gemacht werden, dagegen sind Valin und Leucin in überwiegender Menge vorhanden. So erklärt sich das Auftreten von Fuselöl selbst bei der Vergärung reiner Zuckerlösungen, da nach den Untersuchungen F. Ehrlich's das Leucin die Ursprungssubstanz des Amylalkohols ist. Der Nachweis der Glutaminsäure steht im Einklang mit der Annahme Ehrlich's, daß diese die Ursprungssubstanz der Bernsteinsäure ist. Ferner kann das in den Schlemphen stets vorhandene Tyrosol dem Tyrosin des Hefeneiweißes sein Vorkommen verdanken. Dagegen konnte α -Aminobuttersäure als etwaige Ursprungssubstanz des n-Propylalkohols noch nie mit Sicherheit, auch vom Verf. nicht in Hefe, in Eiweißstoffen erkannt werden.

W. Sutthoff.

F. Ehrlich: Über die Hydrolyse des Hefeneiweißes. (Wochenschr. f. Brauerei 1913, **30**, 424.) — Verf. weist in bezug auf obigen Aufsatz von H. Pringsheim darauf hin, daß er mit A. Wendel bereits im Jahre 1908 die Fischer'sche Estermethode zur Zerlegung des Aminosäuregemisches im Hefeneiweiß mit Erfolg benutzt und die Ergebnisse seiner Untersuchungen in der Biochem. Zeitschr. 1908, **8**, 410—411 und 431—437 — referiert in Wochenschr. f. Brauerei 1908, **25**, 238 — veröffentlicht habe. Von ihm waren mittels dieses Verfahrens Leucin, Isoleucin und Valin als Hauptbestandteile des Hefeneiweißes festgestellt und rein dargestellt worden. Dabei wurde in der Leucinfraction bereits Prolin nachgewiesen, während die anderen Aminosäuren nicht näher untersucht wurde.

W. Sutthoff.

Lichtenstein-Rosenblatt: Über die Differenzierung verschiedener Hefearten mit Hilfe spezifischer Agglutinine. (Wochenschr. f. Brauerei 1914, **31**, 293—295.) — Kaninchen, denen intravenös Hefereinkulturen injiziert wurden, liefern Blutsera, die mit Hilfe der Agglutinationsmethode nicht nur verschiedene *Saccharomyces*-arten (obergärige und untergärige) unterscheiden lassen, sondern auch gestatten, *Torulaceen* von den *Saccharomyces*-arten einwandfrei zu differenzieren. Da diese Untersuchungen verhältnismäßig viel Zeit, außerdem spezielle Einrichtungen sowie gewisse Fertigkeit voraussetzen, wird die Anwendung dieses Verfahrens sich wohl auch in Zukunft in erster Linie nur auf rein wissenschaftliche Untersuchungen beschränken.

W. Sutthoff.

F. Schönfeld und E. Künzel: Die Glykogenbestimmung in der Hefe. (Wochenschr. f. Brauerei 1914, **31**, 9—12.) — Der wirkliche Gehalt einer Bottichhefe an Glykogen kann nur gefunden werden, wenn die Bestimmung mit der kurz gewässerten und schnell gepreßten Hefe vorgenommen wird, da sonst die Hefezellen, selbst bei schneller Trocknung, das Glykogen durch Spaltung und Vergärung vermindern. Die Glykogenbildung in der Hefe ist nicht allein vom Gehalt an Zucker und von anderen Momenten der Gärbehandlung abhängig, sondern vor allem, wie die

Untersuchungen der Verff. zeigen, von der Rasse der Hefe und deren Flockungsgrad im Bier. Eine bruchschwache Rasse niederer Vergärung häufte viel Glykogen an, hochvergärende Rassen speicherten weniger. Es bestätigte sich auch wieder, daß einem höheren Glykogengehalt ein niedrigerer Eiweißgehalt der Hefe entspricht und umgekehrt.

W. Sutthoff.

F. Schönfeld und G. Schönfelder: Die Mineralbestandteile der Hefe und ihre Bedeutung für den Lebenszustand derselben. (Wochenschr. f. Brauerei 1914, **31**, 245—247.) — Die Eigenart einer Hefe ist das Produkt der Bedingungen, unter denen sie gewachsen ist, besonders der Art ihrer Ernährung. Die angenommenen Eigenschaften haften bald fester, bald verändern sie sich mehr oder minder schnell. Entwicklungsstätten von Bruchhefen sind besonders die Brauereien, welche Carbonatwasser verwenden; Staubhefe bildet sich besonders in Betrieben mit Wasser von hohem Gipsgehalt. Gewisse typische Rassenmerkmale erweisen sich bei den Bruchhefen im allgemeinen so gefestigt, daß immer wieder die kennzeichnende Eigenart der betreffenden Hefe in ihrer chemischen Zusammensetzung zu finden ist. Fortlaufende, aber in verschiedenen Zeitperioden und unter Benutzung von Malzen verschiedener Herkunft und Jahrgänge ausgeführte Untersuchungen haben immer wieder höheren Aschegehalt mit höherem Phosphorsäure-, Kali- und auch Magnesiumgehalt als Kennzeichen der Hefe mit starker Neigung zur Bruchform gegenüber der Staubhefe erwiesen. Gegen Kalkaufnahme verhalten sich die Bruchhefen stark ablehnend, während die Staubhefen Kalk speichern. Bei den ersteren ist der mit Wasser beim Kochen in Lösung gehende Anteil der Phosphate größer als bei den Staubhefen. Bei Verwendung von Carbonatwässern nehmen Bruchhefen wenig Schwefelsäure, Staubhefen dagegen neben viel Kalk auch viel Schwefelsäure auf. Der Gehalt an Kieselsäure und an Chlor schwankt jedenfalls unter dem Einfluß der Zusammensetzung der Würze in engeren Grenzen.

W. Sutthoff.

W. Windisch und J. Klein: Über die Benutzung von *Bacillus Delbruecki* zur Säuerung von Brauereimaichen, sowie über den Einfluß der Säuerung auf die Zusammensetzung der Würze. (Wochenschr. f. Brauerei 1913, **30**, 501—504.) — Als Mittel zur Erhöhung und Regulierung der Acidität der Würzen kann *Bac. Delbruecki* dienen, der kräftig Milchsäure bildet und bei 45—50° alle übrigen Pilze unterdrückt. In neutraler Kultur (Zusatz von steriler Schlemmkreide) hält er sich bei niedriger Temperatur monatelang lebend. Bei der Optimaltemperatur von 45—50° angestellte Versuche ergaben während der ersten beiden Stunden nur Spuren von Säure; erst in der dritten Stunde trat eine wesentliche Säurezunahme ein, da der Säurebildung nach den Versuchen von M. Hayduck eine ziemlich lebhaft Vermehrung vorausgeht. Verzuckerungsschwierigkeiten bei vorausgegangener Säuerung sind bei dem praktisch ausreichenden Gehalt von etwa 0,12 % Säure und mehr so gut wie ausgeschlossen; erst bei Säuregehalten, die praktisch nicht in Frage kommen, ist die Verzuckerung unvollständig. Die Ausbeute an Extrakt steigt durch die Säuerung der unverzuckerten Maische, solange überhaupt noch eine Verzuckerung eintritt. Säuerung nach der Verzuckerung gab nur eine geringe Erhöhung der Extraktausbeute. Daß sich bei den vor der Verzuckerung gesäuerten Maichen mehr Stickstoff im Extrakt vorfindet, ist lediglich auf die Wirkung der Malzpeptase, die sich bei den Temperaturen bis 50° noch in ihrem kräftigsten Zustande befindet, zurückzuführen. Der Endvergärungsgrad wird bei größeren Säuremengen herabgesetzt; bei den praktisch in Frage kommenden Säuremengen ist ihr Einfluß gleich Null. *Bac. Delbruecki* läßt sich in kräftiger Verfassung, insbesondere nicht durch zu hohe Temperatur und zu hohen Säuregehalt geschwächt, sehr wohl im Brauereibetriebe verwenden; er säuert auch ungezuckerte Maichen auszeichnet, und die Säuremengen, die wir erzeugen wollen, hemmen keineswegs die Lösung und Verzuckerung des Malzes.

W. Sutthoff.

W. Windisch: Bierherstellungsversuche mit künstlicher Säuerung der Maische durch den *Bacillus Delbruecki*. (Wochenschr. f. Brauerei 1913, **30**, 521—524.) — Die Acidität ist von großer Bedeutung für den Verlauf der Bierherstellung und daher auch für den Charakter und Geschmack des Bieres. Insbesondere ist die Kälteempfindlichkeit des Bieres, d. i. Trübung in der Kälte verbunden mit rauhem, unedlem Geschmack, eine Folge ungenügender Acidität. In statthafter Weise kann ein Mangel an Säure durch Milchsäurebakterien aufgehoben werden, und zwar nicht durch spontane Säuerung bei etwa 45°, wobei oft unreiner Geruch auftritt, sondern durch den vorzüglich geeigneten *Bac. Delbruecki*, dessen Eigenschaften Verf. in Gemeinschaft mit J. Klein (vergl. vorst. Ref.) studiert hat. Verf. ermittelte durch Brauversuche, daß sich diese Säuerung, die schon im großen Anwendung findet, ohne große Änderungen der üblichen Arbeitsweise und der Einrichtungen in den Betrieb einführen läßt.

W. Sutthoff.

R. Seibriger: Über die Löslichkeit der Inhaltsstoffe des Hopfens. (Wochenschr. f. Brauerei 1913, **30**, 530.) — Reine β -Bittersäure geht bei monatelangem Stehen im verschlossenen Gefäß in ein Produkt über, das in Petroläther unlöslich, in Tetrachlorkohlenstoff fast vollkommen löslich ist; es schmeckt, in sehr verdünntem Alkohol gelöst, bitter, ist also brautechnisch nicht wertlos. Neben dem Umstande, daß im Tetrachlorkohlenstoff eine chemisch einheitliche, nicht feuergefährliche Substanz vorliegt, kommt diesem als Kaltextraktionsmittel auch die Eigenschaft zugute, daß er die bitteren Umwandlungsprodukte der β -Säure, vermutlich auch der α -Säure, im Gegensatz zu Petroläther aufzulösen vermag.

W. Sutthoff.

R. Seibriger: Analysengang der Bitterstoffbestimmung durch Kaltextraktion mit Tetrachlorkohlenstoff. (Wochenschr. f. Brauerei 1913, **30**, 610.) — Von dem von etwa vorhandenen Steinchen, nicht aber von Hopfengestengeln befreiten Durchschnittsmuster werden 40 g in einer Messermühle zerkleinert. In den ersten, noch nicht durch die Reibung erwärmten Anteilen wird die Wasserbestimmung durch Trocknen von 3 g bei 105° C während drei Stunden ausgeführt. In dem Rest wird die Bitterstoffbestimmung und eine Hilfswasserbestimmung ausgeführt. Für die erstere werden 10 g des Feinmehles in einem mittels Korkstopfens zu schließenden Glaszylinder mit etwa 2 cm lichtigem, kurzem Halse, 400—450 ccm Volumen und etwa 25 cm Gesamthöhe mit bei 15° abgemessenen 250 ccm Tetrachlorkohlenstoff 2½ Stunden bei 15 Umdrehungen in der Minute ausgeschüttelt. Es wird durch ein Faltenfilter klar filtriert; 100 ccm des Filtrats werden mit 50 ccm neutralem Alkohol von 96% gemischt und mit 1/10 N.-Kalilauge unter Verwendung von Phenolphthalein auf rot titriert. Die Ausrechnung erfolgt nach den Angaben Lintner's.

W. Sutthoff.

E. Heimann: Der Einfluß der Carbonate im Brauwasser auf die Ausbeute. (Wochenschr. f. Brauerei 1913, **30**, 424—426.) — Calcium- und Magnesiumbicarbonat zeigen untereinander und gegenüber destilliertem Wasser keinen merklich verschiedenen Einfluß auf den Extraktlösungsvorgang. Magnesiumbicarbonat verschlechtert das Abläutern. Gipszusatz macht sich bei Maischtemperaturen bis zu 70° nur durch absolute Ausbeuteerhöhung bemerkbar, beeinflußt aber den Extraktlösungsprozeß bei den verschiedenen Wässern gleichmäßig; er verbessert das Abläutern bei Magnesiawässern erheblich stärker als bei den anderen.

W. Sutthoff.

W. Windisch: Über die Bedeutung der Salze des Brauwassers und die Notwendigkeit ihrer exakten Bestimmung und Berechnung. (Wochenschr. f. Brauerei 1914, **31**, 57—60.) — Die Brauwasserfrage charakterisiert sich als Aciditätsfrage. Die Salze des Brauwassers sind teils chemisch unwirksame, dazu gehören alle Alkalisalze außer den Carbonaten, teils chemisch wirksame, die

sich in aciditätserniedrigende, nämlich alle Carbonate sowie die zumeist nur in geringer Menge vorhandenen Alkalisilicate, und in aciditätserhöhende Salze, das sind die Sulfate, Chloride und Nitrate der alkalischen Erden, teilen. Die am schädlichsten wirkende Soda kommt weniger häufig vor; kohlensaure Magnesia gibt der Soda an Schädlichkeit wenig nach; relativ am geringsten ist die nachteilige Wirkung des kohlensauren Kalkes. Bei Beurteilung eines Brauwassers kommt es daher auf die richtige Erkennung der im Wasser gelösten Salze an — als solche glaubt Verf. die gelösten Bestandteile des Wassers vorhanden —. Die seitherige Berechnung der Wassersalze, bei der die gesamte Magnesia an Kohlensäure der Rest dieser an Kalk, der Kalkrest an Schwefelsäure und der Schwefelsäurerest sowie das Chlor an Natrium, das aber nicht bestimmt wurde, gebunden gerechnet wurde, führte dazu, daß schwefelsaure Magnesia fast nie zum Vorschein kam, und ferner bei Wässern mit größerem Magnesiagehalte in vielen Fällen zu der Annahme größerer Mengen Magnesiumcarbonat neben sehr geringen Mengen Calciumcarbonat; gelegentlich war letzteres scheinbar sogar überhaupt nicht vorhanden. Dagegen sprach der Entcarbonisierungseffekt beim Kochen solchen Wassers dem Verf., der in der Lösung Salze, nicht Ionen annimmt, für das Vorhandensein überwiegender Mengen von kohlensaurem Kalk. Er tritt daher an eine Neubearbeitung der Bestimmung und Berechnung der Wassersalze heran (vergl. nachstehendes Referat).

W. Sutthoff.

W. Windisch: Beiträge zur Brauwasserfrage. III. Über eine neue Methode zur Bestimmung der Salze im Wasser von **W. Windisch, K. ten Doornkaat-Koolman** und **H. Krumhaar**. (Wochenschr. f. Brauerei 1914, **31**, 65—67, 73—75, 85—87 und 93—96.) — Die Unhaltbarkeit der alten Berechnungsweise der Wassersalze erhellt noch besonders aus einem Beispiel, bei dem das ursprüngliche Wasser nach dieser Berechnung schwefelsaure Magnesia nicht enthielt, nach fast völliger Entfernung der Carbonate durch Kalk sich jedoch ein nicht unerheblicher Gehalt an schwefelsaurer Magnesia berechnete. Verff. bringen die Berechnung der Wassersalze auch bei den magnesiareicheren Wässern, denn bei diesen treten solche Unstimmigkeiten auf, mit dem Entcarbonisierungseffekt dadurch in Einklang, daß sie außer der Elementarzusammensetzung der gelösten Bestandteile den auf freie und gebundene entfallenden Teil der Kohlensäure und außerdem den zur Erreichung des kritischen Punktes der „Kalkkonstanz im Filtrat“ erforderlichen Kalkwasserzusatz ermitteln. Letzterer liegt in dem Gebiet des Kalkwasserzusatzes, wo die freie Kohlensäure und das Calciumbicarbonat bereits ausgeschieden sind, das Magnesiumbicarbonat der Umsetzung unterliegt und andere Magnesiumsalze noch nicht umgesetzt werden. Der Carbonatkalk ist dann gleich dem Gesamtkalk des Wassers, vermindert um den Kalk des Filtrates und vermehrt um 0,8 g pro hl, entsprechend der Löslichkeit des kohlensauren Kalkes. Der Rest der Carbonatkohlensäure wird dann an Magnesia gerechnet. So gelangt man bei magnesiareicheren Wässern betreffs der Erdalkalicarbonate zu ganz anderen Ergebnissen als bei der alten Methode. Betreffs der Gruppierung der sonstigen Bestandteile der Wassersalze gibt dieses Verfahren noch keinen Aufschluß. (Die Ionentheorie verneint die Möglichkeit der Berechnung der Wassersalze. Verff. bestätigen das völlig gleiche Verhalten aus Salzen verschiedener Ionengruppierung elementargleich hergestellter Wässer. Die praktisch nutzbare Berechnungsweise der Verff. ist den Folgeerscheinungen der durch Wärme oder Kalkzusatz hervorgerufenen Gleichgewichtsverschiebungen angepaßt. Ref.)

W. Sutthoff.

W. Windisch und **H. Krumhaar:** Beiträge zur Brauwasserfrage. V. Über die Vorgänge bei der Entcarbonisierung des Wassers beim Erwärmen und Kochen nebst praktischer Nutzenanwendungen. (Wochenschr. f. Brauerei 1914, **31**, 209—219.) — Bei der Entcarbonisierung eines Wassers ohne chemische Zusätze kommt es darauf an, eine Temperatur zu erreichen, die über der

Zersetzungstemperatur des Calciumbicarbonats (75°) liegt, und die frei gewordene Kohlensäure schnell zu entfernen. Letzteres geschieht durch Kochen im kleinen Laboratoriumsbetrieb leichter als bei der Behandlung großer Wassermengen unter praktischen Verhältnissen. Große Vorteile bietet die Entcarbonisierung unter reichlichem Durchleiten von Druckluft in kleinen Bläschen, wobei die Siedetemperatur nicht erreicht zu sein braucht. Die nach dem Verfahren von Windisch berechnete Menge kohlensaure Magnesia des Wassers fällt unter Umständen schon bei der Luftbehandlung bei 80° zum Teil aus, was Verff. einerseits auf mechanisches Mitgerissenwerden durch den ausfallenden kohlensauen Kalk, zum Teil auch auf die chemische Umsetzung mit Gips zurückführen, wobei sich eine Massenwirkung zeigt, insofern ein größerer Überschuß an Gips günstigere Umsetzungsbedingungen schafft.

W. Sutthoff.

O. Fűrnrroh: Zur Schaumhaltigkeit der Biere. (Zeitschr. ges. Brauwes. 1913, 36, 473—475 u. 481—488.) — Die Schaumhaltigkeit des Bieres hängt ab von der Menge und Art der in ihm enthaltenen Eiweißstoffe. Die Eiweißstoffe des Malzes unterliegen beim Einmaischen einem Eingriff der Enzyme, wobei zunächst die dem eigentlichen Eiweiß noch recht nahe stehenden primären Albumosen, dann die Deuteroalbumosen und Peptone, schließlich weiter abgebaute Produkte, Aminosäuren usw., entstehen. Verf. hat dieselben getrennt bestimmt durch Aussalzen mit Kupfersulfat bezw. Zinksulfat oder Fällung mit Phosphorwolframsäure. Er versetzte je 50 ccm Bier oder Würze nach dem Ansäuern mit 1 Tropfen konc. Schwefelsäure mit 15 g kryst. Kupfersulfat bezw. 55 g kryst. Zinksulfat oder mit 10 ccm konc. Phosphorwolframsäurelösung. Die Abscheidungen filtrierte er nach 24 Stunden ab und bestimmte in ihnen den Stickstoff. Ein Teil dieser Eiweißabbauzeugnisse wird schon durch die Filtration des Bieres entfernt, das filtrierte Bier ist daher weniger schaumhaltend als das unfiltrierte. Die im Bier befindlichen Eiweißstoffe halten als Kolloide auch gewisse Hopfenbestandteile in Lösung. Im Schaum eines Bieres, der eiweißreicher ist als das Bier selbst, sind daher Hopfenbestandteile in vermehrter Menge vorhanden. Die Art der Hopfenzugabe spielt ebenfalls eine Rolle, sie drückt sich in der Albumosenmenge des Bieres aus; die letztere ist bei der gewöhnlichen Hopfenkochung größer als bei Anwendung eines Hopfenauslaugungsverfahrens, das bei letzterem gewonnene Bier daher weniger schaumhaltend. — Von großem Einfluß auf den Albumosengehalt des Bieres ist das Maischverfahren. Beim Hochkurzmaischie sind die Eiweißstoffe stärker abgebaut als beim Dreimaischenbier, daher ist bei ersterem auch das Kohlensäurebindungsvermögen und die Schaumhaltigkeit geringer als bei dem letzteren. Der Grund hierfür ist, daß die Wirkung der eiweißspaltenden Enzyme bei der Einmaischtemperatur des Hochkurzmaischieverfahrens, nämlich $62,5^{\circ}\text{C}$, voll zur Entfaltung kommen kann, namentlich wenn das verwendete Malz gut gelöst und von Haus aus reich an eiweißabbauenden peptischen Enzymen war. Die Maischung soll aber in erster Linie die Tätigkeit der diastatischen Enzyme zur Entfaltung bringen. Man kann daher, um eine größere Schaumhaltigkeit zu erzielen, die Wirkung der Peptase einschränken entweder durch Erniedrigung der Einmaischtemperatur oder durch Verkürzung der Einmaischzeit. Die Wirkung der Temperatur auf die Diastase und Peptase ist gänzlich verschieden. Während die Peptase bei $12,5^{\circ}\text{C}$ gar keine Einwirkung ausübt, also keinen Eiweißabbau verursacht, steigt ihre Wirksamkeit mit zunehmender Temperatur: die peptische Kraft (d. h. die Menge des abgebauten Eiweißes in Prozent des vorhandenen) beträgt bei 35°C 10,5, bei $52,5^{\circ}\text{C}$ 28,9 und bei $62,5^{\circ}\text{C}$ 57,4. Im Gegensatz dazu ist die diastatische Kraft am größten bei niedrigen Temperaturen, sie beträgt bei $12,5^{\circ}\text{C}$ 100, bei 35°C 69,7, bei $52,5^{\circ}\text{C}$ 59,7 und bei $62,5^{\circ}\text{C}$ 17,4. Niedrige Maischtemperatur begünstigt daher die Wirksamkeit der Diastase, also die Verzuckerung und demgemäß die Extraktausbeute, hohe Maischtemperatur dagegen begünstigt die Wirkung der Peptase. Durch geeignete Auswahl der

Maischtemperaturen hat man es daher in der Hand, die Zusammensetzung des Bieres namentlich auch seinen Gehalt an schaumhaltenden Eiweißstoffen, zu beeinflussen. Da bei dem Dreimaishverfahren bei 35° C eingemaischt wird, so enthält das dabei erzeugte Bier größere Mengen von schaumhaltenden Eiweißstoffen als das Hochkurzmaishbier. Mit der Wirksamkeit der Peptase steigt auch der Säuregehalt des Bieres
A. Scholl.

F. Schönfeld: Eisenbier. (Wochenschr. f. Brauerei 1914, **31**, 321—322.)
— Zusatz löslicher Eisenverbindungen zum Bier führt leicht zu Ausscheidungen, wobei das Bier eine Abnahme in seinem Phosphorsäuregehalt erleidet, die mit steigendem Eisenzusatz wächst. Zu den Eisenverbindungen, deren Beständigkeit im Bier verhältnismäßig am größten ist, gehört das Ferrum lacticum, doch ist die geschmackliche Beeinflussung eine ziemlich erhebliche. Um bei der Herstellung von Eisenbier zweckmäßig zu verfahren, muß man sich des alkalisch reagierenden Eisenzuckers des Handels bedienen, da von diesem ein ganz erheblicher Teil in Form des ursprünglichen Präparates in Lösung bleibt. Helle Biere sind zur Herstellung von Eisenbier absolut ungeeignet; am besten geeignet sind die mit Zucker versetzten dunklen Süßbiere, welche einerseits den Eisengeschmack bis zu einem erheblichen Grade verdecken, andererseits infolge des niedrigen Phosphorsäure- und Gerbsäuregehaltes weniger zu Umsetzungen Anlaß geben.
W. Sutthoff.

A. J. Brown und F. P. Morley: Über den Einfluß der Temperatur auf die Wasseraufnahme durch die Gerste mit besonderem Bezug auf den Temperaturkoeffizienten der chemischen Reaktion. (Wochenschr. Brauerei 1913, **30**, 243—246.)

A. Stange: Beiträge zur Stickstofffrage im Brauereibetrieb. (Zeitschr. ges. Brauwesen 1913, **36**, 6—7 u. 17—20.)

F. Ehrlich: Die Gärung des Eiweißes. (Wochenschr. Brauerei 1912, **30**, 561—562.)

W. Windisch: Kochende Gärung. (Wochenschr. Brauerei 1913, **30**, 15—17.)

F. Harder: Ein einfaches und sicheres Mittel zur Erhöhung der Haltbarkeit unserer Biere. (Wochenschr. Brauerei 1913, **30**, 316—318.)

Santmann: Zum Nachweis der Biersarcina. (Brau- u. Malzindustrie **13**, No. 11: Wochenschr. Brauerei 1913, **30**, 259—260.)

P. Lindner: Eigenartige Lebensgemeinschaften in alten Bierfilzen. (Wochenschr. Brauerei 1913, **30**, 537—538.)

Th. Langer: Wodurch entstehen jahrüber Schwankungen in der Qualität der Biere? (Zeitschr. ges. Brauwes. 1913, **36**, 189—190.)

H. Vogel: Wie soll man ein Bier auf seinen Geschmack kritisch prüfen? (Zeitschr. ges. Brauwes. 1913, **36**, 47—51.)

K. Braun: Alkoholische Getränke der Neger in Deutsch-Ostafrika. (Der Pflanzler 1912, **4**, 219; Wochenschr. Brauerei 1912, **29**, 539—540.)

Spirituosen und Essig.

Th. v. Fellenberg: Bestimmung und Nachweis von Methylalkohol. (Mitt. Lebensm. Unters. u. Hyg. Schweizer Gesundh. 1913, **4**, 122—146.)
— Das vom Verf. angegebene Verfahren zur Bestimmung des Methylalkohols beruht auf der verschiedenen Löslichkeit des Methyl- und des Äthylalkohols. Wird Alkohol auf einen bestimmten Prozentgehalt verdünnt und mit dem gleichen Volumen Äther geschüttelt, so ist die Höhe der wässerig-alkoholischen Schicht bei Methylalkohol eine andere als bei Äthylalkohol. Auf die Bestimmung dieser Schichthöhendifferenz hat Verf. seine Methode begründet. Er stellt den Alkohol auf 40% ein und nimmt die Bestimmung vor in einem besonders konstruierten Gefäß. Viele Branntweine enthalten störende Körper, wie Acetale, Aldehyde, Ester usw., welche durch ein besonderes Reinigungsverfahren mit alkalischer Silbernitratlösung beseitigt werden müssen. Reine