ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o 1399.

Ueber *Donati's* Cometen. Von Herrn *J. F. Julius Schmidt*, Director der Sternwarte zu Athen.

Während ich vor vier Jahren zu Wien meine dort angestellten Beobachtungen des Cometen bearbeitete und zum Druck vorbereitete, finde ich gegenwärtig an demselben Orte eine Veranlassung, nochmals auf diesen Gegenstand zurückzukommen. *Bond's* grosse und ausgezeichnete Untersuchung (*Annals of the astronomical Observatory of Harvard College*, Vol. III. Cambridge U. S. 1862), welche ich jüngst auf der Kaiserl. Sternw. kennen lernte, behandelt mit fast erschöpfender Sorgfalt sämmtliche Phänomene, welche der Comet dargeboten hat, und unter diesen namentlich auch die Lichtbögen oder Sektoren der Ausströmung. In der Zusammenstellung aller ihm bekannten Beobachtungen gelangt *Bond* dann seit pag. 335 zu jenen Schlussfolgerungen, die mich nöthigten, diese schwierigen Verhältnisse wiederum zu beleuchten. Gestützt auf eigene Beobachtungen, welche der Zahl nach allen übrigen beträchtlich überlegen sind, gelangte ich zu Resultaten, welche mit denen *Bond's* gänzlich unvereinbar erscheinen. Bevor ich aber von diesen Ergebnissen rede, ist es nöthig, im Allgemeinen die Zahl und den Werth der vorhandenen Beobachtungen zu überblicken, um erst dann auf Grund einer kritischen Richtung, die neue Untersuchung zu beginnen. Fragen wir zunächst nach dem zugänglichen Hülfsmateriale, welches in Betreff der Strömungsphänomene des Cometen brauchbar erscheint, so führt uns das Werk von *Bond* am Leichtesten zum Ziele. Wir finden p. XVII. die List of Authorities for observations etc. und darin gegen 70 Observatorien mit fast 90 Beobachtern. Alle haben die Sektoren am Kerne gesehen; viele haben sie gemessen, gezeichnet oder beschrieben. Der Einfluss ungünstiger Witterung und der meist beschränkten Beobachtungszeit ist überall erkennbar, und man bemerkt, dass die Mannigfaltigkeit der Phänomene dieses Cometen nicht wenig dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit zu theilen, und Einzelheiten übersehen zu lassen, die einer sehr strengen Prüfung werth gewesen wären. Dahin rechne ich vor allem Andern die meist übersehene Thatsache, dass die Vergrößerung der Sektoren sehr rasch von Statten ging, und dass diese Zunahme der Dimensionen mehrfach in Zeit von 30 bis 60 Minuten ohne alle Messung, nur nach dem blossen Anblicke am Fernrohre, constatirt werden konnte, ebenso wie man dasselbe an dem grossen Cometen von 1861 kennen gelernt hat.

59r Bd.

Für meinen diesmaligen Zweck betrachte ich nur die Beobachtungen von 1858 Sept. 29 bis Octob. 16. Aus dieser Zeit haben wir Micrometermessungen der Sektoren von *Mädler*, *Winnecke*, *O. Struve*, *Bruhns*, *Fearnley*, *Secchi*, *Chacornac*, *Bond*, *Lassel*, *Main*, *Challis*, *Hoek* und *Donati*. Alsdann von mir zu Wien Beobachtungen der Passagen der Sektoren; ferner Schätzungen von *Pape* zu Altona u. v. A. Handelt es sich darum, die Raschheit der Bewegung der Cometenmaterie innerhalb der Sektoren zu erkennen, und deren Werth zu bestimmen, so ist selbstverständlich, dass die Beobachtungen eines und desselben Abends genügend zahlreich sein mussten, und dass für jede einzelne Messung, oder wenigstens für das Mittel verschiedener Gruppen, die genaue Zeitangabe nicht fehlen dürfe. Ein Blick auf das vorliegende Material giebt leider zu erkennen, dass diese beiden Hauptbedingungen nicht erfüllt sind, und dass die publicirten Messungen (sehr wenige ausgenommen), sich ungefähr auf der Stufe befinden, wie Cometenörter, welche nach Bogensecunden und deren Decimalen angeben, nicht aber die genaue Zeit der Beobachtung, oder diese Zeit nur in halben oder ganzen Stunden beiläufig ausgedrückt.

Demnach ist klar, dass im Falle einer Bestimmung der Geschwindigkeiten ausschliesslich und allein diejenigen Messungen in Betracht kommen, welche den gewöhnlichen astronomischen Anforderungen genügen.

Erforderlich ist also:

- 1) die wirkliche Messung der Radien, mit dem Micrometer oder durch Passagen,
- 2) die mehrfache Wiederholung derselben am nämlichen Abende,
- 3) die genaue Angabe der Beobachtungszeiten,
- 4) die Angabe, welcher Sector gemessen sei.

Beobachtungen, welche Mikrometermessungen (oder Passagen), nebst genauen Zeitbestimmungen geben, sind allein die folgenden:

1) <i>Mädler</i> zu Dorpat,	10	Nächte mit 20 Messungen
2) <i>Winnecke</i> zu Pulkowa,	7	" " 13 "
3) <i>Schmidt</i> zu Wien,	14	" " 173 " (jede aus 10 Passagen bestehend.)

Mikrometermessungen ohne scharfe Zeitangabe von *Bond*, *O. Struve*, *Bruhns* u. A. Diese Abtheilung ist am stärksten

vertreten, und den meisten Beobachtern standen die grössten Instrumente zu Gebote, wie in Cambridge, Pulkowa, etc. Ich selbst bediente mich eines nur 2-füssigen *Plössel'schen* Refractors mit geringer Vergrösserung. Die Natur der Wiener Messungen ist in meiner Abhandlung über *Donati's Cometen* erörtert.

Es reducirt sich also für unsern Zweck das anscheinend so grosse Material auf ein Minimum, indem ausser meinen Beobachtungen nur noch die von *Mädler* benutzt werden können, weil wenigstens diese 2 mal an einem Abende wiederholt wurden. *Winnecke's* nur einmalige Messungen sind indessen anderweitig zur Vergleichung nützlich. Indem *Bond* von der Auffassung einer sehr geringen Bewegung der Materie innerhalb der Sektoren ausging, lag es ihm nahe zu glauben, dass in *Mädler's* Messungen grosse Differenzen vorherrschen, und dass es mit meinen Angaben, so weit ihm diese im Mai 1861 brieflich vorlagen, ähnlich sich verhalten möge.

Indem es sich nun im vorliegenden Falle um eins der wichtigsten Phänomene handelt, und um das Erkennen von Grundeigenschaften in der Natur der Cometen, die unmittelbar im Kerne ihren Sitz haben, glaubte ich den Versuch wagen zu dürfen, meine Ansicht über die Bewegung der Lichtmaterie, gegen die Meinung von *Bond* insoweit zu begründen und zu vertheidigen, als erforderlich erscheint, nachzuweisen, dass die Geschwindigkeiten 20 bis 30 mal grösser waren, als nach *Bond's* Hypothese, und dass diese Geschwindigkeiten bei zunehmender Entfernung vom Kerne sich verminderten.

Um dies durchzuführen, werde ich alle für meinen Zweck allein stimmfähigen Messungen auf die Entfernung I., alle Beobachtungszeiten auf mittlere Wiener Zeit reduciren. Die Messungen *Mädler's* entnehme ich dem grossen Werke von *Bond*, die Angaben *Winnecke's* dagegen der wichtigen Abhandlung, in welcher man seine und *O. Struve's* Beobachtungen findet (*Mém. de l'académie impériale des sciences de St-Petersbourg*, VII. ser. T. II. 1860). t bedeutet die mittlere Wiener Zeit, ρ, ρ' die aus der Entfernung I. gesehenen Halbmesser der innern und äussern Sektoren. M, W, S seien die Angaben von *Mädler, Winnecke* und mir.

1858 Sept. 29	$t = 5^h 43^m 1$	$\rho' = 20'' 63$	$M.$
	7 4,8	$\rho = 12,20$	$M.$
	7 9,7	$\rho' = 25,39$	$M.$
	5 51,5	$\rho = 8,65$	$W.$
	5 51,5	$\rho' = 19,43$	$W.$
Sept. 30	$t = 5 28,2$	$\rho = 10,17$	$M.$
	5 38,1	$\rho' = 23,67$	$M.$
	5 47,5	$\rho = 10,14$	$W.$
	5 47,5	$\rho' = 18,51$	$W.$
Oct. 2	$t = 8 16,7$	$\rho' = 17,13$	$M.$

1858 Oct. 5	$t = 6^h 15^m 4$	$\rho = 6'' 15$	$W.$
	6 17,9	$\rho = 8,11$	$W.$
	6 17,9	$\rho' = 18,45$	$W.$
Oct. 6	$t = 7 51,1$	$\rho' = 15,33$	$M.$
Oct. 7	$t = 5 8,6$	$\rho = 9,87$	$M.$
	5 54,4	$\rho = 11,09$	$M.$
	7 10,2	$\rho = 15,10$	$M.$
	5 40,0	$\rho' = 11,16$	$W.$
	5 59,9	$\rho' = 21,65$	$W.$
Oct. 8	$t = 5 4,7$	$\rho = 11,44$	$M.$
	5 27,7	$\rho = 13,37$	$M.$
	5 26,1	$\rho = 12,77$	$W.$
	5 26,1	$\rho' = 20,44$	$W.$
Oct. 9	$t = 5 3,7$	$\rho = 12,65$	$M.$
	5 44,6	$\rho = 15,85$	$M.$
	6 37,0	$\rho = 15,71$	$W.$
	6 37,0	$\rho = 21,40$	$W.$
Oct. 12	$t = 5 33,8$	$\rho = 8,60$	$M.$
	5 42,8	$\rho = 9,11$	$M.$
	5 54,7	$\rho = 9,20$	$M.$
Oct. 13	$t = 4 59,9$	$\rho = 9,01$	$M.$
	5 4,9	$\rho = 9,11$	$M.$
	5 26,4	$\rho = 10,21$	$W.$
	5 26,4	$\rho' = 19,09$	$W.$
Oct. 14	$t = 5 12,0$	$\rho = 12,25$	$M.$

Betrachten wir *Mädler's* Messungen allein, so zeigen sie ausnahmslos die rasche Vergrösserung der Radien in kurzen Zeitintervallen, und zwar hat man:

Sept. 29 in $1^h 26^m$	Zunahme von $\rho = 4'' 76$
Octob. 7 $\rho = 2 2$	$\rho = 5,23$
$\rho = 8 0 23$	$\rho = 1,93$
$\rho = 9 0 41$	$\rho = 3,20$
$\rho = 12 0 21$	$\rho = 0,60$
$\rho = 13 0 5$	$\rho = 0,10$

Nenne ich γ, γ' die stündlichen scheinbaren Geschwindigkeiten, gesehen aus der Entfernung I. und ausgedrückt in Bogensekunden, so folgt aus *Mädler's* Messungen:

Sept. 29	$\gamma = 4'' 30$	$p = 4$
Octob. 7	$\gamma = 2,56$	$= 2$
$\rho = 7$	$\gamma = 3,82$	$= 4$
$\rho = 7$	$\gamma = 4,99$	$= 2$
$\rho = 9$	$\gamma = 4,06$	$= 2$
$\rho = 12$	$\gamma = 2,01$	$= 1$
$\rho = 12$	$\gamma = 0,87$	$= 1$
$\rho = 13$	$\gamma = 1,14$	$= 0,5$

Ohne Rücksicht auf Gewichte würde also die stündliche Bewegung im Mittel nahe $3''$ sein, und, ihre Gleichförmigkeit angenommen, im Tage $72''$ betragen. Nach den Gewichten dagegen $\gamma = 3'' 58$.

Werden die jedem Tage zugehörigen Werthe γ, γ' benutzt, und reducirt man *Mädler's* und *Winnecke's* Messungen auf

gewisse Epochen, z. B. 6^h oder 7^h Abends (stets Wiener Zeit), so verschwinden die grossen Unterschiede und man hat beispielsweise:

		Mittel
Sept. 29.	$\rho = 7''56$ <i>M.</i>	8''41
6 ^h Abds.	$\rho = 9,26$ <i>W.</i>	
	$\rho' = 21,84$ <i>M.</i>	20,76
	$\rho' = 20,40$ <i>M.</i>	
	$\rho' = 20,04$ <i>W.</i>	
	$\rho' = 20,04$ <i>W.</i>	
Octob. 7.	$\rho = 12,19$ <i>M.</i>	11,88
6 ^h Abds.	$\rho = 11,33$ <i>M.</i>	
	$\rho = 11,93$ <i>M.</i>	
	$\rho = 12,06$ <i>W.</i>	
Octob. 8.	$\rho = 14,68$ <i>M.</i>	14,90
6 ^h Abds.	$\rho = 15,27$ <i>M.</i>	
	$\rho = 14,76$ <i>W.</i>	
Oct. 12.	$\rho = 9,48$ <i>M.</i>	9,52
6 ^h Abds.	$\rho = 9,71$ <i>M.</i>	
	$\rho = 9,38$ <i>M.</i>	
Oct. 13.	$\rho = 10,15$ <i>M.</i>	10,35
6 ^h Abds.	$\rho = 10,14$ <i>M.</i>	
	$\rho = 10,85$ <i>W.</i>	

Octob. 5 lasse ich aus, weil sich kein Mittel bilden lässt, Octob. 9 desshalb, weil die Identität der gemessenen Radien nicht mehr nachzuweisen ist.

Vergleicht man die Mittelwerthe (μ) aus den einzelnen Messungen (m), welche auf die Epoche 6^h reducirt wurden, so findet man die folgenden übrigbleibenden Fehler:

$(\mu - m) =$	$(\mu - m) =$
Sept. 29 +0''85 <i>M.</i>	Octob. 8 +0''22 <i>M.</i>
-0,85 <i>W.</i>	-0,37 <i>M.</i>
-1,08 <i>M.</i>	+0,14 <i>W.</i>
+0,36 <i>M.</i>	Oct. 12 +0,04 <i>M.</i>
+0,72 <i>W.</i>	-0,19 <i>M.</i>
Octob. 7 -0,31 <i>M.</i>	+0,14 <i>W.</i>
+0,55 <i>M.</i>	Oct. 13 +0,20 <i>M.</i>
-0,05 <i>M.</i>	+0,21 <i>M.</i>
-0,18 <i>W.</i>	-0,50 <i>W.</i>

Diese Reste sind so klein, dass sie mit den besten Filar- und Heliometermessungen verglichen werden dürfen, und wie sie bei den Hilfsmitteln der russischen Beobachter zu erwarten waren. Sie zeigen, dass die genäherten Werthe γ und γ' nicht wohl illusorisch sein können, da sie nicht nur *Mädler's*

Messungen unter sich und mit denen *Winnecke's* in Uebereinstimmung bringen, sondern auch mit den Resultaten aus meinen Messungen allein, ebenfalls übereinstimmen. Diese letztern aber erfordern wegen der excentrischen Figur der Sektoren noch eine, jetzt nicht mehr genau zu ermittelnde Correction. Während die Beobachter *M.* und *W.* den Scheitelradius der Sektoren maassen, bestimmte ich gewöhnlich den Durchmesser der Figur durch Passagen in der Richtung der täglichen Bewegung. *O. Struve's* Messungen, die mehrfach sowohl diese, als die zuerst erwähnte Richtung berücksichtigen, gestatten annähernd eine Correction. Liegt der scheinbare Halbmesser r in der Richtung der täglichen Bewegung gegen Westen gerichtet (Pos. = 270°), der Radius r^0 aber senkrecht dagegen (Pos. = 180°) so finde ich aus *Struve's* Beobachtungen beiläufig:

$$\text{Octob. 5, } \left(\frac{r^0}{r}\right) = 0,85$$

$$= 7 \quad = 0,91$$

$$= 9 \quad = 0,90$$

Setze ich ein Mittel $\frac{r^0}{r} = 0,88$, und verbessere damit einige meiner Messungen, so geben diese, mit den Mittelwerthen aus *M.* und *W.* verglichen beispielsweise:

$$\text{Octob. 6 } (\mu - m) = -0''97$$

$$= 7 \quad = +1,68$$

$$= 8 \quad = -1,07$$

Diese Fehler sind zwar grösser als die obigen, aber meinem unvollkommenen Apparate ganz angemessen; sie zeigen zugleich, dass die Wiener Messungen, wenn auch weniger genau, doch zu der folgenden Untersuchung genügen.

Die Wiener Messungen sind in meiner Abhandlung über *Donati's* Cometen (deren Druck nebst dem der Cometen von 1860, 1861, 1862 bevorsteht) umständlich mitgetheilt. Ich werde daher der Kürze wegen, nur Mittelwerthe anführen, und erst ein Beispiel für Oct. 4 hersetzen. r und ρ sind die wirklich gemessenen und die auf die Entfernung I. reducirten Radien der Sektoren; ρ' die Werthe von ρ nach Ausgleichung durch eine gerade Linie; ρ'' dieselben nach Ausgleichung durch eine Curve.

Oct. 4 5 ^h 36 ^m 5	$r =$	5''38	$\pm 0''07 \dots 14$	Passag.	$\rho =$	3''25	$\rho' =$	4''60	$\rho'' =$	3''50
5 57,0	=	8,77	0,16...10	=	=	5,30	=	5,35	=	5,33
6 2,0	=	9,36	0,08...10	=	=	5,66	=	5,70	=	5,75
6 23,0	=	10,63	0,11...10	=	=	6,43	=	6,45	=	6,80
6 31,0	=	11,73	0,14...10	=	=	7,09	=	6,85	=	7,10
6 56,5	=	13,17	0,16...10	=	=	7,96	=	7,90	=	7,96
7 18,0	=	13,81	0,18...11	=	=	8,34	=	8,80	=	8,65
7 39,0	=	16,45	0,20...10	=	=	9,93	=	9,70	=	9,60
7 56,5	=	16,59	0,18...10	=	=	10,00	=	10,40	=	10,40
8 10,0	=	18,41	0,17...10	=	=	11,10	=	11,00	=	11,25
8 17,0	=	19,80	$\pm 0,43 \dots 10$	=	=	11,91	=	11,50	=	11,85

Um zu zeigen, dass alle Wiener Messungen (wie auch die Dorpater) ausnahmslos eine rasche Zunahme der Radien r angeben, diene die folgende Uebersicht:

Octob. 3	in $1^h 46^m$	Zunahme von $r = 7''2$
3	1 40	$r' = 5,7$
4	2 43	$r = 14,4$
4	1 42	$r' = 7,6$
5	1 45	$r = 10,0$
5	1 10	$r' = 6,0$
6	0 53	$r = 4,4$
7	2 11	$r = 13,5$
7	0 49	$r' = 3,3$
8	1 28	$r = 10,1$
9	0 42	$r = 9,0$
9	0 48	$r' = 4,3$
11	0 35	$r = 8,4$
11	0 22	$r' = 8,1 ::$
14	1 0	$r = 9,7$
15	0 50	$r = 7,4$
16	0 49	$r = 6,5$
17	0 17	$r = 2,6$

Um die aus der Entfernung I. gesehenen Werthe der stündlichen Variationen γ, γ' genauer aus meinen Beobachtungen zu bestimmen, kann man verschiedene Wege einschlagen. Bilde ich zunächst aus den Werthen ρ jedes Abends, ebenso aus denen von ρ' je 2 Hauptgruppen, so werden diese, als aus vielen Messungen zusammengezogene arithmetische Mittel, bedeutend an Sicherheit gewinnen, und ebenso wird man γ, γ' mit grösserer Genauigkeit erhalten. Jede Hauptgruppe wird nun das Mittel aus 40 bis 50 Passagen bilden. Dies Verfahren heisse (A).

Bilde ich aber aus den Werthen von ρ an jedem Abende 3 Gruppen, so wird es möglich sein zu entscheiden, ob sich in einem und demselben Strömungssector durchschnittlich kleinere Geschwindigkeiten ergeben, wenn ρ zugenommen hat. Dies zweite Verfahren werde durch (B) bezeichnet.

Auf dem Wege (A) finden wir zuerst folgende Resultate:

Octob. 3	$7^h 3^m 0$	bei $\rho = 8''85$	ist $\gamma = 2''15$
	7 0,0	$\rho' = 21,52$	$\gamma' = 2,55$
4	6 59,0	$\rho = 7,91$	$\gamma = 2,65$
	6 51,4	$\rho' = 22,06$	$\gamma' = 1,17$
5	6 26,0	$\rho = 9,54$	$\gamma = 5,85$
	6 35,2	$\rho' = 25,03$	$\gamma' = 2,96$
6	7 37,8	$\rho = 15,77$	$\gamma = 2,73$
7	6 56,7	$\rho = 18,89$	$\gamma = 2,80$
	6 31,8	$\rho' = 30,37$	$\gamma' = 2,19$
8	6 33,8	$\rho = 20,67$	$\gamma = 4,49$
9	7 19,2	$\rho = 8,07$	$\gamma = 7,88$
	7 4,6	$\rho' = 24,23$	$\gamma' = 2,30$
11	7 7,9	$\rho = 15,63$	$\gamma = 7,61$
	6 40,3	$\rho' = 27,01$	$\gamma' = 11,68 ::$
14	6 28,5	$\rho = 20,96$	$\gamma = 5,80$
15	6 11,5	$\rho = 22,65$	$\gamma = 5,90$
16	6 10,6	$\rho = 23,29$	$\gamma = 4,50$

Die zweite Angabe von Oct. 11 ist ganz auszuschliessen, da sie auf nur 3 zweifelhaften Messungen beruht. Die andern, nach der mittlern Grösse der Radien ρ geordnet, ergeben ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der Sektoren:

Bei $\rho = 7''9$	$\gamma = 2''65$	Bei $\rho = 20''9$	$\gamma = 5''80$
$= 8,1$	$= 7,88$	$= 21,5$	$= 2,55$
$= 8,8$	$= 2,15$	$= 22,1$	$= 1,17$
$= 9,5$	$= 5,85$	$= 22,6$	$= 5,89$
$= 15,6$	$= 7,60$	$= 23,3$	$= 4,50$
$= 16,0$	$= 2,73$	$= 24,2$	$= 2,30$
$= 18,9$	$= 2,80$	$= 25,0$	$= 2,96$
$= 20,6$	$= 4,49$		

Offenbar müsste man Gewichtszahlen annehmen, die sowohl von der Höhe des Cometen über dem Horizonte, als namentlich auch von der Grösse des Zeitintervalls abhängen, aus dem die stündlichen Geschwindigkeiten γ abgeleitet wurden. Dann hätte sich der Einfluss der extremen Werthe im Ganzen sehr vermindert, und der mittlere Betrag von γ würde an Sicherheit gewinnen. Es ist aber richtiger, den folgenden Weg zu wählen.

Sondert man nämlich γ von γ' , hält man sich also an die Werthe, die jedesmal einem und demselben Sector ρ angehören, und vergleicht diese mit den Werthen, welche sich auf den gleichzeitig sichtbaren zweiten Sector ρ' beziehen; vergleicht man also die zu ρ gehörigen Werthe γ mit den zu ρ' gehörigen γ' , so findet man aus dem vorhin Gegebenen:

Octob. 3	$\left(\frac{\gamma}{\gamma'}\right) = \frac{2''15}{2,55} = 0,84$
4	$= \frac{2,65}{1,17} = 2,18$
5	$= \frac{5,85}{2,96} = 1,97$
7	$= \frac{2,80}{2,19} = 1,28$
9	$= \frac{7,88}{2,30} = 3,42$
11	$= \frac{7,61}{11,68} = 0,65$

Aus dem früher schon angeführten Grunde muss Oct. 11 unberücksichtigt bleiben; die 5 andern Fälle haben also unter sich nur einen Fall, in welchem die innere Geschwindigkeit kleiner erscheint, als die äussere. Alle 5 indessen ergeben im Mittel $\left(\frac{\gamma}{\gamma'}\right) = 1,94$ oder, im innern Sector waren die Geschwindigkeiten ungefähr doppelt so gross, als im gleichzeitig sichtbaren äussern Sector.

Vergleichen wir jetzt das Verfahren (B), und betrachten stets nur den jedesmaligen innern (kleinen) Sector, so werden wir für je 2 Abstände vom Kerne neue Werthe der stünd-

lichen Geschwindigkeiten ableiten können, deren der Zeit nach frühere γ , die spätere γ_1 sein möge. Mit Uebergang der Neuberechneten Normalmittel genüge hier das Folgende.

In dem jedesmaligen innern Sector wären die beiden Werthe γ und γ_1 :

Octob. 4 bei $\rho = 6''7$	$\gamma = 2''86$	bei $\rho = 9''7$	$\gamma_1 = 2''57$
5	8,5	3,57	11,0
6	10,6	4,45	16,5
8	20,0	4,37	22,1
11	15,0	8,79	16,5
14	19,6	6,19	21,9
15	22,7	6,67	23,8

Anmerkung. Die frühere Auslassung von Octob. 11 bezog sich nur auf den äusseren Sector; diesmal handelt es sich um den innern.

Je nach den Umständen der Beobachtung und der Grösse der Intervalle, aus denen γ und γ_1 bestimmt wurden, sind nun beiläufig die Gewichte p angesetzt worden.

Octob. 4	$\left(\frac{\gamma}{\gamma_1}\right) = 1,07$	$p = 7$
5	1,04	8
6	5,17	1
8	0,95	5
11	1,30	3
14	1,14	3
15	2,85	3

Das einfache Mittel ergibt $\left(\frac{\gamma}{\gamma_1}\right) = 1,93$, zufällig mit dem frühern übereinstimmend; in Rücksicht auf die Gewichte erhält man aber $\left(\frac{\gamma}{\gamma_1}\right) = 1,39$, wobei Octob. 6 deshalb ein so geringes Gewicht erhielt, weil die Beobachtungen allzunahe am Horizonte stattfinden mussten.

Im Mittel ergibt sich demnach, dass nicht nur in den grössern (äussern) Sektoren die Geschwindigkeiten geringer waren, als in den innern, sondern auch, dass in einem und demselben Sector die Geschwindigkeit der Materie bei zunehmender Entfernung vom Kerne sich vermindert.

Zeigen sich nun auch die Werthe $\left(\frac{\gamma}{\gamma_1}\right)$ noch beträchtlich von einander verschieden, so ist doch kein ernstlicher Grund gegen das Vorhandensein solches Verhältnisses ausgesprochen. Dass Beobachtungsfehler auf diese Bestimmung sehr grossen Einfluss haben müssen, ist an sich klar, aber hüten wir uns, allzurasch anzunehmen, dass die Zahlen eine bessere Uebereinstimmung zeigen müssten, und stillschweigend Voraussetzungen zu machen, die ohnehin sich auf keine frühere Erfahrung, auf keine gesicherte Theorie zu stützen vermögen. Denn nicht darf übersehen werden, dass die Bewegung in einem Strömungssector verschieden ausfallen könne, wenn 2 oder 3 andere gleichzeitig, und mit ihrer Bewegung

vorhanden sind, auch wenn dazu noch eine neue Bildung ähnlicher Art, und mit grösserer Anfangsgeschwindigkeit, im Entstehen begriffen ist. Es gab für diesen Cometen eine sehr bestimmte Grenze, über welche hinaus (in der Richtung zur Sonne), scharfbegrenzte Bögen nicht mehr gesehen wurden, und schon bei 3000 Meilen Abstand vom Kerne war der, anscheinend von der Sonne bewirkte Widerstand so bedeutend, dass bereits vor dieser Grenze die Umrisse erloschen, deren Helle und Schärfe bei zunehmender Entfernung vom Kerne ähnlich sich schwächten, wie am Cometen von 1861.

Kehren wir nochmals zu den Werthen von γ zurück, so haben wir nach *Mädler's* und meinen Messungen die folgenden Angaben, ohne ρ und p speciell zu unterscheiden:

Sept. 29	$6^h 28^m$	$\alpha = 23''01$	$\gamma = 4''30$	$M. p = 2$
Octob. 3	7 0,0	21,52	2,55	S. = 1
5	3 7 3,0	8,85	2,15	S. = 1
6	6 59,0	7,91	2,65	S. = 4
8	6 51,4	22,06	1,17	S. = 2
9	6 26,0	9,54	5,85	S. = 4
10	6 35,2	25,03	2,96	S. = 3
11	7 37,8	15,97	2,73	S. = 2
12	7 6 56,7	18,89	2,80	S. = 3
13	7 6 4,4	12,03	3,19	M. = 2
14	7 6 31,8	30,37	2,19	S. = 2
15	8 6 33,8	20,67	4,49	S. = 4
16	8 5 16,2	12,40	4,99	M. = 3
17	9 7 19,2	8,07	7,58	S. = 2
18	9 5 24,1	14,12	4,06	M. = 3
19	9 7 4,6	24,23	2,30	S. = 1
20	11 7 7,9	15,63	7,61	S. = 2
21	12 5 43,8	8,97	1,44	M. = 2
22	13 5 1,9	9,06	1,14	M. = 2
23	14 6 28,5	20,96	5,80	S. = 1
24	15 6 11,5	22,65	5,90	S. = 1
25	16 6 10,6	23,29	4,50	S. = 1

Bildet man für jeden Tag, so weit mehrfache Angaben vorliegen, Mittelzahlen, so sind diese:

Sept. 29	$\gamma = 4''30$	$p = 2$
Octob. 3	2,35	1
5	1,91	3
6	4,40	4
8	2,73	2
9	2,74	4
10	4,70	4
11	5,04	3
12	7,61	1
13	1,44	2
14	1,14	2
15	5,80	2
16	5,90	1
17	4,50	1

Nach ungefährender Berücksichtigung der Gewichte stellt sich im Mittel γ , oder die stündliche scheinbare Geschwindigkeit der Ausströmung, gültig für die Entfernung L , auf $3''73$ oder $0,435$ Erdhalbmesser, woraus sich die wahre Geschwindigkeit

in einer Secunde = 395,6 Toisen ergibt. Da aber der wahrscheinliche Fehler hier mindestens ± 50 Toisen beträgt, so genügt es, diese Geschwindigkeit g in $1^s = 400$ Toisen oder 2400 Par. Fuss anzunehmen.

Durch die Kenntniss der Werthe γ und γ' wird es nun möglich, sowohl die Anfangsgeschwindigkeiten, als auch die Epochen der Neubildung der Sektoren, annähernd zu bestimmen. Indessen begnüge ich mich mit wenigen Andeutungen, weil von nun an ein unsicheres Gebiet beginnt. Die primitiven Geschwindigkeiten müssen zu 800 bis 1000 Toisen in der Secunde angenommen werden. Für die Anfangszeiten der aufeinander folgenden Sektoren (Ablösung von stoffförmigen Kugelschaalen) finde ich beispielsweise:

Sept. 29 1 ^h 1 ^m	Anfang von ρ'	Die Zwischenzeiten sind:
Octob. 2 22,6	= ρ'	93,5 Stunden
" 3 2,9	= ρ	4,3 "
" 3 12,9	= ρ'	25,1 "
" 4 4,0	= ρ	10,0 "
" 4 22,1	= ρ'	24,0 "
" 5 4,8	= ρ	15,1 "
" 6 1,8	= ρ'	21,0 "
" 6 16,7	= ρ	18,1 "
" 7 1,7	= ρ	23,4 "
etc. etc.		etc.

Um zu erkennen, nach welchen Intervallen sich etwa die Neubildungen wiederholten, vorausgesetzt nämlich, dass überhaupt eine regelmässige Periode existire, betrachtete ich jene Intervalle 93,5, 4,3, 25,1 etc. als Vielfache, irgend einer kurzen, noch unbekannten Periode. Ich ging nun von 5 Hypothesen aus, um zu versuchen, ob jene Periode zu finden sei, und, geleitet durch meine eigenen Beobachtungen, von der Ansicht, dass diese Perioden kurz sein müssten, und wenige Stunden nicht überschreiten dürften. Der Reihe nach setzte ich 4, 5, 6, 8, 11 Stunden als Hypothese für das Intervall zwischen je 2 Neubildungen der Sektoren. Für die erste Hypothese ergab sich beispielsweise:

Per. = 4,06 Stunden	Per. = 4,52 Stunden
4,30 =	4,68 =
4,18 =	4,18 =
5,00 =	3,72 =
4,00 =	3,93 =
5,03 =	3,75 =
4,20 =	ect.

Nachdem ich auf diese Weise die 5 Hypothesen geprüft, für jede ihrer Zahlreihen die Mittel bestimmt, und aus den Abweichungen der einzelnen Angaben vom Mittel die Quadratsummen der übrigbleibenden Fehler = Σ gefunden hatte, ergab sich:

Wien, 1862 Dec. 10.

1ste Hypothese. Periode: 4,27 Stund. aus 21 Angab. $\Sigma = 2,94$	
2te " " 5,15 " " 19 " 4,38	
3te " " 6,57 " " 17 " 6,49	
4te " " 8,17 " " 19 " 13,20	
5te " " 10,88 " " 16 " 19,13	

Ohne sich durch das rasche Wachsen von Σ im Urtheil bestimmen zu lassen, fällt die Wahl der Periode nicht schwer; denn wäre diese Periode z. B. nur 2 Stunden lang gewesen, so hätte nicht nur ich, sondern die Mehrzahl der Beobachter der Wahrscheinlichkeit nach solche Neubildungen öfter sehen müssen. (Ich selbst sah 2 derselben sicher). War die Periode aber 10 bis 12 Stunden, so ist damit das Erscheinen von bis 4 neuen Bögen an einzelnen Tagen unverträglich, alles unter der Voraussetzung, dass die Periode nahe constant, und dass meine Bestimmung der Geschwindigkeiten die richtige sei. Demnach halte ich für wahrscheinlich, dass die Sektoren in 4 bis 6 Stunden Zeitintervall sich bildeten, wofür *Bond* 4 bis 7 Tage gefunden hat.

Wenn ich jetzt versuchsweise 4 bis 5 Stunden für die Periode der Neubildungen setze, so zwar, dass in 24 Stunden sich je 5 neue Sektoren vom Kerne ablösten, und gegen die Sonne aufstiegen, so erhält man von Sept. 15 bis Octob. 15 schon 150 verschiedene Ausströmungen. Erinnerung man sich, dass zur Erklärung des dunkeln Raumes hinter dem Kerne, die Annahme vieler ineinandersteckender Nebel-Conoide genügt (wie neuerdings *Winnecke* nachgewiesen hat), so gewinnt meine Ansicht von der raschen Aufeinanderfolge der Sektoren schon aus diesem Grunde an Gewicht, ganz abgesehen von den Beweisen für die Grösse der stündlichen Bewegungen, die aus *Mädler's* und meinen Messungen abgeleitet wurden. Nach der Hypothese von *Bond* würden in dem oben bezeichneten Zeitraume nur etwa 5 bis 6 Neubildungen erfolgt sein.

Der Unterschied zwischen meinen Resultaten und denen von *Bond* ist also im Kurzen dieser:

1) Hypothese von *Bond*.

Stündliche Geschwindigkeit im Sector zwischen 0^h12 u. 0^h07
Tägliche " " " " 2,94 $\pm$ 1,60
(pag. 346)

Periode d. Neubildungen zwischen 4,7 u. 7,3 Tagen (p. 349)

2) Resultate aus *Mädler's* u. meinen Messungen.
Stündliche Geschwindigkeit im Sector = 3^h73 im Mittel aus allen.

Tägliche " " " " = 1 $\frac{1}{2}$ Bogenminuten.
Periode der Neubildungen in 4 oder 5 Stunden.

J. F. Julius Schmidt.