Name	No. in Mer. Cat.	RA. 1900	S. Decl. 1900	Epoch 1800 +	Pos. Angle	Dist.	Mgs.
Santiago 259	St. 10941	20 ^h 25 ^m	41° 14'	90.685	155° 1	2' 78	8-8
—	St. 10955	20 27	40 54	91.747	153.1	2.98	
Syd ₁ 323	—	20 33	63 4	91.739	224.5	4.34	7 ¹ / ₂ -8
				91.745	313.7	2.89	9-10
				91.767	312.1	—	
h 5222 ¹ / ₂	St. 11069	20 43	62 48	90.619	91.3	2.98	6-6
				90.687	91.9	2.55	
				90.715	91.3	2.38	
				90.726	91.1	2.56	
Santiago 263	St. 11128	20 52	81 5	90.742	246.7	4.57	7 ¹ / ₂ -9 ¹ / ₂
β 765	St. 11146	20 54	35 41	91.761	126.4	2 ±	7-12 ¹ / ₂
h 5235	St. 11178	21 1	84 43	90.742	264.3	3.51	7 ¹ / ₂ -7 ¹ / ₂
h 5258, θ Indi	St. 11299	21 13	53 52	90.619	284.9	4.73	6-8
				90.709	287.3	4.14	
				90.726	284.2	3.93	
				90.764	285.1	4.72	
β 767	St. 11359	21 21	42 59	90.709	140.9	3.07	6-8
				90.723	143.7	2.89	
				90.750	143.6	2.62	
				90.772	143.9	2.64	
				91.761	141.0	2.46	
h 5278, λ Oct.	St. 11435	21 36	83 11	90.769	72.9	—	5 ¹ / ₂ -8
				91.786	76.0	2.73	
h 5295 ² / ₃ *)	St. 11486	21 42	47 45	91.827	1.2	44.20	6 ¹ / ₂ -9
h 5319	St. 11643	22 6	38 48	91.761	119.0	2.03	7 ¹ / ₂ -7 ¹ / ₂
				91.797	117.1	1.67	
				91.835	116.0	1.86	
—	Cd. GC. 30717	22 27	61 20	91.797	124.3	2 ±	8 ¹ / ₂ -10
β 771, σ ² Gruis	St. 11805	22 31	41 6	91.808	257.8	2.55	6-13
				91.838	260.4	1.90	
γ Pisc. Austr.	St. 11918	22 47	33 24	90.709	269.0	—	6-8
				90.821	269.3	3.6	
β 1011	St. 11983	22 57	36 57	91.808	293.0	1.94	7-10
—	—	22 59	75 18	90.753	72.3	3.8	8-11
				91.115	73.9	—	
h 5381	—	23 0	75 33	91.115	54.2	3 ±	10-10
Jac. 238, θ Gruis	St. 12013	23 1	44 4	91.835	23.6	1.56	4 ¹ / ₂ -8
				91.838	22.7	0.99	
Syd ₁ 348	Cd. ZC. 23 ^h 884	23 34	69 45	91.769	349.5	—	8-9
				91.873	349.8	4.70	
• New	St. 12307	23 45	52 16	91.934	70.4	0.90	7-7 ¹ / ₂
h 5437	St. 12396	23 55	53 39	91.838	293.0	2.04	6 ¹ / ₂ -9 ¹ / ₂
Santiago 289	Cd. GC. 32356-7	23 55	67 14	91.873	261.9	3.80	8-9

Sydney Observatory 1892 Nov. 28.

H. C. Russell, Astronomer.

*) Slow motion.

Ueber die Eigenbewegung des Sterns BD. +44°1408.

Die hiesigen AG. Zonen lassen erkennen, dass der genannte zu den stärker bewegten Sternen gehört. Ausser den hiesigen Beobachtungen und der Position in Bessel's Zone 511 scheinen anderweitige Bestimmungen des Sterns nicht vorzuliegen.

Bei Bessel's Beobachtung ist die Uhrzeit in 6^h 5^m 4^s 29 und dementsprechend auch Weiss's Hora 6.128 zu corrigiren

(vergl. BB. IV S. XXXIV, XXXVII). Ich habe sie mit den neuen Reductionstafeln in der 37. Abtheilung der Königsberger Beobachtungen reducirt, von der Anbringung einer systematischen Correction (etwa nach Boss zu -0.09 und -1.0) aber abgesehen.

Die vorliegenden Beobachtungen lauten unter Berücksichtigung des Kreislagenunterschiedes für Aequ. 1875.0:

1)	Bessel Zone	511	9 ^m	6 ^h 7 ^m 45 ^s 12	+44° 45' 31".1	1832.10
2)	Bonn AG. Z.	174	8.6	43.90	19.28	1873.07
3)	"	422	8.5	43.84	15.12	1876.08
4)	"	871	8.6	43.75	13.82	1884.14
5)	"	1133	8.2	43.56	10.52	1891.15

Bei gleichem Gewicht für alle Bestimmungen ergibt sich die Eigenbewegung in den beiden Coordinaten zu

$$\Delta\alpha = +0.0268 \quad \Delta\delta = -0.343$$

oder im Bogen grössten Kreises zu

$$0.4462 \text{ im Pos.-W. } 140^\circ 14'.$$

Hiermit werden die Beobachtungen (Aequ. 1875.0, Epoche 1871.31) folgendermaassen dargestellt:

	R - B			
1)	44.07	17.7	+0.04	-0.3
2)	43.95	19.9	-0.08	+1.9
3)	43.97	16.8	-0.06	-1.2
4)	44.09	18.2	+0.06	+0.2
5)	44.09	17.3	+0.06	-0.6

Bonn 1893 Januar 22.

Fr. Deichmüller.

Elemente und Ephemeride des Cometen 1893... (Brooks 1892 Nov. 19).

Von F. Ristenpart.

Die mir zugänglichen Beobachtungen dieses Cometen habe ich zu 5 Normalörtern zusammengefasst, nämlich:

1892-93	Bb.	α 1890.0	$\Delta\alpha \cos \delta$	δ 1890.0	$\Delta\delta$
Nov. 26.5	17	196° 25' 33".3	—	+16° 1' 22".1	—
Dec. 22.5	9	216 53 49.9	+0.8	+43 9 43.2	-1.8
Dec. 29.5	5	236 23 52.0	+0.9	+57 4 38.6	-1.0
Jan. 10.5	2	315 28 58.2	+4.0	+62 32 38.8	+0.3
Febr. 5.5	2	0 54 37.0	—	+32 19 10.4	—

denen die Anzahl der zu je einem Normalort vereinigten Beobachtungen, sowie die Darstellung durch die unten folgenden Elemente im Sinne B—R beigelegt ist. Diese Beobachtungen umfassen einen Zeitraum von 76 Tagen und einen heliocentrischen Bogen von 75°. Daraus wurden mittels Variation von $\log M$ folgende Elemente erhalten:

$$\begin{aligned} T &= 1893 \text{ Januar } 6.529304 \text{ M. Z. Berlin} \\ \omega &= 85^\circ 12' 51''.0 \\ \Omega &= 185 \ 36 \ 29.0 \\ i &= 143 \ 51 \ 45.9 \\ \log q &= 0.0774148 \end{aligned} \quad 1890.0$$

Heliocentrische Aequatorealcoordinaten für 1890.0

$$\begin{aligned} x &= [0.0766924] \sin(v + 350^\circ 40' 48''.2) \sec^2 \frac{1}{2} v \\ y &= [9.7854603] \sin(v + 75 \ 6 \ 4.1) \sec^2 \frac{1}{2} v \\ z &= [0.0128071] \sin(v + 82 \ 37 \ 38.6) \sec^2 \frac{1}{2} v. \end{aligned}$$

Ephemeride für 12^h M. Z. Berlin.

1893	α app.	δ app.	$\log r$	$\log A$	H	1893	α app.	δ app.	$\log r$	$\log A$	H
März 1	0 ^h 38 ^m 32 ^s	+22° 33' 5"	0.1635	0.3177	0.62	März 11	0 ^h 48 ^m 17 ^s	+20° 23' 0"			
2	39 35	22 18.6				12	49 11	20 12.1			
3	40 37	22 4.1				13	50 4	20 1.5	0.1946	0.3731	0.42
4	41 37	21 50.1				14	50 57	19 51.1			
5	42 37	21 36.5	0.1738	0.3379	0.54	15	51 49	19 41.0			
6	43 36	21 23.3				16	52 41	19 31.2			
7	44 34	21 10.5				17	53 32	19 21.7	0.2051	0.3883	0.37
8	45 31	20 58.1				18	54 22	19 12.4			
9	46 27	20 46.1	0.1842	0.3563	0.47	19	55 12	19 3.3			
10	47 22	20 34.4				20	56 1	18 54.4			
11	0 48 17	+20 23.0				21	0 56 50	+18 45.7	0.2156	0.4021	0.33

Die Helligkeit 1892 Nov. 21.5 ist als Einheit für H angenommen worden.