Elemente und Ephemeride des Cometen 1881 V (Denning) für die Erscheinung 1890.

Von Dr. B. Matthiessen.

Unter Zugrundelegung des Elementensystems, welches A. N. 2903 p. 364 veröffentlicht wurde, und mit Berücksichtigung genäherter Jupiterstörungen für den ganzen Umlauf, sind die nachfolgenden Resultate erhalten worden. Im Jahre 1887 hat eine Annäherung des Cometen an Jupiter stattgefunden, doch sank die Entfernung der beiden Körper bei Weitem nicht auf ihr absolutes Minimum. Immerhin sind die Störungswerthe beträchtlich angewachsen, und es ist leider sehr zweifelhaft, ob der schwache Comet, bei der naturgemäss noch unsicheren Vorausberechnung und den sehr ungünstigen Verhältnissen seiner scheinbaren Lage zur Sonne, im nächsten Jahr überhaupt wird aufgefunden werden

können. Sollte die Auffindung wirklich nicht gelingen, so würde die spätere Berechnung dadurch äusserst erschwert werden.

Osculation 1890 April 16.0 M. Z. Berlin.

$$\left. \begin{aligned} M &= 356^{\circ} 18' 2'' \\ \omega &= 312 \ 33 \ 5.0 \\ \Omega &= 65 \ 30 \ 0.8 \\ i &= 6 \ 55 \ 25.9 \\ \varphi &= 55 \ 46 \ 18.4 \\ \mu &= 405'' 147 \end{aligned} \right\} \text{M. Aequ. 1890}$$

Das Perihel fällt auf Mai 9.

Ephemeride für 12^h M. Z. Berlin.

1890	α app.	δ app.	$\log r$	$\log A$	H	1890	α app.	δ app.	$\log r$	$\log A$	H
Jan. 17	18 ^h 36 ^m 12 ^s	— 24° 59' 6"	0.2721	0.4421	0.04	April 19	0 ^h 33 ^m 50 ^s	— 0° 3' 0"			
21	18 46 58	— 24 54.9				23	0 54 42	+ 2 20.9	9.8960	0.2166	0.60
25	18 58 5	— 24 47.1	0.2499	0.4221	0.05	27	0 15 55	+ 4 46.0			
29	19 9 33	— 24 36.0				Mai 1	1 37 23	+ 7 9.7	9.8740	0.2194	0.65
Febr. 2	19 21 24	— 24 21.5	0.2262	0.4007	0.06	5	1 59 1	+ 9 29.9			
6	19 33 37	— 24 3.1				9	2 20 46	+ 11 44.5	9.8669	0.2274	0.65
10	19 46 14	— 23 40.4	0.2008	0.3782	0.07	13	2 42 31	+ 13 51.1			
14	19 59 19	— 23 13.0				17	3 4 13	+ 15 48.6	9.8764	0.2394	0.59
18	20 12 50	— 22 40.5	0.1735	0.3546	0.09	21	3 25 45	+ 17 35.5			
22	20 26 49	— 22 2.4				25	3 47 3	+ 19 10.4	9.9003	0.2543	0.49
26	20 41 16	— 21 18.2	0.1440	0.3305	0.11	29	4 8 1	+ 20 31.8			
März 2	20 56 13	— 20 27.6				In der Columnne H befinden sich die Werthe von $1 : r^2 A^2$; die entsprechenden Grössen waren, bei der Auffindung des Cometen durch Denning 1881 Oct. 4 = 2.5 und bei der letzten Strassburger Beobachtung, vom 24. Nov., = 0.45. Einer Aenderung von ± 1 Tag im Perihel entsprechen folgende Aenderungen in den geocentrischen Coordinaten:					
6	21 11 40	— 19 29.9	0.1122	0.3063	0.15						
10	21 27 35	— 18 24.6									
14	21 44 1	— 17 11.4	0.0782	0.2830	0.19						
18	22 10 59	— 15 49.8									
22	22 18 27	— 14 19.6	0.0420	0.2615	0.25						
26	22 36 25	— 12 40.6									
30	22 54 52	— 10 53.0	0.0040	0.2430	0.32						
April 3	23 13 52	— 8 56.3									
7	23 33 19	— 6 51.9	9.9651	0.2287	0.41						
11	23 53 7	— 4 40.8									
15	0 13 17	— 2 24.2	9.9279	0.2197	0.50						

Karlsruhe 1889 Dec. 11.

Der Mondkrater Plinius.

Von Dr. Hermann F. Klein.

In Nr. 2940 der A. N. macht Herr Prof. Thury noch einige Mittheilungen über seine Wahrnehmungen am Centralkrater des Plinius und giebt dazu eine Erklärung des veränderten Aussehens dieses Objectes. Was zunächst die Thatsachen selbst anbetrifft, so ist die von Herrn Thury Nov. 1 wahrgenommene und gezeichnete Gestalt des Centralkraters und des ihm anhängenden Nebenringes, Oct. 30 5^h–6^h M. Z. Köln ebenfalls von mir wahrgenommen worden, als

die Morgenlichtgrenze über Kalippus und Silberschlag ging. Dieses Aussehen des Centralgebirges ist aber gar nichts neues, denn es findet sich schon auf der Mondkarte von Schmidt. Wenn Mädler und Lohrmann auf ihren Karten diesen Doppelkrater nicht haben, so beweist dies nur, dass sie den Centralberg nicht häufig genug beobachteten, um seine wahre Gestalt zu erkennen. Denn schon 1822 und 1826 hat Gruithuisen die beiden Krater gesehen und wie