IV.

In einem Gebiete des Himmels begegnen sich eigenartigerweise die Probleme der 3 Nebelarten. Unweit des südlichen Himmelspols finden sich zwei größere leuchtende Stellen, dem Anblick nach abgesprengte Teile der Milchstraße. Sie heißen die große und die kleine Magellanische Wolke. Alle die Milchstraße besonders kennzeichnenden Gestirnsarten finden sich in ihnen: kurzperiodisch Veränderliche, Wolf-Rayet-Sterne, Sternhaufen, chaotische und planetarische Nebel. Der große, vor etwa 2 Jahren verstorbene, amerikanische Astronom *E. C. Pickering* faßt diese Wolken als die uns nächsten Spiralnebel auf, gleichartig unserer Milchstraße. Neuerdings ist man aber davon abgekommen und subordiniert sie unserem Weltsystem. *Shapley* ermittelte nämlich ihre Entfernung zu 60 000 Lichtjahren, durch die Methoden, die an Hand der Ergebnisse für die veränderlichen Sterne ihn zu den Abständen der kugelförmigen Sternhaufen geführt haben²⁸⁾. Dann hat *Wilson* in dem neuen Lickbande die Radialgeschwindigkeiten von 17 planetarischen Nebeln in der großen und 1 in der kleinen Wolke bestimmt. Letztere ist +168 km/sec, erstere sind im Mittel +276 km/sec und schwanken je nach dem Ort an der Sphäre zwischen +251 und +309 km/sec. *Hertzsprung* zeigte nun²⁹⁾, daß die Annahme, alle Nebel in beiden Wolken bewegen sich mit gleicher Geschwindigkeit parallel zueinander, zu einer guten gemeinsamen Darstellung aller Einzelwerte führt. Aus verschiedenen Gründen kann man nun annehmen, daß die totale räumliche Bewegung 625 km/sec dieser Nebel in bezug auf die Sonne und unsere nähere Umgebung, deren Fluchtpunkt westlich vom Orion liegt, identisch mit der des Gesamtsystems der Wolken ist. Beide Wolken sind danach wirklich isolierte Teile unserer Weltinsel, der Milchstraße.

Wird diese schließlich ganz das Einende sein, indem alles kosmische Geschehen vor sich geht, das Gebiet aller physikalischen Erscheinungen (auch im Sinne der allgemeinen Relativitätstheorie)? Schreitet die Forschung ebenso schnell weiter, wie in dem letzten Jahrzehnt, wie es betreffs der Nebelflecke die obige Darstellung zeigen wollte, so wissen wir vielleicht schon bald die Antwort.

Zur Kenntnis des Selen.

Von Wilhelm Späth, Kiel.

Seit der Entdeckung der lichtelektrischen Eigenschaften des Selen im Jahre 1873 erfreut sich dieser Stoff dauernd eines großen Interesses. Die Möglichkeit der Lösung der verschiedensten Probleme mittels einwandfreier Selenzellen spornte immer wieder zu theoretischen und

praktischen Untersuchungen an und es entstand in den letzten Jahrzehnten eine reichhaltige Selenliteratur (1). In den meisten Arbeiten wird der Zusammenhang der Leitfähigkeit des Selen mit der Belichtung unter Variation irgendwelcher Faktoren untersucht. Leider sind die Ergebnisse der einzelnen Arbeiten bei der großen Anzahl der bestimmenden Faktoren nur schwer oder gar nicht miteinander vergleichbar. Auch ist die Formierung der Selenzellen — Überführung des amorphen Zustandes in die kristallinische Modifikation durch Erhitzen — mehr oder weniger dem Zufall unterworfen. Im allgemeinen erhält man durch geeignete Wahl des Tempos der Erwärmung und Abkühlung Zellen vom Typus Fig. 1a (harte Zellen) bzw. Fig. 1b (weiche Zellen). Im ersten Fall steigt die Leitfähigkeit bei Belichtung mit der Zeit allmählich bis zu einem Grenzwerte an, im zweiten Fall dagegen erreicht die Leitfähigkeit schon in den ersten Sekunden der Belichtung ihren Maximalwert, um langsam absinkend einem Grenzwert zuzustreben (Ermüdung). Bei Verdunklung erreichen die weichen Zellen den Anfangszustand bedeutend rascher als die harten Zellen. Zur Erklärung dieses eigentümlichen Verhaltens der Selenzellen sind mehrere Theorien aufgestellt worden, auf die nicht näher eingegangen werden kann. In letzter Zeit gewinnt jedoch die Ansicht, daß es sich, abgesehen von einer Anzahl Nebenerscheinungen, um einen inneren lichtelektrischen Effekt handelt, die Oberhand.

Eine weitere Klärung der mannigfaltigen Fragen war nur durch Messungen aus ganz anderen Gesichtspunkten heraus möglich. Bereits *Lenard* und *Saeland* (2) fanden an Erdalkaliphosphoren einen engen Zusammenhang zwischen Phosphoreszenz und lichtelektrischer Wirkung. *Stark* und *Steubing* kamen zum Ergebnis, daß bei organischen Substanzen lichtelektrischer Effekt und Luminiszenz genetisch zusammenhängen. Ferner fand *Pauli*, daß bei der Herstellung von Phosphoren Selen sehr wohl die Stelle des Schwefels einnehmen kann. Diese Arbeiten, die aus einer Anzahl Aufsätze mit ähnlichen Ergebnissen angeführt sein mögen, machen es sehr wahrscheinlich, daß bei Belichtung des Selen eine Abspaltung von Elektronen aus dem Atomverband stattfindet. Durch diese Abspaltung von Elektronen ist jedoch auch eine Änderung des elektrischen Moments der Elementardipole bedingt. Es ist also zu hoffen, daß an Selen, und überhaupt an lichtelektrischen Stoffen, bei Belichtung gemeinsam mit der Änderung der Leitfähigkeit eine Änderung der Dielektrizitätskonstanten nachzuweisen ist. In der Tat konnte im Herbst 1919 das Vorhandensein des vermuteten Effekts vom Verfasser nachgewiesen werden (3).

Für die Versuche wurde eine dünne Selen-schicht zwischen zwei leitende Platten gebracht, von denen die eine für Licht durchlässig ist. Die

²⁸⁾ Vgl. Naturwissensch. 1921, S. 769.

²⁹⁾ Monthly Notices Bd. 80, S. 782, 1920/21.

Kapazität der verwandten Zellen betrug etwa 100 cm, ihr Ohmscher Widerstand 10^6 Ohm. Die Versuchsanordnung bestand im wesentlichen aus drei aufeinander abgestimmten Schwingungskreisen, einem Generatorkreis für ungedämpfte Schwingungen (Röhrensender in Rückkopplung), einem Zwischenkreis und einem Detektorkreis. Die Meßfrequenz mußte in Rücksicht auf die Leitfähigkeit der Zellen verhältnismäßig hoch gewählt werden und betrug ca. 10^6 Schwingungen pro Sek. Mit Hilfe eines Galvanometers im Detektorkreis konnte die Resonanzkurve des sehr schwach gedämpften Zwischenkreises aufgenom-

Dunkelwertes an. Der endgültige Kapazitätswert stellt sich unter ähnlichen Trägheitserscheinungen ein wie die Leitfähigkeit, insbesondere weisen die weichen Zellen ähnliche Ermüdungserscheinungen auch für den Kapazitätseffekt auf. Der Verlauf der Kapazität wird für die beiden Zellentypen ebenfalls durch Fig. 1 a und Fig. 1 b veranschaulicht.

Anschließend an diese Versuche sei noch in kurzen Zügen eine Theorie gegeben, deren Resultate das Verhalten der Selenzellen sehr gut wiedergeben. Es wird in den Zellen ein Gleichgewicht angenommen zwischen elektronenschaf-

Fig. 1. Die Leitfähigkeit der Selenzelle steigt bei Belichtung bis zu einem Grenzwert an.

Fig. 2. Zum Ermüdungseffekt.

men werden. Änderte sich die Kapazität der im Generatorkreis eingeschalteten Zelle und damit die Frequenz, so durchlief der Ausschlag des Galvanometers ein Stück der Resonanzkurve. Durch diese Anordnung war eine kontinuierliche Aufnahme der Kapazitätsänderung bei Belichtung möglich.

Als *Hauptergebnis der Versuche* ist festzustellen, daß an jeder Zelle bei Belichtung, parallel mit der Änderung der Leitfähigkeit, eine *Änderung der Kapazität* stattfindet. Während die Leitfähigkeit etwa zwei- bis dreimal größer wird, steigt die Kapazität um 5–10 % ihres

enden und elektronenverbrauchenden Ereignissen. Bei Belichtung wird dieses Gleichgewicht gestört und die für Leitfähigkeit und Kapazität erhaltenen Kurven stellen „Einschaltvorgänge“ dar, die zu einem neuen Gleichgewichtszustand führen. Wesentlich ist die Berücksichtigung des Umstandes, daß durch das angelegte elektrische Feld, zur Bestimmung der Leitfähigkeit, ein sekundärer elektronenverbrauchender Faktor auftritt, der die zu verfolgende primäre Gleichgewichtseinstellung mehr oder weniger modifiziert. Unter der Annahme einer zeitlich gleichbleibenden Elektronenerzeugung läßt sich für den reinen Lichteffect die Gleichung:

$$\frac{dn}{dt} = w N_0 - \alpha n^2 - b n$$

aufstellen, wo n die Anzahl der in der Volumeneinheit vorhandenen freien Elektronen, w die Wahrscheinlichkeit des Zerfalls eines Atoms infolge Belichtung, N_0 die Anzahl der neutralen Atome in der Volumeneinheit, α den Wiedervereinigungskoeffizienten und b den Bruchteil der durch Leitung verbrauchten Elektronen bedeutet. Sowohl für den zeitlichen Verlauf der Leitfähigkeit bei Belichtung und Verdunkelung als auch für die Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der Belichtungsintensität werden aus dieser Gleichung

chung Kurven errechnet, die dem Verhalten der Selenzellen sehr nahe kommen.

Auf Einzelheiten sei nicht weiter eingegangen. Nur auf einen *wichtigen Umstand* sei kurz aufmerksam gemacht. Bei der Untersuchung der selektiven Eigenschaften eines lichtelektrischen Stoffes, z. B. in bezug auf die Frequenz des auffallenden Lichts, tritt w als Funktion der Wellenlänge $w = w(\lambda)$ in obige Gleichung ein. Es ist ersichtlich, daß der primäre Effekt der Elektronenauslösung durch Licht verschiedener Wellenlänge, „gemessen“ durch die Größe des von einer bestimmten Spannung durch die Zelle getriebenen Stromes, in der beobachteten Abhängigkeit des Stromes von der Wellenlänge nur bedingt zum Ausdruck kommen kann. Bei kleinen Spannungen erscheint der selektive Effekt nur angedeutet, mit wachsender Spannung dagegen tritt der verwischende Einfluß der Wiedervereinigung zurück, der selektive Effekt erscheint ausgeprägter.

Große Schwierigkeiten bereitet jeder Theorie die Erklärung der *Ermüdung*. Es wurden meist die Absorptions- bzw. Leitfähigkeitsverhältnisse in sehr dünnen Schichten verantwortlich gemacht. So versucht *Sperling* (4) die Ermüdung durch zeitliche Veränderung der Absorption in den Oberflächenschichten zu erklären und nennt die Ermüdung deshalb auch „Schatteneffekt“. *Ries* (1) dagegen sucht einen wesentlichen, bestimmenden Faktor in der Tatsache, daß der spezifische Widerstand dünner Oberflächenschichten bis zu einer Schichtdicke von 10^{-5} mm konstant bleibt, mit abnehmender Schichtdicke dagegen sehr rasch anwächst. Daß diese Erklärungen nicht stichhaltig sind, beweist die Tatsache, daß weiche Zellen Ermüdungserscheinungen auch für Röntgenstrahlen zeigen, wobei dünne Oberflächenschichten nicht in Frage kommen können. Ferner zeigen Zellen, bei denen die Elektronen parallel zu den Kraftlinien des angelegten Feldes wandern, ebenfalls Ermüdung, trotzdem sich keine dünnen, stromführenden Oberflächenschichten ausbilden können. Eine *befriedigende Erklärung* ist also bis jetzt *noch nicht gefunden* und könnte geradezu als Kriterium einer annehmbaren Theorie gelten.

Die oben angegebene Formel bleibt eine Erklärung der Ermüdung schuldig, da die Elektronenerzeugung als zeitlich konstant angesehen wurde. Ist jedoch w aus irgendwelchen Ursachen groß (geeignete Formierung, große Lichtintensität) und a sehr klein (große Spannung), so kann die zeitliche Abnahme der neutralen Atome und damit die Abnahme der in der Zeiteinheit neu geschaffenen Elektronen nicht mehr vernachlässigt werden. Die Berücksichtigung dieses Abfalls der Elektronenerzeugung führt auf die Gleichung einer Kurve, deren Verlauf im wesentlichen bedingt ist durch die Kombination $e^{-wt} - e^{-bt}$. In Fig. 1 ist dieser Ausdruck für einen bestimmten Wert von w und einige Werte von b dar-

gestellt. Im linken Teil der Fig. 2 ist die Entstehung der Kurven ausführlich gezeichnet, im rechten Teil dagegen sind die Kurven durch Verkürzung der Zeitachse dem in Fig. 1 gewählten Maßstab näher gebracht. Die Kurven bringen, wie ersichtlich, den Ermüdungseffekt gut zum Ausdruck. Aus Fig. 2 lassen sich ohne weiteres eine Anzahl von Folgerungen für den Ermüdungseffekt ableiten, die mit den bekannten Eigenschaften der Selenzellen sehr gut übereinstimmen. Auf die wichtigsten Folgerungen sei kurz hingewiesen.

Hohe Meßspannung begünstigt das Auftreten der Ermüdung. Je kleiner die angelegte Spannung dagegen im Vergleich zur Sättigungsspannung ist, desto weniger ausgeprägt ist die Ermüdung, um bei genügend kleiner Spannung ganz zu verschwinden. Dies ist für manche Zwecke wichtig, denn es ist durch geeignete Wahl der Meßspannung möglich, Zellen zu erhalten, die bei Belichtung beinahe augenblicklich den neuen Leitwert annehmen und denselben auch beibehalten.

Je größer die Wahrscheinlichkeit w der Ionisierung der neutralen Atome ist, desto ausgeprägter ist die Ermüdung. Licht verschiedener Wellenlänge, aber gleicher Intensität, bedingt infolge des selektiven Effekts eine sehr verschiedene Ausbildung der Ermüdung. Ferner muß mit abnehmender Lichtintensität die Ermüdung verschwinden.

Jeder Einfluß, der die Lichtempfindlichkeit vermindert, bewirkt eine Verkleinerung der Ermüdung. So z. B. muß bei hohen Temperaturen, denen eine kleine Lichtempfindlichkeit entspricht, die Ermüdung weniger ausgeprägt sein als bei tiefen Temperaturen. Wie durch geeignete Wahl der Verhältnisse eine weiche Zelle „hart“ gemacht werden kann, so muß es nach obigen Ausführungen möglich sein, eine harte Zelle durch Anlegung einer entsprechenden Spannung und Bestrahlung mit Licht geeigneter Frequenz und Intensität „weich“ zu machen, wobei tiefe Temperaturen noch begünstigend wirken.

In ähnlicher Weise läßt sich das Verhalten des Kapazitätseffekts darstellen. Während jedoch die Leitfähigkeit nur durch die endgültig abgelösten Elektronen bestimmt wird, ist die Dielektrizitätskonstante stets ein Ergebnis aller insgesamt vorhandenen Dipole. Es liefern also gleichzeitig neutrale und ionisierte Atome Beiträge zur Dielektrizitätskonstanten. Wie für den Leitfähigkeitseffekt, so lassen sich auch für den Kapazitätseffekt eine Reihe von Folgerungen aus entsprechend aufgestellten Formeln ableiten, die die Eigenschaften des Kapazitätseffekts gut zum Ausdruck bringen.

Literatur:

1. Zusammenfassende Darstellung: *Ries*, Das Selen.
2. *Lenard* und *Saeland*, A. d. Phys. 1909, S. 476.
3. Inzwischen ist ein ähnlicher Effekt an Sidotblendephosphor festgestellt worden. Vgl.: *B.*

- Gudden u. R. Pohl*, Zur Kenntnis des Sidotblende-phosphors, *Ztsch. f. Physik I*, S. 365.
4. *Sperling*, Beiträge zur Kenntnis der Selenzellen. Diss. Göttingen 1907.

Besprechungen.

Rohr, M. v., Die Brille als optisches Instrument.
3. Aufl. (Handbuch der gesamten Augenheilkunde, begründet von A. Graefe und Th. Saemisch, fortgef. von C. Heß, herausgegeben von Th. Axenfeld und A. Elschnig.) XIV, 254 S. und 112 Textabb. Berlin, Julius Springer, 1921. Preis geh. M. 66,—; geb. M. 78,—.

Das Buch erschien zuerst 1911 als Teil der zweiten Auflage des erwähnten Handbuchs; jetzt bei dessen dritter Auflage zum zweiten Male; daß der Verlag es selbst als 3. Auflage bezeichnet, kann zu Irrtümern führen.

Der Umfang des Buches ist ungefähr um die Hälfte vergrößert, einmal infolge neuer Brillenformen und Untersuchungen, aber auch durch die genauere Kenntnis der Brillengeschichte. — Beides ist zu einem merklichen Teile das Werk des Verfassers des Buches.

Die Anordnung ist insofern geändert, als der Verfasser zu der Überzeugung gelangt ist (VIII—IX), daß es „ein vergebliches Unterfangen sein würde, eine allgemeine Brillengeschichte zu schreiben“. Er hat deshalb der sachlichen Behandlung jeder einzelnen Frage eine geschichtliche beigefügt und den früheren geschichtlichen Teil hier mit verarbeitet.

Das Werk beginnt nach einer Einleitung und der Definition der Brille mit einer Darstellung der minder wichtigen Augenhilfen (Brillen zum Schutz gegen verschiedene Schädigungen, Taucherbrillen usw.). — Bei diesem, vielleicht weniger optisch als kulturgeschichtlich wichtigen Abschnitte findet sich eine wenig bekannte früher übliche Brille zum Schutz bei Eisenbahnfahrten, deren Kenntnis der Verfasser einer persönlichen Mitteilung verdankt, ein Beispiel für die Berechtigung seiner Mahnung im Vorworte, ihm durch öffentliche oder briefliche Mitteilungen behilflich zu sein. — Der Träger der erwähnten Brille muß freilich fürchterlich ausgesehen haben!

Auf einige Betrachtungen über die Randgestaltung der Brillengläser folgt der Hauptteil, der wieder aus zwei Hälften besteht: die Augenhilfen für Augen ohne und für solche mit Astigmatismus. Beide Arten werden zunächst ihrer dioptrischen Wirkung nach (mit dem ruhenden Auge) betrachtet und sodann wird ihre Verbindung mit dem bewegten Auge (Astigmatismus, Bildfeldwölbung und Verzeichnung) bei schiefem Durchblick untersucht. Einen Anhang bilden beide Male die dezentrierten Brillen für Schielende. Im einzelnen sei folgendes angeführt:

Brillen in Verbindung mit dem nicht astigmatischen ruhenden Auge. Behandelt werden die Begriffe des Scheitelbrechwertes, des Hauptpunktbrechwertes, der Dioptrie; der Einfluß der Brille auf die Bildgröße, die Sehschärfe, die Akkommodation; ferner die Wirkung einer Verschiebung der Brille. — Außer den Formeln sind Rechnungen und Schichtendarstellungen gegeben, die freilich nur für achsenametropische und für linsenlose Augen durchgeführt sind. — Es folgt die Einteilung der Brillen in Nahbrillen und Lupenbrillen (für Alterssichtige) einerseits und Fernbrillen andererseits. Sodann eine Behandlung des Unterschieds von Brennweite und Schnittweite sowie des Einflusses der Durchbiegung auf diesen Unterschied. Nachdem die

verschiedenen Durchbiegungen vom technischen Standpunkte aus besprochen sind, folgen die aus mehreren Linsen zusammengesetzten Brillen, namentlich die Fernrohrbrillen mit vergrößertem Netzhautbilde, die zwar schon früher gelegentlich verfertigt wurden, aber erst in neuerer Zeit unter dem Einflusse des Verfassers zu einer häufig benutzten Hilfe für Schwachsichtige geworden sind. Den Schluß bilden die Brillen, die ohne Betätigung der Akkommodation ein Sehen in verschiedenen Entfernungen erlauben (Vorhänger, Zweistärkenbrillen). Die Abteilungen dieses Abschnitts, bei denen durchweg die Gullstrandsche Dioptrienrechnung angewandt ist, sind der ersten Auflage gegenüber vielfach bereichert.

Brillen für nicht astigmatische Augen mit Berücksichtigung der Augenbewegung. — Die Grundlage der Betrachtung dieses Abschnittes bildet der astigmatische Fehler, der bei Bewegung des Auges um seinen Drehpunkt entsteht, also bei schiefem Durchblick durch das Brillenglas; sowie seine Hebung durch passende Durchbiegung. — Die Durchführung knüpft an die Namen W. H. Wollaston, F. Ostwald, M. Tscherning, A. Gullstrand an. — Die gleichzeitige Hebung des Astigmatismus und der Bildfeldfehler (die auf die Schärfenkugel bezogen werden müssen) ist meist unmöglich, und die Verzeichnung kann überhaupt bei einfachen Brillen mit Kugelflächen nicht beseitigt werden. — Der ersten Auflage gegenüber sind hauptsächlich zwei Zusätze zu beachten: geschichtlich ist uns die allmähliche Verbreitung der Kenntnis des Augendrehpunkts genauer bekannt geworden (hauptsächlich durch Aufsätze und Anregungen des Verfassers), und außerdem ist besonders durch E. Weiß die Bedeutung einer falschen Annahme des Ortes des Augendrehpunktes untersucht worden. Die Grundsätze dieses Abschnittes werden auf alle im vorhergehenden Abschnitte behandelten Brillen angewandt. — Bei den einfachen Brillen werden die passenden Durchbiegungen (Tscherningsche Kurve) und die Starbrillen mit einer asphärischen (deformierten Kugel-) Fläche (Gullstrandsche Starbrillen) besprochen.

Das bis dahin gesagte wird nun auf die Brillen für astigmatische Augen angewandt. Hier tritt an Stelle einer Kugelfläche eine zweifach symmetrische Zylinder- oder torische (Wurst- und Tonnen-) Fläche. (Beide Grenzflächen so zu machen, bietet keine praktischen Vorteile.) — Für das ruhende Auge wären alle möglichen solchen Flächen gleichwertig; die Berücksichtigung der Bewegung des Auges gibt Veranlassung für jeden Fall (nach der auf H. Boegehold zurückgehenden Behandlung) eine bestimmte torische Fläche mit einer bestimmten Kugelfläche, bei Starbrillen mit einer asphärischen Fläche, zusammenzusetzen. — Man hat die astigmatischen und anderen Fehler nur in den beiden Symmetrieebenen behandelt, die Grundzüge waren schon vor zehn Jahren bekannt, aber Rechnungen und Versuche der wissenschaftlich arbeitenden optischen Werkstätten haben unsere Kenntnisse doch erheblich erweitert. Hier werden die Namen H. Boegehold, J. Spanuth, E. Weiß genannt.

Auf diese Sonderbehandlung der Brillenarten folgt noch die gemeinsame Betrachtung besonderer Fehler. — Von den Farbenfehlern kommen die in der Achse bei Brillen nicht in Frage. — Die Vergrößerungsunterschiede sind bei einfachen Brillen nicht zu heben — die genaue Feststellung verdankt man wieder E. Weiß —, die zusammengesetzten Starbrillen haben sich bis jetzt nicht einbürgern können; doch geben